

آشنایی با...

هیپوتروئیدیسم^۱

● فرزانه اسلامی / کارشناس ارشد کودکان استثنایی

عقب ماندگی رشد و تحول ذهنی و جسمی از نشانه های هیپوتروئیدیسم مادرزادی محسوب می شود. نشانه ی اولیه این نقص عبارت است از استمرار طولانی نابهنجاری و یرقان در کودکان تازه متولد شده طی اولین ماههای زندگی. علائم مرضی این بیماری عبارت اند از: مشکلات تغذیه، ناکامی در رشد، یبوست، گریه خشن و بیحالی، به علاوه می توان از تورم شکم، خستگی پوست، رشد ضعیف مو و ناخن و تأخیر در نمو دندان نیز نام برد.

هر چند درمان فوری با هورمون تیروئید، در اوایل خردسالی اغلب موفقیت آخورده است، اما درمان بیمار مبتلا به هیپوتروئیدیسم کاملاً پیشرفته و عقب ماندگی ذهنی دائمی، در بسیاری موارد موفقیتی در بر نداشته است. همچنین در بزرگسالان، با درمان جایگزینی، نمی توان بر بیماری فائق آمد و ممکن است درمان باعث پرخاشگری و یا سایر رفتارهای ناخوشایند گردد. داروهایی که بیمار را فعال نگاه می دارد مشروط بر اینکه اثرات جانبی نداشته باشد، مناسب است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

زیر نویس:

1. hypothyroidism



منبع: رابینسون، نانسی ام، رابینسون، هالبر شابی (۱۳۶۸). کودکان عقب مانده ی ذهنی (فرهاد ماهر / مترجم). تهران: انتشارات آستان

قدس رضوی