

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال ۲۹، شماره اول، بهار ۱۳۹۳، شماره پیاپی ۱۱۲

S.A. Masoodian
M. S. Keikhosravi Kiany
F. Rayat pish

سید ابوالفضل مسعودیان، استاد اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان
محمدصادق کیخسروی کیانی، دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان
فاطمه رعیت پیشه، دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان

E-mail: porcista@yahoo.ie

شماره مقاله: ۹۴۱
صص: ۷۳-۸۸
پدیرش: ۹۲/۸/۲
وصول: ۹۱/۱۲/۲

معرفی و مقایسه پایگاه داده اسفزاری با پایگاه‌های داده GPCP، GPCP و CMAP

چکیده

بارندگی نقش مهمی در چرخه آب و انرژی جهانی بازی می‌کند. خاستگاه علاقه‌مندی ما نسبت به واکاوی بلند مدت ریزش‌های آسمانی به علت ارزیابی تغییر اقلیم و اثرهایی است که این رویداد بر جنبه‌های گوناگون زندگی ما می‌گذارد. بر مبنای چنین نیازی، سازمان‌های ملی و فراملی آغازگر بسیاری از پژوهش‌ها و برنامه‌های پایشی شده و از آنها پشتیبانی نمودند. در جهان مراکز بسیاری هستند که داده‌های شبکه‌ای بارش را در مقیاس‌های زمانی و مکانی گوناگون پدید آورده، در دسترس کاربران قرار می‌دهند. در این پژوهش کوشش شده تا پایگاه ملی اسفزاری به همراه پایگاه‌های جهانی GPCP، GPCP و CMAP معرفی و داده‌های بارش شبکه‌ای این سه پایگاه جهانی با پایگاه ملی بر پهنه ایران زمین مقایسه شود. نتایج نشان می‌دهد که، میان پایگاه ملی و این سه پایگاه؛ به ویژه GPCP همبستگی بالایی به ویژه در فصل‌های پربارش دیده می‌شود.

واژه‌های کلیدی: بارش، پایگاه داده اسفزاری، GPCP، GPCP، CMAP،

مقدمه

بارش مهمترین متغیر آب‌شناختی است که پیوند میان جو و فرایندهای سطحی را برقرار می‌سازد. سه چهارم گرمای جو حاصل آزادسازی گرمای نهان تبخیر است. از این گذشته، پراکنش ابر و بخار آب در ترازمندی تابش نقش دارد. ناهنجاری‌های مثبت و منفی بارش سبب بروز سیل و خشکسالی می‌شود. پایه‌گذاری پایگاه بارش جهان از اهداف راهبردی ناساست. دسترسی به داده‌های خوش تفکیک بارش برای افزایش شناخت هوا و اقلیم و سامانه‌های آب‌شناختی و برآورد مناسب ابعاد انسانی تغییر اقلیم لازم است. چگالی زمانی و مکانی داده‌های بارش بر روی اقیانوس‌ها و بر روی بخش بزرگی از خشکی‌ها بسیار تنگ است. بر مبنای داده‌های این ایستگاه‌های پراکنده و کوتاه مدت، نمی‌توان پایگاه داده بارش جهان را پدید آورد؛ حتی در حوضه‌های بزرگ آبی، مانند: آمازون، میکونگ و نیل هم چگالی ایستگاه‌ها آن اندازه نیست که بتوان از مدل‌های آب‌شناختی انتظار پیش‌بینی درست سیل و خشکسالی را داشت. به کارگیری رادارها برای سنجش بارندگی هم پرهزینه است و هم در مناطق کوهستانی پوشش مناسب را به دست نمی‌دهد. در عین حال، داده‌های ماهواره‌ای توان برآورد بارش در مقیاس سیاره‌ای را دارند. گرچه امروزه برخی از گروه‌های پژوهشی داده‌های

بارش روزانه جهان را با تفکیک ۰/۲۵ درجه تولید می کنند، اما برای کاربردهای آبشناختی به تفکیک زمانی و مکانی بیشتری نیاز است. همان گونه که می دانیم، ۷۱٪ از کره زمین را آب فراگرفته و ۲۹٪ دیگر را نیز خشکی و همه ایستگاه های اندازه گیری بارش بر پهنه خشکی ها پراکنده شده اند. بنابراین، ایستگاه های اندازه گیری جهان در نهایت فقط می توانند نماینده بارش ۲۵٪ تا ۳۰٪ از کره زمین باشند. بیشتر اندازه گیری های ایستگاهی از سده بیستم میلادی آغاز گردید. طی این مدت برخی ایستگاه ها رها و برخی دیگر نیز راه اندازی شدند (ین و همکاران^۱، ۲۰۰۴: ۱۲۰۷).

در بسیاری از مطالعات اقلیمی، بررسی و واکاوی جو با تفکیک زمانی - مکانی مناسب بر پایه دیده بانی های دقیق ضروری بوده، نیاز به منابع و پایگاه داده ای معتبر نیز از همین جا ناشی می شود. با آشکار شدن پدیده تغییر اقلیم و پیامدهای حاصل از آن و نیز ضرورت مطالعه همه جانبه اقلیم این نیاز؛ به ویژه طی دهه های اخیر بیشتر احساس شده است. دستیابی به دیده بانی های جوی نیازمند اهتمام و همکاری نهادهای علمی - اجرایی، بهره مندی از توانایی های دانشمندان علوم همسایه و مرتبط، بده بستان داده هاست. برای دستیابی به منابعی این چنین، باید داده های حاصل از منابع گوناگون در سامانه ای یکسان گرد آید. فعالیت ها و مراحل گوناگون برای فراهم آوردن پایگاه داده ای جوی یکسان از منابع سنجده های مختلف را باز کاوی داده های اقلیمی می گویند. در واقع، باز کاوی به مجموعه فعالیت های گردآوری، کنترل کیفیت، گزینش، یکسان سازی و نمایش داده های شبکه ای حاصل از منابع مختلف گفته می شود. برای باز کاوی دیده - بانی ها باید از پایگاه های داده ای دهه های پیشین با کیفیت و ثبات بالا، سامانه های همانندسازی مناسب و مدل های پیش - بینی عددی بهره برد. این امر تنها با به کارگیری فناوری های نوین و قدرتمندی همچون ابررایانه ها امکان پذیر است. در جدول (۱) نام های شماری از این گونه پایگاه های داده بارش آورده شده است. در سال های اخیر پژوهشگران زیادی مطالعات خود را بر پایه پایگاه های داده جهانی بنا گذاشتند. برای نمونه، لو آ و وو^۲ (۲۰۰۷) برای شناسایی روند ویژگی های ریزش های آسمانی نواحی استوایی پایگاه بارشی GPCP (مرکز اقلیم شناسی بارش جهانی) و پایگاه بارشی CMAP (واکاوی ادغام شده بارش) را برای بازه زمانی ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۳ به کار گرفتند. روند میانگین بارش بلند مدت این دو پایگاه نیز با یکدیگر فرق داشت؛ به گونه ای که پایگاه CMAP روند بارش ها را رو به سوی کمتر شدن (روند منفی) و پایگاه GPCP روند بارش ها را رو به سوی بیشتر شدن (روند مثبت) نشان می داد. سینگ و جیهو^۳ (۲۰۰۷) برای همانندسازی بارش های موسمی در جنوب آسیا مدل منطقه ای RegCM3 را در برابر واکاوی های مرکز اقلیم شناسی بارش جهانی (GPCC) برای سال های ۱۹۹۴، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ راست آزمایی کردند. بررسی ها نشان داد الگوی پراکنش بارشی این مدل منطقه ای با آنچه که پایگاه GPCC نشان می دهد، همخوانی دارد. مدل منطقه ای، هسته ریزش ها را بر روی بخش های مرکزی خلیج بنگال، کوهساران شمال شرقی و کرانه های جنوب غربی هندوستان نشان می داد. این در حالی بود که پایگاه GPCC هسته ریزش های آسمانی را بر روی بخش های شمال شرقی خلیج بنگال و کرانه های جنوب غربی شبه قاره هندوستان نشان می داد. **تی دینکو** و همکاران^۴ (۲۰۰۸) پایگاهی بارشی را برای مطالعه یک منطقه پرعارضه در کشور اتیوپی راه اندازی نمودند و سپس این پایگاه را با دیگر پایگاه های بارش جهانی، همچون (NOAA-CPC)

1-Yin et al

2-lau and Wu

3-singh and Jai ho

-T.Dinku

،(GPCC) و (CRU) مقایسه کردند. روی هم رفته، میان این پایگاه‌های جهانی و پایگاه ملی، سازگاری بسیاری چه از نظر سری زمانی بارش و چه از نظر مقادیر بارشی وجود داشت. بررسی ایشان نشان داد از نظر مقادیر بارشی، در تفکیک $2/5 \times 2/5$ درجه طول و عرض جغرافیایی میان نسخه بازکاو GPCC و پایگاه ملی ضریب همبستگی بسیار بالایی وجود دارد؛ به گونه‌ای که برای دوره زمانی ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ و دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ این همبستگی به ترتیب ۹۸٪ و ۹۱٪ بود. یافته‌های این پژوهش نشان داد بالاترین سازگاری میان پایگاه‌های بارش جهانی و پایگاه ملی در پربارترین فصل‌ها رخ داده، اما در فصل‌های خشک این سازگاری ضعیف می‌گردد. سیمورثی و همکاران^۵ (۲۰۱۰) روند ریزش‌های آسمانی را به کمک دو پایگاه بارشی (GPCP) و (CMAP) در تفکیک مکانی $2/5 \times 2/5$ طول و عرض جغرافیایی برای بازه زمانی ۲۰۰۹-۱۹۷۹ واکاوی نمودند. بررسی این دو پایگاه آشکار ساخت به طور یکنواختی ریزش‌های آسمانی بر روی پهنه خلیج بنگال و جنوب غرب دریای عرب طی این بازه زمانی در ماه می رو به سوی افزایش بوده است. یین و گروبر^۶ (۲۰۱۰) تغییر ناگهانی برآورد بارشی پایگاه GPCP را در حوضه رودخانه کنگو واکاوی و راست‌آزمایی نمودند. پایگاه بارشی GPCP نشان می‌داد طی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۴ بر روی پهنه جنوبی آفریقای حاره‌ای از حوضه رودخانه کنگو تا ساحل شرقی ریزش‌های آسمانی روندی منفی به خود گرفته است. هنسلر و همکاران^۷ (۲۰۱۱) برای ارزیابی یافته‌های مدل منطقه‌ای (REMO) از داده‌های بارشی پایگاه مرکز اقلیم‌شناسی بارش جهانی (GPCC) در تفکیک مکانی $0/25 \times 0/25$ در بازه زمانی ۱۹۵۱ تا ۲۰۰۰ بهره جستند. یافته‌های آنها نشان داد در قیاس با پایگاه GPCC مدل منطقه‌ای (REMO) برای نشان دادن الگوی مکانی ریزش‌های آسمانی در آفریقای جنوبی توان‌ترست، اما میل به بیش‌برآورد بارش در مناطق مرطوبتر جنوب‌شرق و شمال‌شرق دارد. پارکاش و همکاران^۸ (۲۰۱۱)، سه پایگاه بارشی GPCC، KALPANDA-1 و GPCP را برای دوره فعالیت بارش‌های موسمی در سال ۲۰۰۹ بر روی شبه قاره هندوستان و مناطق پیرامونش مقایسه کردند.

تغییرپذیری بارش در زمان و مکان در ایران خطرهای بسیاری همچون خشکسالی‌ها و سیلاب‌ها را پدید می‌آورد. سرزمین ناهمواری همچون ایران تغییرپذیری بارش را افزایش می‌دهد. رشته کوه‌های بلند البرز در شمال و کوه‌های زاگرس در غرب مانع از دسترسی رطوبت پهنه‌های آبی مجاور به نواحی داخلی ایران می‌شود. ناهمواری‌ها با وردش‌های مکانی سالانه بارش نیز همراه است. بیشینه بارش سالانه در شمال ایران در سواحل جنوب غربی دریای خزر و شمال‌غرب دامنه غربی رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. نواحی داخلی ایران بارش بسیار اندکی را دریافت می‌کنند. بیشتر شیب‌های داخلی زاگرس در مناطق سایه باران گسترده شده که مقدار بارش سالانه آنها بسیار کمتر از دامنه غربی زاگرس است. بیش از نیمی از کشور بارشی کمتر از ۲۰۰ میلیمتر دریافت می‌کند و بخشی از این پهنه‌ها بارش سالانه کمتر از ۵۰ میلیمتر را دارند. وردش‌های فصلی بارش ایران در ارتباط با موقعیت جنب حاره‌ای ایران به این تغییر پذیری‌ها اضافه می‌شود. بیش از نیمی از بارش سالانه در فصل زمستان از طریق سامانه‌هایی که رطوبت را از دریای مدیترانه می‌آورند، حاصل می‌شود. فصل تابستان به عنوان فصل رویشی مهم در ایران، جز در امتداد سواحل دریای خزر دارای بارش

5 -Sathiyamoorthy

6 -Yin and Gruber

7 -Haensler et al

8 -Prakash et al

محدودی است. در این فصل سواحل جنوبی به دلیل حاکمیت پر فشار جنب‌حاره تقریباً بدون بارش است. تنها در موارد نادری که همزمان با تضعیف پرفشار است، هوای گرم و مرطوب فرصت صعود می‌یابد و بارندگی‌های بسیار سنگین همرفتی را ایجاد می‌کند (علیجانی، ۲۰۰۸). با توجه به ویژگی‌های اقلیمی ایران، و اهمیت بارش در منابع آبی ایران نیاز به مطالعات در مورد بارش و رفتارهای آن به شدت احساس می‌شود. همان‌گونه که می‌دانیم، دسترسی به داده‌های بهنگام بارش یکی از نیازهای اساسی برای هر گونه پژوهش اقلیمی در راستای اهداف محققان و برنامه‌ریزان است، اما تجربه نشان داده‌است دسترسی به داده‌های بارشی بهنگام و با کیفیت بالا برای ایران زمین چندان میسر نبوده است و نخواهد بود. پایگاه ملی اسفزاری به عنوان تنها پایگاه ملی داده‌ای موجود، تنها شامل داده‌های متغیرهای اقلیمی تا سال ۱۳۸۲ به طور کامل است. افزون بر این، در کشوری همچون ایران در بسیاری نواحی آن؛ به خصوص بیابان‌ها و کویرهای داخلی، نواحی با ارتفاع بیشتر از ۲۶۰۰ متر (که کانون‌های آبرگیر کشور به شمار می‌آیند) فاقد ایستگاه‌های سنجش و اندازه‌گیری هستند. همچنین، نواحی مجاوری که از تباین اقلیمی بالایی برخوردارند (مثل دامنه‌های شمالی- جنوبی البرز و دامنه‌های شرقی- غربی زاگرس) از توزیع متناسب و تعداد مناسب ایستگاه‌ها برخوردار نیستند (عساکره، ۱۳۸۷). در این پژوهش کوشش شده تا برون داده‌های به دست آمده از پایگاه‌های داده بارشی شبکه‌ای GPCP، GPCP، CMAP با پایگاه ملی اسفزاری قیاس شود. هدف از انجام این کار، این است که بدانیم با توجه به فقدان داده‌های اقلیمی در دهه اخیر، آیا می‌توانیم با خیالی آسوده از داده‌های پایگاه‌های بارش جهانی استفاده کرده و نسبت به برون داده‌های آنها آسوده خاطر باشیم؟

هم‌اکنون پایگاه‌های بارشی بسیاری در جهان هستند که فرآورده‌های بارشی گوناگونی را در مقیاس‌های مکانی و زمانی مختلف پدید می‌آورند. در جدول ۱ شماری از این پایگاه‌ها آورده شده است.

جدول (۱) شماری از پایگاه‌های بارشی


نشانی تارنما	بازه مکانی	بازه زمانی	تفکیک مکانی	تفکیک زمانی	شماره نسخه	گردآورده شده
http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/gpcp/1dd-v1.1/	جهانی	/ / تا / /		روزانه	V-1-1	GPCP
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.gpcp.html	جهانی	/ تا /		ماهانه	2.2-V	GPCP
ftp://ftp-anon.dwd.de/pub/data/gpcc/html/fulldata_v_download.html	جهانی	/ تا /		ماهانه	v-6	GPCC
http://www.hikyu.ac.jp/precip/	خاورمیانه و جنوب شرق آسیا	// تا / /		روزانه	v-1101	APHR ODITE
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.cmap.html#detail	جهانی	/ تا /		ماهانه	-	CMAP
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.prec.html	جهانی	/ تا /		ماهانه	-	PREC
http://fire.eng.uci.edu/PERSIANN/adj_persiann_hr.html	جهانی	// تا / /		ساعته	-	PERSIAN

آشنایی با پایگاه‌های داده بارش جهانی GPCC

در راستای نیازمندی به داده‌های بلندمدت بارش جهان⁹ GPCC زیر نظر برنامه پژوهش اقلیم جهان (WCRP)¹⁰ راه اندازی شده است. یکی از وظایف GPCC واکاوی بارندگی ماهانه جهان بر روی خشکی‌ها به کمک داده‌های باران سنجی ایستگاه‌های زمینی است. هدف اصلی GPCC بر آوردن نیاز کاربران به داده‌های بهنگام و دقیق از بارش بر روی خشکی‌های جهان است. داده‌های تولید شده در GPCC بر اساس اندازه‌گیری‌های ایستگاهی جهان و با تفکیک‌های گوناگون ۰/۲۵×۰/۲۵ و ۰/۵×۰/۵ و ۱×۱ و ۲/۵×۲/۵ درجه قوسی در دسترس است. بازکای داده‌های کامل GPCC به کمک همه داده‌هایی است که هنگام واکاوی در دسترس است. کاربران باید شمار ایستگاه‌های موجود در هر یاخته معین در هر ماه معین را مد نظر قرار دهند. تعداد متفاوت ایستگاه‌ها در هر یاخته در طول زمان می‌تواند عامل عمده ناهمگنی اعتبار نقشه‌های بارش باشد. داده‌های بازکای شده این پایگاه در شش نسخه انتشار یافته که نسخه ششم این

9 - the Global Precipitation Climatology Centre.

10 - the World Climate Research Program.



پراکنش ایستگاه‌های به کار گرفته شده در تازه‌ترین نسخه GPCC



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

آهنک ۳ درجه در هر صد سال و دمای روزانه با آهنک ۱ درجه در هر صد سال افزایش داشته‌است. او دریافت که افزایش دما در همه ماه‌ها یکسان نبوده است. در نیمه گرم سال آهنک افزایش دما بزرگتر و در نیمه سرد سال آهنک افزایش دما آرامتر بوده و گاهی روند کاهش دما دیده می‌شود. محمدی (۱۳۸۸) به کمک پایگاه اسفزاری بارش‌های ابر سنگین ایران زمین را واکاوی نمود. یافته‌های پژوهش او نشان داد سه الگوی اصلی فشار تراز دریا در پدید آوردن ریزش‌های ابر سنگین در ایران زمین مؤثر بوده‌اند. دارند (۱۳۹۰) به کمک پایگاه داده اسفزاری سرماهای ایران زمین را از بینگاه همدید برای نیم سده گذشته واکاوی نمود. او نشان داد روند سرماهای فرین ایران منفی بوده، شمار روزهای فرین سرد ایران در بیشتر برج‌های سال روند منفی داشته و از نظر پراکنش مکانی، روند منفی شمار روزهای فرین سرد بیشتر در نیمه مرکزی و جنوبی ایران دیده می‌شود. این در حالی است که روند مثبت بر روی پهنه بسیار کوچکی از ایران بر روی ناهمواری‌ها دیده می‌شود.

۱۲ GPCP

طرح اقلیم شناسی بارش جهانی (GPCP) توسط برنامه پژوهش اقلیم جهان^{۱۳} بنیان نهاده شده تا پراکنش و توزیع ریزش‌های آسمانی را بر پهنه کره زمین طی سالهای طولانی اندازه‌گیری نماید. ویژگی فرآورده‌های پایگاه بارشی GPCP به شرح زیر است:

نسخه دوم این پایگاه از ژانویه ۱۹۷۹ تا به امروز را پوشش داده، داده‌های بارشی آن در مقیاس زمانی ماهانه و در تفکیک مکانی $2/5 \times 2/5$ درجه طول و عرض جغرافیایی با دو تا سه ماه تأخیر بر روی وبگاه این پایگاه در دسترس است. فرآورده دیگر داده‌های بارشی در مقیاس ۵ روزه آن هم در تفکیک مکانی $2/5 \times 2/5$ درجه طول و عرض جغرافیایی است که این فرآورده همه پهنه زمین را پوشش داده و داده‌های آن از ژانویه ۱۹۷۹ تا به امروز در دسترس است، اما داده‌های 1×1 درجه طول و عرض جغرافیایی این پایگاه در بازه زمانی روزانه از اکتبر ۱۹۹۶ تا به امروز را پوشش می‌دهد. همه فرآورده‌های نامبرده شده در بالا به کمک یک کاسه کردن و در هم تنیدن داده‌های فرورسرخ، کهموج و داده‌های بارشی واکاوی شده باران سنج‌های زمینی، پدید می‌آیند.

CMAP

واکاوی ادغام شده بارش (CMAP^{۱۴}) تکنیکی است که واکاوی‌های بارش جهانی را در مقیاس‌های ماهانه و پنج روزه فراهم می‌آورد؛ بدین گونه که داده‌های ایستگاهی اندازه‌گیری بارش با برآوردهای به‌دست آمده از ماهواره-ها (فرورسرخ و کهموج) یک کاسه می‌گردند. نسخه ۰۸۰۲ CMAP، افزون بر داده‌های ایستگاهی و ماهواره‌ای، از داده‌های بارشی مدل‌های عددی پیش بینی آب و هوا بهره می‌جوید. واکاوی‌های بارشی پایگاه CMAP در مقیاس مکانی $2/5 \times 2/5$ درجه طول و عرض جغرافیایی هستند. داده‌های پایگاه CMAP از سال ۱۹۷۹ بدین سو در دسترس‌اند. پوشش واکاوی‌های مکانی این پایگاه برای همه خشکی‌ها و آبهای سیاره است. یادآوری می‌کنیم که منابع تأمین داده‌های

12 -Global Precipitation Climatology Project

13-WCRP -World Climate Research Programme

14-CPC Merged Analysis of Precipitation

CMAP برای واکاوی‌های بارشی از سال ۱۹۷۹ تا به امروز ثابت نبوده. برای نمونه، داده‌های SSM/I^{۱۵} در تاریخ ۱۹۸۷ در اختیار این پایگاه قرار گرفت. پیش از آن تاریخ برآوردهای به‌دست آمده از داده‌های کهموج از الگوریتم MSU^{۱۶} موجود بود. همچنین، داده‌های فروسرخ با چگالی زمانی بالا (سه ساعته) از ماهواره‌های زمین آهنگ از سال ۱۹۸۶ در دسترس این پایگاه قرار گرفت. هر یک از منابع داده کاستی‌ها و قوت‌هایی دارد. بنابراین، هنگام گردآوری و یک کاسه-نمودن منابع داده‌ای گوناگون به یک روش منطقی و شایسته نیازمندیم. واکاوی‌های مبتنی بر ایستگاه‌های باران‌سنجی هنگامی که در درون هر کدام از شبکه‌ها شماری بسنده از ایستگاه‌ها وجود داشته باشد، بسیار خوب است. البته، در برخی جاها، چگالی ایستگاهی بالاست. داده‌های فروسرخ برای شناسایی تغییرات در بارش‌های عمیق همرفتی بسیار مناسب است. داده‌های فروسرخ در نواحی استوایی و فصل گرم عرض‌های میانه بالاترین صحت را داشته. این در حالی است که در شرایط سردتر از کمترین دقت برخوردارند.

نکاتی چند برای کاربران پایگاه CMAP:

- ۱) کیفیت واکاوی‌های بارشی این پایگاه به طور چشم‌گیری به کیفیت داده‌های ورودی به کار گرفته شده وابسته است. جاهایی که ایستگاه‌های باران‌سنجی تنک بوده یا اینکه ایستگاهی وجود ندارد، یا نواحی که برآوردهای ماهواره‌ای دارای خطای بزرگ یا نمونه‌برداری ضعیف است، به احتمال بسیار بالا واکاوی‌های بارشی نیز خطاهای بیشتری نسبت به دیگر جاها دارد.
- ۲) همه برآوردهای ماهواره‌ای به کار گرفته شده به طور چشم‌گیری دارای کاستی‌اند. برآوردهای مبتنی بر داده‌های فروسرخ بر رابطه‌ای تجربی میان ابرناکی و بارش وابسته‌اند و چنین رابطه‌ای بی‌تردید در زمان و مکان متفاوت است.
- ۳) به طور کلی، پایگاه داده CMAP برای شناسایی وردش‌های زمانی و مکانی بارش در استوا مناسب است. وردش‌های بارشی در عرض‌های میانه کمتر توسط CMAP توصیف می‌گردند. هنگام به کارگیری داده‌ها برای عرض ۶۰ درجه به بالا دقت بسیاری نیاز است.
- ۴) مقایسه پایگاه داده ملی و پایگاه‌های بارش سیاره‌ای


GPCC و اسفزاری

نخستین گام، برای مقایسه این دو پایگاه داده هماهنگ‌سازی تفکیک زمانی و مکانی داده‌ها بود. با توجه به تفاوت سیستم تصویر، تفاوت تفکیک زمانی و تفاوت تفکیک مکانی داده‌های اسفزاری و GPCC نخست این ناهماهنگی‌ها برطرف گردید. سپس بارش پایگاه ملی اسفزاری را برای هر یک از ماه‌های میلادی به دست آورده؛ آنگاه داده‌های شبکه‌ای پایگاه داده GPCC را در چارچوب زمانی هماهنگ با پایگاه داده اسفزاری با تفکیک مکانی 0.5×0.5 این پایگاه بارگیری کردیم. چارچوب مکانی این داده‌ها نیز مطابق با داده‌های اسفزاری بر روی ایران تطبیق داده شد. اولین مرحله، هماهنگی سیستم مختصات هر دو پایگاه داده بود. از این رو، سیستم مختصات پایگاه داده اسفزاری در راستای هماهنگی با داده‌های GPCC از متریک^{۱۷} به جغرافیایی تبدیل شد. در مرحله بعد نیازمند یکسان‌سازی تفکیک مکانی این

15- Special Sensor Microwave/Imager


16-Microwave Sounding Unit

17- Lambert conformal conic projection (LCC)




شکل ۲) تفکیک مکانی پایگاه داده GPCC
 شکل ۳) تفکیک مکانی پایگاه داده اسفزاری با یاخته‌های
 ۱۵×۱۵ کیلومتر
 ۰/۵×۰/۵ درجه

پرتال جامع علوم انسانی




شکل (۴): رگرسیون خطی میانگین سالانه بارش اسفزاری و GPCC




شکل (۵) همبستگی ماهانه داده‌های اسفزاری و GPCC


پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 رتال جامع علوم انسانی



شکل ۶) همبستگی بارش یاخته‌های پایگاه داده GPCC و اسفزاری



شکل ۷) سری زمانی پایگاه داده اسفزاری و GPCC



شکل ۹) میانگین بارش سالانه پایگاه داده اسفزاری



شکل ۸) میانگین بارش سالانه پایگاه داده GPCC

شکل (۶) نشان دهنده همبستگی حاصل از مقایسه یاخته‌ای بارش GPCC و اسفزاری است. بیشتر یاخته‌ها ضریب همبستگی بیش از ۸۰ درصد را نشان می‌دهند. در شکل‌های ۸ و ۹ نیز میانگین بارش هر دو پایگاه داده با هم مقایسه شده که نشان‌دهنده هماهنگی بسیار بالای آنهاست. هسته‌های بیشینه بارش ۶۰۰ و ۷۰۰ در زاگرس و کرانه‌های خزر، در هر دو نقشه کاملاً یکسان هستند، که بسیار شایان توجه است. محاسبه اختلاف این دو نقشه نشان‌دهنده تفاوتی اندک میان برونداد این دو پایگاه داده در بخش‌های شمالی ایران زمین است، که البته ناچیز است. خطوط همبارش در ایران مرکزی و سایر نواحی ایران در هر دو نقشه همسانی بسیاری به هم دارند.

مقایسه بارش پایگاه ملی اسفزاری و GPCP

برای مقایسه پایگاه داده اسفزاری و GPCP، دو رویکرد پیش رو بود: نخست مقایسه یاخته به یاخته هر دو پایگاه داده بود، همانند آنچه در مورد GPCC انجام شد، اما رویکرد دوم، مقایسه بارش میانگین این دو پایگاه داده بود، که رویکرد دوم برای قیاس میان این دو پایگاه برگزیده شد.


ابتدا داده‌های GPCP از وبگاه این پایگاه^{۱۸} بارگزاری شد. این داده‌ها ماهانه و با فرمت nc در دسترس است. نخستین گام تبدیل فرمت این داده‌ها به کمک نرم افزار GRADS بود. همان طور که بیان شد، این داده‌ها با تفکیک مکانی ۲/۵ درجه طول و عرض جغرافیایی در اختیار هستند. بنابراین، دارای ۱۴۴ یاخته طولی و ۷۲ یاخته عرضی هستند. با توجه به شکل ماهانه این داده‌ها، داده‌های اسفزاری نیز به شکل ماهانه در ماتریسی به ابعاد ۵۲۵ × ۷۱۸۷ تبدیل شد. پایگاه داده GPCP شامل داده‌هایی با پوشش کامل سیاره‌ای است. از این رو، در این مرحله تنها بخشی از این داده‌ها که درون مرزهای ایران قرار گرفته بودند، برداشت شد. این کار با به کار گیری تابع Inpolygon انجام شد.

x, y : مختصات مکانی داده‌های GPCP


xv, yv : مختصات مکانی پایگاه داده اسفزاری

با به کار گیری این تابع، تنها داده‌هایی از GPCP برداشته می‌شود که در چارچوب مرزهای ایران قرار گرفته باشد. ماتریس به دست آمده دارای ابعاد ۳۸۴ × ۲۶ است، که سطرها نشان دهنده بعد زمانی (شمار ماه‌ها) و ستون‌ها نمایانگر بعد مکانی است؛ یعنی تنها ۲۶ یاخته مکانی از داده‌های GPCP درون مرزهای ایران قرار گرفته است. شکل (۱۰) نشان دهنده تعداد این یاخته‌هاست. ستون‌های این ماتریس نیز نشان دهنده تعداد ماه‌ها (بعد زمانی) است. پس از هماهنگ‌سازی کامل داده‌های اسفزاری و GPCP و برچیدن ماه‌هایی که با نبود داده همراه بودند، در نهایت دو ماتریس با ابعاد ۳۱۲ × ۲۶ به دست آمد. پس از آن میانگین وزنی بارش هر یاخته از طریق رابطه زیر محاسبه شد:


$$F_{i,j} = \frac{1}{\sum_{ai} 1} \left\langle \sum_{i=1}^{26} P_i a_i \right\rangle \quad (1)$$



شکل (۱۰) تفکیک مکانی پایگاه داده GPCP و CMAP



شکل (۱۱) رگسیون مقدار بارش ماهانه GPCP و اسفزاری (۳۱۲ ماه مشترک)



شکل ۱۲) رگرسیون خطی میان مقدار بارش ماهانه پایگاه داده CMAP و اسفزاری (۳۱۲ ماه مشترک)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

منابع

- ۱- بختیار، محمدی. (۱۳۸۸). *تحلیل هم‌مدید بارش‌های ابرسنگین ایران*، مسعودیان، ابوالفضل، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
- ۲- دارند، محمد. (۱۳۹۰). *تحلیل هم‌مدید سرماهای فرین ایران*، مسعودیان، ابوالفضل، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
- ۳- عساکره، حسین. (۱۳۸۷). «کاربرد روش کریجینگ در میان‌یابی بارش»، *جغرافیا و توسعه*، ش ۱۲، پاییز ۸۷.
- ۴- منتظری، مجید. (۱۳۸۴). *تحلیل زمانی- مکانی دمای ایران در نیم سده گذشته*، مسعودیان، ابوالفضل، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
- 5- B. Alijani, J.O'Brien, B. Yarnal, (2008): << *Spatial analysis of precipitation intensity and concentration in Iran*>>, *Theor. Appl. climatol* 94: 107-124.
- 6- A. Haensler, S. Hagemann and D. Jacob (2011): << *Dynamical downscaling of ERA40 reanalysis data over southern Africa: added value in the simulation of the seasonal rainfall characteristics*>> << *international journal of climatology*>> *Int. J. Climatol.* 31: 2338-2349
- 7- [californiahttp://chrs.web.uci.edu/research/satellite_precipitation/index.html](http://chrs.web.uci.edu/research/satellite_precipitation/index.html).
- 8- G. P. Singh and Jai-Ho Oh (2007): << *act of Indian Ocean sea-surface temperature anomaly on Indian summer monsoon precipitation using a regional climate model*>> << *international journal of climatology* >> *Int. J. Climatol.* 27: 1455-1465
- 9- K.-M. Lau and H.-T. Wu (2007): << *Detecting trends in tropical rainfall characteristics, 1979-2003* >> << *international journal of climatology*>> *Int. J. Climatol.* 27: 979-988
- 10- S Parkash, C Mahesh, R M. Gairola (2010) << *Large-scale precipitation estimation using Kalpana-1 IR measurements and its validation using GPCP and GPCC data* >> *Meteorol Atmos Phys* 110:45-57.
- 11- T. Dinku, S. J. Connor, P. Ceccato and C. F. Ropelewski (2008): << *Comparison of global gridded precipitation products over a mountainous region of Africa*>> << *international journal of climatology*>> *Int. J. Climatol.* 28: 1627-1638
- 12- X Yin and A Gruber (2004): << *Comparison of the GPCP and CMAP Merged Gauge-Satellite Monthly Precipitation Products for the Period 1979-2001*>> << *journal of hydrometeorology*>> 1207-1222
- 13- X Yin and A Gruber (2010): << *Validation of the abrupt change in GPCP precipitation in the Congo River Basin*>> *international journal of climatology* *Int. J. Climatol.* 30: 110-119
- 14- V. Sathiyamoorthy, B Paul Shukla and P.K. Pal (2010): << *Increase in the pre-monsoon rainfall over the Indian summer monsoon region*>> *Atmospheric science letters Atmos. Sci. Let.* 11: 313-318



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی