

# مدلسازی میزان عملکرد محصول گندم دیم با توجه به معیارهای اقلیم‌شناسی کشاورزی در استان آذربایجان غربی

منوچهر فرج‌زاده<sup>۱</sup>، آذر زرین<sup>۲</sup>

۱- استادیار دانشگاه تربیت مدرس

۲- کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

## چکیده

یکی از مشکلاتی که کشاورزی در دنیا بویژه در مناطق خشک با آن روبه‌رو است، نوسان میزان بازده محصولات دیم طی سالهای مختلف است. از نظر فعالیتهای کشاورزی عوامل مؤثر در توسعه کشت دو دسته است. دسته اول عواملی که یا در طول زمان ثابتند یا می‌توان با به‌کارگیری فناوری و روشهای اصلاحی، آنها را اصلاح نمود. دسته دوم عوامل ناپایدارند که در ارتباط با آب و هوای هر منطقه‌اند، همچون میزان بارش، درجه حرارت، رطوبت نسبی و ... که کنترل آنها تقریباً از دست انسان خارج است. زیرا تغییر آب و هوا متناسب با نیاز هر محصول فقط در شرایط گلخانه‌ای آن هم در مقیاس کوچک امکان‌پذیر است. بنابراین شناخت معیارهای اقلیمی مؤثر بر میزان محصول بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا با تهیه مدلهایی برای پیش‌بینی محصول می‌توان برنامه‌ریزیهای لازم را برای تأمین نیازها در صورت کمبود و ذخیره در سیل‌ها در صورت مازاد انجام داد. در این پژوهش معیارهای اقلیمی مؤثر در میزان عملکرد محصول گندم دیم در استان آذربایجان غربی مطالعه شده و با ایجاد مدلهای رگرسیون چند متغیره، روابط موجود بین میزان بازده محصول و معیارهای اقلیمی بررسی شده است. در نهایت، مدلهایی برای پیش‌بینی میزان بازده محصول گندم دیم در استان آذربایجان غربی ارائه شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که معیارهای مجموع بارش سالیانه و میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه سهم بیشتری در تولید مدلهای نهایی دارند.

**کلید واژه‌ها:** اقلیم‌شناسی کشاورزی، گندم دیم، میزان عملکرد محصول، بازده محصول، استان آذربایجان غربی.

## ۱- مقدمه

گندم چه از نظر دارا بودن بالاترین سهم در کل سطح اراضی زیر کشت و چه به عنوان





اصلی‌ترین غذای مردم ما و مهمترین منبع تأمین کالری مورد نیاز روزانه افراد در کشور دارای اهمیت است. از طرف دیگر شرایط آب و هوایی عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای در بالا بردن میزان برداشت محصول گندم دیم است. حتی وقتی که سایر عوامل تولید محصول در سطح مطلوب قرار داشته باشد، تغییرات در آب و هوا می‌تواند تا ۵۰ درصد بازده محصول را تغییر دهد. هر مرحله از رشد گیاه با شرایط جوی خاصی تعیین می‌شود و هر گیاهی برای آنکه کل توان خود را عرضه کند، به هوای مطلوب خاصی نیاز دارد. بنابراین دانش تأثیر عوامل جوی بر رشد گیاه و بازده محصول برای کشاورزی بسیار حائز اهمیت است [۱].

برای اولین بار استارت<sup>۱</sup> مدل‌های پیش‌بینی بازده محصولات کشاورزی را در کشورهای منتخب در جنوب و جنوب شرقی آسیا به کار برد. مدل‌ها برای انواع محصولات کشاورزی از جمله برنج، ذرت، گندم، چغندر قند و ... بسته به دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان مربوط به بازده محصول در سطح ملی و منطقه‌ای به کار برده شدند [۲].  
رابطه کلی این مدل‌ها به صورت زیر است:

$$Y = a_0 + a_1 + \sum_{i=2}^n a_i \cdot x_i \quad (1)$$


که در آن Y بازده پیش‌بینی شده (q/ha)،  $a_0$  عدد ثابت رگرسیون،  $a_1$  ضریب رگرسیون برآورد شده به عنوان عامل تغییرات زمانی خطی (برای مثال  $1=1951$ ، ...  $21=1981$ )،  $a_i$  آی امین ضریب رگرسیون برآورد شده،  $x_i$  آی امین متغیر پیش‌بینی هوا  $I = 1, 2, \dots, n$  است.

از جمله این مدل‌ها، می‌توان به مدل FYWM اشاره نمود که در سال ۱۹۷۴ رابرتسن آن را برای محصول گندم تهیه کرده است و با تأثیر دادن هوای قبلی و کنونی می‌تواند میزان بازده مورد انتظار را پیش‌بینی نماید. متغیرهای اصلی به کار رفته در این مدل عبارتند از: محصول تخمین زده شده در پایان دوره قبلی، کل بارش در بین دوره‌ها، متوسط دمای حداکثر و متوسط دمای حداقل در بین دوره‌ها و متوسط تابش خورشیدی روزانه در طول زمان در بین دوره‌ها [۲].

یک مدل دیگر برای پیش‌بینی میزان بازده محصول، مدلی است که در سال ۱۹۷۶ بخش

1. Steyaert

2. q=quintal=100 kg



هواشناسی کشاورزی فائو ارائه کرده است. اساس این مدل بیلان آب هفتگی یا ده روزه محصول است که در هر مرحله از رشد گیاه، شاخصی ارائه می‌دهد که درجه کفایت نیاز آبی محصول را برآورد می‌کند. این شاخص با بازده محصول به شدت مرتبط است و با آن می‌توان میزان محصول مورد انتظار را بخوبی پیش‌بینی کرد [۳].

مدلسازی اقلیم کشاورزی در کشور از موضوعات جدید به شمار می‌آید. مطالعات انجام گرفته در ایران عمدتاً مربوط به شاخصهای اقلیمی مؤثر در رشد گیاه است. از جمله این مطالعات، بررسی حساسیت ارقام گندم در مراحل مختلف رشد فیزیکی نسبت به کمبود رطوبت توسط منصور صارمی است که در این بررسی عملکرد محصول و ارتفاع گیاه با عمل آبیاری و بدون عمل آبیاری اندازه‌گیری شده و شاخص حساسیت رطوبتی گیاه گندم ارائه شده است [۴].

مطالعه دیگر را که غلامحسین سرمدنیا انجام داده است بررسی اثر درجه حرارت نامناسب بر رشد و عملکرد پنج رقم گندم پاییزه است. در این مطالعه تأثیر درجه حرارت نامناسب در مراحل مختلف رشد گیاه گندم بررسی و نتایج آن ارائه شده است [۵].

در پژوهش حاضر که طی سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶ صورت گرفته سعی شده است تا برای اولین بار با مدلسازی میزان عملکرد محصول و معیارهای اقلیمی مؤثر در آن، مدلی ارائه شود که بتواند برای پیش‌بینی میزان عملکرد محصول به کار آید. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش همبستگی است. برای انجام این امر یک مدل رگرسیون چند متغیره با روشهای مختلفی از جمله Backward، Enter و ... ارائه و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. روابط موجود بین میزان عملکرد محصول و معیارهای اقلیمی از جمله دما، بارش، رطوبت نسبی در این مطالعه مدنظر قرار گرفته است.

## ۲- ویژگیهای منطقه


استان آذربایجان غربی یکی از استانهایی است که در زمینه تولید و مصرف گندم سابقه دیرینه دارد. به دلیل داشتن آب و هوای مناسب برای کشت دیم در این استان هر جا که جنس خاک و شیب زمین مساعد بوده و امکان بهره‌برداری از زمین با آبیاری وجود نداشته، کشت دیم حتی در قطعات کوچک انجام شده است.

این استان در شمال غربی ایران قرار دارد و با وجود آنکه مساحت آن فقط ۳۹/۴۸۶



کیلومترمربع است، در حدود ۴ درجه در عرض جغرافیایی گسترش یافته است. به همین دلیل تنوعی در آب و هوای آن به چشم می‌خورد. با توجه به نقشه ۱ تغییرات مکانی بارش در استان آذربایجان غربی از جنوب به شمال دارای روند کاهشی است. بیشترین مقدار بارندگی سالیانه مربوط به شهرستانهای تکاب با ۶۲۷ میلیمتر و سردشت با ۵۸۷ میلیمتر و کمترین مقدار بارندگی سالیانه مربوط به شهرستان خوی با ۲۳۴ میلیمتر است.

از طرف دیگر همان طور که در نقشه ۱ ملاحظه می‌شود، تغییرات روند بارش در شمال استان از غرب به شرق رو به کاهش است. در صورتی که در جنوب استان این روند تغییرات مشاهده نمی‌شود. دلیل این امر را می‌توان به جریان‌هایی نسبت داد که در شمال استان از سمت مدیترانه وارد شده و مسلماً در قسمت غرب استان بارشهای بیشتری را سبب شده و تا به شرق استان برسند، به علت ضعیف شدن جریان، بارش کمتری ایجاد می‌کنند ولی در جنوب استان، وضعیت قرار گرفتن ارتفاعات به گونه‌ای است که در نقاط شرقی استان هم بارندگی مثل نواحی غربی آن است (نقشه ۲).






نقشه ۲ نقشه همباران سالیانه استان آذربایجان غربی




همچنین وضعیت خاص ناهمواری استان در پراکندگی میانگین دما در استان تأثیر گذاشته است (نقشه ۳).



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقشه ۳ نقشه همدمای متوسط استان آذربایجان غربی

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دمای میانگین در قسمت‌های شمالی و مرکزی از غرب به شرق رو به افزایش است که دلیل این امر را می‌توان به وضعیت خاص ناهمواری استان نسبت داد که از غرب به شرق از ارتفاع کوه‌ها کاسته می‌شود. ولی در قسمت‌های جنوبی استان به دلیل شرایط خاص ناهمواری این قسمت گرادیان درجه حرارت به گونه‌ای است که از شمال این منطقه به سمت جنوب دمای میانگین کاهش می‌یابد. طبق نقشه ۲، گرمترین منطقه استان، خوی با  $۱۲/۱۱$  درجه سانتیگراد است و سردترین نقاط به ترتیب تکاب با  $۹/۶$  و سردشت با  $۱۰$  درجه سانتیگراد.



همچنین از نظر وضعیت زراعت گندم دیم در استان آذربایجان غربی باید گفت که بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، در سال ۷۶-۷۷، سطح زیر کشت کل کشور ۹۷۵۴۵ هزار هکتار بوده که از این میزان ۶۱۸۰ هزار هکتار به کشت گندم اختصاص داشته است. در همین سال کل میزان تولیدات کشاورزی کشور ۴۴ میلیون و ۴۳۵ هزار تن و سهم گندم ۱۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تن بوده است که با این حساب میزان عملکرد محصول گندم در کل کشور ۱۹۳۴ کیلوگرم در هکتار در آن سال بوده است [۶].

در همین سال میزان کل تولید گندم استان آذربایجان غربی ۶۹۸،۹۵۱ تن بوده است که ۳۹۳،۳۶۵ تن آن گندم آبی و ۵۵۸،۳۳۳ تن آن گندم دیم بوده است. سطح زیر کشت کل گندم استان ۷۸۸،۳۳۱ هکتار بوده که ۱۰۲،۷۰۸ هکتار آن به گندم آبی و ۰۸۰،۲۲۹ هکتار آن به گندم دیم اختصاص داشته است. به این ترتیب میزان کل عملکرد محصول گندم در استان در سال ۷۶-۷۷، ۲۱۰۷ کیلوگرم در هکتار برآورد گردیده است. مقدار عملکرد گندم آبی ۳۵۵۷ و گندم دیم ۱۴۵۶ کیلوگرم در هکتار بوده است [۶].

### ۳- مواد و روشها

برای تهیه یک مدل برای پیش‌بینی محصول، اولین گام تعیین معیارهای اقلیمی مؤثر بر عملکرد آن و تعیین ارزش متوسط وزنی هر معیار در محدوده ایستگاه هواشناسی مورد نظر است. بعد از تعیین ارزش وزنی معیارها با ایجاد یک رابطه از طریق روش رگرسیون چند متغیره می‌توان به کار مدلسازی پرداخت.

#### ۳-۱- تعیین معیارهای اقلیمی

مطالعاتی که در مورد فیزیولوژی و مراحل مختلف رشد و نمو گندم دیم به عمل آمده، نشان داده که برخی معیارهای اقلیمی در بعضی از ماههای سال اثر بسیار قابل توجهی بر عملکرد محصول می‌گذارند، مثلاً در موقع جوانه زدن که حدود ۵ تا ۱۰ روز پس از کاشت صورت می‌گیرد، درجه حرارت، میزان بارندگی و میزان رطوبت اثر بسیار مهمی دارند. همچنین میزان بارش به هنگام ساقه رفتن و سنبله رفتن که گیاه به حداکثر آب احتیاج دارد و عامل درجه حرارت در هنگام گل کردن و رسیدن دانه بسیار تعیین کننده‌اند.

در نتیجه با بررسیهای به عمل آمده ۱۱ معیارهای اقلیمی زیر به عنوان معیارهای اولیه



برای مدلسازی انتخاب شدند:

مجموع بارش سالیانه، مجموع بارش ماه اکتبر، مجموع بارش آوریل، مجموع بارش مه، میانگین دمای متوسط سالیانه، میانگین دمای متوسط ماه اکتبر، میانگین دمای متوسط ماه ژوئن، میانگین رطوبت نسبی سالیانه، میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر، میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه، میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل.

### ۲-۳- داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی

در دوره پژوهش حاضر ۶۲-۶۷، هفت ایستگاه سینوپتیک و هفت ایستگاه کلیماتولوژی و یک مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی در سطح استان وجود داشت.


با توجه به سالهای آماری مورد نیاز در تحقیق حاضر (از سال ۶۲ تا ۷۶) و تازه تأسیس بودن برخی از این ایستگاهها (سالهای بعد از ۱۳۷۰)، در این تحقیق هفت ایستگاه سینوپتیک موجود و دو ایستگاه از ایستگاه‌های کلیماتولوژی انتخاب شدند.

از نه ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی مورد استفاده، فقط آمار مربوط به دو ایستگاه ارومیه و خوی کامل بوده و در هفت ایستگاه دیگر بازسازی آماری به روش همبستگی صورت پذیرفته و داده‌ها تهیه شده است.

از آنجا که هدف از شناخت ویژگیهای اقلیمی در این پژوهش، بررسی تأثیر آنها در کشاورزی است، در اولین گام آمار موجود و بازسازی شده ایستگاهها بر اساس سال زراعی مرتب شد که به این منظور از آمار ماههای اکتبر، نوامبر و دسامبر یک سال قبل از دوره آماری یعنی سال ۱۳۶۱ نیز استفاده و پایگاه داده‌ها تشکیل شد. نکته مهمی که استفاده از داده‌های طولانی مدت اقلیمی را غیرممکن ساخته، نبود داده‌های کشاورزی مستند طولانی مدت بوده و فقط جمع‌آوری آنها برای ۱۵ سال زراعی یعنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶ امکان‌پذیر شد. بدون شک هر قدر آمار بلند مدت اقلیمی و زراعی در اختیار باشد دقت مدلسازی بیشتر خواهد شد ولی با توجه به محدودیتهای ذکر شده در این مطالعه به ۱۵ سال اکتفا شد.

### ۳-۳- تعیین و منطقه‌بندی نواحی کشت گندم دیم

در سالهای مورد بررسی، تغییراتی در تقسیمات سیاسی استان آذربایجان غربی به وجود آمده است. به این معنا که در آمار نامه‌های منتشر شده مرکز آمار ایران تغییراتی در محاسبه





سطح زیرکشت و میزان تولید گندم و به تبع آن میزان عملکرد گندم در مناطق مختلف به وجود آمده است. مثلاً آمار مربوط به شهرستانهای میاندواب، تکاب و شاهین‌دژ تا سال ۱۳۶۹ به طور یکجا و به نام میاندواب بوده است ولی از سال ۱۳۷۰ به بعد دو شهرستان تکاب و شاهین‌دژ از این شهرستان جدا شده و در نتیجه آمارهای مربوط به آنها به صورت جداگانه آمده است.

برای رفع این مشکل با بررسیهای زیاد، استان آذربایجان غربی به هفت منطقه ماکو، خوی، ارومیه، پیرانشهر، سردشت، مهاباد و میاندواب تقسیم گردید و آمارهای عملکرد محصول گندم دیم در هر منطقه به صورت وزنی محاسبه و در محاسبات آماری مدلسازی استفاده شد.

به این ترتیب در هر منطقه حداقل یک ایستگاه هواشناسی و در دو منطقه میاندواب و ارومیه که مناطق وسیعی هستند دو ایستگاه موجود است.

### ۳-۴- تهیه نقشه‌های منحنیهای هم‌ارزش و محاسبه ارزش متوسط وزنی برای معیارهای اقلیمی

در این مرحله ابتدا همبستگی هر معیار با ارتفاع ایستگاهها تعیین و ضرایب  $a$ ,  $b$  و  $r$  محاسبه شد. با در نظر گرفتن معنادار بودن میزان  $r$  معادله خط  $y=a+bx$  برای هر معیار برای دوره آماری ۱۵ ساله تشکیل و با توجه به آنها نقشه‌های منحنیهای هم‌دما، هم‌بارش و ... تهیه شد. به علت وجود ۱۱ معیار اقلیمی، در مجموع ۱۶۵ نقشه منحنیهای هم‌ارزش تهیه گردید. پس از تهیه منحنیهای هم‌ارزش، ارزش متوسط وزنی هر معیار برای هر یک از مناطق تعیین شد. به این منظور ابتدا سطوح بین منحنیها در هر منطقه با پلانیمتر دیجیتال محاسبه و مساحت هر سطح تعیین گردید، سپس با ضرب مساحت اندازه‌گیری شده در میانگین پارامتر آن سطح، ارزش وزنی آن سطح تعیین شد. با جمع کردن ارقام مربوط، ارزش وزنی آن معیار برای هر منطقه از مناطق هفتگانه تعیین گردید.

### ۳-۵- مدلسازی چند متغیره

روشهای مختلفی برای ورود متغیرها به مدل رگرسیونی وجود دارد. در نرم‌افزار آماری Spss پنج روش Enter, Stepwise, Backward, Forward, Removed برای ورود متغیرها به مدل رگرسیون وجود دارد [۷]. در این قسمت با آمار موجود، کلیه این روشها





بررسی شده. اما از آنجا که با دو روش Forward و Removed عملاً برای تمام مناطق مدل ساخته نشد یا مدل‌های ساخته شده از کارایی خوبی برخوردار نبود، لذا در این قسمت فقط مدل‌های مربوط به بقیه روشها بحث می‌شود.

### ۳-۵-۱- روش Enter

در این روش کلیه معیارهای مربوط، در یک مرحله واحد مدل و در نهایت یک مدل برای برآورد محصول در کل استان و هفت مدل دیگر برای هفت منطقه مورد نظر تهیه شد. با بررسی‌های به عمل آمده، مشاهده گردید که میزان عملکرد محصول پیش‌بینی شده با استفاده از مدلها با میزان عملکرد واقعی مشاهده شده محصول در سالهای قبل همبستگی بسیار بالایی را نشان می‌دهد، به طوری که برای مدل استان همبستگی ۱۰۰ درصد است. کمترین میزان همبستگی نیز مربوط به منطقه پیرانشهر است که همبستگی آن ۰/۸۸۴ است (جدول ۱).

جدول ۱ میزان همبستگی بین عملکرد محصول محاسبه شده با عملکرد واقعی مشاهده شده محصول با روش Enter

انحراف معیار	R <sup>۲</sup>	R	منطقه
۱۳۱/۱۴۶	۰/۹۲۰	۰/۹۵۹**	خوی
۲۰/۵۴۸	۰/۸۸۱	۰/۹۳۹**	مهاباد
۱۴۷/۸۶۰	۰/۹۲۶	۰/۹۶۲**	ماکو
۳۳/۹۹۵	۰/۷۸۳	۰/۸۸۵**	میاندواب
۲۳۹/۶۴۶	۰/۷۹۷	۰/۸۹۳**	سردشت
۱۵۴/۹۲۳	۰/۹۴۴	۰/۹۷۲**	ارومیه
۴۵۸/۴۹۱	۰/۷۸۲	۰/۸۸۴**	پیرانشهر
—	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰**	کل استان

\*\* همبستگی در سطح ۰/۰۱ معنادار است.

با دقت در مدل‌های به دست آمده مشاهده می‌شود که در مدل‌های مناطق هفتگانه تمام متغیرها وارد مدل شده ولی در مدل مربوط به استان آذربایجان غربی فقط ۶ متغیر به مدل وارد شده و البته میزان همبستگی به دست آمده نیز بسیار بالا و ۱۰۰ درصد است.

به این ترتیب برای آنکه با درصد اطمینان بالایی بتوان میزان عملکرد محصول گندم دیم را در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی پیش‌بینی کرد می‌توان از مدل‌های روش Enter و برای پیش‌بینی میزان عملکرد محصول در کل استان نیز می‌توان از این مدل استفاده کرد.

### ۳-۵-۲- روش Stepwise

از آنجا که یکی از اهداف پژوهش حاضر شناخت متغیرهای تأثیرگذار در میزان عملکرد محصول بود و نیز از آنجا که مدل‌های به دست آمده در روش Enter تمام ۱۱ معیار اولیه را در مدل دخالت داده‌اند (به جز مدل مربوط به کل استان) و به کارگیری هر ۱۱ معیار در مدلها مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است، لذا این سؤال پیش می‌آید که آیا می‌توان با استفاده از روشهای دیگر معیارهای مستقل را به ۳ تا ۴ پارامتر اصلی تقلیل داد یا خیر. به همین منظور با روشهای دیگر مدلسازی رگرسیون چند متغیره نیز کار تهیه مدلها انجام شد. در روش Stepwise متغیرهای مستقل به صورت مرحله‌ای از مهمترین متغیر تا کم‌اهمیت‌ترین آنها وارد مدل شد. برای شش منطقه مهاباد، خوی، ماکو، میاندوآب، ارومیه و پیرانشهر شش مدل تهیه شد (جدول ۲).

جدول ۲ میزان همبستگی بین عملکرد محصول محاسبه شده و عملکرد واقعی مشاهده شده محصول با روش Stepwise

منطقه	R	R <sup>۲</sup>	انحراف معیار
خوی	۰/۸۳۱**	۰/۶۹۰	۱۲۸/۹۸۰
مهاباد	۰/۶۷۳**	۰/۴۵۳	۲۱۵/۰۷۵
ماکو	۰/۸۳۸**	۰/۷۰۲	۱۴۲/۳۳۸
میاندوآب	۰/۵۲۶**	۰/۲۷۷	۲۹۷/۲۵۳
ارومیه	۰/۶۵۵**	۰/۴۲۹	۲۳۷/۸۶۰
پیرانشهر	۰/۸۴۳**	۰/۷۱۰	۲۶۴/۵۵۵

\*\* همبستگی در سطح ۰/۰۱ معنادار است.

\* همبستگی در سطح ۰/۰۵ معنادار است.

به طوری که ملاحظه شد عملاً برای منطقه سردشت و نیز کل استان آذربایجان غربی مدلی با روش Stepwise به دست نیامد. این امر نشانگر آن است که در این دو منطقه هیچ متغیری که سطح اهمیت بسیار بالایی نسبت به سایرین داشته باشد وجود نداشته است.



با بررسی‌های به عمل آمده در مدل‌های تهیه شده با روش Stepwise مشاهده گردید که مدل‌های به دست آمده را نمی‌توان برای پیش‌بینی صحیح عملکرد میزان محصول به کار برد؛ زیرا اولاً در این روش برای منطقه سردشت و کل استان نمی‌توان مدلی ارائه نمود، ثانیاً متغیرهای به کار رفته در مدلها کم است به طوری که برای مثال در مدل‌های ارائه شده با این روش برای مدل ماکو فقط مجموع بارش ماه آوریل و برای مدل ارومیه فقط میانگین دمای متوسط ماه ژوئن لحاظ شده است، ثالثاً با ارزیابی مدل‌های به دست آمده مشاهده شد که میزان همبستگی بین عملکرد محصول پیش‌بینی شده با مدلها، با میزان عملکرد واقعی مشاهده شده محصول در سالهای قبل برای برخی مناطق درصد پایینی را نشان می‌دهد.

### ۳-۵-۳- روش Backward

در این روش ابتدا کلیه متغیرها با روش Enter به مدل وارد شده و سپس با معیار حذف تعیین شده، ابتدا متغیری که از همه کم‌اهمیت‌تر است از مدل حذف شده و این عمل تا حذف تدریجی کلیه متغیرهای کم‌اهمیت ادامه یافته است و در نهایت یک مدل برای کل استان آذربایجان غربی و هفت مدل دیگر برای هفت منطقه مورد نظر به دست آمده است.

با بررسی‌های به عمل آمده مشاهده گردید که میزان عملکرد محصول پیش‌بینی شده با استفاده از این مدلها با میزان عملکرد واقعی مشاهده شده محصول در سالهای قبل همبستگی قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. به طوری که برای مدل منطقه ماکو همبستگی بالای ۹۰ درصد است و برای سایر مناطق و نیز کل استان همبستگی از ۸۲ درصد بالاتر است و فقط مدل مربوط به منطقه میاندواب همبستگی ۷۸/۵ درصد را نشان می‌دهد (جدول ۳).

مدل‌های به دست آمده با روش Backward از نظر تعداد متغیرها نسبت به مدل‌های ساخته شده با روش Enter و روش Stepwise برتری دارند یعنی نه تعدادشان مثل مدل‌های روش Enter زیاد است و نه مثل مدل‌های روش Stepwise کم است و در تمام ۸ مدل ۳ یا ۴ متغیر دخالت دارند. همچنین در این مدلها نسبت به روش Stepwise همبستگی بالاتری بین عملکرد محصول محاسبه شده و عملکرد واقعی مشاهده شده محصول وجود دارد. به همین دلیل می‌توان این مدلها را به عنوان مدل‌های نهایی پیش‌بینی میزان عملکرد محصول گندم جدول ۳ میزان همبستگی بین عملکرد محصول محاسبه شده و عملکرد واقعی مشاهده شده محصول

با روش Backward



منطقه	R	R <sup>2</sup>	انحراف معیار
خوی	۰/۸۶۸**	۰/۷۵۴	۱۲۰/۰۵۳
مهاباد	۰/۸۶۰**	۰/۷۳۹	۱۶۹/۴۵۳
ماکو	۰/۹۲۰**	۰/۸۴۶	۱۱۶/۷۳۴
میاندوآب	۰/۷۸۵**	۰/۶۱۷	۲۴۷/۶۹۰
سردشت	۰/۸۲۰**	۰/۶۷۲	۱۵۸/۰۲۸
ارومیه	۰/۸۹۹**	۰/۸۰۹	۱۵۷/۰۲۸
پیرانشهر	۰/۸۴۱**	۰/۷۰۷	۲۷۷/۶۴۱
کل استان	۰/۸۹۲**	۰/۸۷۶	۱۶۷/۴۹۶

\*\* همبستگی در سطح ۰/۰۱ معنادار است.

دیم در مناطق هفتگانه استان آذربایجان غربی به کار برد. اما از آنجا که مدل ساخته شده با روش Enter برای کل استان آذربایجان غربی متغیرهای کمی دارد (۶ متغیر)، به عنوان مدل نهایی پیش‌بینی عملکرد محصول در استان آذربایجان غربی پیشنهاد می‌شود.

**۳-۶- مدل‌های نهایی پیش‌بینی میزان عملکرد گندم در استان آذربایجان غربی**  
با توجه به نتایجی که در بخش ۳-۵ به دست آمد، مدل‌های زیر بر مبنای روش Backward به عنوان مدل‌های نهایی پیش‌بینی عملکرد محصول گندم در استان آذربایجان غربی و نیز برای پیش‌بینی عملکرد محصول در کل استان معرفی شده است.

**۳-۶-۱- مدل پیش‌بینی میزان عملکرد گندم در منطقه ماکو**


$$Y = -0.394/1.08 + 4/567 X_1 - 3/6.2 X_2 + 237/0.64 X_3 - 66/375 X_4 \quad (2)$$

Y میزان بازده محصول (کیلوگرم/هکتار)، X<sub>1</sub> مجموع بارش سالیانه (میلیمتر)، X<sub>2</sub> مجموع بارش ماه اکتبر (میلیمتر)، X<sub>3</sub> میانگین دمای متوسط ماه ژوئن (درجه سانتیگراد)، X<sub>4</sub> میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل.

**۳-۶-۲- مدل پیش‌بینی میزان عملکرد گندم در منطقه خوی**

$$Y = -6.05/252 + 3/1.3 X_1 + 6/651 X_2 + 67/642 X_3 \quad (3)$$

Y میزان بازده محصول (کیلوگرم/هکتار)، X<sub>1</sub> مجموع بارش ماه اکتبر (میلیمتر)، X<sub>2</sub>





مجموع بارش ماه مه (میلیمتر)،  $X_3$  میانگین دمای متوسط ماه اکتبر (درجه سانتیگراد).

۳-۶-۳- مدل پیش‌بینی میزان عملکرد گندم دیم در منطقه خوی

$$Y = -2247/196 + 112/667 X_1 + 56/203 X_2 - 42/702 X_3 + 59/886 X_4 \quad (4)$$

$Y$  میزان بازده محصول (کیلوگرم/هکتار)،  $X_1$  میانگین دمای متوسط ماه ژوئن (درجه سانتیگراد)،  $X_2$  میانگین رطوبت نسبی سالیانه (درصد)،  $X_3$  میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر (درصد)،  $X_4$  میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل.

۳-۶-۴- مدل پیش‌بینی میزان عملکرد گندم دیم در منطقه پیرانشهر

$$Y = -5522/763 X + 12/787 X_1 + 282/576 X_2 + 323/656 X_3 \quad (5)$$

که در آن  $Y$  میزان بازده محصول (کیلوگرم/هکتار)،  $X_1$  مجموع بارش ماه آوریل،  $X_2$  میانگین دمای متوسط سالیانه (درجه سانتیگراد)،  $X_3$  میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه.

۳-۶-۵- مدل پیش‌بینی میزان عملکرد گندم دیم در منطقه مهاباد

$$Y = 663/052 + 1/058 X_1 - 2/686 X_2 + 151/825 X_3 - 192/463 X_4 \quad (6)$$

که در آن  $Y$  میزان بازده محصول (کیلوگرم/هکتار)،  $X_1$  مجموع بارش سالیانه (میلیمتر)،  $X_2$  مجموع بارش ماه اکتبر (درجه سانتیگراد)،  $X_3$  میانگین دمای متوسط ماه اکتبر (درجه سانتیگراد)،  $X_4$  تعداد روزهای یخبندان سالیانه.

۳-۶-۶- مدل پیش‌بینی میزان عملکرد گندم دیم در منطقه سردشت

$$Y = 2766/833 + 5/638 X_1 - 206/798 X_2 + 78/047 X_3 \quad (7)$$

که در آن  $Y$  میزان بازده محصول (کیلوگرم/هکتار)،  $X_1$  میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر (درصد)،  $X_2$  میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه،  $X_3$  میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل.

۳-۶-۷- مدل پیش‌بینی میزان عملکرد گندم دیم در منطقه میاندواب

$$Y = -1160/559 + 1/013 X_1 + 96/903 X_2 + 35/394 X_3 - 24/194 X_4 \quad (8)$$

که در آن  $Y$  میزان بازده محصول (کیلوگرم/هکتار)،  $X_1$  مجموع بارش سالیانه،  $X_2$  میانگین دمای متوسط سالیانه (درجه سانتیگراد)،  $X_3$  میانگین رطوبت نسبی سالیانه (درصد)،

$X_4$  میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر (درصد).

۳-۶-۸- مدل پیش‌بینی میزان عملکرد گندم دیم برای کل استان آذربایجان غربی در

منطقه میان‌دواب

$$Y = -24.091/0.045 - 8/487 X_1 - 100.6/990 X_2 + 1647/793 X_3 - 287/614 X_4 - 2170/792 X_5 + 900/206 X_6 \quad (9)$$

که در آن  $Y$  میزان بازده محصول (کیلوگرم/هکتار)،  $X_1$  مجموع بارش سالیانه (میلیمتر)،  $X_2$  میانگین دمای متوسط ماه اکتبر (درجه سانتیگراد)،  $X_3$  میانگین دمای متوسط ماه ژوئن (درجه سانتیگراد)،  $X_4$  میانگین رطوبت نسبی سالیانه (درصد)،  $X_5$  میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه،  $X_6$  میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل.

### ۳-۷- تحلیل مدل‌های نهایی پیش‌بینی عملکرد محصول

همان‌طور که از روابط موجود در بخش ۳-۶ استنباط می‌شود، برخی معیارهای اقلیمی در اکثر مدل‌ها وجود داشته و برخی فقط در یک مدل به چشم می‌خورد. مثلاً معیارهای مجموع بارش سالیانه، میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه و میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل در چهار مدل از هشت مدل به کار رفته است. همچنین معیارهای مجموع بارش ماه اکتبر، میانگین دمای متوسط ماه اکتبر، میانگین دمای متوسط ماه ژوئن، میانگین رطوبت نسبی سالیانه و میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر هر یک در سه مدل تکرار شده است، در حالی که سه معیار مجموع بارش ماه آوریل، مجموع بارش ماه مه و میانگین دمای متوسط سالیانه هر یک فقط در سه مدل به کار رفته است. این امر نشانگر آن است که در مورد بارش، مجموع بارش سالیانه اهمیت بیشتری نسبت به بارش ماه آوریل و ماه مه دارد و نیز درجه حرارت در ماه اکتبر (در زمان جوانه زدن) و ماه ژوئن (در زمان رسیدن و برداشت دانه) اهمیت بیشتری نسبت به میانگین درجه حرارت متوسط سالیانه دارد. نکته قابل توجه در مدل‌های محاسبه شده وجود ضرایب منفی در معیارهای مورد توجه است که بیانگر نبود رابطه مثبت بین مقدار محصول و آن معیار و به نحوی بیانگر نارسایی مدل است. بنابراین در استفاده از مدل نهایی، ارزشهای منفی باید مد نظر قرار گیرد و به نحوی تعدیل شود.

به این ترتیب همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مدل‌های مختلفی برای مناطق مختلف استان به دست آمده است و معیارهای اقلیمی به کار رفته مدل در هر یک از مناطق با منطقه دیگر



تفاوت دارد. به عبارت دیگر هر منطقه یک مدل خاصی برای پیش‌بینی عملکرد محصول داشته و نمی‌توان از مدل یک منطقه برای پیش‌بینی عملکرد محصول منطقه دیگر استفاده نمود. در اینجا سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا می‌توان به یک مدل واحد دست پیدا کرد که بتوان از طریق آن میزان عملکرد محصول را برای کل استان و مناطق مختلف آن پیش‌بینی کرد؟ برای پاسخگویی به این سؤال با بررسی مدل‌های مربوط و با حذف پارامترها به روش دستی، مدل نهایی مشترک برای تمام نقاط استان را به دست آورده و به بررسی میزان کارایی آن می‌پردازیم.

### ۳-۸- روش حذف دستی

از آنجا که هدف از مدلسازی دستیابی به یک مدل واحد برای تمام مناطق بود؛ به طوری که بتوان با ارائه یک مدل واحد میزان عملکرد محصول را در هر منطقه پیش‌بینی کرد، لذا در این قسمت معیارهای موجود در مدل‌های نهایی به دست آمده برای مناطق از طریق روش Backward با هم مقایسه شده و معیارهایی که در بیشتر مناطق در مدل نهایی باقی مانده بود، انتخاب و معیارهای مجموع بارش ماه آوریل، مجموع بارش ماه مه و میانگین دمای متوسط سالیانه که هر یک فقط در یکی از مدل‌ها بود. حذف شد (جدول ۴).

جدول ۴ معیارهای موجود در مدل نهایی مناطق به روش Backward

تعداد	سردهشت	پیرانشهر	ارومیه	میاندواب	ماکو	مهاباد	خوی	معیارهای اقلیمی
۳				×	×	×		مجموع بارش سالیانه
۳					×	×	×	مجموع بارش ماه اکتبر
۱		×						مجموع بارش ماه آوریل
۱							×	مجموع بارش ماه مه
۱		×						میانگین دمای متوسط سالیانه
۲						×	×	میانگین دمای متوسط ماه اکتبر
۲			×		×			میانگین دمای متوسط ماه ژوئن
۲			×	×				میانگین رطوبت نسبی سالیانه
۳	×		×	×				میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر
۳	×	×						میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه





مدلسازی میزان عملکرد محصول گندم دیم با توجه...

۳	×		×		×	×	میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل
---	---	--	---	--	---	---	--

به این ترتیب با حذف معیارهای فوق، کار مدلسازی با معیارهای باقیمانده ادامه یافت و هفت مدل دیگر به روش Backward برای مناطق تهیه شد. با بررسی این مدلها مشاهده شد که برخی معیارها در مدلهای ۱ کمتر به کار رفته و برخی دیگر در اغلب مدلهای باقی مانده است (جدول ۵).

جدول ۵ معیارهای موجود در مدلهای ۱ مناطق به روش Backward

تعداد	سردشت	پیرانشهر	ارومیه	میاندواب	ماکو	مهاباد	خوی	معیارهای اقلیمی
۵	×	×		×	×	×		مجموع بارش سالیانه
۵		×	×	×	×	×		مجموع بارش ماه اکتبر
۲	×					×		میانگین دمای متوسط ماه اکتبر
۴	×			×	×		×	میانگین دمای متوسط ماه ژوئن
۲			×				×	میانگین رطوبت نسبی سالیانه
۴	×		×	×			×	میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر
۲	×					×		میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه
۴	×		×		×		×	میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل

لذا در این قسمت نیز سه معیار متوسط دمای ماه اکتبر، میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه و میانگین رطوبت نسبی سالیانه حذف شد و کار مدلسازی با پنج معیار باقیمانده ادامه یافت و هفت مدل دیگر با روش Backward برای مناطق تهیه گردید. در مدلهای تهیه شده در این مرحله - مدلهای شماره ۲ - نیز مشاهده گردید که می توان برخی معیارهای کمتر تکرار شده را حذف نمود (جدول ۶).

جدول ۶ معیارهای موجود در مدلهای ۲ مناطق به روش Backward

تعداد	سردشت	پیرانشهر	ارومیه	میاندواب	ماکو	مهاباد	خوی	معیارهای اقلیمی
۵		×	×	×	×	×		مجموع بارش سالیانه
۳			×		×		×	مجموع بارش ماه اکتبر
۱					×			میانگین دمای متوسط ماه ژوئن



۵	×	×		×		×	×	میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر
۳	×				×		×	میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل

در این مرحله از کار مدلسازی نیز مشاهده گردید که پارامتر میانگین دمای متوسط ماه ژوئن فقط در مدل ماکو آمده و در مدل مناطق دیگر حذف شده است، لذا در این مرحله معیار میانگین دمای متوسط ماه ژوئن حذف شده و کار مدلسازی با سایر معیارها ادامه یافت و در نهایت با چهار معیار باقی مانده در مدل، یعنی مجموع بارش سالیانه، مجموع بارش ماه اکتبر، میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر و میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل، هفت مدل برای مناطق و یک مدل برای کل استان به روش Backward تهیه شد. ضرایب مربوط به مدلها در جدول ۷ آمده است.

جدول ۷ عدد ثابت و ضرایب مربوط به مدل نهایی مناطق هفتگانه مدل کلی و استان آذربایجان غربی



با بررسیهای به عمل آمده مشاهده گردید که میزان عملکرد محصول پیش‌بینی شده با این مدلها با میزان عملکرد واقعی مشاهده شده محصول در سالهای قبل برای منطقه ارومیه و منطقه ماکو همبستگی نسبتاً خوبی را نشان می‌دهد (جدول شماره ۸). اما برای سایر مناطق همبستگیها چندان رضایت بخش نیست و ارقام به دست آمده با مدل‌های مزبور را نمی‌توان برای پیش‌بینی عملکرد محصول به کار برد.

جدول ۸ میزان همبستگی بین عملکرد واقعی مشاهده شده محصول و عملکرد محصول محاسبه شده با مدل‌های نهایی

منطقه	R	R <sup>2</sup>	انحراف معیار
خوی	-.۷۲۷**	-.۵۲۹	۱۵۲/۸۶۴
مهاباد	-.۵۲۱**	-.۲۷۱	۲۴۸/۳۲۵
ماکو	-.۷۸۴**	-.۶۱۴	۱۶۱/۹۳۲
میاندواب	-.۷۴۳**	-.۵۵۲	۲۳۳/۸۰۹
ارومیه	-.۸۲۱**	-.۶۷۳	۱۷۹/۸۹۹
پیرانشهر	-.۵۵۳*	-.۳۰۶	۳۹۳/۱۱۱
سردشت	-.۶۳۶*	-.۴۰۵	۱۹۷/۱۳۹
کل استان	-.۸۲۹**	-.۷۹۵	۱۳۵/۳۹۶۸

\*\* همبستگی در سطح ۰/۰۱ معنادار است.

\* همبستگی در سطح ۰/۰۵ معنادار است.

#### ۴- نتیجه‌گیری


همان گونه که ملاحظه شد کار مدلسازی میزان عملکرد محصول با روشهای مختلف انجام شد و مدل‌های به دست آمده تجزیه و تحلیل گردید. در نهایت با توجه به میزان همبستگی به دست آمده بین عملکرد محصول محاسبه شده برای سالهای ۱۳۶۲-۱۳۷۲ و عملکرد واقعی



محصول در این سالها، کارایی مدل‌های روش Enter از سایر مدل‌ها بهتر بود (جدول ۹). ولی به لحاظ آن که در این مدل‌ها تمام یازده معیار اقلیمی دخالت داشت با روش‌های دیگری نیز کار مدلسازی انجام شد. مدل‌های روش Stepwise و همچنین مدل‌های روش حذف دستی نیز با وجود داشتن معیارهای کمتر، به دلیل به دست دادن همبستگی کم بین عملکرد محصول محاسبه شده و مشاهده شده، در عمل کارایی خوبی را نشان ندادند و در نهایت مدل‌های روش Backward به عنوان مدل‌های نهایی برای پیش‌بینی میزان عملکرد محصول گندم در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی انتخاب شدند و برای پیش‌بینی میزان عملکرد محصول در کل استان نیز مدلی انتخاب گردید که با روش Enter با داشتن شش معیار مستقل به دست آمده بود.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرتال جامع علوم انسانی



جدول ۹ میزان همبستگی بین عملکرد واقعی مشاهده شده محصول و عملکرد محصول محاسبه شده با روشهای مختلف

حذف دستی	Backward		Stepwise		Enter		روش مناطق		
	R <sup>۲</sup>	R	R <sup>۲</sup>	R	R <sup>۲</sup>	R			
	۰/۵۲۹	۰/۷۲۷**	۰/۷۵۴	۰/۸۶۸**	۰/۶۹۰	۰/۸۳۱**	۰/۹۲۰	۰/۹۵۹**	خوی
	۰/۲۷۱	۰/۵۲۱**	۰/۷۳۹	۰/۸۶۰**	۰/۴۵۳	۰/۶۷۳**	۰/۸۸۱	۰/۹۳۹**	مهاباد
	۰/۶۱۴	۰/۷۸۴**	۰/۸۴۶	۰/۹۲۰**	۰/۷۰۲	۰/۸۳۸**	۰/۹۲۶	۰/۹۶۲**	ماکو
	۰/۵۵۲	۰/۷۴۳**	۰/۶۱۷	۰/۷۸۵**	۰/۲۷۷	۰/۵۲۶**	۰/۷۸۴	۰/۸۸۵**	میاندواب
	۰/۶۷۳	۰/۸۲۱**	۰/۶۷۲	۰/۸۲۰**	-	-	۰/۷۹۷	۰/۸۹۳**	سردشت
	۰/۳۰۶	۰/۵۵۳**	۰/۸۰۹	۰/۸۹۹**	۰/۴۲۹	۰/۶۵۵**	۰/۹۴۴	۰/۹۷۳**	ارومیه
	۰/۴۰۵	۰/۶۳۶**	۰/۷۰۷	۰/۸۴۱**	۰/۷۱۰	۰/۸۴۳**	۰/۷۸۲	۰/۸۸۴**	پیرانشهر
	۰/۷۹۵	۰/۸۲۹**	۰/۸۷۶	۰/۸۲۹**	-	-	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰**	کل استان

از آنجا که یکی از اهداف این پژوهش شناخت معیارهای اقلیمی و بررسی میزان تأثیر آنها در میزان عملکرد محصول گندم در استان آذربایجان غربی بود، چنین به نظر می‌رسد که پژوهش حاضر تا اندازه‌ای توانسته است این معیارها را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، این معیارها برای تمامی مناطق استان آذربایجان غربی یکسان نبوده ولی برخی معیارها همچون مجموع بارش سالیانه و میانگین تعداد روزهای یخبندان در مدل‌های بیشتری به کار رفته است.

برخلاف تصور اولیه که به نظر می‌رسید معیارهای درجه حرارت نقش مؤثری در مدل‌ها خواهد داشت، ملاحظه شد که فقط در مدل‌های دو منطقه خوی و مهاباد میانگین درجه حرارت ماه اکتبر دخالت دارد و میانگین درجه حرارت متوسط ماه ژوئن نیز در مدل‌های دو منطقه ماکو و ارومیه و معیار میانگین دمای متوسط سالیانه فقط در مدل منطقه پیرانشهر به کار رفته است.

در مورد معیارهای بارش نیز مؤثرترین معیارها دو معیار مجموع بارش سالیانه و مجموع بارش ماه اکتبر است. مجموع بارش سالیانه در مدل‌های مناطق ماکو، مهاباد، میاندواب و مدل استان آذربایجان غربی و مجموع بارش ماه اکتبر در مدل‌های مناطق ماکو، خوی و



مهاباد مؤثر بوده است. در حالی که معیار مجموع بارش ماه آوریل فقط در مدل منطقه پیرانشهر و مجموع بارش ماه مه فقط در مدل منطقه خوی به کار رفته است. همچنین معیارهای رطوبت نسبی و تعداد روزهای یخبندان نیز معیارهای بسیار تأثیرگذاری است. میانگین رطوبت نسبی سالیانه در مناطق ارومیه و میاندوآب و میانگین رطوبت نسبی ماه اکتبر در مناطق ارومیه، میاندوآب و سردشت از معیارهای تأثیرگذار در عملکرد میزان محصول است. میانگین تعداد روزهای یخبندان سالیانه در عملکرد میزان محصول مناطق پیرانشهر، مهاباد و سردشت و میانگین تعداد روزهای یخبندان ماه آوریل در عملکرد میزان محصول مناطق ماکو، ارومیه و سردشت مؤثر است.

البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت و آن محدود بودن آمار و اطلاعات لازم برای بررسی همه جانبه تأثیر عوامل اقلیمی بر عملکرد محصول است. همان طور که قبلاً نیز به آن اشاره شد اغلب ایستگاههای هواشناسی استان آذربایجان غربی جدیدالتأسیس است و حتی برای پانزده سال آماری اخیر که در این پژوهش از آن استفاده شده است، فاقد آمار و اطلاعات کافی بوده است و همین محدود بودن تعداد سالهای آماری یکی از مشکلات پژوهش حاضر است و مسلماً در صورت وجود آمار سی ساله نتایج بهتری کسب می‌شد.

## ۵- منابع

- [1] Gopaldaswamy, N., Agricultural Meteorology, New Dehli, Rawat, 1994.
- [2] Mavi, H. S., Introduction to Agrometeorology, London, Oxford & IBH Publi-shing Co., 1986.
- [3] Price-Budgen, Avrill, Using Meteorological Information and Products, London, Ellis, Horwood, 1990.
- [4] صارمی، منصور، «بررسی حساسیت ارقام گندم در مراحل مختلف رشد فیزیولوژیکی نسبت به کمبود رطوبت»، خلاصه مقالات اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.
- [5] سردمنیا، غلامحسین، «اثر درجه حرارت نامناسب بر رشد و عملکرد ۵ رقم گندم پاییزه»، مجله علوم کشاورزی ایران، ج. ۲۶، ش. ۲، ۱۳۷۴.
- [6] سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی، آمار نامه کشاورزی استان آذربایجان غربی، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی، ۱۳۷۶.
- [7] شرکت آمار پردازان، راهنمای کاربری Spss 6.0 for Windows، ج. دوم، تهران، مرکز فرهنگی



پروژه شگانه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرتال جامع علوم انسانی

