

کودک و بیماری



در اطاق بیمار

نگهداری از کودکی بیمار، کار آسانی نیست. زیرا، کودک درک نمی‌کند که چرا باید در تخت دراز بکشد، چرا پرسک از او عیادت می‌کند و چرا احساس درد و ناراحتی می‌کند.

بدين جهت همه چیز باید روال طبیعی خود را تا حد ممکن حفظ کند. به علت اصرار و تاکید زیاده از حد بر رعایت بهداشت، کودک را از محیط آشنای خود دور نکنید. او را در تخت خود در اطاق بجهه بگذارید و اگر فاصله بین اطاق بجهه و اطاق نشیمن زیاد است، تخت او را به اطاق نشیمن سیاورید "استثنای فقط در مورد بیماری‌های مسری خطرناک، که کودک حتماً باید



شمار احس نکند . از خود آرامش و اطمینان
نشان دهید ، تا کودک شما احساس ترس و عدم
اطمینان ننماید . بدون عجله و ناراحتی
اقدامات لازم را نجام دهید .

کودکان بیمار معمولاً ، به شدت حضور مادر
را نزد خود طلب می کنند . با بارگذاشتن
در ، به کودک امکان دهید که برای شما
بیند . برخی از کارهارانیز ، می توانند در
اطاق کودک انعام دهید .

وقت کافی برای قصه کفتن برای کودک و تماشای
کتاب های مصور همراه با کودک خود را نظر
سگیرید . بدین ترتیب کودک ، خود را طرد شده
حس نخواهد کرد .

برای اینکه مانع بیخوصلکی طفل بشوید اسباب
بازیهایی برای بازی در تخت درست رش قرار
دهید میز کوچکی نیز در کنار تخت اوبکدارید ،
ناکودک در صورت نشستن بر روی تخت ، اسباب
بازیهارابر روی میز بجیند .

با وجود تمام رحماتی که می کشد ، زمانی
میرسد که کودک بعلت بی خوصلکی میل به ترک
تخت دارد . این اجازه را به کودک بدھیمد ،
اگر نون ، پرشکان بسیاری بزاین عقیده هستند
که ، ضررها روانی که در اثر ماندن اجباری
کودک در تخت بوجود می آید ، بیشتر از حسنه -
های متبت آن ، یعنی سلامت جسمی کودک است
پس از آنکه کودک مدتی در اطاق راه رفت
دوباره با علاقه به تخت پرسکشته ، استراحت
می کند . باید تا بهبودی کامل کودک از
هیجانات شدید (آمدن کودکان دیگر و سما
سر و صدای خواهران و برادران) اجتناب نمود .

عيادت پرشک و بیمارستان
هر بار که کودک خود را برای عیادت پرشک آماده

نتیجا باشد ، وجود دارد .) بدین ترتیب
خود را " مطمئن " حس کرده ، بیماری را عنوان
چیزی غریب و تپیدید کننده در نظر نخواهد
گرفت . اگر بیماری مدت زمان طولانی ادامه
یابد ، وضعیت فرق می کند . بیماری طولانی
معمولًا تغییرات ایکانات و وسائل رسیدگی به بیمار
این تغییرات ایکانات و وسائل رسیدگی به بیمار
تهیمه می شود . (امکانات شست و شوی
بیمار در اطاق ، تشک مخصوص وغیره) پرشک
در این زمینه به شما کم خواهد کرد .

تعویض هوای اطاق بیمار یکی از نکات بسیار
مهم است . اما از کوران هواباید بهشت دوری
جست . اکسیژن تاره باعث فعالیت ششهای شده
و بهترین پیشکری برای جلوگیری از ذات الریه
ناشی از استراحت طولانی است . در حمحرارت
اطاق - بویزه درمورد . بیماریهای همراه با این
و سرماخوردگی - نباید بالاتر از ۲۰ درجه
سانتیگراد باشد . مسائله باکریگی اطاق بیمار
نیز بینی نهایت مهم است . هر روز اطاق را با
پارچه نمدار گردکری کنید . از جارو کردن احتراز
کنید . زیرادرگرد و غباری که در اثر جارو کردن بر
مسی خیزد ، باکتریهای بسیاری وجود دارد .
بقا یای غذا ولکن مدفعه وادرار - بعلت
دارا بودن میکرب - باید فوراً از اطاق بیمار
خارج کردد . لباس خواب را باید هر روز تعویض
کرد ، در صورت امکان در بیماریهای همراه با
تب ، ملافه نیز باید روزانه عوض شود .

دارو راه رکز در دسترس کودک در اطاق
نگذارید ، امکان دارد کودک دارو هارا خورده و به
خود زیان برسسد .

رفتار شخص ماء نوس طبیعتنا " وقتی که کودک شما بیمار است ، شما
ناراحت هستید ، سعی کنید که کودک ناراحتی

ساده‌تر سودمند موقعيت کودک خود انجام مي‌دهيد به او غذاها و بوشابه‌هایی که دوست دارد مي‌دهيد وقت بيشتری صرف اومی کنید ، با اقبالی کرده و با صبر و حوصله امیال شرآورده می‌کنید . حتماً ملاحظه حساسیت زیاده‌زار حد و تغیيرات خلق و خوش اورانیز خواهيد کرد . تمام این اعمال کامل صحیح است . از آنجا که کودک در این سن علت بیماری و حریان آن رانمی داند ، بیماری به شدت باعث ناراحتی اومی گردد . محبت و توجه شما به کودک عامل متعادل کننده‌ای برای ازیمان بردن ناراحتیهای ناشی از بیماریست . به مخصوص آنکه کودک حالت بهتر شد ، خود به خود - حتی اگر شما اورا کمی هم لوس کرده باشید - میل به انجام فعالیتهای همیشگی خود را پیدا خواهد کرد خطر فقط زمانی که ، شما "مرحله طبیعی شدن" را به ناء خیر بیندازید وجود خواهد داشت . در این صورت کودک می‌تواند به سادگی از درد و ضعف به عنوان وسیله فشار استفاده کند . او می‌تواند تبدیل به کودکی پرمدعا گردد که همیشه به دیگران دستور می‌دهد و آنان را مجبور به رسیدگی به خود می‌کند .

علامت‌های مهم در کودک بیمار دقت کنید که ، اطلاعات داده شده در این بخش نمی‌توانند جانشین پرشک‌گردند (حتی اگر این اطلاعات بسیار کامل نیز بودند ، باره‌نمی‌توانستند جایگزین پرشک‌گردند .) در اینجا بیشتر نکاتی تذکر داده می‌شوند که ، باعث دقت و توجه شما می‌گردند تا بتوانید کودک را از لحاظ بدنی به خوبی مورد مشاهده قرار دهید اگر متوجه شدید که چیزی غیرعادی در کودک به چشم می‌خورد که علت آن رانمی دانید و فکر می‌کنید که ، بتواند احتمالاً شروع یک بیماری

می‌کنید ، بحاویگوئید که ، پرشک برای کمیک کردن می‌آید و کارهایی را که پرشک انجام خواهد داد ، برای اوتوضیح دهید . در هنگام معاينه برای آنکه کودک ناگهان با فردی بیگانه در اطاق تنها نماند ، شما نیز در اطاق حاضر باشید و در هنگامی که کودک دچار ترس می‌گردد او را آرام کنید . طوری با پرشک صحبت کنید که ، کودک حسکند شما نیز از پرشک خوشتان می‌آید و به اعتماد و اطمینان دارید . در حضور کودک هم می‌توانید با پرشک راحع به بیماری کودک صحبت کنید . راجع به زمان استراحت نیز معماهی برای کودک بوجود نباورید . وعده‌های غلط مانند "فردا حالت خوب خواهد شد" آنوقت مجبور نیستی استراحت کنی "که باعث پیدا شی امید غیر قابل تحقق می‌گردد" به کودک ندهید . فقط در زمانی که واقعاً "واجب و ضروری است ، کودک را برای مشاهده معاينه و معالجه به بیمارستان بفرستید . زیرا حتی در صورت بهترین مراقبتها ، رفتن کودک به بیمارستان بمتابه شوکی برای کودک است . حتی امکان دارد که ، کودک جدایی از شما را به عنوان تنبیه در نظر گیرد . ناشیرات روانی معمولاً سخت ترازنی را احتیاطی بدنی التیام می‌باشد . برخی از بیمارستانها به مادر امکان می‌دهند که همراه کودک در بیمارستان باشند . اگر از لحاظ زمانی و اقتصادی قادر به انجام این کارهستید ، حتماً با کودک خود در بیمارستان بمانید .

ترس از لوس شدن کودکان بیمار معمولاً ، محتاج محبت هستند ، آنان ترجیح می‌دهند که مادر همیشه در کنارشان باشد . مسلماً "شما نیز هر اقدامی را برای

باشد ، بهتر است که با پرسش مشورت نماییم
صیر طولانی ممکن است ناراحتی ها علی وارض
بعدی داشته باشد .

تب

علت : تب علامت بسیاری از ناراحتی‌های
بدنی می باشد و مهمین جهت به کرات باتب
کودک خود مواجه می شویم . وقتیکه در حالت
حرارت بدن بالاتر از ۳۷/۵ درجه سانتیگراد
باشد می توان گفت که کودک تب دارد . بهترین
سنچش تب را در اطاقی با درجه حرارت بین ۱۸ تا
۲۰ درجه از طریق سنچش تب ازراه مقعد -
بدست خواهید آورد .

تب ، خودیک بیماری نیست ، بلکه واکنش
دافعی بدن است . تب پس از بیدایش عفونت
از طریق باکتری ، ویروس و یا باسیل و یا در زمان
از بین رفت نسوج که نتیجه خون مردگی است
پیش می آید . تب حزئی از زوند سلامتی است
زیرا در اثر تب حرارتی که در اثر تنفس
غلط در بدن بوجود آمده به خارج هدایت
می گردد . سن کودک در این میان نقشی ندارد
 فقط کودکان زودرس و یا کودکانی که در اثر
بیماری طولانی ضعیف کشته‌اند ، قادر به تحمل
این واکنش دافعی بدن نیستند . در هنگام تب
از آنجاکه سوخت و ساز بدن به سرعت انحصار
می گیرد . تمام بدن به میزان قابل ملاحظه‌ای
ضعیف می گردد .

علام : اگر کودک ، بدون هیچ علت خارجی
به شدت عرق کرده و یاداری کونه‌های سرخ گشته
باشد و سریع تراز معمول نفس بکشد ، علائم
متداول تب در اوضاعه می شود . تب ، باتبیش
شدید قلب و بینض همراه می باشد ، هنگام تب
شدید ، سردردهم مشاهده می شود .

اگر تب به میزان ۴۰ درجه و یا بیشتر باشد ،

کودکان دچار نارامی عمومی کشته و برخی
از اوقات دچار هذیان می شوند و بشدت گریه
و فریاد می کنند . اگر تب بیشتر از چند روز ادامه
یابد ، - بعلت بی اشتیاهی ناشی از تب -
اشکالات غذایی نیز بیش خواهد آمد . در اثر
ازدست دادن آب بدن از طریق تعریق ، بیوست
نیزدیده می شود . برخی از کودکان ، در اثر
تب شدید دچار تشنج شده‌ویا بی هوش می شوند
امکان ازدست دادن آنکه بهمدت طولانی نیز
وجود دارد .

مداوا : تب برخی از اوقات به شدت بالا می‌رود
اگر درجه حرارت بدن کودک بالاتر از ۳۹ درجه
شداباید در هر صورت شب و یا در روز تعطیل با
پرسک تماس بکیرید . در مورد تب خفیفی که
بیشتر از ۴۸ ساعت طول بکشد ، نیز با پرسک
تماس بکیرید .

بدین ترتیب کودک تحت معاینه دقیق قرار
گرفته و مداوا می شود .

بادادن مقدار زیادی بو شابه به کودک ، برای
جبان آب ازدست رفته بدن به او کم خواهد
نمود . کم اشتیاه‌شدن کودک امری غیر طبیعی
نیست . به جای غذای معمولی ، بهتر است
به کودک میوه آبدارنا زه ، سوپهای مقوی
و نظایر آنان را بدھید . به غذا تندگی نمک اضافه
کنید ، زیرا بدن کوچک کودک در اثر تعریق
سدیم ، پتاسم ، کلسیم ، فسفر و مواد مهیم
دیگر معدنی را ازدست می دهد . سعی کنید که
کودک در تخت استراحت کند . اگر تب به بالاتر
از ۳۸/۵ درجه رسید با استفاده از یک وسیله
قدیمی - پاشویه - به کودک کمک کنید . برای
پاشویه نوارهای پارچه رادر آب خیس کرده (آب
از آن نچکد) و سپس بدور پاهای کودک بپیچید



قادر به تمیز کردن بینی می باشد باید حتماً از دستمالهای کاغذی یکبار مصرف استفاده کنند تا از خطر سرایت شخصی جلوگیری شود . داروهای تجویز شده از طرف پزشک را از داروخانه خریداری کرده و دفیقاً بر حسب دستور پزشک و با بروشور داخل دارو عمل کنید . اگر میزان تب کودک در هنگام سرماخوردگی از ۳۸ درجه بالاتر رفت و یا اگر مخاط بیرون آمده از بینی چرکی بودند ، در هر حال با پزشک تماش بگیرید .

جریان بیماری و عوارض : در حالت معمولی سرماخوردگی مرض خطرناکی نیست و بیمار پس از چند روز بهبود می یابد .

اما سرماخوردگی می تواند تبدیل به التهاب سینوس ها یعنی مجاری میانی بینی (حتی در زمان نوزادی) نیز بشود . مشخصه التهاب سینوسها سر درد همیشگی و نامشخص می باشد . التهاب گوش میانی نیز که در نوزادان به سادگی در اثر سرماخوردگی ایجاد می شود ، دردناک است . اگر سرماخوردگی چرکی باشد مخاط چرکی از دیواره حلق به مجاری تنفسی رفته و از آنجا به برشها می رسد . در این زمان خطر برونشیت وجود دارد .

بد محض آنکه حس کردیدکه ، کودک در اثر سرماخوردگی دچار ناراحتی شدید شده است با پزشک تماس گرفته و معالجات لازم را نجات دهدید .

این عمل راهر ۳۰ دقیقه یکبار انجام دهدید . این عمل مشکلی برای شما بسیار کوچک شماست اما نتیجه ؟ حاصل از آن بسیار خوب است . در بسیاری از موارد می توانید با کمک پاشویه ، درجه حرارت را پایین آورید .

سرماخوردگی

علت : التهاب مخاط بینی باعث سرماخوردگی می شود . عامل بیماری ویروس و در برخی از موارد باکتری می باشد که در اکثر موارد از طریق سرایت بزاقی (سرایت از طریق قطرات ریز بزاق حامل میکروب که از طریق سرفه و عطسه پخش می شوند) ، صورت می گیرد . به همین علت ، پس از آنکه فردی از اعضاء خانواده دچار سرماخوردگی گشت ، افراد دیگر خانواده نیز دچار عطسه می شوند . اما همیشه ، قدرت سرایت عامل بیماری ، به آن حدی که باعث بیماری گردد نیست ، عامل بیماری در مخاط حلق و بینی جای گرفته و قرار گرفتن در کوران هوا ، کم لباس پوشیدن ، و یا تغییرات درجه حرارت بخصوص در زمان تغییر فصول — باعث عطسه کردن کودک می گرددند . گذشته از آن عطسه می تواند علامت سرخ نیز باشد . در هر صورت عطسه همیشه دلیل سرماخوردگی نیست . نوزادان از طریق عطسه بینی خود را پاک می کنند .

علایم : سرماخوردگی کودک با تورم مخاط بینی شروع می شود . از بینی مایع رقیق ، شفافی خارج می شود . سفت شدن مایع ، زرد — سیز و چرکی بودن آن نشانه وجود باکتریست .

مداوا : بینی نوزادان را چندین بار در روز برا تکمای بینی پاک کنید . کودکان بزرگتر که ، خود

