

اختلال نافرمانی مقاومت‌آمیز در کودکان و نوجوانان (O.D.D)

ترجمه: فرانک طهماسبی

کارشناس علوم اجتماعی (مددکار اجتماعی) - تهران




نشانه‌ها

نشانه‌های اختلال نافرمانی مقاومت‌آمیز (O.D.D) ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- کج خلقی و اوقات تلخی‌های مداوم
- مشاجرات بیش از اندازه با بزرگترها
- مبارزه‌طلبی و خودداری از قبول خواستها و مقررات بزرگترها
- تلاش عمدى برای آزار دادن و ناراحت کردن دیگران
- سرزنش دیگران به خاطر اشتباهات و بدرفتاری‌های خود
- حساسیت و زورنجی بسیار
- عصبانیت و غضب مداوم
- صحبت کردن با لحنی تنفرآمیز و شرورانه در هنگام عصبانیت
- داشتن حس تلافی جویانه در مورد عملکرد دیگران

همه کودکان گهگاه رفتارهای مخالفت‌آمیز در برابر بزرگسالان از خود نشان می‌دهند، بهویژه وقتی که خسته، گرسنه یا مضطرب و ناراحت‌اند. آن‌ها ممکن است به مشاجره، نافرمانی، مبارزه‌طلبی و دادن جواب‌های نامناسب در مقابل والدین، معلمان و سایر بزرگترها اقدام کنند. رفتارهای مخالفت جویانه، اغلب امری طبیعی در روند رشد کودکان، بهویژه در سنین ۲ تا ۳ سالگی و بیش از این نوجوانی به شمار می‌آیند؛ اما اگر رفتارهای غیردوستبه و مخاصمه جویانه به طور مکرر و مداوم اتفاق بیفتد، به‌گونه‌ای که تعامل کودک با کودکان دیگر و نیز زندگی خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی او را تحت تأثیر قرار دهد، این مسئله ممکن است به یک نگرانی جدی منجر شود.

در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال O.D.D، الگوی رفتاری خصم‌انه، مخالفت‌آمیز و بدون روحیه همکاری که به‌سمت منش سمت‌بدانه بیش‌می‌رود، به‌طور جدی بر عملکرد روزانه کودکان و نوجوانان مبتلا تأثیر می‌گذارد.



این نشانه‌ها معمولاً در موقعیت‌های گوناگون بروز می‌کند، اما بیشتر در خانه و مدرسه مشاهده می‌شود.

علل و عوامل

۱۵ تا درصد کودکان در سالین مدرسه به اختلال O.D.D دچارند. علل بوجود آورنده این اختلال شناخته نشده است. اما برخی از والدین گزارش کرده‌اند که این کودکان در سالین خردسالی، در مقایسه با خواهران و برادرانشان، سخت‌گیرتر و طبلکارتر بوده‌اند. البته عوامل زیستی و محیطی نیز ممکن است در برخی این اختلال مؤثر باشند.

کودک دارای علائم اختلال O.D.D باید مورد ارزیابی وسیع گیرد، زیرا ممکن است این اختلال با اختلالاتی مثل کم توجهی بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری، اختلالات خلقی (افسردگی و اختلالات دوقطبی) و اختلالات اضطرابی اشتباه گرفته شود. شایان ذکر است که بهبود علائم اختلال O.D.D، بدون درمان اختلال با هم زیستن در این گونه کودکان، ممکن است دشوار باشد.

راههای درمان

درمان اختلال نافرمانی مخصوصاً آمیز (O.D.D)، از طریق ارائه برنامه تربیتی مشخص به والدین برای مدیریت رفتار کودکان، روان درمانی فردی برای تأثیر بیشتر بر مدیریت رفتار و کنترل عصبانیت‌ها، روان درمانی خانواده برای بهبود ارتباطات، شناخت رفتار درمانی برای کمک کردن به حل مسئله و کاهش منفی گرامی و نیز آموزش مهارت‌های زندگی به منظور افزایش انعطاف‌پذیری و حس مداراً با همسن و سلان صورت می‌گیرد.

توصیه‌هایی به والدین

تحمل کودکان مبتلا به O.D.D ممکن است برای والدین شان بسیار سخت و دشوار باشد. این گونه والدین نیاز به حمایت و درک بیشتر توسط دیگران دارند. پدران و مادران نیز می‌توانند با به کارگیری توصیه‌های زیر به کودک یا نوجوانشان کمک کنند:

- زمانی که کودک یا نوجوان تان از خوبی انعطاف پذیری و

روحیہ همکاری نشان می دهد، اور ارشاد کرنے والا
نکات مشتبہ، افتاء، اور تأکید کرتا۔

- سے او مہلت دھد تا عیوب کا خود اے طرف کند و

کل های، مشیت انعام دهد.

منی