

# آشنایی با...

## اختلال آتوز<sup>۱</sup>

آتوز اساساً با فلج مغزی همراه است و یکی از موارد بیماری دیسکنزی (نابهنجاری در میزان و نوع فعالیت حرکتی) به شمار می‌رود. آتوز عبارت است از حرکت‌های بی‌هدف و غیر ارادی انگشتان، دست‌ها، صورت، پاها و سایر قسمت‌های بدن که ناشی از ضایعات عقده‌های قاعده‌ای (سیستم خارج هرمی در دستگاه

هرمی مغز) می‌باشد. در بعضی موارد، گفتار تحت تأثیر حرکت غیر قابل کنترل زبان و سایر اندام گفتاری قرار می‌گیرد. شواهدی در دست است که علائم مرضی آتوز در اغلب موارد باعث آنوکسی<sup>۲</sup> می‌شود. فلج در آتوز، آشکارا معلول صدمات هنگام تولد، بعد از تولد و یا زردی می‌باشد.

• فرزانه اسلامی / کارشناس ارشد کودکان استثنایی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرتال جامع علوم انسانی

زیر نویس‌ها:

1. Athetosis
2. Dyskinesia
3. Anoxia

(فقدان یا کاهش اکسیژن در خون بر اثر کمبود کمتر از حد معمول اکسیژن در خون)

منابع:

- رابینسون، نانسی ام، رابینسون، هالبرت بی. (۱۳۶۸). کودک عقب مانده ذهنی (فرهاد ماهر / مترجم). تهران: انتشارات آستان قدس

رضوی

- ویلیامز، فیلیپ. (۱۳۷۵). فرهنگ کودکان استثنایی (احمد به پژوه و همکاران / مترجمان). تهران: انتشارات بعثت

