

برآوردهای غیرمستقیم میزان سقط جنین عمدى کل با استفاده از مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری در ایران به تفکیک استان‌ها

*توكل آقایاری هیر
☆امیرهوشنگ مهریار

با وجود نقش مهمی که سقط جنین عمدى در حرکات جمعیتی دارد، حساسیت‌های خاص آن در بسیاری موارد مانع از بررسی معمول مستله شده است و استفاده از روش‌های غیرمستقیم در مطالعه آن را ضروری می‌سازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل پاروری و داده‌های پیمایش جمیعت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران (DHS)، در راستای برآوردهای میزان‌های سقط عمدى کل و تأثیر نسبی بازدارندگی عوامل بلافصل روی باروری در کشور تلاش کرده است. برآوردها نشان می‌دهد هر زن ایرانی در طول دوره‌ی باروری خود و با فرض ثبات نسبی میزان‌های ویژه‌ی سقط عمدى زمان پژوهش، به طور متوسط در حدود ۱/۷۱ مورد را تجربه می‌کند که این میزان در مناطق شهری و در استان‌های با وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالا، بیشتر بوده است. براساس یافته‌ها، استفاده از وسائل تنظیم خانواده با $\frac{59}{3}$ درصد بیشترین تأثیر بازدارنده روی باروری را داشته است و دیرکرد یا عدم ازدواج با $\frac{21}{2}$ درصد، سقط عمدى با $\frac{15}{8}$ درصد و نازابی موقت با $\frac{3}{8}$ درصد در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند. در ادامه، برآوردهای انجام گرفته مورد بررسی و ارزیابی بیشتر قرار گرفته است.

وازکان کلیدی: تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری، باروری کل، باروری نکاحی، شاخص ازدواج، شاخص تنظیم خانواده، شاخص نازابی موقت، شاخص سقط جنین عمدى، میزان سقط جنین عمدى کل، بونگاروت و پاتر.

aghayarih@yahoo.com

ahmehryar@yahoo.com

*دانشجوی دکترای جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران.

☆ استاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

مقدمه

سقط جنین عمدی^۱ به عنوان یکی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری^۲ در کنار برخی دیگر از جمله ازدواج، تنظیم خانواده و نازایی موقت^۳، از زمان معرفی آن‌ها در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط دیویس و بلیک^۴ (۱۹۵۶)، و بحث دقیق‌تر آن‌ها توسط بونگارت (۱۹۸۲) و بونگارت و پاتر^۵ (۱۹۸۳)، جایگاه خاصی را در مطالعات مربوط به باروری و بعدها سقط جنین عمدی به‌دست آوردند. سقط عمدی به‌دلیل دلالت‌های جمعیت‌شناختی آن و نقشی که در حرکات جمعیتی دارد، می‌تواند به عنوان آخرین وسیله‌ی پیشگیری از بارداری در موقع شکست روش‌های تنظیم خانواده مورد استفاده قرار گیرد (بونگارت و وستوف^۶ ۲۰۰۰؛ مارستون و کللن^۷ ۲۰۰۳) و همچنین تأثیری که در سلامت مادران می‌تواند داشته باشد (سازمان بهداشت جهانی^۸؛ موسسه آلن گاتچر^۹ ۲۰۰۶)، از اهمیت خاصی در مطالعات جمعیتی برخوردار است.

متأسفانه با وجود تأثیر مهم سقط عمدی در حرکات جمعیت و سلامت مادر، در بیشتر کشورها به‌ویژه کشورهایی که سقط عمدی در آن‌ها با حساسیت‌های اجتماعی، مذهبی و موانع قانونی روبرو است، داده و اطلاعات معتبر مربوط به آن در دست نیست و همین مسئله پس‌بردن به نقش آن در حرکات جمعیتی و هر نوع برنامه‌ریزی در مورد آن را غیرممکن می‌سازد. به دلایل فوق، هر نوع جمع‌آوری اطلاعات در مورد سقط جنین عمدی، چه از نوع مطالعات پیمایشی و چه از نوع گزارش‌های رسمی و یا ثبت‌های بیمارستانی، از عدم دقیق و کم‌شماری فراوان رنج می‌برند. این درحالی است که با وجود همه موانع بر سر راه انجام آن، سقط عمدی بدون توجه به قانونی بودن یا نبودن، به عنوان وسیله‌ای برای پیشگیری از تولیدهای ناخواسته مورد استفاده قرار می‌گیرد (جانستون و هیل^{۱۰} ۱۹۹۶: ۱۱۴).

با توجه به محدودیت‌های مذکور در مورد دسترسی به اطلاعات مربوط به سقط عمدی، هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد میزان سقط عمدی کل به روش غیرمستقیم است. به دلیل انجام محاسبات به تفکیک استانی و مناطق شهری و روستایی، بررسی مقایسه‌ای برآوردها در

- 1. Induced Abortion
- 3. Postpartum infecundity
- 5. Bongaarts and Potter
- 7. Marston and Cleland
- 9. Alan Guttmacher Institute

- 2. Proximate Determinants of Fertility
- 4. Davis and Blake
- 6. Westoff
- 8. World Health Organization
- 10. Johnston and Hill

بین استان‌های مختلف کشور نیز به عنوان هدف جزئی مورد توجه بوده است. همچنین تحقیق حاضر با بررسی تأثیر بازدارنده‌ی هر یک از متغیرهای اصلی بلافصل (ازدواج، تنظیم خانواده، نازایی موقت و سقط عمده) روی باروری طبیعی، که در نبود دیگر عوامل بازدارنده می‌تواند تجربه شود، سعی کرده است تا تأثیر هر یک از عوامل بلافصل در کنترل باروری در کشور را مورد بررسی قرار دهد.

ادبیات پژوهش

برای اولین بار دیویس و بلیک (۱۹۵۶) بودند که به طور مفصل سخن از متغیرهای میانی باروری^۱ به میان آوردند و پس از آن بود که این متغیرها و بیشتر تحت عنوان تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری (بونگارت و پاتر، ۱۹۸۳) نقش مهم و کلیدی در تحلیل‌های مربوط به باروری پیدا کردند. این متغیرها که در سه دسته کلی جای می‌گیرند عبارت‌اند از: عوامل مربوط به امکان رابطه جنسی، عوامل مربوط به تلقیح یا تشکیل نطفه و عوامل مربوط به بارداری و زایمان (دیویس و بلیک ۱۹۵۶: ۲۱۲). هر یک از این عوامل سه‌گانه خود موارد جزئی تری را شامل می‌شوند (در کل حدود ۱۱ متغیر) که در بین آن‌ها سقط جنین عمده نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار روی باروری در نظر گرفته می‌شود.

بونگارت (۱۹۸۲) در پژوهش خود تحت عنوان «تأثیر بازدارنده‌ی متغیرهای میانی روی باروری» با استفاده از چارچوب مفهومی دیویس و بلیک سعی کرد با قرار دادن باروری به عنوان تابعی از متغیرهای بلافصل، به برآورد غیرمستقیم باروری بپردازد. این روش به ویژه زمانی که میزان باروری مشاهده شده به دلایلی از دقت کافی برخوردار نباشد اهمیت خاصی می‌یابد. بونگارت با بررسی حدود ۴۱ کشور پیش‌رفته، در حال توسعه و نیز جمعیت‌های اولیه نشان داد که از بین همهٔ متغیرهای میانی مورد نظر دیویس و بلیک، تنها چهار مورد از آن‌ها (ازدواج، تنظیم خانواده، سقط عمده و نازایی موقت) بیشترین تأثیر را بر باروری داشته‌اند و حدود ۹۶٪ از تغییرات باروری را تبیین می‌کنند (همان: ۱۸۶). از این‌روی بونگارت به همراه پاتر (۱۹۸۳)، مدل مشهور خود تحت عنوان مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری را ارائه کردند که در آن، باروری کل تابعی از چهار متغیر بلافصل مذکور در نظر گرفته می‌شود. همین مدل بعداً اساس بسیاری از تحقیقاتی قرار گرفت که سعی داشتند باروری کل را به روش غیرمستقیم و با استفاده از اطلاعات موجود در مورد

1. Intermediate Fertility Variables

تعیین‌کننده‌های بلافصل به دست آورند^۱.

در مواردی از این مدل برای محاسبه غیرمستقیم باروری استفاده شده است، علاوه بر این، به دلیل این که در آن سقط عمدی به عنوان یکی از اجزاء مدل قرار می‌گیرد، برخی سعی کرده‌اند تا با تنظیم مجدد مدل، به محاسبه سقط عمدی به عنوان متغیر مجهول مدل پردازنده که از جمله این افراد می‌توان به فوریت و نورتمن^۲ (۱۹۹۲)، جانستون و هیل (۱۹۹۶) و آچاریا^۳ (۲۰۰۱) اشاره کرد.

فوریت و نورتمن (۱۹۹۲) در کار خود تحت عنوان «روشی برای محاسبه میزان‌های سقط جنین عمدی» با ترکیب مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری و مفهوم تولدات‌های ممانعت شده^۴، سعی کرده‌اند میزان‌های سقط جنین ویژه‌ی سنی نکاحی را محاسبه کنند. در این مدل، باروری نکاحی مشاهده شده برابر است با حداکثر باروری بالقوه ضرب در شاخص تعدیل شده‌ای از نازایی موقت منهای مجموع تولدات‌های ممانعت شده توسط وسایل تنظیم خانواده منهای مجموع تولدات‌های ممانعت شده توسط سقط عمدی. بدین شیوه آن‌ها میزان‌های سقط جنین عمدی تعداد سقط عمدی برای هر زن در طول دوران باروری – را برای سه شهر از شهرهای آمریکای جنوبی مورد محاسبه قرار دادند که میزان سقط جنین عمدی کل برای شهرهای بلوهایزته، لیما و لاپاز به ترتیب ۴/۶، ۴/۷ و ۶/۶ (همان: ۱۳۲) برآورد شد. آن‌ها بیش از حد واقع بودن میزان‌های سقط جنین کل را به بیش برآورد احتمالی در حداکثر باروری طبیعی که به پیروی از بونگارت و پاتر حدود ۱۵/۳ یا ۱۵ در نظر گرفته بودند، نسبت دادند. استناد اصلی آن‌ها در این مورد به محاسبات هولبریاخ و نورتمن^۵ (۱۹۸۶؛ نقل از فوریت و نورتمن ۱۹۹۲) بود که حداکثر باروری طبیعی در بیشتر کشورهای مورد بررسی خود را (در ۸ مورد از مجموع ۹ کشور)، پایین‌تر از ۱۵/۳ در نظر گرفته بودند. به هر حال، آن‌ها قرار گرفتن این شهرها در مرحله انتقال جمعیتی را به عنوان تبیینی احتمالی برای میزان بالای سقط عمدی در نظر گرفتند و میزان‌های برآورده شده را میزان‌هایی نزدیک به واقع دانستند (فوریت و نورتمن ۱۹۹۲: ۱۳۵). به نظر جانستون و هیل (۱۹۹۶: ۱۰۸) مشکل این رهیافت این بود که به دلیل ضرب شدن اثر عامل نازایی موقت در حداکثر باروری طبیعی، در مقابل کم شدن تأثیر مربوط به وسایل پیشگیری و سقط جنین عمدی، اثر عامل نازایی بیش از حد واقع

۱. برای نمونه مراجعه شود به:

- Prem (2004) Karaduman Tas, (1996); Nouralhslam and Mazharolhslam (1993).
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 2. Foriet and Nortman | 3. Acharya |
| 4. Births Averted | 5. Hollerbach and Nortman |

(یا حداقل بیش از دو متغیر دیگر در شرایط مساوی) در برآوردها وارد می‌شود و نتایج را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

جانستون و هیل (۱۹۹۶) در تحقیقی تحت عنوان سقط جنین عمدی در کشورهای در حال توسعه: برآوردهای غیرمستقیم، سعی کردند با استفاده از مدل بونگارت و پاتر و با استفاده از داده‌های استاندارد پیماش‌های جمعیت و سلامت (DHS) در حال توسعه، سطح سقط جنین عمدی را برآورد کنند. آن‌ها با استفاده از مدل بونگارت و پاتر، که توضیحات مفصل آن در ادامه خواهد آمد، و محاسبه شاخص‌های چهارگانه مدل و مجھول قراردادن میزان سقط عمدی و تنظیم دوباره رابطه اصلی، شاخص سقط عمدی برای کشورهای مورد بررسی را محاسبه کردند (همان: ۱۰۹). آن‌ها برای اطمینان بیشتر، علاوه بر تأثیر چهار متغیر اصلی، اثر بخشی دیگر از تعیین‌کننده‌های بلافصل از جمله؛ توان باروری^۱، مرگ و میر داخل رحمی^۲ و نازایی دائم^۳ را هم مورد بررسی قرار دادند که در هیچ یک از موارد تأثیرات معنادار و مورد انتظار مشاهده نشد (همان: ۱۱۳).

پیش از به پایان بردن این بخش بهتر است به کار آچاریا (۲۰۰۱) نیز اشاره شود که در برآورد غیرمستقیم میزان‌های سقط جنین عمدی کوشش کرده است. وی در پژوهش خود با عنوان «برآورد نرخ ویژه مرتبه تولدی سقط جنین: یک رهیافت جدید» که در بیست و چهارمین کنفرانس عمومی انجمن بین‌المللی مطالعات علمی جمعیتی (IUSSP)^۴ ارائه کرد، تنها به معرفی روشی پرداخت که در عمل نیاز به داده‌های بسیار دقیق و خاصی دارد و به ادعای خود وی (همان: ۷) یه دلیل در دسترس نبودن پاره‌ای از اطلاعات موردنیاز، محاسبات تا زمان انجام تحقیق امکان‌پذیر نبوده است. به دلیل این‌که امکان استفاده از این رهیافت در حال حاضر وجود ندارد از بحث بیش‌تر در مورد آن خودداری می‌شود.

روش‌های مختلفی برای برآورد سقط عمدی وجود دارند، که از جمله آن‌ها می‌توان به مواردی چون؛ بررسی مراکز انجام دهنده سقط غیرمجاز^۵، استفاده از اطلاعات مربوط به عوارض بارداری، سقط، مرگ و میر مادران و نظایر آن‌ها، گزارش توسط خود افراد^۶، روش باقی‌مانده‌ها^۷ (مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری)، گزارش اشخاص ثالث^۸ و روش تخمین

1. Fecundability

2. Spontaneous Intrauterine Mortality

3. Permanent Sterility

4. IUSSP, International Union for Scientific Studies of Population

5. Survey of Illegal Abortion Providers 6. Self-Reports

7. Residual Method

توسط متخصصین^۹ (روسیر ۲۰۰۳) اشاره کرد، اما در این پژوهش روش باقی‌مانده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر روسیر استفاده از روش باقی‌مانده‌ها در صورت وجود اطلاعات دقیق در مورد روابط جنسی و استفاده از وسائل تنظیم خانواده، که در بیشتر پیمایش‌های جمیعتی قابل دسترسی هستند، می‌تواند نتایج مناسبی به دست دهد (همان: ۹۹). با توجه به دقت نسبی اطلاعات پیمایش جمیعت و سلامت ایران و در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به روابط جنسی زوجین در زمان بعد از زایمان و نیز با توجه به این‌که حداقل در زمان انجام پیمایش، روابط جنسی بیشتر در قالب روابط زناشویی صورت می‌گیرد، روش باقی‌مانده‌ها به عنوان روش انتخابی مورد استفاده قرار گرفته است که در ادامه به این روش بیشتر پرداخته می‌شود.

مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری

مدل پیشنهادی بونگارت و پاتر (۱۹۸۳) برای محاسبه غیرمستقیم میزان باروری کل، هر چند نه به طور مستقیم، به هر حال راهی را گشود که از آن برای انجام تحقیقات بعدی در مورد برآوردهای غیرمستقیم سقط عمده نیز استفاده شد (برای اطلاع بیشتر به بخش ادبیات پژوهش رجوع شود). مدلی که اول بار توسط بونگارت و پاتر ارائه شد در اساس روشی برای برآوردهای میزان باروری کل با استفاده از متغیرهای میانی و تأثیر آن‌ها بر باروری بود. این مدل خود بر پایه متغیرهای میانی دیویس و بلیک (۱۹۵۶) پایه‌ریزی شده که رابطه شماره ۱ آن را ارائه می‌دهد:

$$(1) \quad TFR = C_m \times C_c \times C_t \times C_a \times TF$$

که در آن باروری کل تابعی از تأثیر کاهنده‌ی تعیین‌کننده‌های بلافصل شامل؛ ازدواج، تنظیم خانواده، نازایی موقت و سقط عمده روی باروری طبیعی در نظر گرفته می‌شود. دامنه تغییرات هر یک از چهار شاخص که نشان از تأثیر بازدارنده‌ی آن‌ها روی باروری دارد، بین صفر و یک تغییر می‌کند. مقدار صفر برای هر شاخص نشان‌دهنده‌ی این است که شاخص مربوطه به تنها یک همه باروری را مانع می‌شود و مقدار یک حاکی از این است که شاخص مربوطه هیچ نوع تأثیر بازدارنده‌ای روی باروری ندارد. هر چه میزان این شاخص‌ها به صفر نزدیک‌تر باشد حاکی از قدرت بازدارنگی بیشتر آن‌ها روی باروری کل طبیعی (باروری که بدون استفاده از وسائل و شیوه‌های جلوگیری از بارداری می‌تواند تجربه شود) خواهد بود. برای رسیدن به میزان باروری کل با این مدل، اثر بازدارنده‌ی هر یک از شاخص‌ها روی باروری طبیعی، که در حدود ۱۵/۳ در

نظر گرفته می‌شود، اعمال و باروری کل از این طریق برآورد می‌شود. اجزای مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری (رابطه شماره ۱) عبارت‌اند از:

TFR: باروری کل مشاهده شده؛

C_m : شاخص ازدواج (تأثیر بازدارنده مربوط به دیرکرد یا عدم ازدواج)؛

C_e : شاخص تنظیم خانواده (تأثیر بازدارنده استفاده از وسائل جلوگیری از بارداری)؛

C_t : شاخص نازایی موقت (تأثیر نازایی ناشی از شیردهی یا عدم رابطه جنسی پس از زایمان)؛

C_s : شاخص سقط جنین عمدی (تأثیر مربوط به سقط عمدی) و در نهایت،

TF: میزان حداکثر باروری طبیعی.

دو فرض اصلی در این مدل وجود دارند. فرض اول میزان حداکثر باروری طبیعی را حدود $\frac{49}{3}$ در نظر می‌گیرد. بر این اساس، هر زن در صورتی که در طول دوران باروری خود (۱۵ تا ۴۹ سالگی) از هیچ نوع وسیله پیشگیری از بارداری استفاده نکند، در حالت تئوریک قادر خواهد بود به طور متوسط تا حدود $\frac{15}{3}$ کودک به دنیا بیاورد. این امر مسلم است که شرایط محیطی و اجتماعی امکان تجربه چنین باروری بالایی را برای بسیاری از زنان فراهم نخواهد کرد. فرض دوم این است که از میان همه متغیرهای میانی مورد نظر دیویس و بلیک (۱۹۵۶) تنها اثر چهار مورد از آن‌ها از جمله؛ ازدواج، تنظیم خانواده، سقط جنین عمدی و نازایی موقت، روی باروری مهم و تعیین‌کننده در نظر گرفته شده و اثر دیگر تعیین‌کننده‌های بلافصل قابل چشم‌پوشی قلمداد می‌شوند (بونگارت ۱۹۸۲). هر چند به ندرت ممکن است اتفاق بیفتد، در هر حال اگر اثر یکی یا چند مورد از این متغیرها روی باروری قابل توجه باشد خواهد توانست نتایج نهایی را تحت تأثیر قرار دهد. به هر حال بررسی‌های جاستنون و هیل (۱۹۹۶) چنین تأثیری را از جانب متغیرهای میانی کم اهمیت‌تر نشان نداده است. در پژوهش حاضر در مورد تأثیر دیگر تعیین‌کننده‌های بلافصل که نیاز به بررسی‌های مستقلی دارد، تلاشی صورت نگرفته است.

باروری کل (TFR)

باروری کل به تعداد متوسط فرزندان هر زن دلالت می‌کند که در طول دوره باروری خود (۱۵ تا ۴۹ سالگی) به دنیا آورده است. از آن‌جا که در تحقیق حاضر از داده‌های نمونه‌ای پیمایش جمعیت و سلامت (DHS) برای محاسبه شاخص‌ها استفاده شده، برای بالا بردن دقت برآوردها، باروری کل با استفاده از اطلاعات مربوط به تاریخچه باروری و تعداد تولدات ۵ ساله قبل از زمان پیمایش به جای یک سال، مورد محاسبه قرار گرفته است. برای این‌که مشکل مربوط به

توسعه دوره زمانی محاسبه از ۱ به ۵ سال نیز حل شده باشد سن زنان حدود ۲/۵ سال به عقب برگردانده شده است تا با توزیع دویاره آن‌ها در گروه‌های سنی مختلف در میانه دوره ۵ ساله، در نهایت تصویر واقعی تری از میزان باروری به دست آید.

شاخص ازدواج: $(2) C_m = \sum f(a) / \sum [f(a) m(a)]$

در این شاخص که با استفاده از رابطه شماره ۲ قابل برآورد است، $m(a)$ عبارت است از نسبت ازدواج یعنی نسبتی از زنان واقع در سنین باروری در گروه سنی a که دارای همسر هستند که از تقسیم تعداد زنان همسردار بر کل زنان واقع در همان گروه سنی به دست می‌آید. $f(a)$ نیز عبارت از میزان‌های باروری ویژه سنی برای زنان در همان گروه‌های سنی است.

حاصل این رابطه، تأثیر کاهشی دیرکرد یا عدم ازدواج روی باروری را نشان می‌دهد. هر چه مقدار آن به صفر نزدیک‌تر باشد حاکی از این خواهد بود که نسبت بیشتری از زنان واقع در سنین باروری در یک جامعه در وضعیت بدون همسر قرار دارند و امر مسلم، در چنین شرایطی تأثیر بازدارنده شاخص ازدواج روی باروری بیشتر خواهد بود. هرچند تولداتی بیرون از دایره ازدواج می‌توانند محاسبات را تحت تأثیر قرار دهند، ولی این دسته از تولدات در ایران سال ۱۳۷۹ نمی‌تواند مسئله جدی برای برآوردها به وجود آورد.

شاخص تنظیم خانواده: $(3) C_e = 1 - 1.08 \times u \times e$

در این شاخص که توسط رابطه شماره ۳ قابل محاسبه است، u نسبت زنانی است که در سنین باروری قرار دارند و از وسائل جلوگیری از بارداری استفاده می‌کنند، e عبارت از متوسط اثربخشی وسائل جلوگیری از بارداری و $1/0.8$ ضریب تصحیح مربوط به میزان نازایی در بین زنان و نیز برای در نظر گرفتن اثر کم‌شماری و یا موارد سقط غیرعمد (بونگارت ۱۹۷۸) است. برای بالا بردن دقت محاسبات مربوط به میزان استفاده-اثربخشی^۱ وسائل جلوگیری، زنان نازای موقت و دائم از محاسبات کنار گذاشته می‌شوند تا جمعیت در معرض حادثه به شکل دقیق تری تعیین شده باشد.

از جمله موارد بحث‌انگیز در این رابطه، میزان اثربخشی وسائل پیشگیری از بارداری است. در پیشرفت پژوهش‌هایی که در زمینه برآورد غیر مقیم میزان‌های باروری صورت گرفته، به دلیل در دسترس نبودن داده‌های مورد نیاز، اثربخشی پیشنهادی بر اساس بررسی‌های تجربی چندی، از جمله؛ نورتمن و هافستاتر^۲ (۱۹۷۵)، واتسون و لافان^۳ (۱۹۷۴) و سازمان ملل^۴ (۱۹۷۶) (همگی نقل از بونگارت ۱۹۷۸: ۱۳۱)، به عنوان میزان‌های استاندارد اثربخشی وسائل تنظیم

1. Use-Effectiveness

2. Nortman and Hofstatter

3. Watson and Laphan

4. United Nations

خانواده استفاده شده است. اما در تحقیق حاضر از آن جایی که امکان محاسبه میزان اثربخشی عملی و سایل با استفاده از داده های پیمایش جمعیت و سلامت وجود داشت، میزان های اثربخشی عملی هر یک از وسایل به تفکیک شهری و روستایی در هر یک از استان های کشور محاسبه شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. با این حال چون در پاره ای موارد میزان استفاده از وسیله یا وسایلی خاص در استان های مورد بررسی از نظر فراوانی بسیار کم بود و تنها تغییرات جزئی می توانست نتایج را تحت تأثیر قرار دهد، از میزان اثربخشی وسایل در کل مناطق شهری برای محاسبه شاخص های مربوط به مناطق شهری و از میزان های اثربخشی وسایل در کل مناطق روستایی برای محاسبات مناطق روستایی به عنوان میزان اثربخشی وسایل تنظیم خانواده استفاده شد.

شاخص نازایی موقت: $i = 20/18.5 + Ci \quad (4)$

رابطه شماره ۴ نحوه محاسبه شاخص نازایی موقت را نشان می دهد. در این رابطه، i عبارت از متوسط ماههای نازایی موقت، Ci به دلیل شیردهی و عدم شروع قاعدگی و α به دلیل عدم مقایرت با شوهر در دوره پس از زایمان، است. هر چند می توان از میانه یا میانگین هر یک از تعداد ماههای خودداری از مقایرت و یا عدم شروع دوباره قاعدگی به عنوان مقدار α استفاده کرد، در تحقیق حاضر برای بالا بردن دقیق محاسبات، از میانگین وزنی آن دو استفاده شده است، یعنی مقدار α از طریق میانگین وزنی تعداد ماههای خودداری نزدیکی پس از زایمان و تعداد ماههای سپری شده تا شروع دوباره قاعدگی، برآورد شده است. عدد ۲۰ در رابطه شماره ۴ عبارت از فاصله زمانی (به ماه) بین دو تولد زنده در صورت عدم شیردهی است که خود قابل تقسیم شدن به چهار دوره است: $1/5$ ماه نازایی موقت پس از زایمان در صورت عدم شیردهی، $7/5$ ماه به طور متوسط به عنوان زمان انتظار برای باردار شدن، 2 ماه برای در نظر گرفتن تعداد ماههای از دست رفته بین دو تولد زنده به دلیل مرگ های جنینی و 9 ماه که تعداد ماههای یک بارداری کامل را دربر می گیرد. عدد $18/5$ عبارت از تعداد ماههای بین دو تولد زنده بدون در نظر گرفتن $1/5$ ماه نازایی موقت پس از زایمان است. این $1/5$ ماه در صورت شیردهی با خودداری جنسی مسلمان بیشتر طول کشیده و توسط فاکتور α در نظر گرفته خواهد شد. در حقیقت شاخص نازایی به عنوان نسبت تعداد ماههای بین دو تولد زنده با و بدون حضور شیردهی تعریف می شود (بونگارت: ۱۹۷۸: ۱۱۵-۱۶).

شاخص سقط جنین عمده: $Ca = TFR/[TFR + 0.4 (1 + u) TA] \quad (5)$

در این شاخص که توسط رابطه شماره ۵ تعریف می شود، u نسبت شیوع استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در جمعیت مطالعه است و TA معرف سقط جنین عمده کل در

جمعیت مورد بررسی و به عبارت دیگر متوسط تعداد سقط عمدی برای هر زن تا پایان دوره باروری است با این فرض که میزان‌های اختصاصی سقط‌جنین عمدی رایج در زمان پیمایش در افق آینده تداوم یابد. ضریب ثابت $4/0$ در واقع تعداد متوسط تولد‌های ممانعت شده توسط یک مورد سقط‌جنین در موارد عدم استفاده از وسایل جلوگیری است که در زمان استفاده از وسایل (که با ضریب $u + 1$ در رابطه وارد می‌شود) می‌تواند به مقادیر بالاتر میل کند و حتی با استفاده - اثربخشی متوسط تا مرز $8/0$ افزایش یابد (همان: ۱۱۳-۴). دلیل این‌که یک مورد سقط‌جنین نمی‌تواند از یک تولد کامل جلوگیری کند این است که سقط در حالت معمول زودتر از به پایان رسیدن دوره 9 ماهه (و در بسیاری موارد در ماههای اول بارداری) رخ می‌دهد و فرد بلافاصله در معرض حاملگی‌های بعدی قرار خواهد گرفت. شاخص مزبور در عمل از تقسیم میزان باروری کل مشاهده شده برو میزان باروری کل، بدون در نظر گرفتن تأثیر سقط عمدی قابل تعریف شدن است (همان: ۱۱۴).

میزان سقط‌جنین عمدی کل: $TA = TFR - (Ca \times TFR) Ca \times 0.4 \times (1 + u)$ (۶)

با توجه به رابطه شماره 6 سقط‌جنین عمدی کل را می‌توان از طریق جایگزینی مقدار شاخص سقط‌جنین، که خود از طریق مدل اولیه بونگارت و پاتر به دست می‌آید، و تنظیم دوباره آن، مورد محاسبه قرار داد. اجزای این رابطه در بخش‌های قبلی به شکل کامل معرفی شده‌اند.

محاسبه سهم نسبی تعیین‌کننده‌ها در کنترل باروری

هنگامی که هدف مشخص کردن تأثیر نسبی هر یک از شاخص‌ها در کنترل باروری است، اندازه و میزان مطلق شاخص‌های محاسبه شده امکان مقایسه دقیق را فراهم نمی‌کند. از همین روی بونگارت و پاتر (۱۹۸۳) در پژوهش از تأثیر نسبی شاخص‌ها، تأثیر ترکیبی چهار تعیین‌کننده‌ی بلافصل را به طور کلی عدد 100 در نظر گرفتند و سهم هر یک از شاخص‌ها را به صورت درصدی از کل باروری جلوگیری شده توسط چهار شاخص به دست دادند. آن‌ها برای انجام این کار از رابطه شماره 7 استفاده کردند:

$$(V) \quad 100 [\log C_s / (\log C_m + \log C_c + \log C_i + \log C_g)]$$

که در آن، C_s نماینده هر یک از چهار شاخصی است که اثر نسبی آن در کاهش باروری مورد نظر باشد. دیگر شاخص‌ها نیز در مراحل قبلی مورد محاسبه قرار گرفته‌اند و در دسترس خواهند بود. با حل این رابطه برای هر یک از شاخص‌های مورد بحث در مدل، سهم نسبی هر یک از آن‌ها در پایه 100 مورد محاسبه قرار می‌گیرد و به شکل درصد بیان می‌شود. در این مرحله قابلیت

مقایسه تأثیر نسبی شاخص‌ها با یکدیگر در استان‌ها و مناطق شهری و روستایی ممکن خواهد شد.

داده‌ها و تعدیل صورت‌گرفته در مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری

چنان‌که پیش‌تر هم گفته شد، در تحقیق حاضر برای برآورد شاخص‌های مورد نیاز از داده‌های پیمایش جمعیت و سلامت کشور^۱ (DHS) استفاده شده است. این داده‌ها با نمونه‌های نمایا در هر یک از مناطق شهری و روستایی استان‌های کشور (۲۰۰۰) در هر منطقه و در مجموع ۴۰۰ خانوار در هر استان (گردآوری شده است و به دلیل شناخته شده بودن نیازی به توضیحات مفصل در مورد کم و کیف داده‌ها احساس نمی‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند در این زمینه به گزارش پیمایش مریبوطه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشکی^۲ (۲۰۰۳) مراجعه کنند. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری و با پیاده‌کردن آن روی داده‌های DHS، سعی در برآورد میزان سقط عمدی کل برای استان‌ها و نیز مناطق شهری و روستایی کشور دارد.

پیش از این‌که به نتایج و یافته‌های تحقیق پرداخته شود، لازم است در مورد تعدیلی که در فرض اول مدل تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری صورت‌گرفته است، اندکی بحث شود. میزان باروری کل طبیعی در مدل بونگارت و پاتر ۱۵/۳ تولد است که چنان‌که هولرباخ و نورتمن (۱۹۸۶؛ نقل از فوریت و نورتمن ۱۹۹۲) نیز اشاره کرده‌اند، به مراتب بیشتر از آن است که در شرایط زندگی اجتماعی و طبیعی برای همه زنان اتفاق بیفت. در بسیاری از کشورهای مورد بررسی هولرباخ و نورتمن (در ۸ مورد از ۹ کشور)، باروری کل طبیعی پایین‌تر از ۱۵/۳ بوده است (همان). بر این اساس سعی شد تا میزان باروری کل طبیعی تعدیل یافته‌ای به جای مقدار ۱۵/۳ برای محاسبات در نظر گرفته شود تا بدین نحو از پیش‌برآورد میزان‌های سقط جنین عمدی جلوگیری شود. برای این کار، باروری طبیعی برای هر استان، به عنوان میانگینی از باروری طبیعی پیشنهادی بونگارت و پاتر (۱۵/۳) و باروری مشاهده شده برای آخرین گروه سنی زنان در مناطق روستایی هر استان، که احتمال داشتن باروری نزدیک به سطح باروری طبیعی آن‌ها می‌رفت، در محاسبات مورد استفاده قرار گرفتند.

تعدیلی که به این نحو در باروری طبیعی صورت گرفت، مقدار آن را به همان مقادیری که

هولرباخ و نورتمن برای کشورهای مورد بررسی خود محاسبه کرده بودند، بسیار نزدیک کرد. دامنه تغییرات باروری طبیعی که بدین شیوه محاسبه شد، در نقاط شهری از ۱۰/۵۸ در شهر تهران تا ۱۲/۴۸ در نقاط شهری استان سیستان و بلوچستان و در مناطق روستایی از ۱۱/۴۶ در استان مازندران تا ۱۲/۸۸ در نقاط روستایی استان‌های کردستان و زنجان است. میانگین حاصل از بررسی‌های هولرباخ و نورتمن برای ۹ کشور مورد بررسی آن‌ها هم در حدود ۱۱/۵۸ محاسبه شده بود (همان: ۱۳۰) که بسیار نزدیک به میانگین مقادیر محاسبه شده برای نقاط شهری (۱۱/۵۳) و روستایی (۱۲/۴۵) کشور است.

یافته‌های پژوهش

نتایج محاسبات انجام‌گرفته برای باروری کل و برآورد شاخص‌های مربوط به تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری؛ ازدواج، تنظیم خانواده، نازایی موقعت، سقط عمدى و میزان سقط جنین عمدى کل در استان‌های مختلف به فکیک مناطق شهری و روستایی در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

میزان باروری کل (TFR)

چنان‌که از جدول شماره ۱ برمی‌آید، بیشترین میزان باروری کل در مناطق شهری و مناطق روستایی و همچنین در کل استان، متعلق به استان سیستان و بلوچستان است. میزان باروری کل در مناطق شهری این استان برابر با ۳/۶۲ و در مناطق روستایی برابر با ۵/۰۸ و در کل استان ۱/۴۴ برابر با ۴/۲۹ برآورد شده است. کمترین میزان باروری کل در مناطق شهری متعلق به شهر تهران و حدود ۱/۷۱ و در مناطق روستایی متعلق به استان مازندران و در حدود ۱/۱ است و در کل نیز استان مازندران کمترین میزان باروری کل را با میزان ۱/۶۶ به خود اختصاص داده است. میزان باروری کل برای کل مناطق شهری کشور برابر ۱/۸۲ و برای نقاط روستایی برابر ۲/۵۷ و برای کل کشور در حدود ۲/۲۱ برآورد شده است. به این ترتیب، بنا بر الگوی باروری زمان انجام پیمایش، میانگین تعداد فرزند زنده به دنیا آمده به ازای هر زن برابر با ۲/۲۱ است. البته باید در نظر داشت که این میزان، به دلیل حضور نسل‌های مختلف زنان در محاسبات مربوط به باروری در مطالعات مقطعی، یک میزان نسلی دقیق نیست.

۱. از آنجاکه مقادیر استانی شاخص‌ها میانگین وزنی از مقادیر شهری و روستایی است. در جدول مربوطه به استثنای میزان سقط جنین عمدى کل، ارائه نشده‌اند.

جدول ۱. باروری کل، باروری طبیعی تعدیل شده، شاخص های مربوط به تعیین کننده های بلافضل باروری و میزان سقط جنین عمدی کل برای استان های مختلف کشور به تفکیک شهری و روستایی

باروری کل	باروری طبیعی	شاخص ازدواج	شاخص نسله	شاخص نازلی	شاخص سقط عمدی	میزان سقط جنین عمدی کل
تعداد شد	طبیعی	روستا	شهر	روستا	شهر	روستا
استان		شهر	روستا	شهر	روستا	کل
مرکزی		۱/۸۵	۱/۷۲	۰/۹۲۵	۰/۸۶۹	۱/۷۲۵
گیلان		۱/۶۳	۱/۱۰	۰/۸۷۱	۰/۸۷۱	۱/۱۱۲
مازندران		۱/۷۱	۱/۷۰	۰/۸۷۸	۰/۸۷۸	۱/۸۷۵
آذربایجان شرقی		۱/۷۷	۱/۷۷	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۱/۷۰۴
آذربایجان غربی		۱/۷۹	۱/۷۹	۰/۹۵۰	۰/۹۵۰	۰/۹۷
كرمانشاه		۱/۷۸	۱/۷۸	۰/۹۴۸	۰/۹۴۸	۰/۹۲۵
خوزستان		۱/۷۲	۱/۷۲	۰/۹۴۷	۰/۹۴۷	۰/۹۷
فارس		۱/۷۳	۱/۷۳	۰/۹۴۸	۰/۹۴۸	۱/۷۱
کوهدان		۱/۷۴	۱/۷۴	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴
خراسان		۱/۷۳	۱/۷۳	۰/۹۴۵	۰/۹۴۵	۰/۹۲۲
آذربایجان غربی		۱/۷۴	۱/۷۴	۰/۹۴۶	۰/۹۴۶	۰/۹۴۵
کرمان		۱/۷۵	۱/۷۵	۰/۹۴۷	۰/۹۴۷	۰/۹۴۴
همدان		۱/۷۶	۱/۷۶	۰/۹۴۸	۰/۹۴۸	۰/۹۴۵
سیستان و بلوچستان		۱/۷۳	۱/۷۳	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
کردستان		۱/۷۴	۱/۷۴	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
همدان		۱/۷۴	۱/۷۴	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۶
چهارمحال و بختیاری		۱/۷۵	۱/۷۵	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۷
لرستان		۱/۷۵	۱/۷۵	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۲
ایلام		۱/۷۶	۱/۷۶	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
کهگیلویه و بویراحمد		۱/۷۶	۱/۷۶	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۷
پوشش		۱/۷۶	۱/۷۶	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
زنجان		۱/۷۷	۱/۷۷	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۶
سمنان		۱/۷۷	۱/۷۷	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
یزد		۱/۷۸	۱/۷۸	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۶
هرمزگان		۱/۷۸	۱/۷۸	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
تهران (بدون شهرتهران)		۱/۷۹	۱/۷۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
اردبیل		۱/۷۹	۱/۷۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
قم		۱/۷۹	۱/۷۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
قزوین		۱/۷۹	۱/۷۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
گلستان		۱/۷۹	۱/۷۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
شهرتهران		۱/۷۹	۱/۷۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵
کل کشور		۱/۷۹	۱/۷۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۹	۰/۹۴۵

مأخذ اطلاعات: داده های پیمایش جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹.

بیشترین میزان باروری نکاحی در نقاط شهری کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۴/۹) و کمترین آن متعلق به شهر تهران (۱۷/۲) برآورد شده است. با در نظر گرفتن مناطق روستایی کشور، بیشترین میزان باروری نکاحی در استان سیستان و بلوچستان (۵/۶) و کمترین میزان مربوط به استان مازندران و در حدود ۴۸/۲ برآورد شده است. میزان باروری نکاحی برای مناطق شهری کشور ۶۵/۲، مناطق روستایی حدود ۶۶/۳ و کل کشور ۱/۳ برآورد شده است.

شاخص ازدواج (C_m)

شاخص ازدواج نشان‌دهنده تأثیر کنترلی دیرکرد یا نبود ازدواج روی باروری است و هرچه نسبت افراد واقع در سنین باروری کمتر در وضعیت دارای همسر قرار داشته باشند مقدار این شاخص کمتر و در نتیجه تأثیر کنترلی آن روی باروری زیادتر خواهد بود.

بر اساس برآوردها، بیشترین مقدار شاخص ازدواج در مناطق شهری استان‌های مختلف، متعلق به استان قم و حدود ۷۸/۰ است. به عبارتی کمترین تأثیر بازدارنده شاخص ازدواج (در واقع نبود یا دیرکرد آن) روی باروری در نقاط شهری، در استان قم مشاهده شده است. کمترین مقدار آن متعلق به نقاط شهری استان ایلام و در حدود ۶۷/۰ می‌باشد. در مناطق روستایی نیز بیشترین مقدار از آن مناطق روستایی استان قم (۸/۰) و کمترین آن مربوط به نقاط روستایی استان ایلام (۲۶/۰) است. در کل، استان قم فضای مذهبی تری نسبت به دیگر مناطق دارد و شاید حضور پرنگ‌تر مذهب و آموزه‌های دینی در زندگی عموم، باعث می‌شود تا افراد بیشتری تشکیل خانواده دهند و نسبت افراد دارای همسر در آن نسبت به بقیه استان‌ها بیشتر باشد.

به عنوان تبیین جزئی برای پایین‌بودن مقدار شاخص ازدواج (یا بیشترین تأثیر بازدارنده این شاخص روی باروری طبیعی در بین استان‌ها) در استان ایلام، ذکر این نکته ضروری است که بر اساس گزارش یافته‌های پیمایش جمعیت و سلامت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشکی ۳۰۰۲) نقاط شهری این استان (به همراه استان همدان) بیشترین درصد طلاق‌گرفته‌ها را به خود اختصاص داده است که در حدود ۶/۴ درصد از کل افراد ازدواج کرده را شامل می‌شود. نقاط روستایی این استان نیز یکی از بالاترین میزان‌های طلاق را داراست. بر اساس همان گزارش، میانگین سن ازدواج برای مردان در نقاط شهری استان ایلام حدود ۱/۲۷ سال (دومین پس از تهران با ۳/۲۷ سال) و در نقاط روستایی ۷/۲۶ سال (بیشترین میزان در بین نقاط روستایی کشور) و برای زنان روستایی این استان باز بیشترین میزان در بین نقاط روستایی کشور (۱/۱۲) سال) است. تفاوت چندانی بین سن ازدواج زنان شهری استان با مناطق شهری استان‌های دیگر وجود ندارد (همان: ۳۸). همین موارد باعث شده است تا شاخص ازدواج در این استان جزو

کمترین مقادیر (با بیشترین تأثیر در کنترل باروری) باشد. با توجه به این‌که هم نسبت افراد مطلقه و هم میانگین سن ازدواج در این استان در دهه‌های گذشته جزو بالاترین مقادیر در کل کشور بوده است، شاید بتوان محرومیت اقتصادی و اجتماعی منطقه را به عنوان دلیلی برای روند مشاهده شده در این استان قلمداد کرد. وضعیت اقتصادی نامناسب و محرومیت می‌تواند تأثیر زیادی در اقدام افراد برای ازدواج و تشکیل خانواده و یا حفظ کانون‌های خانوادگی داشته باشد. مشکلات اقتصادی - اجتماعی از جنگ را نیز تباید از نظر دور داشت که همگی کم و بیش در زمان جنگ و پس از آن در این استان حضور داشته‌اند.

این شاخص در کل نقاط شهری برابر با ۷/۰ و در نقاط روستایی برابر با ۷۱/۰ برآورد شده است. تفاوت چندانی بین مقادیر شهری و روستایی این شاخص به چشم نمی‌خورد و هر دو نزدیک به میزان محاسبه شده برای کل کشور (۷/۰) است. بر این اساس به نظر می‌رسد دیرکرد و یا عدم ازدواج در کشور در کاهش باروری نقش قابل توجهی بازی کرده است. به این بحث در ادامه بیشتر پرداخته خواهد شد.

شاخص تنظیم خانواده (C_e)

مقادیر پایین شاخص وسائل تنظیم خانواده در نقاط شهری و روستایی کشور حاکمی از تأثیر قوی و بازدارندگی زیاد آن روی باروری است. شاخص تنظیم خانواده در مقایسه با شاخص ازدواج نقش مهم‌تری در کنترل باروری داشته است. تأثیر بازدارنده این شاخص روی باروری، چنان‌که انتظار می‌رفت، به دلیل استفاده مؤثرتر از وسائل تنظیم خانواده، در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، چراکه معمولاً هم اثربخشی و هم آگاهی از روش‌های مختلف به طور متوسط در شهرها بیشتر از روستاهاست، هر چند برای این گفته استثنایی هم در برخی از استان‌ها (نظری گلستان و فارس) وجود دارد.

قبل از این‌که به نتایج مربوط به برآورد شاخص تنظیم خانواده پرداخته شود، بهتر است نگاه اجمالی به نسبت استفاده و اثربخشی از وسائل انداخته شود. باز هم شهر تهران بیشترین نسبت استفاده از وسائل جلوگیری از بارداری در نقاط شهری را به خود اختصاص داده است که حدود ۹۱ درصد از زنان در معرض بارداری در این شهر از وسائل تنظیم خانواده استفاده می‌کنند (نتایج مربوط به شیوع استفاده برای همه استان‌ها در جدول ۱ آرائه نشده است). در مقابل، کمترین نسبت استفاده از وسائل جلوگیری از بارداری در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان و در حدود ۶۹ درصد بوده است. پس در مناطق شهری این استان در زمان انجام تحقیق (۱۳۷۹)،

هنوز حدود ۳۱ درصد از زنان در معرض بارداری که نمی‌خواهند بچه دار شوند، از وسایل تنظیم خانواده استفاده نمی‌کنند. نسبت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان کم‌ترین (۲۸ درصد) و در مناطق روستایی استان‌های گیلان، تهران، سمنان و کردستان بیشترین (۸۷ درصد) بوده است. نسبت استفاده از وسایل تنظیم خانواده برای کل کشور در حدود ۸۳ درصد (۸۶ درصد شهری و ۷۸ درصد روستایی) بوده است. زنان مناطق شهری در مقایسه با همتایان روستایی خود بیشتر از وسایل جلوگیری از بارداری استفاده کرده‌اند. نسبت‌های اثربخشی عملی وسایل جلوگیری^۱ به تفکیک وسیله و در مناطق شهری و روستایی کشور در جدول شماره ۲ ارائه شده است و به دلیل گویا بودن اطلاعات جدول، توضیح اضافی در مورد آن‌ها داده نشده است:

جدول ۲. میزان اثربخشی عملی وسایل تنظیم خانواده به تفکیک روش و مناطق شهری و روستایی

نوع روش	شهری	روستایی	متوسط شهری و روستایی
بستن لوله زن	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰
بستن لوله مرد	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰
آی یودی (IUD)	۰/۸۷۷	۰/۸۷۲	۰/۸۸۲
نورپلنت	۰/۹۵	۰/۹	۱/۰۰۰
آمپول	۰/۹۵۹	۰/۹۵	۰/۹۵۷
قرص	۰/۷۵۸	۰/۷۴۲	۰/۷۷۵
کاندوم	۰/۶۶۲	۰/۶۳۵	۰/۶۸۹
نژدیکی منقطع	۰/۵۹۲	۰/۵۲۸	۰/۶۰۱
دوره مطمئن	۰/۴۸۳	۰/۵	۰/۴۶۷

مأخذ اطلاعات: داده‌های پیمایش جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹

براساس نتایج برآورده شده برای شاخص تنظیم خانواده و با در نظر گرفتن مناطق شهری، بیشترین مقدار آن (یا کمترین تأثیر بازدارندگی) استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری روی باروری) متعلق به نقاط شهری استان سیستان و بلوچستان (۴۳٪) و کمترین آن در نقاط شهری استان اردبیل (۲۷٪) مشاهده شده است. به این معنی که در بین مناطق شهری، تأثیر بازدارندگی استفاده از وسایل تنظیم خانواده روی باروری در نقاط شهری استان اردبیل بیشتر از سایر

۱. در مورد نحوه محاسبه این نسبت‌ها به بخش روش‌شناسی مراجعه شود.

استان‌ها بوده است. در مناطق روستایی، بیشترین مقدار شاخص استفاده از این وسایل، در نقاط روستایی استان سیستان و بلوچستان (۶۷/۰) و کمترین آن در استان اردبیل (۳۳/۰) بوده است. میزان شاخص استفاده از وسایل تنظیم خانواده در کل مناطق شهری کشور در حدود ۳۶/۰ و در مناطق روستایی در حدود ۴/۰، برآورد شده است.

نسبت بالای استفاده از وسایل تنظیم خانواده مدرن بهویژه در نقاط روستایی استان اردبیل را می‌توان علت پایین بودن میزان شاخص استفاده -اثربخشی وسایل تنظیم خانواده در این استان در نظر گرفت. در این استان و بهویژه در مناطق روستایی آن، استفاده کنندگان از وسایل تنظیم خانواده بیشتر از همایان خود در دیگر استان‌ها از وسایل مدرن استفاده می‌کنند (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۰۱۳: ۶۴). البته خود این یافته نیاز به بررسی بیشتر دارد که از حوصله بحث خارج است.

شاخص نازایی موقت (C_i)

میزان بالا و نزدیک به ۱ مقادیر مربوط به شاخص نازایی موقت، نشان از تأثیر اندک این شاخص در کنترل باروری در کشور دارد. این شاخص چه در مقایسه با شاخص ازدواج و چه در مقایسه با شاخص تنظیم خانواده نقش حاشیه‌ای در کنترل باروری داشته و تنها نسبت بسیار اندکی از آن را مانع شده است. به این نکته در بحث از سهم نسبی هر یک از شاخص‌ها در کنترل باروری بیشتر و دقیق‌تر پرداخته خواهد شد.

بیشترین مقادیر برآورد شده برای این شاخص در نقاط شهری استان‌های مختلف متعلق به استان‌های خوزستان، کردستان و لرستان (۹۵/۰) بوده است. به عبارت دیگر، در مناطق شهری استان‌های مذکور در مقایسه با دیگر استان‌ها، شیردهی به کودک و تعداد ماههای لازم برای شروع دوباره قاعده‌گی و خودداری جنسی بعد از زایمان، کمترین تأثیر را در کنترل باروری داشته است. کمترین میزان این شاخص در نقاط شهری در حدود ۹۲/۰ و مربوط به استان گیلان است. در میان نقاط روستایی، بالاترین میزان این شاخص در استان کردستان (۹۷/۰) و کمترین آن در نقاط روستایی استان هرمزگان (۹/۰) مشاهده شده است.

شاخص سقط جنین عمدی (C_e)

داده‌های موجود در پیمایش جمعیت و سلامت در ایران در حالی که امکان محاسبه دیگر شاخص‌ها را به خوبی فراهم می‌آورند، اطلاعات کمتری در مورد سقط جنین، بهویژه در مورد سقط عمدی، به دست می‌دهند. شاخص سقط عمدی پس از محاسبه همه شاخص‌های قبلی و

تنظیم دوباره مدل، مورد محاسبه و برآورده قرار گرفته است. نکته‌ای که باید اذعان کرد این است که در یک مورد (مناطق روستایی استان آذربایجان غربی)، میزان برآورده شده برای شاخص سقط‌جنین عمدی، بالاتر از حد تئوریک آن ($1/0.51$) بوده است. باید گفت هر چند از لحاظ تئوریک این مشاهده غیرقابل قبول است، ولی در عمل همیشه به علت پاره‌ای از خطاهای مربوط به دو فرض اصلی مدل، که پیش‌تر بحث آن‌ها گذشت، ممکن است برخی از شاخص‌ها بالاتر از حد تئوریک آن‌ها برآورده شوند (برای بحث بیشتر مراجعه شود به جانستون و هیل ۱۹۹۶). به هر حال، در این مورد مقدار شاخص تنها $0/0.5$ بیشتر از حد تئوریک بوده است و مسلماً این میزان قابل ملاحظه نیست.

با در نظر گرفتن نقاط شهری استان‌های مختلف، بالاترین میزان شاخص سقط‌جنین عمدی برآورده شده متعلق به استان سیستان و بلوچستان و در حدود $0/995$ و کمترین آن مربوط به نقاط شهری استان فارس و در حدود $0/595$ بوده است. بیشترین مقدار این شاخص در نقاط روستایی استان آذربایجان غربی و در حدود $0/105$ و کمترین آن در مناطق روستایی استان مازندران و در حدود $0/58$ ، محاسبه شده است. با توجه به اندازه شاخص‌های محاسبه شده، ملاحظه می‌شود که قدرت بازدارنده سقط‌جنین عمدی روی باروری در نقاط شهری استان فارس و نقاط روستایی استان مازندران به ترتیب در بین نقاط شهری و روستایی مهم‌تر و مؤثرتر بوده است. نقش بازدارنده سقط‌جنین عمدی روی باروری و محدودیتی که این شاخص روی باروری اعمال می‌کند در بین استان‌های مختلف کشور، در استان اصفهان بیشترین و در استان آذربایجان غربی کمترین است.

مقدار این شاخص برای نقاط شهری کشور برابر $0/689$ و برای نقاط روستایی آن برابر با $0/78$ ، برآورده شده است. مقایسه مقادیر شهری و روستایی نشان می‌دهد که اثر محدودکننده شاخص سقط‌جنین عمدی روی باروری در نقاط شهری بیشتر از مناطق روستایی است. واقعیت این است که در شهرها به دلیل داشتن فضای اجتماعی ناشناس، بازار و باکتری اجتماعی پایین، امکان استفاده از سقط‌جنین، به عنوان وسیله‌ای برای پیشگیری از تولید در بارداری‌های ناخواسته، می‌تواند بیشتر باشد.

میزان سقط‌جنین عمدی کل (TA)


میزان سقط‌جنین عمدی کل به تعداد متوسط سقط‌جنین عمدی برای هر زن در طول دوران باروری او، با فرض باروری طبیعی مربوط به هر استان و با تداوم الگوی سقط‌جنین عمدی زمان پیمایش در آینده، دلالت دارد. میزان‌های سقط‌جنین عمدی کل بر اساس سطح باروری کل تعدیل یافته

(میانگین باروری طبیعی و باروری زنان گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله مناطق روستایی در هر استان) مورد برآورد قرار گرفته‌اند. نمودار شماره ۱ سقط جنین عمدی کل برای استان‌های مختلف کشور را ارائه کرده‌است:

در نقاط شهری استان‌های مختلف، بیشترین میزان سقط عمدی کل مربوط به استان گلستان (۱/۶۴) و کمترین آن مربوط به نقاط شهری استان اردبیل (۰/۰۲) است. با در نظر گرفتن نقاط روستایی، بالاترین میزان متعلق به استان قم و در حدود ۲/۲۶ و کمترین آن متعلق به نقاط روستایی استان آذربایجان غربی بوده که در حدود ۰/۱۹ - برآورد شده است. علت منفی شدن این مورد مربوط به بیشترآورده شاخص سقط عمدی است که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت. استان اصفهان با داشتن میزان سقط جنین عمدی کل در حدود ۱/۵۶ بالاتر از همه استان‌ها قرار گرفته است و استان‌های یزد، مازندران و خراسان هم به ترتیب با ۱/۵ و ۱/۴۳ در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کمترین میزان سقط عمدی کل متعلق به استان آذربایجان غربی و در حدود ۰/۰۷ برآورده شده است که استان‌های اردبیل، خوزستان و کرمان به ترتیب با ۰/۳۹ و ۰/۰۳۷ و ۰/۱۲ در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

سقط جنین عمدی کل برای نقاط شهری کشور در حدود ۱/۱۰۸ (کمی بیشتر از ۱ مورد) و در نقاط روستایی کشور به طور متوسط در حدود ۱/۰۱۲ برآورده شده است. زنان شهری در مقایسه با زنان روستایی سقط جنین عمدی بیشتری را تجربه می‌کنند. میزان سقط جنین عمدی کل برای کل کشور حدود ۱/۰۷۱ برآورده شده است، به این معنی که به طور متوسط هر زن ایرانی تا پایان دوره باروری خود، با فرض باروری طبیعی در نظر گرفته شده و نیز تداوم الگوی سقط جنین عمدی زمان انجام پیمایش در طول زمان، کمی بیشتر از ۱ مورد سقط جنین عمدی را تجربه می‌کند. با توجه به قرار گرفتن کشور در دوره انتقال باروری در سال‌های اخیر، انکا به سقط عمدی به عنوان آخرین شیوه برای کنترل بارداری‌های ناخواسته هنگام شکست روش‌های پیشگیری (بونگارت و وستوف ۲۰۰۰) را به عنوان دلیلی بر تجربه بالای آن در کشور می‌توان در نظر گرفت.

میزان سقط جنین عمدی کل



نمودار ۱. میزان سقط جنین عمدی کل برآورده شده برای استان‌های مختلف کشور

سهم نسبی بازدارندگی تعیین‌کننده‌های بلافضل باروری

در بین استان‌های مختلف کشور شاخص ازدواج بیشترین تأثیر بازدارنده روی باروری را در استان سیستان و بلوچستان نشان داده است. شاخص مذکور در این استان حدود ۲۶/۶۷ درصد (۲۶/۱۷ درصد در نقاط شهری و ۲۷/۴۸ درصد در نقاط روستایی) از کل باروری کنترل شده توسط چهار تعیین‌کننده بلافضل باروری را به خود اختصاص داده است. در مقایسه بین استان‌ها، ضعیف‌ترین تأثیر این شاخص در استان قم و در حدود ۱۴/۳۹ درصد (۱۴/۸۲ درصد در نقاط شهری و ۱۳/۸ درصد در مناطق روستایی) دیده شده است. متوسط این نسبت برای نقاط شهری کشور حدود ۲۰/۰۷ درصد و برای مناطق روستایی در حدود ۲۲/۴۴ درصد است. این نسبت برای کل کشور و در مقایسه با تأثیر سه شاخص دیگر روی باروری حدود ۲۱/۱۸ درصد باروری کنترل شده را شامل می‌شود.

به طور کلی در میان چهار تعیین‌کننده مورد بررسی، بیشترین قدرت بازدارندگی متعلق به شاخص تنظیم خانواده است. بدون استثنا و در همه استان‌ها و چه در نقاط شهری و چه روستایی، این شاخص بیشترین نقش را در تحديد باروری ایفا کرده است. در بین استان‌های مختلف کشور بیشترین تأثیر این شاخص در تحديد باروری در استان آذربایجان غربی بوده که حدود ۷۳/۳۹ درصد (۳۴/۶۹ درصد در نقاط شهری و ۷۸/۳۲ درصد در مناطق روستایی) باروری کنترل شده را به خود اختصاص داده است. کمترین نسبت در شهر تهران (۵۰/۸۸ درصد) و سپس در استان مازندران و در حدود ۱۸/۱۸ درصد (۲۷/۶۴ درصد شهری و ۰۱/۴۷ درصد روستایی) مشاهده شده است. این نسبت در کل مناطق شهری کشور در حدود ۲۸/۵۹ درصد و در نقاط روستایی در حدود ۳۸/۵۹ درصد باروری کنترل شده توسط چهار شاخص را به خود اختصاص داده است.

مقایسه این نسبت برای مناطق شهری و روستایی کشور نشان می‌دهد که شاخص تنظیم خانواده تأثیر کم و بیش یکسانی در تبیین میزان باروری کنترل شده در نقاط شهری و روستایی داشته است. این شاخص در کل کشور حدود ۵۹/۲۱ درصد از کل باروری ممانتع شده توسط چهار شاخص را شامل می‌شود. یعنی در کل کشور، حدود ۶۰ درصد باروری کنترل شده قابل ارجاع به استفاده از وسائل تنظیم خانواده است. چهل درصد باقی مانده، تأثیر کنترلی سه شاخص دیگر است که به ترتیب اهمیت، ازدواج (۲۱/۲ درصد)، سقط عمدی (۱۵/۸ درصد) و نازایی موقت (۳/۸ درصد) در آن سهم داشته‌اند. نمودار شماره ۲ نتایج برآوردها در مورد تأثیر بازدارنده هر یک از تعیین‌کننده‌های بلافضل روی باروری طبیعی در استان‌های مختلف کشور را ارائه می‌کند:

نسبت پاروری ممانعت شده توسط تعیین کننده های بالا فصل

	تائید ازدیاد (۱)	تائید تغییر خانواده (۲)	تائید نازاری سوقت (۳)	تائید سعید محمدی (۴)
مرکزی	۱۶.۹	۵۸.۰	۲۱.۹	۱۰.۷
میلان	۲۲.۸	۵۱.۹	۲۱.۲	
مازندران	۱۸.۷	۵۱.۲	۲۹.۴	
آذربایجان غربی	۱۷.۷	۵۱.۲	۱۸.۱	
آذربایجان شرقی	۲۲.۱	۷۲.۹		
گرمانشاه	۲۲.۹	۵۰.۹	۲۶.۵	
خوزستان	۲۰.۱	۵۰.۹	۲۰.۸	
فارس	۲۱.۸	۵۲.۸	۲۲.۲	
گرمان	۲۴.۸	۵۹.۵	۲۶.۹	
خراسان	۱۸.۹	۵۹.۷	۲۱.۲	
اصفهان	۱۶.۱	۵۳.۰	۲۷.۲	
سیستان و بلوچستان	۲۹.۷	۴۴.۶	۱۱.۸	
گردستان	۲۰.۳	۶۴.۷	۱۲.۱	
همدان	۱۸.۸	۶۹.۱	۱۸.۲	
چهارمحال و بختیاری	۱۸.۸	۶۰.۰	۱۷.۱	
Lorestan	۲۱.۲	۶۱.۰	۱۹.۷	
ابواله	۲۵.۷	۶۱.۵	۲۸.۹	
کوهپلکوه و بویر احمد	۲۲.۷	۶۸.۲	۱۲.۸	
بوشهر	۲۲.۴	۶۷.۹	۲۰.۷	
زنجان	۱۸.۷	۵۹.۹	۱۲.۴	
صفصان	۱۹.۵	۶۷.۹	۱۲.۲	
بزد	۱۸.۱	۶۹.۷	۲۶.۵	
هرمزگان	۲۰.۴	۵۱.۲	۱۹.۸	
تهران پسوند شهر تهران	۱۸.۳	۶۰.۰	۱۷.۷	
اردبیل	۲۲.۷	۶۹.۶	۱۲.۲	
قم	۱۶.۹	۶۹.۹	۲۶.۹	
قزوین	۱۶.۹	۵۷.۱	۲۶.۸	
گلستان	۲۲.۰	۶۷.۹	۲۲.۰	
شهر تهران	۲۰.۶	۵۰.۹	۲۰.۹	
کل کشور	۲۱.۲	۶۹.۷	۱۰.۸	

نمودار ۲ - تأثیر نسبتی بازدارنگی تعیین کننده های بالا فصل در استان هایی با لطفاً کشور

بر اساس برآوردها شاخص نازایی م وقت در بیشتر موارد کمترین تأثیر بازدارنده روی باروری را در میان چهار شاخص نشان داده است و این کاملاً عکس آن وضعیتی است که در مورد شاخص تنظیم خانواده وجود داشت. به هر حال بیشترین تأثیر این شاخص در مقایسه بین استان‌های مختلف کشور، در استان سیستان و بلوچستان و در حدود $6/99$ درصد $5/27$ در نتایج شهری و $9/13$ درصد در مناطق روستایی) برآورده شده است. در مقابل، کمترین مقدار آن در استان کردستان و در حدود $2/04$ درصد بوده است که این میزان برای نقاط شهری و روستایی این استان به ترتیب در حدود $2/62$ و $1/57$ درصد برآورده شده است. در نقاط شهری کشور این شاخص تنها سهم $3/43$ درصدی از باروری کنترل شده توسط چهار شاخص را به خود اختصاص داده و نسبت مشابه برای مناطق روستایی کشور اندکی بیشتر و در حدود $4/25$ درصد است. متوسط کشوری برای شاخص نازایی م وقت حدود $3/82$ درصد برآورده شده است، به این معنی که با احتساب باروری ممانعت شده توسط چهار شاخص به میزان $100/100$ واحد، تنها $3/82$ واحد آن توسط شاخص نازایی م وقت کنترل شده است. ملاحظه می‌شود که این شاخص به طور کلی تأثیری حاشیه‌ای در کنترل باروری در کشور داشته است.

در بین چهار شاخص مورد بررسی، شاخص سقط جنین سومین شاخص مهم پس از تنظیم خانواده و ازدواج است. در مقایسه بین استان‌ها، بیشترین نسبت برآورده شده، مربوط به استان اصفهان و در حدود $27/61$ درصد ($26/73$ درصد شهری و $27/9$ درصد روستایی) است. کمترین میزان این نسبت نیز در استان آذربایجان غربی و در حدود $1/74$ درصد ($5/43$ درصد در مناطق شهری و $3/39$ -درصد در مناطق روستایی) بوده است. علت منفی بودن نسبت اخیر، که باز از نظر منطقی درست نمی‌تواند باشد، پیش‌تر ذکر شد. میزان این نسبت برای نقاط شهری کشور حدود $17/22$ درصد و مناطق روستایی حدود $13/94$ درصد برآورده شده است. در کل کشور این شاخص در حدود $15/79$ درصد برآورده شده است، به این معنی که از مجموع 100 درصد باروری ممانعت شده توسط چهار شاخص موربدیت، سهم این شاخص در حدود $15/79$ درصد بوده است. نقش سقط عمدی در کنترل باروری در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است، امری که در مورد شاخص سقط جنین نیز از نظر تفاوت‌های شهری و روستایی صدق می‌کرد.

از زیبایی کلی برآوردها

به طور کلی برای ارزیابی برآوردهای انجام گرفته سعی شد تا به بررسی رابطه بین مقادیر برآورده شده سقط عمدی کل با برخی از متغیرهایی که در ادبیات پژوهشی رابطه‌شان با سقط

عمدی مورد تأکید قرار گرفته بود (البته تا حد ممکن)، پرداخته شود. در این میان از همبستگی بین مقادیر شهری و روستایی، که رابطه بالا میان آن‌ها مورد انتظار بود، نیز به عنوان محکمی برای ارزیابی محاسبات استفاده شده است.

از جمله متغیرهای احتمالی که می‌شد به رابطه آن با سقط جنین عمدی پرداخت، بارداری ناخواسته بود، چرا که در قریب به اتفاق موارد این بارداری ناخواسته است که ممکن است به سقط منتهی شود و هیچ دلیلی برای سقط عمدی بارداری خواسته و برنامه‌ریزی شده وجود ندارد. هرچند در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که بایستی رابطه مستقیمی بین دو متغیر وجود داشته باشد (بارداری ناخواسته بالا، سقط عمدی بالا)، یافته‌ها عموماً حاکی از رابطه منفی بین دو متغیر است که با لحاظ مناطق روستایی این رابطه معنادار ($t = -0.369$, $p = 0.027$) است. به عنوان تبیین جزئی برای چنین رابطه‌ای باید اشاره کرد که هرچند چنین رابطه‌ای در سطح فردی کاملاً دلالت پیدا می‌کند، ولی ممکن است در سطوح تحلیلی کلان^۱ لزوماً چنین رابطه‌ای دیده نشود. این‌که، هر چه میزان بارداری ناخواسته در جایی بیشتر باشد، می‌توان این فرض را کرد که افراد کمتر از سقط عمدی برای پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته استفاده می‌کنند. بنابراین در مواردی که نسبت بارداری‌های ناخواسته، به ویژه از نوع قطعی آن (تولد‌های ناخواسته) بیشتر باشد می‌تواند حاکی از اجتناب از سقط برای جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته باشد که در عمل به رابطه معکوس بین دو متغیر منجر خواهد شد.

از آن جا که انتظار می‌رفت در شرایطی نظیر شرایط ایران که سقط عمدی با موانع قانونی روبرو است، افراد سقط‌های عمد خود را به عنوان سقط‌های غیرعمد یا خودبه‌خودی گزارش کنند، رابطه مستقیم بین دو متغیر مورد انتظار بود. بررسی‌ها حاکی از وجود رابطه معناداری بین دو متغیر است ($t = 0.519$, $p = 0.002$).

رابطه مستقیم بین باسادی زنان و سقط عمدی در ادبیات پژوهشی پیوسته مورد تأکید بوده است (تاک^۲؛ رنه^۳؛ ۱۹۷۴؛ احمد^۴؛ ۱۹۹۷؛ اگلستون^۵؛ ۱۹۹۹؛ اکونوفوآ و همکاران^۶؛ ۱۹۹۶؛ کورجو و همکاران^۷؛ ۲۰۰۳). چنین رابطه‌ای را به شکل نسبتاً شدید و معنادار در پژوهش حاضر نیز می‌توان سراغ گرفت. ضرایب همبستگی بین دو متغیر در مناطق شهری و روستایی به ترتیب در حدود ۰/۶۰ و ۰/۶۲ بوده است که هر دو با سطح معناداری <0.000 از

1. Aggregate
2. Tak
3. Renne
4. Ahmed
5. Eggleston
6. Okonofua et al
7. Korejo et al

نظر آماری جزء روابط معنادار به شمار می‌آیند. رابطه مشاهده شده حاکی از این واقعیت است که میزان سقط عمدی معمولاً در بین افراد باسواند که دارای عقاید سکولارتری نسبت به افراد بی‌سواد هستند (همان منابع)، رواج بیشتری دارد.

شاید به عنوان مهم‌ترین عامل، روند باروری در یک جامعه تأثیر مهمی در تغییرات سقط جنین عمدی داشته باشد. یا اذعان به این‌که این موضوع نه جزو اهداف کاربوده و نه امکان زمانی این کار وجود داشته است که نگارندگان در مورد روند کاهشی باروری در ایران در این مختصراً، اقدام به ارائه شواهد و مستندات کنند، به نظر می‌رسد در جوامعی که در دوره انتقال جمعیتی قرار گرفته باشند و یا در حال کاملاً کردن آن باشند، کاهش باروری و تمایل زوجین به تحديد مواليد باعث خواهد شد که اولاً؛ میزان استفاده از وسائل جلوگیری از بارداری شیوع بیشتری پیدا کند و ثانیاً؛ در صورت شکست وسائل، افزایش یابد (بونگارت و وستوف ۲۰۰۰). ناگفته تولد حداقل بخشی از بارداری‌های ناخواسته، افزایش یابد (بونگارت و وستوف ۲۰۰۰). پیداست که ایران در حال حاضر بنابر نظر بسیاری از صاحب‌نظران (عباسی‌شوازی و همکاران^۱ ۲۰۰۶؛ مهریار و همکاران^۲ ۲۰۰۱؛ آقاجانیان و مهریار^۳ ۱۹۹۹) در حال کاملاً کردن انتقال جمعیتی بوده و در طول دو دهه گذشته کاهش «شگفت‌انگیزی» را در سطح باروری خود تجربه کرده است. کشور در حال حاضر میزان‌های باروری بسیار پایینی، حداقل از دید مقطعی، نسبت به گذشته‌ای نه چندان دور را تجربه می‌کند که حتی در برخی از استان‌ها به حد جایگزینی و پایین‌تر نیز رسیده است (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پیش‌شکنی ۲۰۰۳).

تمایل بالا برای تحديد مواليد خود می‌تواند دلیلی برای بالا بودن هر دو میزان استفاده-اثربخشی وسائل و نیز بارداری‌های ناخواسته در یک جامعه باشد (بونگارت و وستوف ۲۰۰۰). همان‌طور که قبل‌اً هم گفته شد در موارد شکست روش، وقتی افراد به فکر خاتمه‌دادن بارداری‌های ناخواسته باشند، این تنها استفاده از سقط عمدی است که می‌تواند به عنوان یک گزینه توسط آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. رابطه مستقیم بین میزان استفاده از وسائل جلوگیری از بارداری و میزان سقط عمدی در ادبیات پژوهشی (میساگو و همکاران^۴ ۱۹۹۸؛ میشارا و همکاران^۵ ۱۹۹۷؛ بونگارت^۶ ۱۹۹۸؛ احمد^۷ ۱۹۹۸؛ اکینرینولا و همکاران^۸ ۱۹۹۸؛ اکونوفوآ و همکاران^۹ ۱۹۹۶؛ مؤسسه آلن گاتمچر^{۱۰} ۱۹۹۹؛ سنلت^۷ ۲۰۰۰) هم بسیار مورد تأکید

1. Abbasi-Shavazi et al

2. Mehryar et al

3. Aghajanian and Mehryar

4. Misago et al

5. Mishara et al

6. Akinrinola et al

7. Senlet

قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که این نه صرف شیوع استفاده از وسایل، بلکه میزان اثربخشی آن است که در درجه اول اهمیت قرار دارد. می‌توان انتظار داشت که در جایی که میزان اثربخشی وسایل بالا است، از بارداری‌های ناخواسته جلوگیری شده و در نتیجه نیاز کمتری به استفاده از سقط عمدی برای جلوگیری از تولد بارداری‌های ناخواسته است. بنابر بررسی‌های انجام‌گرفته رابطه معکوس و بهنسبت شدیدی ($p < 0.000$, $r = -0.701$) بین دو متغیر مورد بحث مشاهده شد.

شاید بتوان با توجه به رابطه اخیر، دلیل بالا بودن میزان سقط جنین عمدی در برخی نقاط مذهبی و روستایی، که در نگاه اول شیوع کم سقط عمدی در آن‌ها مورد انتظار است را توضیح داد. در جایایی که مذهب و دین در زندگی اجتماعی حضور پررنگ‌تری دارند (نظیر آنچه در مورد استان‌های قم و خراسان صدق می‌کند)، شیوع ازدواج بیشتر بوده و در عین حال سطح باروری کشور طی انتقال جمعیتی اخیر پایین آمده است. در چنین شرایطی، جلوگیری از بارداری‌های برنامه‌ریزی نشده بایستی از طریق استفاده مؤثر از وسایل تنظیم خانواده صورت گیرد. با توجه به این‌که در استان‌های مذکور میزان استفاده اثربخشی وسایل از جمله پایین‌ترین‌ها است، شاید پاره‌ای از بارداری‌های برنامه‌ریزی نشده از طریق سقط عمدی جلوگیری شوند. مسلماً این گفته در مورد مناطق روستایی استان‌های نظری سیستان و بلوچستان که دارای باروری بالایی هستند (و عمللاً میزان بارداری‌های ناخواسته در چنین شرایطی کمتر خواهد بود)، نمی‌تواند به همان اندازه درست باشد.

وضعیت اقتصادی و رفاهی بالا نیز از جمله متغیرهای مهمی است که رابطه مستقیم آن با سقط عمدی در ادبیات پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است (اکینرینولا و همکاران؛ ۱۹۹۸؛ ویلدزشات^۱؛ ۱۹۹۹؛ مؤسسه آلن گاتچر ۱۹۹۹؛ کورجو و همکاران ۲۰۰۳). از آن‌جا که یک شاخص کلی برای پایگاه اجتماعی و اقتصادی در دسترس نبود به بررسی رابطه برخی از متغیرهایی که می‌توانستند به عنوان نماینده‌هایی از این پایگاه در نظر گرفته شوند، از جمله وجود برخی وسایل رفاهی در خانوار و میزان سقط عمدی پرداخته شد. در بررسی‌ها مشخص گردید که استان‌های با سطح توسعه بالاتر و با وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر در کل دارای میزان‌های بالای سقط عمدی هستند. برای نمونه روابط مستقیم و معناداری بین نسبت خانوارهای دارای وسایل رفاهی چون اتومبیل، تلفن، یخچال و نیز تعداد اتاق‌های در اختیار خانوار و سقط عمدی در سطح استانی مشاهده گردید.

بهمنتظر یک ارزیابی کلی، همبستگی بین مقادیر شهری و رستایی سقط عمدی برآورد شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها حاکی از رابطه معنادار و با شدت متوسط بین دو متغیر بود و با حذف دو مورد از استان‌ها (استان سیستان و بلوچستان به دلیل دارا بودن باروری بسیار بالا در مقایسه با دیگر استان‌ها و استان ایلام به دلیل قرار داشتن تحت تأثیرات جنگ در دهه‌های گذشته که روندهای طبیعی جمعیتی در آن دستخوش تحولات فراوانی بوده است) به عنوان مقادیر پرست، شدت رابطه بین دو متغیر تا حد $0.75 < p < 0.000$ بهبود نشان داد که جزء ضرایب همبستگی بالا است. بیشتر بررسی‌ها به نحوی حاکی از دقت بالای برآوردهای انجام گرفته برای سقط عمدی است.

بحث و نتیجه‌گیری

چنان‌که بیشتر هم بحث شد، بررسی نقش سقط عمدی در تحولات جمعیتی کشور به دلیل مواجهه با حساسیت‌های اجتماعی و موانع قانونی، کار آسانی نیست و احتمالاً کارهای انجام‌گرفته در این زمینه توسط سازمان‌ها و افراد، در عمل نمی‌تواند تصویر درست و قابل انتکایی از مسئله در سطح جامعه به دست دهد. هرچند روش‌های غیرمستقیم هم مشکلات و احتیاط‌های مربوط به خود را دارند، با این حال در نبود اطلاعات، شاید بتوانند در فهم بهتر و بیشتر مسئله مؤثر افتد.

سقط عمدی از دیرباز به عنوان یکی از عوامل کنترل جمعیتی و نیز تنظیم تعداد و ترکیب کوドکان دلخواه افراد، مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر آن، نقش آن در زمان انتقال جمعیتی که تعداد ایده‌آل فرزندان کاهش می‌یابد، برای جلوگیری از تولد بارداری‌های تاخوسته ممکن است بیشتر و مهم‌تر شود با توجه به این‌که اطلاعات قابل انتکایی در مورد سقط عمدی در حال حاضر (۱۳۷۹) در کشور وجود ندارد، تحقیق حاضر در واقع تلاشی برای به دست دادن برآورده از سطح سقط عمدی در جامعه ایرانی و پی‌بردن به نقش آن در تحولات اخیر جمعیتی کشور است. یافته‌ها حاکی از تجربه به نسبت بالای سقط عمد در کشور و بهویژه در بین بسواندان، مناطق شهری و مناطق دارای سطح بالاتر توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

به هر حال به دلایل اجتماعی، فرهنگی و قانونی در کشورهایی که سقط جنین صرفاً به دلیل ناخوسته بودن بارداری نمی‌تواند توسط زوجین و یا هر کس دیگری صورت گیرد، بدون این‌که از بروز مسئله جلوگیری شود، باعث خزیدن آن به لایه‌های زیرین اجتماعی می‌شود. این امر از طرفی بررسی خود پدیده را با مشکل مواجه می‌سازد و از طرف دیگر، انجام آن به شیوه‌هایی غیرقانونی و در شرایط محیطی پرخطر را موجب می‌شود که در ادامه می‌تواند بار سلامتی

زیادی به دنبال داشته باشد. ممنوعیت سقط عمدی، در شرایطی که می‌تواند در موارد بارداری‌های ناخواسته توسط افراد به عنوان یک راه حل جایگزین نسبت به کثار آمدن با تولد ناخواسته، مورد ارزیابی قرار گیرد، تنها مانع از ابراز اجتماعی سقط عمدی می‌شود و در چنین شرایطی، برآورده نیازهای موجود با توصل به شیوه‌های غیرقانونی و عموماً توسط افراد ناآزموده و غیرماهر، عواقب نامناسب بسیاری در پی خواهد داشت. از این روی به نظر می‌رسد، فراهم آمدن زمینه برای بررسی ابعاد مختلف سقط عمدی، عوامل و عواقب چند بعدی آن، نیازمند تغییر نگاه موجود به مسئله است تا هرچه بیشتر بتوان در راستای کاهش عواقب نامناسب آن گام برداشت.

در صورت کاهش تعداد ایده‌آل فرزندان، تنها استفاده از وسائل جلوگیری صدرصد مطمئن می‌تواند افراد را در رسیدن به تعداد ایده‌آل فرزندان باری رساند. باید در نظر داشت که با همه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در فناوری‌های مربوط به باروری، هنوز بر حسب شرایط، همه وسائل تنظیم خانواده از اطمینان کامل در زمان استفاده برخوردار نیستند و در نتیجه همیشه نسبتی از افراد با بارداری‌های ناخواسته مواجه خواهند بود. پس زمانی که بروز ناخواسته بدخی بارداری‌ها برای هر کس متصور است، شاید تغییر در نگرش جامعه به سقط عمدی از هر بعد و در نظر گرفتن همه ابعاد قانونی، اجتماعی و جز آن، در فضایی کاملاً علمی و بدون پیش‌داوری بتواند گام مهمی در جهت کاهش مسائل مختلف ناشی از سقط عمدی در کشور باشد.

سپاس‌گزاری

برای انجام پژوهش حاضر از داده‌های جمع‌آوری شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی با همکاری بدخی دیگر از سازمان‌های ملی و بین‌المللی (که تحت عنوان پیامیش سلامت و جمعیت در ایران یا DHS شناخته می‌شود) استفاده شده است که به این وسیله از تلاش‌های این وزارت‌خانه برای فراهم آوردن داده‌های بسیار مفید برای تحلیل‌های جمعیت و سلامت که مسلم‌آمیز این در دسترس نبودند، قدردانی می‌شود همچنین نویسنده‌گان سپاس‌گزار حمایت‌های مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه هستند که امکان انجام طرح پژوهشی «برآورد غیرمستقیم میزان سقط‌جنین عمدی کل در ایران به تفکیک استان‌ها» را فراهم نموده است. این کار پژوهشی در سال ۱۳۸۴ - ۱۳۸۳ انجام شده و مقاله حاضر به نحوی خلاصه نتایج حاصل از آن است. همچنین از توصیه‌های سازنده داوران محترم مقاله که به بهود شکل و محتوای آن کمک کرد، قدردانی می‌شود.

منابع

- Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal, Meimanat Hosseini-Chavoshi, Peter McDonald(2006) "The Path to Below Replacement Fertility in Iran", Paper Presented at Seminar on Fertility Transition in Asia: Opportunities and Challenges 18-20 December, Bangkok. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- Acharya, Rajib (2001) "Estimating the Parity Specific Rate of Induced Abortion: A New Approach", Paper Presented at the XXIV General Population Conference of the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP): 18-24 August.
- Aghajanian, A. & Mehryar, A. H. (1999) "Fertility Transition in the Islamic Republic of Iran, 1976-1996", *Asian-Pacific Population Journal*, Vol. 14, No. 1: 21-42.
- Ahmed, M. K., B. Mizanur and V. G. Jeroen (1998) "Induced Abortion in Matlab, Bangladesh: Trends and Determinants", *International Family Planning Perspectives*, Vol. 24 No. 3: 128-32.
- Akinrinola, B., S. Singh and H. Taylor (1998) "Reasons Why Women Have Induced Abortion: Evidence From 27 Countries", *International Family Planning Perspectives*, Vol. 24 No. 3: 117-27.
- Alan Guttmacher Institute (2006) *Abortion in Women's Lives*, New York: Alan Guttmacher Institute, Inc.
- (1999) *Sharing Responsibility: Women, Society, and Abortion Worldwide*, New York: Alan Guttmacher Institute, Inc.
- Bongaarts, John (1997) "Trends in Unwanted Childbearing in the Developing World", *Studies in Family Planning*, Vol. 28, No. 4: 267-77.
- (1982) "The Fertility-Inhibiting Effects of the Intermediate Fertility Variables", *Studies in Family Planning*, Vol. 13, No. 6.7: 179-89.
- (1978) "A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility", *Population and Development Review*, Vol. 4, No. 1: 105-32.
- Bongaarts, John and Charles F. Westoff (2000) "The Potential Role of Contraception in Reducing Abortion", *Studies in Family Planning*, Vol. 31, No. 3: 193-202.
- Bongaarts, John and Robert G. Potter (1983) *Fertility, Biology and Behavior, An Analysis of Proximate Determinants*, New York: Academic Press.
- Davis, Kingsley and Judith Blake (1956) "Social Structure and Fertility: An Analytic Framework", *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 4, No. 3: 211-235.
- Eggleston, E. (1999) "Determinants of Unintended Pregnancy among Women in Ecuador", *International Family Planning Perspectives*, Vol. 25 No. 1: 27-33.
- Foriet, Karen G. and Dorothy L. Nortman (1992) "A Method for Calculation Rates of

- Induced Abortion", *Demography*, Vol. 29, No. 1: 127-137.
- Johnston, Heidi Bart and Kenneth H. Hill (1996) "Induced Abortion in the Developing World: Indirect Estimates", *International Family Planning Perspectives*, Vol. 22, No. 3: 108-114 & 137.
- Karaduman Tas, Ayse (2004) "Internal Migration and Fertility: An Application of the Bongaarts' Model", Online [17.04.2004], <http://www.die.gov.tr/tkba/paper1_3.PDF>
- Korejo, R., K. j. Noorani and S. Bhutta (2003) "Socio-Cultural Dterminants of Induced Abortion", Karachi: Jinnah Postgraduate Medical Center, Vol. 13, No. 5: 260-62.
- Marston, Cicely and John Cleland (2003) "Relationships Between Contraception and Abortion: A Review of the Evidence", *Interrnational Family Planning Perspectives*, Vol. 29, No. 1: 6-13.
- Mehryar, A. H., F. Roudi, A. Aghajanian, & F. Tajdini (2001) "Repression and Revival of the Family Planning Program and Its Impact on Fertility Levels in the Islamic Republic of Iran", *Working Paper 2022, Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran and Turkey*, Cairo, Egypt.
- Ministry of Health and Medical Education (2003) *Population and Health in the Islamic Republic of Iran*, 2000, Tehran: SANOUBAR.
- Misago, Chizuru, Walter Fonseca, Luciano Correia, Lucilia M. Fernandes and Oona Campbell (1998) "Determinants of Abortion among Women Admitted to Hospitals in Fortaleza, North Eastern Brazil", *International Journal of Epidemiology*, Vol. 27, No. 5: 833-39.
- Mishra, U. S., Mala Ramanathan and S. Irudaya Rajan (1997) *Induced Abortion Potential Among Indian Women*, Trivandrum: Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology.
- Nurullah, M. and M. Mazharullah (1993) "Biological and Behavioral Determinants of Fertility in Bangladesh: 1975-1980", *Asia-Pacific Population Journal*, Vol. 8, No. 1: 3-18.
- Okonofua, F. E., Clifford Odimegwu, Bisi Aina, P. H. Daru and A. Johnson (1996) *Women's Experience of Unwanted Pregnancy and Induced Abortion in Nigeria*. Population Council, New York: NY 10017 USA.
- Prem, C. Saxena-Rozzett Jurd (2004) "Impact of Proximate Determinants on the Recent Fertility Transition in Yemen", Online [17.12.2007] <<http://www.escwa.un.org/popin/publications/new/prem.doc>>
- Renne, E. P. (1997) "Changing Patterns of Child-Spacing and Abortion in a Northern Nigerian Town", Office of Population Research, Working Paper No. 97-1.

- Rossier, Clementine (2003) "Estimating Induced Abortion Rates: A Review", *Studies in Family Planning*, Vol. 34, No. 2: 87-102.
- Senlet, P., M. Jill, L. Sain and R. Han (2000) *Abortion and Contraceptive Use in Turkey*, Carolina Population Center, Chapel Hill, NC 27516.
- Tak, Van Der (1974) *Abortion, Fertility, and Changing Legislation: International Review*, Washington D.C.: Health and Company.
- Wildschut, H. J. (1999) "Sociodemographic Factors: Age, Parity, Social Class and Ethnicity", In: James, D. K., et al., (eds.) *High Risk Pregnancy, Management Options*. pp: 39-52.
- World Health Organization (2004) *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2000*, Forth Edition.

