

ازتوباکتری‌ها و حفاظت محیط زیست

دکتر ناصر سعادت لاجوردی
و مهندس محمود اخوت


خاک یکی از سرمایه‌های ازلی انسان است و برای نگهداری آن و در نتیجه حفظ محیط زیست از کلیه امکانات باید بهره‌گرفت و کلیه نیروها را برای حراست از آن بسیج کرد .
جلوگیری از فرسایش خاک و جلوگیری از تخریب آن راههای گوناگونی دارد و در این پژوهش یکی از راههای جلوگیری از این پدیده عنوان می‌شود .

در مناطق گرم و خشک پراکنده شدن رس‌های از عوامل مهم بی‌ثبات بودن خاک است و برای جلوگیری از این نمود زیان آور، بالا بردن میزان مواد آلی خاک و در صورت طوبت بهترین راه چاره جوئی است (۵۴) . میزان مواد آلی خاکهای ایران بسیار پائین و حدود ۱/۵ درصد است (۱) و همین مشکل علتی است برای پائین بودن عملکرد محصولات زراعی (بویژه حبوبات) اگر بتوانیم میزان میکرواورگانیزم های خاک ایران را بالا ببریم و یا از اتلاف آنها جلوگیری کنیم هم در حفظ خاک کوشیده ایم و هم کمبود محصولات زراعی تا حدی جبران می‌پذیرد .
متأسفانه استفاده از کودهای شیمیایی بویژه اوره روز بروز بیشتر میشود و همگان بر این عقیده هستند که افزایش اوره در تخریب خاک بسیار مؤثر بوده و اگر میزان آن در خاک از حدی تجاوز

1. Azotobacters

نماید اولاً " آبهای سطح الارضی را آلوده میکند و در ثانی فعالیت میکرواورگانیسم های خاک بشدت مختل میشود (۱) . (زیرا ۱۱۱ محیط در نتیجه این عمل تغییر یافته و عمل جذب عناصری نظیر مولیبدن و آهن بسختی انجام میگردد) .

میکرو اورگانیسم های جاذب ازت در خاک بردونوعند ازتوباکترها و آکتینومیست ها . آکتینومیست ها حد واسط قارچ ها و باکتریها هستند . در مناطق خشک و گرم نقش آکتینومیست هادر جذب ازت بیش از نقش باکتریها ست و در این مناطق ۳٪ میکرو اورگانیسم ها آکتینومیست ها میباشد . (۳) . جذب ازت بوسیله ازتوباکترها و سیکل ازت در خاک بشرح زیر است . (۶)



ریشه گیاهان طایفه حبوبات (Leguminosae) و پروانه آسایان (Papillonaceae) بعلت ترشحات ویژه میکربهای از نوع ریزوبیوم (ازتوباکتر) رابطرف خود جلب می نماید این میکربها با تشکیل غده ها یاگره هائی قسمتی از ازت جو را جذب میکند . برای آگاهی به اتمسفر خاک جدول زیر ارائه داده میشود :

	N	O	CO2	
	۷۹/۵	۱۹/۲	۰/۹	اتمفر خاک
	۷۸/۶	۲۰/۹	۳٪	اتمفر آزاد

مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست

باکتریهای مذکور در حالت آزاد کروی بوده وقادر به جذب ازت نیستند وهنگامیکه داخل سلولهای موئین گیاه شدند بشکل " V " و یا " Y " در آمده و ازت جو و یا NO₂ آزاد در خاک را جذب می کنند و پس از برداشت حبوب ازت مجتمع درروی ریشه که بمیزان ۲۰۰ کیلودر هکتار میباشد در خاک میماند و پس از پوسیدن برخی تغییرات شیمیائی جذب زراعت بعدی میشود (۱۰) . باین ترتیب ارزش اقتصادی آن کاملاً مشهود است . مواد مورد استفاده

در این تحقیق شناسائی نژادهائی فیزیولوژیکی ریزوبیوم ها گام اولیه بوده است . هرنوع حبوبی احتیاج به نژاد خاصی از ازتوباکتر دارد . (۲) . مطالعات انجام شده روی گونه های مختلف گیاهی نشان میدهد که ۱۴ دسته ریزوبیوم تاکنون شناخته شده که ۱۰ دسته آن روی ریشه گیاهان تیره لگومینوز بشرح زیر یافت میشود .


- ۱- ریزوبیوم های گروه یونجه که بویژه روی یونجه و شبدر شیرین دیده میشود .
- ۲- ریزوبیوم های گروه شبدر که بویژه روی شبدر قرمز و شبدر سفید دیده میشود
- ۳- ریزوبیوم های گروه نخود فرنگی که بویژه روی نخود فرنگی ، نخود و ماشک دیده میشود .
- ۴- ریزوبیوم های گروه لوبیا که بویژه روی لوبیا ، لوبیا سبز و باقلا دیده می شود .
- ۵- ریزوبیوم های گروه لوبیا چشم بلبلی که بویژه روی لوبیا چشم بلبلی و بادام زمینی دیده میشود .
- ۶- ریزوبیوم های گروه سویا (لوبیای روغنی) که بویژه روی سویا دیده میشود .
- ۷- ریزوبیوم های گروه لوپن که بویژه روی لوپن (باقلا مصری) دیده میشود .

سپس آنرا به 900°C محلول فوق اضافه مینمائیم و مجموعه را داخل حمام ماری قرار می دهیم تا آگار آن حل شود بعد 20°C از محلول بدست آمده را داخل لوله آزمایش ریخته و دهانه آنرا با پنبه بسته و بمدت ۴۵ دقیقه در اتو کلاو استریل می نمائیم. این محیط کشت برای کشت ریزوبیوم مذکور بکار میرود. در ۷ محیط کشت دیگر بجای آب لوور محلولی از اوره

به غلظت های زیر میافزائیم

صفر درصد ۰/۱ ۰/۲ ۰/۴ ۰/۸ ۱/۶ ۳/۲
 به هر یک mg ۰/۱ از سوش مذکور اضافه میکنیم (۸). پس از ۴۸ ساعت اقدام به شمارش میکروبهها می نمائیم (البته پس از رقیق کردن محیط). نتیجه بدست آمده در جدول زیر خلاصه میشود.
 تعداد ریزوبیوم

تعداد ریزوبیوم	درصد غلظت محلول اوره
۱۰۰۰۰۰۰	صفر درصد اوره (محیط حاوی آب لوور)
۵۰۰	" " بدون " " "
۱۰۰۰	" " " " " ۰/۱۰
۲۰۰۰	" " " " " ۰/۲
۵۰۰۰	" " " " " ۰/۴
۴۰۰۰	" " " " " ۰/۸ گرم
۱۵۰۰	" " " " " ۱/۶ گرم
۵۰۰	" " " " " ۳/۲ گرم



۸- ریزوبیوم های گروه افاقیا که بویژه روی افاقیا دیده میشود.
 ۹- ریزوبیوم های گروه ماش که بویژه روی ماش دیده میشود.
 ۱۰- ریزوبیوم های گروه عدس که بویژه روی عدس دیده میشود. چون ممکن است عدهای ریزوبیوم با گره های حاصل از حمله نماتدهای مولد غده ریشه حبوبات عدهای را به اشتباه اندازه اطلاع از این غده ضروری است (۹).

غده های باکتریهای تثبیت کننده ازت براحتی از ریشه جدا میگردد و چنانچه آنها را بشکافیم در وسط آبکی و برنگ قرمز است. غده های حاصل از حمله نماتدها بصورت پیچیدگی و تورم ریشه بوده و چنانچه آنها را بشکافیم مقطع دانه دانه بوده و قطر دانهها باندازه یک تا ۲ میلیمتر است و برنگ سفید میباشد که نمودار وجود نماتدهای کامل ماده است. در اینحالت ریشه قطور و متورم میشود و حالت سرطانی دارد و تعداد ریشه موئین آن کم است.

در آزمایش دیگر اثر ازت روی تغییرات ریزوبیومها مطالعه شد. اگر 0.1 mg از سوش های *Rhizobium Japonicum* که برای کشت سویا (لوبیای روغنی) بفروش میرسد در محیط کشت متعارفی (۷ و ۸) حاوی مواد زیر کشت دهیم:
 نمک طعام ۰/۲ گرم NaCl
 سولفات بی سدیم ۰/۵ گرم HNa_2PO_4
 سولفات منیزیم ۰/۲ گرم Mg SO_4
 کربنات کلسیم ۰/۱ گرم CaCO_3
 مانیتول ۱۰ گرم $\text{Manitol (C}_6\text{H}_8 (\text{OH})_6$)
 ژلوز (آگار) ۱۵ گرم

مواد فوق را در ارلن میر *Erlenmeyer* ریخته و آب مقطر میافزائیم تا حجم آن به 900°C برسد.

در ظرف دیگری ۱۰ گرم لوور را داخل 100°C آب مقطر ریخته و آن را روی اجاق میگذاریم تا لوور در آب حل شود و

میکرو بیولوژی خاک افزایش کود ازته بایستی با احتیاط صورت گیرد. زیرا همانطور که ملاحظه شد خطر از بین رفتن میکروبهها مفید خاک بسیار زیاد است و از بین رفتن آنها همانطور که مذکور افتاد باعث تخریب سریع خاک میشود و از لحاظ اقتصادی نیز باعث از بین رفتن سرمایه میشود. چه ضمن ملحوظ داشتن هزینه کود ازته و هزینه افزایش آن بخاک بایستی تخریب ساختمان که سرمایه اصلی انسان است نیز در مد نظر قرار گیرد و بیشتر شدن نیاز آبی گیاهان بهنگام افزایش کود شیمیایی نیز مورد توجه باشد

در خاکهایی که بمقدار زیاد ازت وجود دارد از فعالیت ریزوبیومها کاسته میگردد. هنگامیکه محلولی از اوره به غلظت ۳/۲ درصد بخاک بدهند فعالیت میکروبههای فوق کاهش مییابد و بیشتر از این مقدار به سمت صفر میل میکنند. بنابراین میزان کود ازته با این ترتیب در حدی باید باشد که غلظت آن از ۵/۵ درصد تجاوز نکند. کودهای سولفات نظیر $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ بر سایر کودهای ازته ارجحیت دارد زیرا که باعث اسیدی شدن خاک و فعالیت بیشتر میکروبهها میشود بنابراین برای حفظ محیط زیست و تعادل



LES AZOTOBACTÉRES ET L'ENVIRONNEMENT

par:

N. Saadat – L.

M. Okhovat

Sommaire:

Dans les sols possédant une grande quantité d'N. ammoniacal, l'activité des Rhizobiums diminue et quand nous ajoutons au sol une quantité d'urée de l'ordre de 3.2% l'activité en question devient presque nulle. Donc l'apport d'engrais azoté doit être fait de telle manière que la concentration d'N dans le sol ne dépasse pas 0,5 %.

Les engrais sulfatés [$(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4$], dans ces conditions se comportent mieux que les autres formes d'N, car ils tendent à diminuer le pH du sol et par la suite l'activité des micro-organismes tend à augmenter. Or, l'augmentation d'engrais doit être pratiquée avec précaution, car on risquerait de déséquilibrer la microflore naturelle du milieu.

D'autre part, il y a le risque de dégradation du sol et sa structure deviendrait de plus en plus fine et farineuse ce qui n'est pas souhaitable en agronomie. L'intérêt économique que présente une diminution de l'apport d'azote est très considérable aussi bien pour la consommation d'eau que pour les investissements initiaux.

منابع مورد استفاده

- ۱- زرین کفش- سعادت لاجوردی - علوم خاکشناسی - صفحه ۳۱۵ - ۳۲۵ انتشارات نیل ۱۳۴۸
- ۲- سعادت لاجوردی ناصر - ریز و بیوم های غده زا در سويا نهمین سمینار تحقیقات دانه های - روغنی - تهران ۱۳۵۳
- ۳- صالح راستین - ناهید - پلی کپی میکروبیولوژی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ۱۳۵۳
- 4- Broadbent - F.E. Effect of fertilizer Nitrogen on the Release of soil nitrogen. S.S.S.A Proceedings p. 692-696, Nov. Dec. 1965
- 5- Broadbent - F.E. et al-plant Recovery of Immobilized N- in Greenhouse Experiments. S.S.S.A. Proceeding P. 55-60 Jan.Feb. 1965
- 6- Demobon A. Croissance des Végétaux cultivés p. 183-206, Ed. Dunod, Paris 1956.
- 7- Harris R.F. et al-Soil Aggregate Stabilization by the Indigenous Microflora. S.S.S.A. Proceedings p. 205-210. March-April 1966.
- 8- Holste D.A. Burus R.C. et al. - Establishment of Symbiosis between Rhizobium and Plant Cells in Vitro -Research Dep. Pont de Nemours. Vol. 232, July 16, 1971.
- 9- Lie, T.A. - Rhizobium, Plant and Soil, 30, 391 (1969).
- 10- Vincent J.M. Survival of the root nodule Bacteria. Australian J. of Agro. p. 108 - 123, (1973).

