

# ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران

## با مدل تخریب

دکتر نصرت ا... صفائیان \*

دکتر مریم شکری \*\*

مهندس بهمن جباریان امیری \*\*\*

### چکیده

بدون شک توسعه و تحولات صنعتی امکانات رفاهی بسیاری را در اختیار انسان قرار داده است، ولی مشکلات اجتماعی و زیست محیطی گوناگونی نیز به موازات آن برای آدمی فراهم آمده است. غالباً این مشکلات ناشی از خود توسعه و یا تکنولوژی نبوده، بلکه مشکلات زیست محیطی به دنبال عدم توجه به نتایج جانبی و کاربرد نادرست صنعت و تکنولوژی ایجاد شده است. حاشیه جنوبی دریای خزر به دلیل جذبیت اکوسیستم های آن و با توجه به دارابودن شرایط بسیار مناسب، در طیفی وسیع، تغییرات چشم گیری را در کاربری اراضی (جنگل، مرتع، آب بندان و...) تحت عنوان توسعه در خود داشته است. از آنجا که توسعه عجولانه و بدون ارزیابی دقیق زیست محیطی می تواند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و رفاه انسانهای وابسته به آن داشته باشد، مطالعه حاضر در کرانه های جنوبی دریای خزر با کاربرد مدل تخریب محیط زیست و تعیین میزان آسیب پذیری اکولوژیک با استفاده از روش عینی آسیب پذیری به منظور ارزیابی اثرات توسعه و ارائه مدل صورت پذیرفت. از آنجا که مشکلات بلند مدت زیست محیطی را نمی توان به مدد فناوری (تکنولوژی) سریعاً حل نمود، با درک همبستگی بین حفاظت و توسعه، اهمیت و ضرورت ارزیابی های زیست محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار یادآور می شود.

### پیال جامع علوم انسان

#### کلمات کلیدی:

توسعه، محیط زیست، مدل تخریب، آسیب پذیری، دریای خزر.

\* دانشیار اکولوژی کاربردی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران.

\*\* دانشیار اکولوژی کاربردی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران.

\*\*\* کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، وزارت نیرو.

یکی از روش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی است که آثار فعالیتهای انسانی را در مقیاس منطقه‌ای یا آبخیز تحلیل می‌نماید و مقدار آن را به طور کمی مشخص می‌کند.

مقاله حاضر، با اجرای مدل تخریب محیط زیست در شمال کشور، میزان تخریب ناشی از توسعه را در آبخیزهای خرد استان مازندران تعیین و مشخص می‌نماید.

### سابقه پژوهش

بررسی‌های کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که برای اولین بار مخدوم (۱۳۷۲) مدل تخریب را معرفی نموده و در سطح استان آذربایجان به مورد اجرا گذاشته است. جباریان (۱۳۷۵)، آذری (۱۳۷۵)، نوری (۱۳۷۶)، منصوری (۱۳۷۷)، عماریان (۱۳۷۷) و جعفری (۱۳۸۰) به ترتیب مدل مذکور را در حوزه آبخیز سد امیرکبیر و حوزه آبخیز سد سفیدرود، استان کرمانشاه، استان هرمزگان، شرق استان تهران و حوزه آبخیز سد لتيان اجراء نمودند. از ویژگیهای عمدۀ مدل، تکیه بر قضاوت کارشناسی و نیز کارگسترهای میدانی است. این ویژگی باعث می‌گردد که ارزیابان کم تجربه در هنگام اجرای مدل دچار سردرگمی شوند. چرا که برای اجرای آن ارزیاب باید بر اساس اطلاعات و دانش اکولوژی خود و با انجام کارهای میدانی ای عوامل آسیب پذیری اکولوژیک و شدت تخریب را بر اساس قضاوت‌های کارشناسی خود تعیین نماید. جباریان (۱۳۷۵) گام‌هایی را در جهت عینی سازی مدل تخریب از طریق معرفی یک روش عینی برای تعیین آسیب پذیری اکولوژیک برداشته است. با این وجود همچنان تعیین شدت عوامل تخریب بر اساس قضاوت‌های کارشناسی باقی مانده است. ضمن آنکه پیشنهاد نموده است تا از رابطه ذیل برای عینی سازی و تعیین شدت عوامل مخرب استفاده شود.

$$I_i = \sum_{i=1}^n \left( \frac{A_i}{AS_i} \times D_i \right)$$

که در آن:

$I_i$  = شدت تخریب فعالیت مخرب در زیرحوزه

### سرآغاز

در چند دهه گذشته جامعه انسانی دریافته است که الگوهای انتخابی او در مورد توسعه اقتصادی درست نبوده است و پایداری و جاودانگی آن مستلزم وارد نمودن جنبه‌های حفاظت محیط زیست در فرآیند آن است. با این نگرش، مفهوم توسعه پایدار به جامعه انسانی معرفی گردید و مسئله انتخاب میان صنعتی شدن یا حفظ محیط زیست کم رنگ شده و اکنون مشغولیت ذهنی جامعه انسانی دست یابی به الگوئی از توسعه است که ضمن بهبود وضعیت اقتصادی، کیفیت محیط زیست را به عنوان بستر پذیرنده توسعه بهبود بخشد.

ارزیابی اثرات محیط زیستی و آمایش سرزمین از ابزارهای دست یابی به توسعه پایدار محسوب می‌شوند، به طوری که ضمن مکان یابی کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک و نیازهای اقتصادی - اجتماعی، از اجرای پروژه‌های عمرانی که اثرات تخریبی زیادی از خود بر محیط زیست بر جای می‌گذارد جلوگیری به عمل آورد (Abaza, 1995). در هنگام ملاحظه کردن جنبه‌های محیط زیستی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه باید به نحوی عمل کرد که مکانیزم ارزیابی محیط زیستی نه تنها تأخیری بر سر راه اجرای پروژه‌هایی که از نظر محیط زیست قابل قبول هستند ایجاد ننماید، بلکه بتوان از طریق تدوین و اجرای طرحهای بهسازی به یک توسعه پایدار دست یافت. مشکلات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه به توسعه نامتوازن آنها مربوط می‌شود و صرف انتقال فنون ارزیابی از کشورهای شمال به کشورهای جنوب نمی‌تواند بهترین راه حل برای حل مسائل محیط زیستی آنها باشد، چرا که تفاوت‌های فرهنگی، ساختار سازمانی، الویت‌های سیاسی و نوع مسائل محیط زیستی در کشورهای در حال توسعه باعث می‌گردد خود به ایجاد تغییرات لازم در فنون برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست مبادرت ورزند (Habitat, 1992). در این راستا ارائه مدل تخریب محیط زیست (مخدوم، ۱۳۷۲) را می‌توان گامی در جهت بومی کردن فنون برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست تلقی نمود (جباریان، ۱۳۷۵). مدل تخریب محیط زیست در واقع

درجه و ۴۷ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۵۴ درجه و ۱۰ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. مساحت آن  $23756/6$  کیلومتر مربع و برابر  $1/46$  درصد کل کشور است (آمارنامه استان مازندران، ۱۳۷۷). این آبخیز کلان در خود ۱۱ آبخیز خرد را با مساحت های مختلف جای داده است (جدول ۱). رشته اصلی کوههای البرز مانند سدی در جنوب دریای خزر کشیده شده و مانع ورود رطوبت دریای مازندران به نواحی مرکزی می گردد، به همین دلیل زمین های نواحی جنوبی استان و کوههای آن از شرایط بسیار مطلوبی برای داشتن جنگلهای انبوه و مراتع سرسبز برخوردار می باشند. منطقه مطالعاتی دارای ۲۰ شهرستان و جمعیتی در حدود  $2673852$  و تراکم جمعیتی برابر  $112/55$  نفر در کیلومترمربع است (آمارنامه استان مازندران، ۱۳۷۷).

**جدول شماره (۱): مساحت و درصد مساحت آبخیزهای خرد در منطقه مطالعاتی**

درصد	مساحت (Km <sup>2</sup> )	تعداد شبکه	شماره آبخیز
۳/۴	۱۷۸۱	۲۸۵	۱
۷/۲	۳۰۱۲	۴۸۲	۲
۱/۱۶	۴۸۱	۷۷	۳
۹/۴۲	۳۹۱۹	۶۷۲	۴
۱۳/۲۲	۵۵۰۶	۸۸۱	۵
۳/۶۲	۱۵۰۶	۲۴۱	۶
۶/۸۴	۲۸۵۰	۴۵۶	۷
۱۱	۴۵۸۱	۷۳۳	۸
۶/۷۲	۲۸۰۰	۴۴۸	۹
۸/۴۲	۳۵۰۶	۵۶۱	۱۰
۲۸/۱	۱۱۷۰۰	۱۸۷۲	۱۱

رویهم گذاری نقشه زیرحوزه های منطقه مطالعاتی با نقشه مرزبندیهای سیاسی نشان می دهد که این دو نقشه موضوعی به میزان ۸۰ درصد با هم انطباق دارد. رودخانه اصلی و شهرهای عمده زیرحوزه ها به طور خلاصه چنین است:

- زیرحوزه شماره یک، نام رودخانه اصلی، سلمان رود و شهرهای

$A_i =$  مساحتی که فعالیت مخرب در زیر حوزه  $i$  به خود اختصاص داده،

$AS_i =$  مساحت زیر حوزه  $i$

$D_i =$  درجه اهمیت

این ایده ضمن برابر تلقی نکردن اثرات بر جای مانده از فعالیتهای انسانی، زمینه ای را فراهم می اورد تا در صورت وجود اطلاعات اقتصادی - اجتماعی و ایجاد یک سیستم اطلاعات جغرافیائی بتوان شدت فعالیتهای انسانی را تعیین نمود. در همین راستا نوری (۱۳۷۶) در سطح استان کرمانشاه برای اولین بار اقدام به اجرا و بکارگیری مدل تخریب محیط زیست نمود و در یک اقدام ابتکاری از شبکه بندي UTM به عنوان واحد نشانزد بهره جست. او برای اولین بار در کشور از مرزبندی های سیاسی شهرستان استفاده نمود تا با اجرای مدل، میزان تخریب محیط زیست را که ناشی از فعالیتهای انسانی است تعیین نماید. در یک جمع بندي می توان گفت که نوری (۱۳۷۶) گام مهم و مؤثری در ملموس کردن نتایج اجرای مدل برای تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی برداشت زیرا برای آنان، مرزبندی های سیاسی دهستان، شهرستان و استان در مقایسه با نتایج در سطح زیرحوزه های یک آبخیز کلان روشن تر و قابل درک تر است. منصوری (۱۳۷۹) و عماریان (۱۳۷۷) به پیروی از ابتکار عمل صورت گرفته از سوی نوری (۱۳۷۶) شبکه بندي منطقه مطالعاتی خود را بر مبنای شبکه UTM قرار دادند تا گامی دیگر در جهت عینی سازی شدت عوامل مخرب بردارند. در ضمن تلاش نموده اند تا با تدوین چند پیش فرض برای شبکه ها الیت توسعه را مشخص نمایند. این پیش فرض ها مبتنی بر عدم توسعه در مناطق حفاظت شده، تالاب های بین المللی، شبکه های دارای گسل های فعال و زلزله خیز، گندلهای نمکی، مناطق باتلاقی و در معرض جزر و مد و شبکه های فاقد منابع آب و الیت دهی توسعه به شبکه های دارای منابع آب می باشد.

### منطقه مطالعاتی

منطقه مورد مطالعه در حاشیه جنوبی دریای خزر، بین ۳۵

نشانزد (Impact Unit) عمل می‌نمایند، شناسائی و فهرست می‌شوند. سپس میزان شدت عوامل تخریب طبق جدول (۲) و آسیب پذیری اکولوژیک بر طبق جدول (۳) با استفاده از روش عینی آسیب پذیری اکولوژیک (جباریان، ۱۳۷۷) محاسبه می‌گردد. در هر واحد نشانزد، عامل تخریب شناسائی، کدگذاری و در نهایت با شدت تخریب هر عامل ادغام می‌گردد و به صورت خطی در مدل نمایان می‌شود. برای واقعی و مؤثرتر نشان دادن اثر جمعیت بر اکوسیستم‌ها عامل تراکم فیزیولوژیک که در واقع حاصل تقسیم جمعیت بر سطح اکوسیستم‌های تولیدکننده است (میلر، ۱۳۶۶) وارد مدل شده است (مخدوم، ۱۳۷۲).

جدول شماره (۲): طبقه‌بندی شدت‌های تخریب محیط زیست

کیفیت تخریب	کل شدت تخریب
خفیف	۱
متوسط	۲
شدید	۳
خیلی شدید	۴

جدول شماره (۳): طبقه‌بندی آسیب پذیری اکولوژیکی

کیفیت تخریب پذیری	کد آسیب پذیری
خیلی مقاوم	۱
مقاوم	۲
متوسط	۳
حساس	۴
خیلی حساس	۵

برای نمایاندن درجه تخریب محیط زیست در سطح زیرحوزه‌ها و انجام مقایسه آسان بین زیرحوزه‌ها برای هر زیرحوزه بر اساس رابطه ذیل یک مدل تخریب محیط زیست نوشته می‌شود و در نهایت میزان تخریب با آن محاسبه می‌گردد (جباریان، ۱۳۷۵).

$$LDM = \sum_{i=1}^n (A_i \times I_i) + \left( \frac{D_i}{S_i} \right)$$

به طوری که در آن:

- زیرحوزه شماره دو، نام روادخانه اصلی صفارود و شهرهای عمده آن تنکابن و رامسر
- زیرحوزه شماره سه، نام روادخانه آن سرداب رود و شهر عمده آن چالوس
- زیرحوزه شماره چهار، نام روادخانه چالوس رود و شهر عمده آن نوشهر
- زیرحوزه شماره پنج، نام روادخانه آن هراز و شهرهای عمده آن آمل و فریدونکنار
- زیرحوزه شماره شش، نام روادخانه اصلی بابلرود و شهرهای عمده آن بابل و بابلسر
- زیرحوزه شماره هفت، نام روادخانه اصلی تالار و شهرهای عمده آن سوادکوه و قائمشهر
- زیرحوزه شماره هشت، نام روادخانه تجن و شهر عمده آن ساری
- زیرحوزه شماره نه، نام روادخانه اصلی نکارورد، شهر عمده آن بهشهر
- زیرحوزه شماره ده، نام روادخانه اصلی آن قره سو و شهرهای عمده آن گرگان و کردکوی
- زیرحوزه شماره یازده، نام روادخانه اصلی گرگان رود و شهرهای عمده آن علی آباد، گنبدکاووس و بندرترکمن

### روش کار

برای انجام مطالعه حاضر از مدل تخریب محیط زیست استفاده شده است. مدل تخریب محیط زیست یکی از شیوه‌های مدل سازی است که به روش تحلیل سیستمی تعلق دارد، به طوری که در این شیوه ارزیاب با آمیزه‌ای از اطلاعات گذشته، حال و آینده سروکار دارد یعنی نه تنها از اطلاعات گذشته و حال استفاده می‌کند بلکه به تولید اطلاعات نیز می‌پردازد (مخدوم، ۱۳۷۲). در مدل تخریب محیط زیست برای نمایاندن تخریب در زیرحوزه‌های یک‌آبخیز کلان از مدل‌های خطی استفاده می‌گردد. به طوری که نخست با بررسی‌های میدانی ای تمام عوامل تخریب در هر یک از زیرحوزه‌ها، که در اینجا به عنوان واحد

### برآورد آسیب پذیری اکولوژیکی

بر اساس روش عینی تعیین آسیب پذیری اکولوژیک (جباریان، ۱۳۷۵) و با استفاده از نقشه های منابع فیزیکی (شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، زمین شناسی، خاک و اقلیم) و نقشه های منابع زمینی (پوشش گیاهی) آسیب پذیری اکولوژیک واحد های نشانزد تعیین گردید (صفائیان و همکاران، ۱۳۸۱). جدول شماره ۵ میانگین شاخص آسیب پذیری و طبقه آن را در منطقه مطالعاتی نشان می دهد.

$LDM$  = مدل تخریب محیط زیست (بدون بعد)

$A_i$  = عامل تخریب در زیرحوزه شماره  $i$

$I$  = شدت تخریب عامل مخرب  $A_i$  در زیرحوزه  $i$

$D_i$  = تراکم فیزیولوژیک در زیرحوزه  $i$

$S_i$  = آسیب پذیری اکولوژیکی در زیرحوزه  $i$  است

### یافته ها

### برآورد شدت فعالیت ها

برای مشخص نمودن این جزء که در واقع از عوامل اصلی مدل تخریب محسوب می شود، نخست با استفاده از نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰: ۱ نقشه زیرحوزه های منطقه مطالعاتی تهیه گردید و هر یک از این یازده زیرحوزه به عنوان واحد نشانزد در نظر گرفته شد. از طریق انجام بازدید میدانه ای از هر یک از زیرحوزه ها فعالیت های موجود در آن تعیین گردید. پس از آن با استفاده از منابع موجود (سازمان جغرافیایی ایران، ۱۳۷۵) فرهنگ آبادی های ایران (۱۳۷۵) و نقشه پوشش گیاهی (وزارت کشاورزی) تراکم فیزیولوژیک در هر یک از زیرحوزه ها محاسبه گردید و نتایج آن در جدول شماره ۴ آورده شده است.

### جدول شماره (۵): میانگین شاخص آسیب پذیری

### اکولوژیکی و طبقه بندی آن در زیرحوزه ها

طبقه	میانگین شاخص آسیب پذیری	نام آبخیز خود	شماره
۵	۸۲/۳	شلمانرود	۱
۴	۶۹/۷	صفارود	۲
۵	۸۰/۸	سرداب رود	۳
۴	۷۴	چالوس رود	۴
۳	۶۱/۵	هراز	۵
۳	۶۴/۷	بابلرود	۶
۲	۵۹/۷	تالار	۷
۲	۵۹/۳	تجن	۸
۵	۸۱/۷	نکارود	۹
۱	۴۴/۹	قره سو	۱۰
۲	۵۴	گرگانرود	۱۱

### جدول شماره (۴): تراکم فیزیولوژیک در آبخیز های

### خرد منطقه مطالعاتی

زیرحوزه	تراکم فیزیولوژیک
۱	۶۱۰
۲	۲۹۲۹
۳	۴۰۲
۴	۸۱۲
۵	۸۴۵
۶	۱۲۴۲۸
۷	۲۶۴۴
۸	۳۲۷
۹	۲۱۹۶۱
۱۰	۳۱۶
۱۱	۳۴

در گام آخر مدل تخریب با توجه به اطلاعات بدست آمده برای ۱۱ زیرحوزه از آبخیز کلان استان مازندران با توجه به موارد زیر نوشته شده است:

XF - تبدیل جنگل به مرتع

XT - تبدیل جنگل به باغ و ویلا

XT - بهره برداری از جنگل

X - تبدیل جنگل به اراضی زراعی

ZF - قطع درختان برای سوخت و مصارف روستائی

HA - تخریب زیستگاه ها

H - شکار غیراصولی

- آلوده کردن خاک	YS	- تغییر کاربری اراضی	XU
- استفاده بی رویه از آب	WU	- تبدیل مرتع به اراضی زراعی	XR
- زباله	WA	- تبدیل مرتع به اراضی صنعتی	RI
- صید بی رویه ماهیان	FI	- چرای بیرویه	OG
- بالا بودن سطح آب زیرزمینی	GW	- استفاده غیراصولی از آب بندان	W
- هجوم گونه های غیربومی	EX	- آلوده کردن هوا	YA
		- آلوده کردن آب	YN

$$S_1 = XF_3 + XT_3 + FU_4 + X_4 + ZF_3 + HA_3 + H_4 + XU_3 + XR_3 + RI_2 + RT_2 + Z_2 + IL_3 + PS_3 + OG_3 + W_2 + YA_2 + YN_2 + YS_2 + WU_2 + WA_2 + FI_3 + GW_2 + EX_2 + TO_3 + DI_2 + IM_2 + R_3 + \frac{610}{5} = 196$$

$$S_2 = XF_3 + XT_3 + FU_4 + X_3 + ZF_3 + HA_4 + H_3 + XU_4 + XR_3 + RI_3 + RI_4 + Z_2 + IL_3 + PS_3 + UG_4 + W_2 + YA_3 + YN_3 + YS_3 + WU_2 + WA_3 + FI_4 + GW_3 + EX_2 + TO_4 + DI_3 + IM_3 + R_4 + \frac{2929}{4} = 820$$

$$S_3 = XF_2 + XT_3 + FU_4 + X_3 + ZF_3 + HA_4 + H_3 + XU_3 + XR_3 + RI_3 + RI_4 + Z_3 + IL_3 + PS_3 + OG_4 + W_2 + YA_4 + YN_3 + YS_3 + WU_2 + WA_2 + FI_4 + GW_3 + EX_3 + TD_4 + DI_2 + IM_3 + R_4 + \frac{402}{5} = 165$$

$$S_4 = XF_3 + XT_3 + FU_3 + X_4 + ZF_4 + HA_3 + H_3 + XU_3 + XR_1 + RI_4 + RT_3 + Z_2 + IL_4 + PS_3 + W_3 + OG_4 + YA_2 + YN_3 + YS_3 + WU_4 + WA_4 + FI_2 + GW_3 + EX_3 + TO_3 + DI_3 + IM_1 + R_4 + \frac{812}{4} = 288$$

$$S_5 = XF_2 + XT_3 + FU_3 + X_3 + ZF_2 + HA_3 + H_3 + XU_4 + XR_3 + RI_4 + RT_4 + Z_2 + IL_4 + PS_3 + OG_4 + W_4 + YA_4 + YN_4 + YS_4 + WU_4 + WA_4 + FI_4 + GW_5 + EX_4 + TO_4 + DI_4 + W_4 + R_4 + \frac{845}{3} = 375$$

$$S_6 = XF_3 + XT_2 + FU_3 + X_3 + ZF_3 + HA_4 + H_3 + XU_2 + XR_2 + RI_4 + RT_3 + Z_2 + IL_3 + PS_4 + W_3 + OG_4 + YA_2 + YN_4 + YS_4 + WU_3 + WA_3 + FI_3 + GW_3 + EX_2 + TO_3 + DI_3 + IM_2 + R_3$$

$$+ \frac{12428}{3} = 3892$$

$$S_7 = XF_3 + XT_2 + FU_3 + X_3 + ZF_3 + HA_4 + H_4 + XU_3 + XR_4 + RI_2 + RT_3 + Z_3 + IL_3 + PS_4 + OG_4 + W_4 + YA_3 + YN_4 + YS_4 + WU_4 + WA_3 + FI_4 + GW_3 + EX_3 + TO + DI_3 + IM_3 + R_3$$

$$+ \frac{2644}{2} = 1412$$

$$S_8 = XF_3 + XT_2 + FU_4 + X_3 + ZF_3 + HA_3 + H_3 + XU_3 + XR_2 + RI_3 + RT_2 + Z_2 + IL_2 + PS_4 + OG_3 + W_3 + YA_3 + YN_3 + YS_3 + WU_4 + WA_3 + FI_2 + GW_2 + EX_2 + TO_2 + DI_3 + IM_2 + R_3$$

$$+ \frac{327}{2} = 240$$

$$S_9 = XF_4 + XT_2 + FU_4 + X_3 + ZF_3 + HA_3 + H_3 + XU_3 + XR_3 + RI_3 + RT_2 + Z_3 + IL_4 + PS_3 + OG_3 + W_0 + YA_2 + YN_2 + YS_2 + WU_3 + WA_2 + FI_2 + GW_1 + EX_1 + TO_1 + DI_2 + IM_4 + R_2$$

$$+ \frac{21961}{5} = 4463$$

$$S_{10} = XF_2 + XT_1 + FU_3 + X_2 + ZF_2 + HA_3 + H_4 + XU_2 + XR_2 + RI_2 + RT_2 + Z_3 + IL_4 + PS_4 + OG_4 + W_2 + YA_2 + YN_3 + YS_3 + WU_3 + WA_2 + FI_1 + GW_2 + EX_1 + TO_2 + DI_3 + IM_1 + R_2$$

$$+ \frac{316}{1} = 383$$

$$S_{11} = XF_2 + XT_1 + FU_4 + X_3 + ZF_2 + HA_3 + H_4 + XU_3 + XR_3 + RI_3 + RT_2 + Z_2 + IL_4 + PS_4 + OG_4 + W_1 + YA_2 + YN_3 + YS_4 + WU_2 + WA_3 + FI_2 + GW_2 + EX_1 + TO_1 + DI_3 + IM_1 + R_1$$

$$+ \frac{34}{2} = 86$$

ترین آنان تشخیص داده شد: بهره برداری زیاد و غیراصولی از جنگل، تبدیل جنگلها و مراتع به اراضی زراعی، واحدهای صنعتی و بطور کلی تغییر کاربری آنان. ضمناً در همه حال فقدان یک مدیریت دلسوzenه، آینده نگر و علمی نیز مشهود است. پایین بودن ضرائب تخریب در بعضی شبکه ها مانند گرانرود، قره سو و... را می توان بیشتر در نتیجه پایین بودن مقدار تراکم فیزیولوژیک (حضور انسان) و یا در نتیجه پایین رفتن شدت

## بحث و نتیجه گیری

ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست شمال کشور نگران کننده است. از ۲۸ عامل تخریب مطالعه شده در ۱۱ زیرحوزه حاشیه جنوبی دریای خزر (گرگان - رامسر)، خصوصاً در زیرحوزه های شلمان رود، نکارود و سرداب رود که به دلیل بهره برداری های غیراصولی به عنوان آسیب پذیرترین قسمت ها در عرصه مورد مطالعه معرفی شده اند، عوامل زیر به ترتیب از مخرب

جباریان، بهمن، ۱۳۷۷. معرفی یک روش عینی گرا برای تعیین آسیب پذیری اکولوژیک، مجله محیط‌شناسی شماره ۲۱، سال ۵۷-۶۸: ۲۴.

جعفری، حمیدرضا، ۱۳۸۰، کاربرد سیستماتیک مدل تخریب در ارزیابی اثرات توسعه در حوزه آبخیز سدلتیان، مجله محیط‌شناسی شماره ۲۷: ۱۰۹-۱۲۰.

سازمان جغرافیایی ارشاد، ۱۳۷۵. فرهنگ آبادیها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

صفاییان، نصرت‌الله، شکری، مریم و جباریان، بهمن، ۱۳۸۱. تعیین آسیب پذیری اکولوژیک حاشیه جنوبی دریای خزر، مجله محیط‌شناسی، شماره ۲۹: ۴۵-۵۰.

مخدوم، مجید، ۱۳۷۲. محیط زیست و توسعه در آذربایجان شرقی، سمینار توسعه آذربایجان شرقی، استانداری آذربایجان شرقی.

منصوری، سیدمصطفی، ۱۳۷۷. بررسی و شناخت اثرات توسعه بر محیط زیست در استان هرمزگان با استفاده از مدل تخریب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس.

معماریان، رامین، ۱۳۷۷. ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شرق استان تهران با مدل تخریب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.

میلر، ج. ۱۳۶۶. زیستن در محیط زیست، ترجمه دکتر مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران.

نوری، علی اصغر، ۱۳۷۶. مطالعه آثار توسعه بر محیط زیست در استان کرمانشاه با استفاده از مدل تخریب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

Abaza H. 1995. A new role for environmental assessment. *Dur Planet*, 7(1): 25-27.

Habitat. 1992. A Methodological Framework for EIA for Urban Development; UN center for Human Settlement.: 11-18.

عوامل تخریب و یا به عبارتی توسعه نیافتگی (نوری، ۱۳۷۶) دانست تا شرایط فیزیکی و طبیعی مناسب برای توسعه به همین دلیل نیز با وجود پایین بودن درجه آسیب پذیری بوم شناختی در بسیاری از شبکه‌های مطالعه شده، هر گونه توسعه در این مناطق می‌باشد با توجه به شرایط بوم شناختی (فیزیکی و زیستی) آنها صورت گیرد. لازمه این امر انجام مطالعات ارزیابی توان بوم شناختی در مقیاس بزرگتر است (نوری، ۱۳۷۶). به هر حال در نگرش و تعریف حاکم برای توسعه، چشم انداز مطلوبی برای آینده شمال کشور و آینده‌گان وابسته به محیط زیست این مرز و بوم متصور نیست.

### سپاسگزاری

این مقاله حاصل قسمتی از تحقیقات یک پژوهه ملی تحت عنوان بررسی اثرات توسعه بر محیط زیست حاشیه جنوبی دریای خزر می‌باشد. بدینوسیله مراتب سپاسگزاری محققین از شورای پژوهش‌های علمی کشور، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران که امکان این تحقیق را فراهم ساخته اند و همچنین کلیه کسانی که به هر نوعی در این تحقیق مساعدت نموده اند ابراز می‌گردد.

### منابع مورد استفاده

آذری دهکردی، فرود، ۱۳۷۵. ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست در حوزه آبخیز سدسفیدرود با مدل تخریب و تهیه برنامه کامپیوتری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.

آمارنامه استان مازندران، ۱۳۷۷. سازمان برنامه و بودجه، معاونت آمار و اطلاعات، نشریه شماره ۱۷۲.

جباریان، بهمن، ۱۳۷۵. ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در حوزه آبخیز سد امیرکبیر با مدل تخریب و تهیه برنامه کامپیوتری برای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.