

بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبد یزد

سید عباس باقری یزدی^{*}، دکتر جعفر بواله‌ری^{**}، دکتر داود شاه‌محمدی^{***}

چکیده:

در این تحقیق، میزان شیوع اختلالات روانی در جمعیت بالای ۱۵ سال در مناطق روستایی میبد یزد ($N=400$)، به شیوه نمونه‌گیری خوش‌های و با استفاده از آزمون SCL-90-R^(۱) و مصاحبه بالینی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ۱۲/۵ درصد از افراد مورد بررسی دچار انواع اختلالات روانی بوده‌اند. میزان شیوع اختلالات خلقتی ۵/۷۵ درصد، اختلالات اضطرابی ۵/۵ درصد، اختلالات شبه جسمی و عضوی مغز هر کدام ۰/۵ درصد و اسکیزوفرنیا ۰/۲۵ درصد بود. در میان اختلالات خلقتی، افسرده خوبی با ۰/۲۵ درصد و در میان اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب منتشر، ۰/۴۷۵ درصد، شیوع بیشتری داشته‌اند. همچنین شیوع اختلالات روانی به طور معنی‌دار، در زنان بیش از مردان و در افراد بیساد و کم سواد بیش از افراد با سواد بود. در گروه سنی ۴۴-۲۵ ساله، افراد متاهل، زنان خانهدار، مردان بیکار و خانواده‌های پرجمعیت اختلالات روانی شیوع بیشتری داشته است. برای بررسی پایایی آزمون R-SCL^(۲) از روش بازارآمایی با فاصله زمانی یک هفته استفاده شد. بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون، ضریب همبستگی پیرسون ۰/۹۷ محاسبه شد. بررسی اعتبار تشخیصی این آزمون، که نشان دهنده بالا بودن کارآیی و حساسیت آن بوده، نشانگر آن است که این آزمون می‌تواند به عنوان یک وسیله سریع در مطالعات همه گیر شناسی با موفقیت بکار برده شود.

Andeasbeh
Va
Raftar
اندیشه و رفتار
۳۲

کلیدواژه: همه گیر شناسی، شیوع اختلالات روانی، شهرستان یزد

مقدمه:

تأمین سلامتی اقشار مختلف جامعه یکی از مهمترین مسائل اساسی هر کشوری است که می‌باید آنرا از سه دیدگاه جسمی، روانی و اجتماعی مورد توجه قرار داد. طبق آمارهای منتشر شده از طرف سازمان جهانی بهداشت (WHO)^(۳)، حداقل ۵۲ میلیون نفر از مردم جهان در سینین مختلف از بیماریهای شدید روانی همچون

* کارشناس ارشد روانشناسی بالینی - اداره کل مبارزه با بیماریها، تهران خیابان ایرانشهر جنوبی.

** استادیار، روانپزشک و عضو هیئت علمی انتستیتو روانپزشکی تهران، خیابان طالقانی نرسیده به خیابان شریعتی، کوچه جهان، پلاک ۱.

*** روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اداره کل مبارزه با بیماریها، تهران خیابان ایرانشهر جنوبی.

1- Symptom Check List - Revised

2- World Health Organization

استاندارد جهت سرند و مصاحبه‌های بالینی بر اساس ملاک‌های تشخیصی طبقه بندیها استفاده نمایند. در اطلاعات بدست آمده از مرور مطالعات همه‌گیر شناسی اختلالات روانی در کشورهای مختلف جهان که در آنها از آزمونهای سرند و ارزیابی بالینی استفاده شده میزان شیوع اختلالات بین ۱۰ تا ۴۱ درصد در نوسان بوده است. هر چند مطالعات همه‌گیر شناسی گستردۀ و جامعی در سطح کشور ایران تاکنون صورت نگرفته و بررسیهای انجام شده نیز در نوع خود بسیار محدود بوده‌اند ولی اطلاعات بدست آمده دلالت بر این دارد که با وجود محدود بودن این مطالعات، میزان شیوع این اختلالات در ایران، از آمار سایر کشورها و سازمان جهانی بهداشت کمتر نیست (باش، ۱۹۶۳؛ به نقل از صاحب‌الزمانی، ۱۳۴۲؛ باش، ۱۹۶۹؛ داویدیان، ۱۳۵۳؛ شاه‌محمدی، ۱۳۶۹).

هدف مطالعه حاضر بررسی همه‌گیر شناسی اختلالات روانی در افراد بالای ۱۵ سال مناطق روستایی میبد واقع در استان یزد بود. پژوهش حاضر نیز سعی دارد به سوالات زیر پاسخ گوید:

(۱) میزان شیوع اختلالات روانی در نمونه مورد مطالعه بر مبنای آزمون SCL-90-R (درآگوتیس، ۱۹۷۶) و مصاحبه بالینی روانپزشک بر اساس طبقه‌بندی DSM-III-R^(۱۴) چگونه است؟

(۲) کدام بیماری روانی در منطقه مورد مطالعه شایعتر می‌باشد؟

اسکیزوفرنیا، ۱۵۰ میلیون نفر از اختلالات خفیف روانی، ۱۲۰ میلیون نفر از عقب ماندگی ذهنی، ۵۰ میلیون نفر از صرع، و ۳۰ میلیون نفر از ابتلاء به دمانتس رنج می‌برند. وطبق همین گزارشات میزان شیوع اختلالات روانی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است، در حالیکه در برنامه ریزیهای توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشورها، پایین‌ترین اولویت به آنها داده می‌شود. درنوند^(۱۵) (۱۹۸۲) در معرفی بر مطالعات همه‌گیر شناسی اختلالات روانی، این مطالعات را به سه دوره کلی تقسیم می‌کند:

- دوره اول اکثراً در نیمه اول قرن بیستم و قبل از وقوع جنگ دوم جهانی صورت گرفته است. محققین این دوره، در زمینه بیماریابی در جامعه، بیشتر به گزارش‌های مراکز بیمارستانی، پرونده‌های بیماران و اطلاع دهندگان کلیدی متکی بوده‌اند (دانهام^(۱۶) و فاریس^(۱۷)، ۱۹۳۹؛ اودیگارد^(۱۸)، ۱۹۴۶؛ کلارک^(۱۹)، ۱۹۴۸؛ مالتبرگ^(۲۰) و لی^(۲۱)، ۱۹۵۶؛ ویلسون^(۲۲) و لاتس^(۲۳)، ۱۹۵۷).

- دوره دوم به دنبال جنگ جهانی دوم انجام گردیده و همانند بیشتر مطالعات انجام شده در کشورهای اروپایی و آسیایی (لين^(۲۴)، ۱۹۵۳؛ هاگنل^(۲۵)، ۱۹۶۶؛ باش^(۲۶)، ۱۹۶۹؛ کاتو^(۲۷)، ۱۹۶۹) یک روانپزشک یا تیم تحقیق با تمام افراد جامعه مصاحبه نموده و تشخیص موارد بر اساس مصاحبه‌ها داده شده‌اند.

درنوند در مقایسه مطالعات انجام گرفته قبل و بعد از جنگ دوم جهانی مطرح نمود که میانگین شیوع انواع اختلالات روانی در ۱۶ برسی دوره اول برابر ۳/۶ درصد و در ۰۰ تحقیق دومین دوره، ۲۰ درصد بوده است. سومین دوره شامل مطالعات همه‌گیر شناسی در طول دو دهه گذشته و با استفاده از ملاک‌های تشخیصی DSM-III و یا سایر طبقه بندیهای رایج بین‌المللی بوده است. در این دوره که از اوآخر سالهای دهه ۱۹۷۰ شروع شد محققین سعی نمودند از وسائل و ابزارهای معتبر و

1-Dohrenwend

2-Dunham

3-Faris

4-Odegaard

5-Clark

6-Malzberg

7-Lee

8-Wilson

9-Lantz

10-Lin

11-Hagnel

12-Bash

13-Kato

14-Diagnostic & Statistical Manual Of Mental Disorders (3rd ed.) Revised.

سؤال برای ارزشیابی علایم روانی است و توسط دراگوتیس، لیپمن و کووی (۱۹۷۲) معرفی شد و براساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیلهای روانسنجی مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن تهیه گردید (دراگوتیس، ریکلزوراک، ۱۹۷۶).

۹۰ ماده این آزمون ۹ بعد مختلف شکایات جسمانی، وسوس و اجراب، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی، و روان پریشی را در بر می‌گیرد. نمره گذاری و تفسیر آزمون بر اساس سه شاخص کلی علایم مرضی (GSI)، معیار ضریب ناراحتی (PSDI) و جمع علایم مرضی (PST) صورت می‌گیرد.

در این مطالعه با توجه به بیسودای تعدادی از آزمودنیها و به منظور یکنواختی و همسانی اجرای این آزمون، از همکاری پرسشگران دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم شاغل در شبکه بهداشتی این شهرستان که ۴ مرد و ۲ زن بودند بهره‌مند شدیم. نحوه ارائه سوالات و اجرای آزمون در طی ۵ جلسه ۳ ساعته به آنها آموزش داده شد و پس از اجرا برروی ۲۰ آزمودنی توسط هر یک از آنها و اطمینان از توانمندی پرسشگران، اجرای آزمون با نمونه‌های انتخاب شده آغاز گردید.

در بررسی اعتبار و پایایی این آزمون که توسط میرزاچی (۱۳۵۹) بر روی ۷۸۰ نفر از اهالی روستاهای صومعه‌سرا، توکمن صحرا، شیزار و تعدادی از ساکنان تهران انجام گردیده میانگین کلی علائم مرضی (GSI) آزمودنی‌ها برابر با ۰/۴ بود که در پژوهش فعلی به عنوان نقطه برش پذیرفته شده است.

پس از محاسبه GSI نمونه‌های مورد مطالعه، افرادی که در آزمون، GSI بزرگتر یا مساوی ۰/۴

۳) آیا ارتباطی بین عوامل دموگرافیک همچون وضعیت تأهل، سن، شغل، میزان تحصیلات و تعداد افراد خانواده با اختلال روانی وجود دارد؟

روش پژوهش:

جامعه آماری: در این پژوهش جمعیت بالای ۱۵ سال روستایی شهرستان میبد، واقع در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته که دارای ۵۶۸۷۰ نفر جمعیت بوده و حدود ۲۰۰۰۰ نفر آن روستایی هستند. از جمعیت روستایی، ۱۰۸۴۴ نفر بالای ۱۵ سال سن داشته‌اند که نمونه مورد مطالعه از بین آنها انتخاب گردید.

روش نمونه‌گیری: نمونه مورد مطالعه در این پژوهش به شیوه نمونه‌گیری خوش‌آی از بین خانوارهای روستاهای شهرستان میبد انتخاب شده است. به این صورت که از ۴۰۶۱ خانوار روستایی ۲۰ خوش‌آی در هر خوش‌آی ۱۰ خانوار به طور تصادفی انتخاب گردید. از مجموع ۴۲۶ نفر افراد بالای ۱۵ سال خانوارهای تعیین شده بر اساس پرونده‌های بهداشتی موجود در خانه‌های بهداشت این شهرستان، تعداد ۲۴ آزمودنی شامل ۸ خانوار به دلیل مهاجرت یا مسافت، ۳ آزمودنی به دلیل امتناع از همکاری و ۹ آزمودنی به دلیل عدم دسترسی، از مجموعه آزمودنیها حذف گردیدند. بدین ترتیب ۴۰۰ آزمودنی مورد ارزیابی قرار گرفته که از این تعداد ۱۹۶ نفر مرد و ۲۰۴ نفر زن بوده‌اند.

ابزار پژوهش:

- (۱) آزمون SCL-90-R جهت سرند اولیه
- (۲) انجام مصاحبه بالینی و فرم مصاحبه روانپزشک (داویدیان، ۱۳۵۰) از افراد مشکوک به بیماری و ارزیابی تشخیصی بر اساس طبقه‌بندی DSM-III-R بوسیله دو روانپزشک فراهم گردیده است.

(الف) آزمون SCL-90-R: این آزمون شامل ۹۰

1-Global Severity Index(GSI)

2-Positive Symptom Distress Index (PSDI)

3-Positive Symptom Total (PST)

و اختلالات اضطرابی با ۵/۵ درصد بالاترین میزان شیوع را دارا بوده است. در میان اختلالات خلقی، افسرده خوبی با ۲/۵ درصد بیشترین میزان شیوع را دارا بود و این اختلال در زنان بیش از مردان شایع بود (۴/۵ در برابر ۷/۰ درصد). در میان اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب منتشر با ۷/۵ درصد بیشترین میزان شیوع را داشت که این اختلال نیز همانند اختلال افسرده خوبی در زنان بیش از مردان گزارش شده است (۳/۲۵ برابر ۱/۵ درصد). شیوع اختلالات عضوی و شبه جسمی هر کدام با ۵/۰ درصد و میزان شیوع اسکیزوفرنیا ۲/۵ درصد بود. به طور کلی میزان شیوع انواع اختلالات روانی در زنان ۹/۲۵ درصد و در مردان ۳/۲۵ درصد بود و میزان این اختلالات در زنان نسبت به مردان ۲/۸۵ درصد می‌باشد.

این جدول همچنین نشان می‌دهد که میزان اختلالات خلقی در زنان نسبت به مردان ۷/۶ برابر و اختلالات اضطرابی ۱/۷۵ برابر بوده است. در این مطالعه اختلالات تبدیلی، گذرهایی، اختلال دوقطبی، افسردگی اساسی و اسکیزوفرنیا تنها در زنان و اختلال وسواسی - اجباری، اختلال پس از استرس ضربه‌ای و اختلالات عضوی مغز تنها در مردان وجود داشته است.

بالاترین میزان شیوع اختلالات روانی در گروه سنی ۴۴-۴۵ سال با ۶۴٪، افراد بیساد با ۴۰٪، افراد متاهل با ۸۶٪، خانواده‌های ۵ نفر به بالا با ۷۸٪، زنان خانه‌دار با ۷۴٪ و در مورد مردان بالاترین میزان اختلال در افراد بیکار دیده شد (۱۰٪/ مبتلایان).

از لحاظ آماری همبستگی معنی‌داری بین جنسیت، میزان سواد، وضعیت تأهل و بعد خانوار با اختلالات روانی دیده شده اما بین گروههای سنی و ابتلاء به اختلالات روانی همبستگی وجود نداشت.

نتایج مربوط به میانگین و انحراف استاندارد مقیاسهای ۹ گانه آزمون SCL-90-R بر روی افراد مورد مطالعه در جدول شماره ۲ آورده شده است. آزمون

(GSI>۰/۴) را بدست آوردند به عنوان افراد مشکوک به بیماری انتخاب گردیده و وارد مرحله ارزشیابی بالینی شده‌اند.

ب) مصاحبه بالینی: بعد از مشخص شدن افراد مشکوک به بیماری از فرم مصاحبه بالینی روانپزشک (دکتر داویدیان، ۱۳۵۰) که با فرم مصاحبه بالینی سازمان یافته روانپزشکی ارائه شده در کاپلان و سادوک تطبیق داده شد توسط پژوهشگر از آنها مصاحبه بالینی به عمل آمد و سپس تشخیص گذاری توسط دو روانپزشک بر اساس DSM-III-R انجام گرفت.

به منظور ارزیابی پایایی آزمون، با فاصله زمانی یک هفت‌ماهه از آزمون اول، از ۰/۱ درصد کل آزمودنیها تست مجدد به عمل آمد.

جهت تعیین اعتبار، حساسیت و کارآئی آزمون بعد از مشخص شدن افراد مشکوک به بیماری با GSI>۰/۴ (یعنی ۵۱ نفر)، از بین افرادی که دارای GSI>۰/۰ بودند ۵۱ نفر دیگر به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و در مجموع این دو گروه (یعنی ۱۰۲ نفر) مورد مصاحبه و ارزیابی بالینی و تشخیصی روانپزشک قرار گرفتند.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: بخش اعظم داده‌های این پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی گزارش گردیده و به منظور آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آماری X² (خی دو) و t استفاده شده است.

یافته‌های پژوهش

اطلاعات مربوط به میزان شیوع انواع اختلالات روانی بر اساس آزمون SCL-90-R و تشخیص روانپزشک بر مبنای DSM-III-R به تفکیک جنسیت در جدول ۱ منعکس گردیده است.

همانطور که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود میزان شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی ۱۲/۵ درصد بوده است. اختلالات خلقی با ۵/۷۵ درصد

فرضیه‌ها مربوط به این سؤال که آیا تفاوت معنی‌داری بین میانگین مقیاسهای ۹ گانه و ضریب کلی علایم مرضی کلیه مقیاسهای آزمون بجز دو مقیاس پرخاشگری و افکار نمرات حاصل از آزمون SCL-90-R بین دو گروه زن و مرد پارانوئیدی بین دو گروه معنی‌دار است. در سایر مقیاسها وجود دارد یا خیر؟ از آزمون ۱ مستقل استفاده شد نتایج زنان دارای میانگین بالاتری نسبت به مردان بودند.

جدول شماره ۱: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک نوع بیماری و جنسیت

نوع بیماری براساس					
درصد	کل	مرد	زن	نحوه	DSM-III-R
اختلالات اضطرابی:					
۴/۷۵	۱۹	۶	۱۳	۳۰۰/۰۲	اختلال اضطراب منتشر
۰/۲۵	۱	۱	-	۳۰۰/۳۰	اختلال وسواسی-اجباری
۰/۲۵	۱	-	۱	۳۰۰/۲۲	گذره راسی
۰/۲۵	۱	۱	-	۳۰۰/۸۹	اختلال پس از استرس ضربه‌ای
۵/۵	۲۲	۸	۱۴		
جمع					
اختلالات خلقی:					
۰/۲۵	۱	-	۱	۲۹۵/۵	اختلال دوقطبی
اختلال افسردگی:					
۰/۲۵	۱	-	۱	۲۹۲/۲	انسردگی اساسی
۵/۲۵	۲۱	۳	۱۸	۳۰۰/۴۰	انسردگی خوبی
۵/۷۵	۲۳	۳	۲۰		
جمع					
اختلالات عضوی مغز					
۰/۲۵	۱	۱	-	۲۹۴/۱۰	دمانس
۰/۲۵	۱	۱	-	۲۹۳/۸۳	اختلال خلقی عضوی ^(۱)
۰/۵	۲	۲	-		
جمع					
اسکیزوفرنیا:					
۰/۲۵	۱	-	۱	۲۹۵/۳	پارانوئید
۰/۲۵	۱	-	۱		
جمع					
اختلالات شبه جسمی:					
۰/۵	۲	-	۲	۳۰۰/۱۱	اختلالات تبدیلی
۰/۵	۲	-	۲		
جمع					
جمع کل					
۱۲/۵	۵۰	۱۲	۳۷		

۱- این اختلال ثانویه بر صریح بوده است.

جدول شماره ۲: میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های نه گانه آزمون SCL-90-R بر روی افراد مورد مطالعه

میانگین انحراف استاندارد		افراد سالم		جنسیت		تعداد و جنسیت		مقیاس‌های نه گانه آزمون SCL-90-R
(N=۵۱)	(N=۳۳۹)	(N=۴۰۰)	(N=۱۹۶)	(N=۲۰۲)	(N=۲۰۲)	مرد	زن	
SD	X	SD	X	SD	X	SD	X	میانگین انحراف استاندارد
۰/۴۶	۱/۰۱	۰/۰۴	۰/۱۹	۰/۳۲	۰/۰۶	۰/۲۶	۰/۳۱	شکایات بدنی
۰/۱۳۳	۰/۰۸۶	۰/۰۲۳	۰/۰۷۷	۰/۰۴۴	۰/۰۳۵	۰/۰۲۱	۰/۰۲۸	وسوگس - لجبار
۰/۰۷۷	۰/۰۷۶	۰/۰۲۶	۰/۰۲۶	۰/۰۲۷	۰/۰۲۲	۰/۰۲۴	۰/۰۳۹	حساسیت در روابط مقابل
۰/۰۰	۱/۰۷۸	۰/۰۲۹	۰/۰۲۶	۰/۰۳۲	۰/۰۲۹	۰/۰۲۲	۰/۰۲۸	فسرده‌گی
۰/۰۹	۱/۰۳۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۴۵	۰/۰۲۶	۰/۰۲۱	۰/۰۲۹	اضطراب
۰/۰۳۸	۰/۰۸۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۶	۰/۰۲۸	۰/۰۳۱	۰/۰۲۶	۰/۰۱۷	پرهاشگری
۰/۰۷	۰/۰۷۱	۰/۰۲۷	۰/۰۲۴	۰/۰۲۸	۰/۰۳	۰/۰۲۶	۰/۰۳۰	تریس مرضی
۰/۰۵	۰/۰۹۲	۰/۰۲۳	۰/۰۱۹	۰/۰۲۴	۰/۰۲۴	۰/۰۲۸	۰/۰۲۲	افکار پارانوئید
۰/۰۲	۰/۰۵۸	۰/۰۲۱	۰/۰۱۷	۰/۰۲۲	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۱۵	روان پریشی
۰/۴	۰/۰۹	۰/۰۲۷	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۵	۰/۰۲۸	۰/۰۲۹	GSI
۱۸/۱۶	۳۸/۳۵	۱۲/۰۷	۱۴/۰۴	۱۳/۱۰	۱۷/۰۵	۱۱/۰۸	۱۲/۰۸	PST
۰/۰۵	۱/۰۸	۰/۰۲۱	۱/۰۷۸	۰/۰۲۳	۱/۰۳۵	۰/۰۲۷	۰/۰۸۸	PSDI

Andeeshan
Va
Raftar
اندیشه‌وارث
۳۷

اساس ضریب کلی علایم مرضی بدست آمده با فرمول پیرسون برابر با $= ۰/۹۷$ بود که از لحاظ آماری معنی دار است. از لحاظ اعتبار تشخیصی از مجموع ۵۱ نفر مشکوک به بیماری بر اساس نتیجه آزمون SCL-90-R طبق تعریف تشخیص روانپژوهی از این موارد، تنها یک نفر سالم تشخیص داده شد. از ۵۱ نفر افراد سالم انتخاب شده (یعنی دارای $GSI < ۰/۰$) در طی مراحل ارزیابی و مصاحبه بالینی ۴۸ نفر سالم و ۳ نفر بیمار بودند که در این صورت حساسیت^(۱)، ویژگی^(۲)، و کارآیی^(۳) آزمون به ترتیب برابر با $۰/۹۴$ ، $۰/۹۸$ و $۰/۹۶$ بود.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از فرم مطالعه روانپژوهی $۸۰/۸\%$ بیماران برای اولین بار بعد از شروع علایم بیماری به پژوهش عمومی و یا متخصصین غیرروانپژوهی و تنها $۱۲/۰\%$ به روانپژوهی مراجعه نموده‌اند. از نقطه نظر درصد فراوانی علایم بیماری نزد بیماران، بیشترین علایم به ترتیب مربوط به سردرد و سرگیجه، ضعف و بیحالی، دلهزه و دلشوره، بدخواهی، غمگینی و کم حوصلگی، فراموشکاری، کاهش اعتماد نفس و و کمترین درصد مربوط به داشتن توهمندی و هذیان بوده است.

ضریب پایانی آزمون با روش بازآزمایی از $۱۰/۰\%$ نمونه مورد مطالعه با فاصله زمانی یک هفته بعد از اجرای اولین آزمون به عمل آمد. ضریب همبستگی نتایج که بر

1-sensitivity

2-specificity

3-efficacy

یکسان بودن تشخیص بین نتایج آزمون SCL-90-R بر مبنای بالا بودن مقیاسهای آزمون و ارزیابیهای روانپزشک حدود ۰/۹ بوده و از نقطه نظر تشخیص بیماری بر اساس ضریب کلی علائم مرضی و تشخیص روانپزشک حدود ۰/۹۸ می‌باشد.

لی^(۶)، ۱۹۹۰) میزان شیوع این اختلالات روانی با افزایش سن بیشتر مشاهده گردید. کاهش میزان شیوع این اختلالات در سنین بالاتر در این مطالعه می‌تواند به دلیل حمایت و احترام اعضای خانواده و جامعه از آنها باشد.

در این بررسی همانند اکثر تحقیقات انجام شده دیگر همچون لمکانو^(۷) (۱۹۴۲)، لیتون^(۷) (۱۹۶۵)، رژیه^(۸) (۱۹۷۸)، هولی فیلد^(۸) (۱۹۹۰)، لهتینن^(۹) (۱۹۹۰)، باش^(۹) (۱۹۶۴) و داویدیان^(۱۰) (۱۳۵۳) میزان شیوع اختلالات روانی در زنان بیش از مردان بود که شاید دلیل بالا بودن این میزان به دلیل استرس‌های محیطی وارد بر آنان باشد.

همچنین در این بررسی مانند نتایج بدست آمده توسط لین^(۱۱) و ورجیس^(۱۲) (۱۹۷۳) میزان شیوع اختلالات روانی در افراد بیساد و کم‌سود بیش از افراد باساد بود.

از نقطه نظر شغل این بررسی همانند نتایج ارائه شده توسط دوب^(۱۳) و ورجیس^(۱۴) (۱۹۷۳) نشان داد که میزان شیوع اختلالات روانی در زنان خانه‌دار و مردان بیکار بیشتر از سایر گروهها بود.

نتایج این بررسی نشان داد که اختلالات روانی در میان افراد متاهل بیش از مجردین، بیوه‌ها و دوباره ازدواج کرده‌ها بوده، در حالیکه این میزان در تحقیق رژیه^(۱۵) (۱۹۷۸) در ایالات متحده در افراد مطلقه یا جدا شده و در تحقیق دوب^(۱۶) و هوپر^(۱۷) (۱۹۷۹) در افراد مجرد بیش از متأهل بوده است. شاید دلیل بالا بودن اختلال در افراد متأهل در این پژوهش، بواسطه پایین بودن سن ازدواج در مناطق روستایی در ایران باشد.

ارزیابی اعتبار تشخیصی، پایایی و تشابه تشخیصی بین آزمون SCL-90-R با تشخیص روانپزشک

یکسان بودن تشخیص بین نتایج آزمون SCL-90-R بر مبنای بالا بودن مقیاسهای آزمون و ارزیابیهای روانپزشک حدود ۰/۹ بوده و از نقطه نظر تشخیص بیماری بر اساس ضریب کلی علائم مرضی و تشخیص روانپزشک حدود ۰/۹۸ می‌باشد.

بحث در نتایج

میزان شیوع اختلالات روانی در این مطالعه با تایپ بررسیهای انجام گرفته توسط باش (به نقل از صاحب‌الزمانی، ۱۳۴۲) در مناطق روستایی شیراز با ۱۱/۹٪، مناطق روستایی خوزستان (باش، ۱۹۶۹) با ۱۴/۹٪ و در منطقه رودسر (داویدیان، ۱۳۵۳) ۱۷٪، نزدیک می‌باشد. احتمالاً وجود اختلافات مشاهده شده می‌تواند به دلیل تفاوت در سن مورد ارزیابی در این بررسیها، شیوه بیماریابی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی مناطق مورد مطالعه باشد.

در پژوهش حاضر شایعترین اختلالات، اختلالات خلقی و اضطرابی بوده است که این یافته، نتایج بدست آمده توسط ورجیس^(۱۱) (۱۹۷۳)، و بارت^(۱۲) (۱۹۸۸) را تأیید می‌کند.

مطالعه حاضر نشان داد که میزان شیوع اختلالات روانی در گروه سنی ۲۵-۴۴ سال بیشتر از سایر گروههای سنی می‌باشد که این خود مؤید نتایج لین^(۱۳) (۱۹۵۳)، دوب^(۱۶) (۱۹۷۰) و رژیه^(۱۵) (۱۹۷۸) بوده که نشان دادند میزان شیوع اختلالات روانی در سنین باروری و میانسالی بیش از سایر گروههای سنی می‌باشد. میزان شیوع این اختلالات در گروه سنی بالاتر از ۶۵ سال همچون تحقیق بارت (۱۹۸۸) کمتر از سایر گروههای سنی بود. نتایج این تحقیق و اکثر تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال رشد نشان می‌دهد که میزان شیوع اختلالات روانی با افزایش سن کاهش می‌یابد. در حالی که در بررسیهای انجام شده در کشورهای پیشرفته (رنی و اسرول، ۱۹۵۴؛

1-Vergheese	2-Barret
3-Lin	4-Dube
5-Regier	6-Lee
7-Leighton	8-Hollifield
9-Lehtinen	

دلالت بر این دارد که این آزمون می‌تواند بعنوان یک وسیله سرند تشخیصی در مطالعات همه‌گیرشناسی اختلالات روانی بطور موقت آمیز به کار رود.

از سایر اختلالات روانی نظیر عقب ماندگی ذهنی ضرورت بکارگیری ابزار دیگری را مطرح می‌نماید.
۳) زیاد بودن تعداد سُوالات وجود سُوالاتی راجع به مسائل و امور جنسی بخصوص برای افراد مجرد در فرهنگ ما نمی‌تواند بخوبی پذیرفته شود.

پیشنهاد می‌گردد باتوجه به اینکه پژوهش حاضر صرفاً در مناطق روستایی صورت گرفته تحقیقات مشابهی در سایر نقاط روستایی و شهری کشور به لحاظ تفاوت‌های بین فرهنگی صورت گیرد و به منظور ارزیابی طرح ادغام بهداشت روان در مراقبتها بهداشتی اولیه در مناطق روستایی کشور، پس از اجرای طرح در این منطقه روستایی، بررسی مجددی انجام گیرد و در پایان در زمینه علت شناسی و علامت شناسی اختلالات روانی مطالعاتی صورت پذیرد.

محدودیتها و پیشنهادات

کوپروشپرد (۱۹۷۳) مشکلات موجود در مطالعات همه‌گیرشناسی را نمونه‌گیری، تکنیکهای مورد استفاده جهت بیماریابی، طبقه‌بندی و تشخیص گذاری مطرح می‌کند که در این پژوهش نیز مشکلات و نتایجی وجود داشت:

- ۱) بررسی حاضر بمنظور تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در یک منطقه روستایی صورت گرفت که با توجه به تعداد نمونه مورد بررسی در مورد تعمیم نتایج آن به کل مناطق روستایی کشور احتیاط شود.

۲) محدودیت توانایی SCL-90-R در سرند مشکلات روانی و رفتاری افراد زیر ۱۵ سال و نیز مواردی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

منابع

اداره کل مبارزه با بیماری‌ها (۱۳۷۱). طرح کشوری بهداشت روانی. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
صاحب الزمانی، ناصرالدین (۱۳۴۲). روح نابسامان. تهران، ص ۹۴-۱۲۲.

داویدیان، هاراطون (۱۳۵۰). میزان و علل مراجعه بیماران روانی به اطبای غیر روانپزشک. مجله تازه‌های روانپزشکی. سال اول، شماره سوم، ص ۱۳۳-۱۲۲.

داویدیان، هاراطون؛ ایزدی، سیروس؛ وارتکس، نهادیان؛ معتبر، منصور (۱۳۵۳). بررسی مقدماتی شیوع بیماریهای روانی در منطقه بحر خزر (شهرستان رودسر-۱۳۵۰). مجله بهداشت ایران، سال سوم (شماره ۴)، ص ۱۴۵-۱۵۶.

شاه‌محمدی، داوود (۱۳۶۹). ادغام بهداشت روانی در مراقبتها بهداشتی اولیه (روستاهای شهرکرد، ۱۳۶۸-۶۹). اداره کل مبارزه با بیماریها.

میرزاپی، رقیه (۱۳۵۹). ارزیابی پایابی و اعتبار آزمون SCL-90 در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم رفتاری: دانشگاه تهران.

- Barret, J. E., Barret, J. A., Oxman, T. E. & Gerber, P. D. (1988). The prevalence of psychiatric disorder in a practice. *Archive General Psychiatry*, 45, 1100-1106.
- Bash, K. W. (1964). A psychiatric study of the city of Shiraz (Fars Province). Paper presented at WPA International symposium of epidemiological studies in psychiatry, Tehran, Iran.
- Bash, K. W. & Liechti, J. (1969). Studies on the epidemiology of neuropsychiatric disorders among the rural population of the province of Khuzestan. *Iran Social Psychiatry*, 4, 137 - 143.
- Clark, R. E. (1948). The relationship of schizophrenia to occupational income and occupational prestige. *American Social Review*, 13, 325 - 330.
- Cooper, B. & Shepherd, M. (1973). Epidemiology and abnormal psychology, in Eysenck, H. J., (Ed.) *Handbook of abnormal psychology*. London: Pitman Medical, 34-65.
- Derogatis, L. R., Lipman, R. S., & Covi, L. (1973). SCL - 90: An outpatient psychiatric rating scale preliminary report. *Psychopharmacology Bulletin*, 9, 13 - 27.
- Derogatis, L. R., Rickels, K., & Rock, A. (1976). The SCL - 90 and the MMPI: a step in the validation of a new self - report scale. *British Journal of Psychiatry*, 128, 280 - 289.
- Derogatis, L. R. (1977). SCL-90-R: administration, scoring and procedures. Manual 2. *Clinical psychometric research*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Dohrenwend, B. P. & Dohrenwend, B. S. (1982). Perspectives on the past and future of psychiatric epidemiology. *American Journal of Public Health*, 72, 1271-1279.
- Dube, K. C. (1970). A study of prevalence and biosocial variables in mental illness in a rural and an urban community in Utharpradesh, India. *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 46, 327-332.
- Dunham, H. W. & Farris, R. E. (1939). *Mental disorders and psychosis*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Einagar, M. N., Maitra, P., & Rao, M. N. (1971). Mental health in an Indian rural community. *British Journal of Psychiatry*, 118, 499 - 505.
- Hagnell, O. (1966). *A prospective study of the incidence of mental disorder*. Stockholm: (Publisher?).
- Hollifield, M., Katon, W., Spain, D. & Pule, L. (1990). Anxiety and depression in a village of Lesotto, A comparison with the United States, *British Journal of Psychiatry*, 156, 343-350.
- Hopper, E. W., Nycz, G. R., Cleary, P. D., Regier, D. A. & Goldberg, I. D. (1979). Estimated prevalence of RDC mental disorder in primary medical care. *International Medical Journal of Mental Health*, 8, 6-15.

- Kaplan, H. I. & Sadock, B. J. (1989). *Comprehensive textbook of psychiatry*. Fifth edition. Baltimore: Williams & Wilkins Company.
- Kato, M. (1969). Psychiatric epidemiological survey in Japan: The problem of case finding. *Mental health research in Asia and the Pacific*. Honolulu: East - West Center press.
- Lee, C. K., Kwak, Y. S., Yamamoto, J., Kim, S. & Lee, Y. H. (1990). Psychiatric epidemiology in Korea. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 178, 247-252.
- Leighton, D. C. Harding, J. C., Macklin, D. S., Mackmillan, A. N., & Leighton, A. H. (1963). *The character of danger: psychiatric symptoms in selected communities*. New York: Basic Books.
- Leighton, A. H. (1965). Transcultural psychiatry. In A. V. S. De Reuke, R. Porter & A. Churchill(Eds.) London: Routledge.
- Lehtinen, V. (1990). Prevalence of mental disorders among adults in Finland. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 81, 418-425.
- Lemkau, P., Tietze, C., & Coper, M. (1942). Mental hygiene problems in an urban district. *Mental Hygiene*, 26, 100-107
- Lin, T. A. (1953). Study of the incidence of mental disorders in Chinese and other cultures. *Psychiatry*, 16, 313 - 318.
- Malzberg, S. & Lee, F. S. (1956). *Migration and mental illness*. New York: Social Sience, Reserved Concial.
- Odegaard, O. (1946). A statistical investigation of the incidence of mental disorder in Norway. *Psychiatric Quarterly*, 23, 381 - 385.
- Regiel, D. A., Goldberg, I. D. & Taube, E. N. (1978). The defacto U. S. mental health services system. *Archive General Psychiatry*, 35, 688-694
- Rennie, T. A. C., Srole, L., Opler, M. K. & Langer, T. S. (1957). Urban life and mental health. *American Journal of Psychiatry*, 113, 831-837
- Vergheese, A., Beig, A., Senseman, L. A., Rao, S. S. & Benjamin, V. (1973). A social and psychiatric study of representative group of families in Vellore town. *Indian Journal of Medical Research*, 61, 608-620.
- Wilson, D. C. & Lantz, E. M. (1957). The effect of culture change on the negro race in Virginia. *American Journal of Psychiatry*, 114, 23 - 24.
- W. H. O. (1993). Human rights: The vulnerability of the mentally ill. *Press Release*, 44.