

حرکت

سال اول - شماره ۳ - زمستان ۱۳۷۸

ص ص : ۹۵ - ۱۰۹

مقایسه اعتبار جدول قد - وزن و فرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

دکتر خسرو ابراهیم - دکترو ارسلان دهیرچی

دکتر فرهاد رحمانی نیا - سیده تمیمه سعیدی

دانشیار دانشگاه گیلان، استادیار دانشگاه گیلان، استادیار دانشگاه گیلان،
کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه گیلان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه اعتبار جدول قد - وزن و فرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. جامعه تحقیق، شامل گروه (۱) زنان ورزشکار تیم های ملی به تعداد ۷۴ نفر و گروه (۲) زنان غیر ورزشکار به تعداد ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان می باشند. روش اندازه گیری به این صورت بود که ابتدا در برگه مشخصات فردی، اطلاعات لازم ثبت و سپس وزن مطلوب به سه طریق زیر محاسبه شد:

جدول قد - وزن بیمه عمر متروبولیتن (۱۹۸۳)، فرمول استاندارد، و بر اساس میزان درصد چربی بدن با اندازه گیری چربی تحت جلدی، برای تعیین تیپ بدنی، با استفاده از روش های پیشنهادی شرکت بیمه عمر متروبولیتن (با اندازه گیری پهنای آرنج)

آزمودنی‌ها به سه تیپ (اندام ریز، متوسط، درشت) طبقه‌بندی شده و شاخص توده بدنی (BMI) آنها، بر مبنای میزان چاقی آزمودنی‌ها از تقسیم وزن بدن (کیلوگرم) بر محدود قدر (سانتی‌متر) به دست آمد. سپس از ابعاد مختلف بدن آزمودنی‌ها، اندازه‌گیری به عمل آمد و اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج ذیل حاصل این تجزیه و تحلیل است:

۱- جدول قد - وزن و فرمول استاندارد در برآورده وزن مطلوب بدن، ارتباط معنی‌داری با روش معیار (ارزیابی ترکیب بدن با کالیپر) در دو گروه زنان ورزشکار و غیر ورزشکار دارد.

۲- میزان همبستگی بین جدول قد - وزن و فرمول‌ها با روش معیار در برآورده وزن مطلوب، برای رشته‌های شنا و والیبال کمتر از سایر رشته‌های ورزشی بوده است.

۳- بین نتایج به دست آمده، از برآورده درصد چربی بدن با روش معیار و اندازه‌گیری دوراندام‌ها، در غیر ورزشکاران و ورزشکاران، بالاترین همبستگی در اندازه دور ران، کمر و شکم مشاهده شد.

با توجه به نتایج این پژوهش، به نظر می‌رسد که جدول قد - وزن شرکت بیمه عمر متropolitn، فرمول‌های استاندارد و شاخص توده بدنی، مقیاس نسبتاً مناسبی در برآورده وزن مطلوب جامعه تحقیق می‌باشد.

واژه‌های کلیدی

جدول قد - وزن، شاخص توده بدنی، ارزیابی ترکیب بدنی.

مقدمه

وجود چاقی به دلیل تجمع چربی در بدن، در چند دهه اخیر بویژه در کشورهای توسعه یافته، به صورت یک مشکل جدی ظاهر شده و در برنامه‌های سالم‌سازی اجتماعات، به عنوان یکی از مهمترین موضوعات طب پیشگیری به آن توجه شده است. در دنیای امروزه، عوامل بسیاری از جمله نفوذ پیشرفت ماشینیسم در زندگی مردم، تغیرات کم تحرک، تسهیلات فراوان، تهیه انواع غذاها، دریافت مقدار زیاد انرژی و سایر عوامل، موجب چاقی و در نتیجه افزایش درصد مرگ و میر و کوتاهی طول عمر انسان‌ها شده است. از طرف دیگر، چاقی معمولاً با بیماری قلب بویژه، تنگ شدن عروق کرونر،

بیماری قند، خونریزی مغزی، بروخی امراض کلیه، کیسه صفراء، واریس، تصلب شرائین همراه می‌باشد^(۵). مضرات چاقی نه تنها از نظر فیزیکی و فیزیولوژیکی، بلکه از نظر روانی نیز قابل اهمیت و توجه است. بنابراین کنترل وزن و توانایی بدنی، برای عموم مردم از جمله ورزشکاران بسیار ضروری است. سازمان‌های بهداشتی کشور، باید برنامه‌ریزی‌هایی را برای پیشگیری و کنترل معضل چاقی به عمل بیاورند. از آنجایی که هر برنامه‌ریزی در ارتباط با کنترل وزن و چاقی و ارزیابی وضعیت مراجع و تعیین وزن مطلوب می‌باشد، هدف از این تحقیق میزان کاربرد روش‌های رایج تعیین وزن مطلوب، برای ورزشکاران رشته‌های مختلف و همچنین غیر ورزشکاران و بر طرف ساختن ابهامات و اشکالات موجود می‌باشد.

چاقی و وزن مطلوب

افزایش وزن بدن نسبت به اندازه طبیعی را چاقی می‌نامند. این امر اغلب به علت بیشتر شدن چربی ارگانیسم صورت می‌گیرد. فردی که دارای وزنی مازاد ۱۵ درصد از مقداری است که به عنوان وزن طبیعی مورد توجه می‌باشد متمایل به چاقی است در حالی که فردی با وزن ۲۵ درصد بیش از حد طبیعی کاملاً چاق است^(۶). یک راه علمی ارزیابی چاقی، نسبت چربی به وزن کل بدن می‌باشد. وزن بدون چربی اساساً نمایانگر توده عضلانی است، البته شامل وزن بافت‌ها و سایر ارگان‌های بدن از جمله استخوان و پوست نیز می‌شود. بنابراین وقتی درصد چربی بدن مشخص شد، وزن مطلوب وی را برآورد می‌کنیم. برای به دست آوردن درصد چربی، نیاز به وسایل آزمایشگاهی و افراد متخصص می‌باشد که این امکانات را در دسترس ندارند از این رو، همگان از روش‌های ساده‌تر همچون جدول قد - وزن و فرمول‌های استاندارد می‌توان استفاده نمود. روش‌های گوناگون تعیین وزن مطلوب را می‌توانیم در دو دسته مورد مقایسه و بررسی قرار دهیم و با نکات ضعف و قوت آنها آشنا شویم.

۱- روش‌های ارزیابی ترکیب بدن در برآورد وزن مطلوب

روش‌های ارزیابی ترکیب بدن، امروزه اطلاعات مفیدی را برای همگان بخصوص مریبان و ورزشکاران فراهم نموده است. علی‌رغم اینکه اندازه و وزن کل بدن اهمیت دارد، با این حال ترکیب بدن بسیار مهمتر است^(۷). در اکثر کتاب‌های موجود، بر ضرورت برآورد چربی بدن اشاره شده است. در تحقیق حاضر، از روش اندازه‌گیری چربی بدن از طریق چربی زیر جلدی به عنوان روش معیار استفاده

شده که به تشریح این روش می‌پردازیم.

اندازه‌گیری چربی بدن از طریق چربی تحت جلدی^(۱)

کاربردی‌ترین روش میدانی، اندازه‌گیری ضخامت چربی تحت جلدی در یک یا چند نقطه از بدن و استفاده از مقادیر به دست آمده به منظور برآورد چگالی بدن، چربی نسبی بدن یا توده بدن چربی است (۷). دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که تقریباً ۵۰ درصد از کل بافت چربی ذخیره در سلول‌های مخصوص، در زیر پوست جای دارد، از این رو با اندازه‌گیری چربی زیر پوست، می‌توان کل چربی موجود در بدن را محاسبه نمود (۱). اندازه‌گیری چربی زیر پوست که با اندازه‌گیری ضخامت چین پوستی به دست می‌آید، نسبتاً ساده است و توسط متخصصین و مردمیان در افراد مختلف از جمله ورزشکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندازه‌گیری توسط ابزاری به نام کالیپر^(۲) صورت می‌گیرد. به کمک کالیپر دقیق، با انگشت شست و سایه می‌توان چربی زیر دو لایه پوست برخی از بخش‌های اندام یا تن را که شاخصی از کل چربی بدن هستند (مانند سه سر بازو یا کتف) اندازه‌گیری کرد و سپس با استفاده از معادلات، درصد چربی بدن را محاسبه نمود. از آنجایی که ارتباط بین ضخامت چربی تحت جلدی و چگالی بدن در گروه‌های مختلف با هم فرق می‌کند، باید نواحی مختلفی از بدن تحت اندازه‌گیری قرار گرفته و فرمول‌های مختلف مطابق با سن، جنس و نوع رشته‌ای که ورزشکار فعالیت می‌کند استفاده شود (۹).

جکسون و پولاک^(۳) در سال ۱۹۷۸ و جکسون، پولاک و وارد^(۴) در سال ۱۹۸۰، فرمول‌هایی را برای هر دو جنس ارائه داده‌اند. یکی از رایج‌ترین این فرمول‌ها معادله‌ای است که توسط جکسون و پولاک برای سنین ۱۸ تا ۶۱ سال تهیه شده که در سال ۱۹۸۱ ریون آن را به نوموگرام تبدیل کرد (۹) و (۲). اندازه‌های به دست آمده از ضخامت چربی تحت جلدی با بهره‌گیری از معادلات، برآورد صحیح و معقولی از کل چربی یا چربی نسبی بدن با ضریب همبستگی ۹۰ تا ۹۶ درصد است (۷). همچنان این فرمول‌ها و معادلات برای برآورد چگالی بدن نیز، دارای اعتبار و پایایی است (۹). در برخی از کتاب‌ها، به این نکته اشاره شده که در برآورد درصد چربی بدن با روش اندازه‌گیری چربی تحت جلدی، فقط ۳ تا ۵

در صد احتمال خطأ وجود دارد و این روش میدانی استفاده وسیعی برای تعیین ترکیب بدنی دارد (۹) و (۲).

۲- فرمول‌ها و جدول قد - وزن در برآورد وزن مطلوب

در اکثر کتاب‌ها، با جداول و فرمول‌هایی که برای ارزیابی چاقی و تعیین وزن مطلوب بدن معروف شده‌اند، آشنا شدیم. اساس کلی روش‌های مذکور، بر ارتباط میان قد و وزن بنا شده و فرد می‌تواند وزن مطلوب خود را تخمین بزند. در برخی موارد، جنس و نوع استخوان‌بندی نیز مورد نیاز است که در آن صورت، برآورد دقیق‌تری به دست می‌آید. از معروف‌ترین این شاخص‌ها، جدول قد - وزن شرکت بیمه متروپولیتن^(۱) است که برای اولین بار در دهه ۱۹۴۰ ارائه شد. در فاصله سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۵، پس از تحقیق ۲۶ شرکت بیمه عمر که در مورد فشار خون و ساختار بدن پنج میلیون شهروند آمریکایی و کانادایی انجام شد، تغییراتی در جدول مذکور صورت گرفت که نتیجه آن جدول قد - وزن متروپولیتن در سال ۱۹۵۹ بود. مجدداً با تحقیق دیگری که توسط بیمه عمر بر روی ۴ میلیون نفر در فاصله سال‌های ۱۹۵۴ - ۱۹۷۳ صورت گرفت، جدول جدیدی در اول مارس ۱۹۸۳ ارائه شد که آخرین جدول قد - وزن شرکت متروپولیتن است. در جدول قد - وزن ۱۹۸۳، روشی برای تعیین استخوان‌بندی شخص، با استفاده از اندازه‌گیری پهنه‌ای آرنج درج شده‌است. این روش موجب می‌شود شخص بتواند وزن مطلوب خود را در سه گروه اندام ریز، اندام متوسط و اندام درشت، تعیین نموده و از مشکلات انتخاب ذهنی نوع استخوان‌بندی اجتناب نماید. (۱۱) و (۲).

در بسیاری از تحقیقات، برای اندازه‌گیری چاقی و اضافه وزن، از شاخص توده بدنی (BMI)^(۲) استفاده کرده‌اند. این شاخص از حاصل تقسیم وزن بر محدوده قد به دست می‌آید (قد / وزن) و نتیجه آن با نرم ویژه‌ای مقایسه می‌شود. بر طبق نرم، چنانچه شاخص توده بدنی شخص بیشتر از عدد ۲۷ باشد، چاق محسوب می‌شود.

پس از معرفی روش‌های برآورد وزن مطلوب، جا دارد به نتایج تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است بپردازیم :

اوبراين^(۳) و همکارانش در سال ۱۹۹۲، چهار روش ارزیابی ترکیب بدن را روی ۵۵ فوتbalist

1- Metropolitan life insurance company

2- Body Mass Index

3- Obrien

سیاه پوست و ۳۵ سفید پوست آمریکایی مورد بررسی قرار دادند. در ابتدا میانگین درصد چربی بدن را به وسیله روش وزن کشی در زیر آب برآورد کردند سپس با سه روش دیگر مورد مقایسه قرار دادند. با توجه به نتایج حاصله، روش اندازه گیری چربی تحت جلدی با میانگین تفاوتی را نشان نداده و به نظر می رسد که روش مذکور یک روش بهتر، سریعتر و صحیح‌تر در تخمین ترکیب بدن ورزشکاران (بدون توجه به نژاد) می‌باشد (۱۰).

افرل^(۱) در سال ۱۹۹۴، مقایسه‌ای را بین ۵ روش برای تعیین ترکیب بدن در دختران نوجوان انجام داد. در این آزمایش ۳۱ داوطلب شرکت داشتند. روش‌های تعیین ترکیب بدن عبارت بودند از: وزن کشی زیر آب، هدایت الکتریکی کل بدن، مقاومت الکتریکی، اندازه گیری جذب اشعه X و اندازه گیری چربی تحت جلدی (با استفاده از فرمول جکسون و پولاک و وارد). اندازه حجم بدن با استفاده از روش چربی تحت جلدی و وزن کشی زیر آب تعیین و توسط فرمول تبدیل به درصد چربی شدند. نتایج حاصله از دو روش فوق، با سه روش دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بالاترین ضریب همبستگی، بین اندازه گیری جذب اشعه X و اندازه چربی تحت جلدی و پایین‌ترین ارتباط بین مقاومت الکتریکی و روش چربی تحت جلدی مشاهده شد (۱۲).

در سال ۱۹۹۴ استوت^(۲)، تحقیقی در مورد اعتبار روش‌های سنجش درصد چربی در مردان سیاه پوست انجام داد. درصد چربی توسط روش اندازه گیری چربی تحت جلدی و روش مقاومت الکتریکی به دست آمد و با روش وزن کشی زیر آب مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که روش اندازه گیری چربی تحت جلدی، میزان خطای پایین‌تری دارد پنایزهای، این روش برای برآورد چربی توصیه می‌شود (۱۳).

استوت و همکارانش در سال ۱۹۹۴، روش‌های اندازه گیری چربی تحت جلدی و اثربازی مادون قرمز و روش مقاومت الکتریکی را برای تخمین درصد چربی بدن ۵۷ مرد جوان مورد آزمایش قرار دادند و با روش اندازه گیری زیر آب مقایسه کردند. روش اندازه گیری چربی تحت جلدی، با پایین‌ترین خطای و بالاترین ضریب همبستگی با روش وزن کشی زیر آب برای سنجش درصد چربی مردان جوان توصیه شد (۱۴).

استوت و همکارانش در سال ۱۹۹۵، تحقیقی در مورد اعتبار فرمول‌های چربی تحت جلدی،

برای تخمین حجم بدن در کشته‌گیران جوان، انجام دادند. آزمودنی‌ها ۴۸ نفر بودند. نتایج این فرمول‌ها با روش وزن‌کشی زیر آب مقایسه شد، نتایج نشان داد که این فرمول‌ها برای سنجش ترکیب بدن این جوانان، دارای اعتبار می‌باشد (۱۵).

در ادامه لازم است به بررسی سوابق تجربی متعددی در ارتباط با نکات ضعف و قوت جدول قد

- وزن و فرمول‌های استاندارد نیز پردازیم.

کاستیل ویلمور^(۱) عنوان کرده‌اند که جدول قد - وزن، برآورد صحیحی از وزن مطلوب ورزشکاران ارائه نمی‌کند، زیرا آنها ترکیب بدن را مورد ملاحظه قرار نمی‌دهند. ممکن است ورزشکاری که مطابق با این جداول دچار اضافه وزن است، مقدار چربی بدن او در حد طبیعی یا کمتر از حد طبیعی باشد. بر عکس، ممکن است ورزشکار دیگری متناسب با قد خود، از دامنه وزن مناسب برسخوردار باشد، اما در واقع دچار چربی بیش از حد باشد (۷).

شبور^(۲) گزارش می‌دهد زمانی ۵۱ مرد از پرسنل نیروی هوایی آمریکا توسط دو استاندارد مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. ملاحظه شد که ۱۵ نفر از افراد بر طبق جدول استاندارد وزن، دارای اضافه وزن تشخیص داده شده‌اند، در واقع چاق بودند (با بیش از ۲۰ درصد چربی)، همچنین ۶ نفر از کسانی که دارای اضافه وزن تلقی شده‌اند کمتر از ۲۰ درصد چربی داشتند و چاق نبودند. این بدان معناست که ۲۱ نفر از ۵۱ نفر آزمایش شونده با استفاده از جدول به غلط طبقه‌بندی شده‌اند (۳).

کاستیل ویلمور، در یک گزارش عنوان کرده‌اند که در مسابقات جهانی، یکی از بهترین بازیکنان بیسبال که توسط جدول قد - وزن آزمایش شده بود دارای اضافه وزن بوده، با وجود این برای ارزیابی صحیح‌تر، از ترکیب بدن به وسیله روش وزن سنجی زیر آب مورد آزمایش قرار گرفت و میزان چربی بدن وی ۶ درصد تخمین زده شد. به طور طبیعی، ۴ درصد چربی، برای زنده ماندن ضروری می‌باشد، ولی این ورزشکار از وزن بدن خود کم می‌کرد، و با این عمل احتمالاً به دوران ورزشی خود لطمہ شدیدی وارد می‌نمود (۷).

صارمی و خمسه عنوان کرده‌اند، اگر اضافه وزن فرد کم باشد، پزشک می‌تواند با مراجعت به جدول، وزن متناسب اشخاص را با توجه به قد، جنس و نوع استخوان‌بندی مشخص نماید و وجود یا عدم وجود چاقی را دریابد. در دو مورد، مراجعت به جداول، پزشک را در تشخیص چاقی منحرف

می‌سازد:

- ۱- اگر حجم عضلات فرد خیلی بیشتر از حد معمول بوده و نسبت حجم عضلات به چربی وی بالا باشد.
- ۲- اگر حجم عضلات کمتر از حد طبیعی بوده، در نتیجه نسبت چربی به عضلات از حد طبیعی بالاتر باشد.

با توجه به دو عامل فوق، ممکن است یک فرد عضلانی وزنش بیش از حد طبیعی به نظر برسد و یک فرد لاغر با عضلات آتروفیک با ذخیره چربی زیاد، وزنش در حد طبیعی یا حتی کمتر از آن به نظر آید (۴).

رحمانی نیا، در پژوهشی به این نتیجه رسیده که جدول جدید قد - وزن شرکت بیمه عمر متropolyen مقیاس نسبتاً مناسبی در برآورد وزن مطلوب جامعه تحقیق می‌باشد. ولی هیچ گونه ارتباط معنی داری بین نتایج به دست آمده از فرمول استاندارد با روش معیار، در گروه‌های زنان ورزشکار و غیر ورزشکار مشاهده نشده است. در نتایج حاصل از شاخص توده بدنی نیز، در گروه‌های زنان ورزشکار و غیر ورزشکار، هیچ گونه ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.

بر خلاف انتظار محقق، در گروه ورزشکاران تیم‌های ملی نیز ارتباط معنی داری میان جدول قد - وزن و روش معیار به دست آمده است. اما میزان همبستگی جدول قد - وزن و فرمول‌ها، با روش معیار در برآورد وزن مطلوب رشته‌های ورزشی کشتی، جودو، دو میدانی و قایقرانی کمتر از دیگر رشته‌های ورزشی بوده است (۲).

با توجه به موارد ذکر شده، اگر مقیاس‌های مذکور به طور مناسب تهیه نشوند، ورزشکاران ممکن است خود را برای رسیدن به وزنی که کمتر از میزان مطلوب است، تحت فشار قرار دهند. از این روی، اهمیت زیادی دارد که مقیاس‌های مناسب وزن تهیه شود.

روش تحقیق

این تحقیق از نوع توصیفی و شامل نمودارها، جداول، میانگین‌ها و ... می‌باشد. در این روش، با طبقه‌بندی و خلاصه کردن اطلاعات، به صورت معنی داری و بیزگی‌های یک دسته از اطلاعاتی را که پژوهشگر جمع آوری کرده، مقایسه و ارزشیابی می‌نمایند. لازم به توضیح است که روش مرجع که ارزشیابی معیاری بر اساس آن صورت می‌گیرد، روش برآورد ترکیب بدن از طریق اندازه‌گیری چربی

تحت جلدی با کالیپر می‌باشد.

جامعه تحقیق، نحوه انتخاب آزمودنی‌ها، تعداد و سن آزمودنی‌ها

در تحقیق حاضر، دو گروه مستقل تحت بررسی قرار گرفتند که شامل:

گروه (۱) - زنان ورزشکار طراز اول کشور (اعضای تیم‌های ملی کشور)

گروه (۲) - زنان غیرورزشکار

نمونه برداری در گروه‌های (۱) و (۲) به طور غیرتصادفی و هدفدار انجام شد. نمونه‌های گروه (۱)، از میان ورزشکاران تیم‌های ملی در رشته‌های دو و میدانی، والیبال، شنا، بسکتبال، ژیمناستیک و کاراته، در دو مین دوره مسابقات همیستگی بانوان کشورهای اسلامی انتخاب شدند تعدادشان ۷۴ نفر بود. برای این گروه هیچ گونه محدودیت سنی وجود نداشت. نمونه‌های گروه (۲)، شامل ۲۴ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور و ۷۶ نفر از دانشجویان غیر تربیت بدنی دانشگاه گیلان بودند. دامنه سنی این گروه ۱۸ تا ۳۳ سال مشخص شد.

متغیرهای تحقیق

متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از:

۱- قد: قد آزمودنی‌ها به سانتی‌متر

۲- وزن: وزن آزمودنی‌ها به کیلوگرم

۳- سن: سن تقویمی آزمودنی‌ها به سال

۴- وزن مطلوب: در این تحقیق به سه صورت وزن مطلوب آزمودنی‌ها محاسبه شده است.

الف - جدول قد - وزن: وزن مطلوب بر اساس میزان قد و تیپ بدنی با استفاده از جدول قد -

وزن شرکت بیمه عمر متropolitn (۱۹۸۳) محاسبه شده است.

ب - فرمول استاندارد: وزن مطلوب بر اساس میزان قد و با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده

است:

$$\text{وزن مطلوب زنان} = \frac{\text{قد}}{\text{قد} + ۱۵۰}$$

ج - بر اساس میزان درصد چربی بدن که با اندازه گیری چربی تحت جلدی به دست آمده و بر

مبناً فرمول زیر محاسبه شده است (این روش اصطلاحاً برآورده وزن مطلوب از طریق ارزیابی ترکیب

وزن خالص بدن (توده بدون چربی) = وزن مطلوب

$$\frac{\text{وزن خالص بدن (توده بدون چربی)}}{\text{درصد چربی مطلوب}} - ۱$$
 بدن معرفی می‌کنند).

۵- تیپ بدنی : با استفاده از روش پیشنهادی شرکت بیمه عمر متropolitn، آزمودنی‌ها به سه تیپ، (اندام ریز، اندام متوسط، اندام درشت) طبقه‌بندی شده‌اند.

۶- شاخص توده بدنی (BMI) : بر مبنای آن، میزان چاقی آزمودنی‌ها از تقسیم وزن بدن (کیلوگرم) بر محدود قدر (سانتی‌متر) به دست می‌آید.

$$\text{وزن} = \frac{\text{قد}}{\text{قد}} \quad (\text{BMI})$$

۷- میزان چربی بدن : در این تحقیق، میزان چربی بدن با اندازه‌گیری چربی تحت جلدی با استفاده از کالیپر به دست آمده است.

نتایج و یافته‌های تحقیق:

در جدول (۱)، مشخصات و تعداد آزمودنی‌های گروه‌های مختلف تحقیق و میانگین و انحراف استاندارد و سایر اطلاعات به دست آمده درج شده‌است. جدول (۲)، همبستگی براورد وزن مطلوب بدن از طریق روش ارزیابی ترکیب بدن با کالیپر، جدول قد - وزن، فرمول استاندارد و شاخص توده بدن در رشته‌های مختلف ورزشی را نشان می‌دهد.

جدول (۱)- مشخصات و تعداد آزمودنی‌های گروه‌های مختلف تحقیق

و میانگین و انحراف استاندارد

BMI	وزن مطلوب (فرمول)	وزن مطلوب با جدول (قد - وزن)	وزن مطلوب (با کالیپر)	وزن چربی (با کالیپر)	درصد چربی (با کالیپر)	سن	قد	وزن	
$۲۱/۷ \pm ۲/۳$	۵۸۰ ± ۵۷	۶۲۰ ± ۶۵	$۶۱/۲ \pm ۶/۵$	$۱۹/۵ \pm ۲/۵$	$۲۲/۱ \pm ۴/۶$	$۱۶۷ \pm ۶/۸$	$۶۱/۳ \pm ۷/۹$	$۷۴ \pm ۷/۸$	گروه (۱) ورزشکاران تیم‌های ملی $n = ۷۴$
$۲۳ \pm ۷/۸$	$۵۳/۷ \pm ۴/۳$	$۵۷/۲ \pm ۴/۸$	$۵۵/۱ \pm ۷$	$۲۱/۶ \pm ۶$	$۲۱/۴ \pm ۲/۱$	$۱۵۷ \pm ۱۲/۷$	$۵۶/۸ \pm ۱۰/۴$	$۱۰۰ \pm ۷/۸$	گروه (۲) غیرورزشکاران $n = ۱۰۰$

جدول (۲) - همبستگی برآورده وزن مطلوب با کالیپر، جدول قد - وزن ، فرمول استاندارد و شاخص توده بدنی در گروه ورزشکاران

رشته ورزشی	وزن مطلوب بدن (جدول قد - وزن)	وزن مطلوب بدن (فرمول استاندارد)	شاخص توده بدنی (BMI)
ژیمناستیک (n = ۳)	۹۱٪.	۹۲٪.	۸۶٪.
شنا (n = ۱۰)	۲۱٪.	۲۲٪.	۵۶٪.
بسکتبال (n = ۱۵)	۶۵٪.	۵۹٪.	۲۹٪.
دو میدانی (n = ۱۹)	۶۷٪.	۶۹٪.	۲۹٪.
والیبال (n = ۱۵)	۳۶٪.	۴۲٪.*	۸۰٪.***
کاراته (n = ۱۲)	۷۵٪.*	۷۳٪.*	۷۶٪.*

$$(P < 0.01) *** \quad (P < 0.05) *$$

تجزیه و تحلیل یافته‌های گروه (۱) - ورزشکاران تیم‌های ملی

فرضیه‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۶) مربوط به ورزشکاران تیم‌های ملی است. نتایج آزمون فرضیه‌ها

عبارت است از :

۱- در تعیین وزن مطلوب بدن ، بین نتایج به دست آمده از جدول قد - وزن با برآورد ترکیب بدن با کالیپر ارتباط معنی دار. $P = 0.000$ وجود دارد، بنابراین فرض پوچ (۱) رد می شود.

۲ الف - در تعیین وزن مطلوب بدن، بین نتایج به دست آمده از فرمول استاندارد با برآورد ترکیب بدن ارتباط معنی دار. $P = 0.000$ وجود دارد.

۲ ب - بین نتایج به دست آمده از برآورد ترکیب بدن (با کالیپر) و شاخص توده بدنی نیز ارتباط معنی دار. $P = 0.000$ وجود دارد. بنابراین فرض پوچ (۲) رد می شود.

۳ - میزان همبستگی بین جدول قد - وزن و فرمول‌ها با ارزیابی ترکیب بدن در برآورد وزن مطلوب برای رشته‌های ورزشی شنا و والیبال کمتر از دیگر رشته‌های ورزشی است. بنابراین فرض پوچ (۳) با توجه به اینکه در بیشتر رشته‌ها همبستگی بالای وجود دارد رد می شود.

۴- با توجه به فرض ع، ارتباط معنی داری بین بعضی از اندازه‌های ابعاد بدنی و درصد چربی بدن وجود دارد.

تجزیه و تحلیل یافته‌های گروه (۲) - زنان غیر ورزشکار

فرضیه‌های (۴)، (۵) و (۷) مربوط به زنان غیر ورزشکار می‌باشد. نتایج آزمون فرضیه‌ها عبارت است از:

- ۱- در تعیین وزن مطلوب بدن، بین نتایج به دست آمده از جدول قد - وزن با برآورده ترکیب بدن با کالیپر، ارتباط معنی دار $P = 0/00051\%$ وجود دارد، بنابراین فرض پوچ (۴) رد می‌شود.
- ۲ الف - در تعیین وزن مطلوب بدن، بین نتایج به دست آمده از فرمول استاندارد با برآورده ترکیب بدن با کالیپر، ارتباط معنی دار $P = 0/0050\%$ وجود دارد.
- ۲.ب - بین نتایج به دست آمده از برآورده ترکیب بدنی با کالیپر و شاخص توده بدنی، ارتباط معنی دار $P = 0/00067\%$ وجود دارد، بنابراین فرض پوچ (۵) رد می‌شود.
- ۳- با توجه به فرض ۷، ارتباط معنی داری بین اندازه‌های ابعاد بدنی و درصد چربی بدن مشاهده شده است.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج این پژوهش، برای مشخص شدن میزان اعتبار جدول قد - وزن و فرمول استاندارد در برآورده وزن مطلوب، اطلاعات حاصل با نتایج و یافته‌های تحقیقات قبلی مقایسه می‌شود:

- ۱- جدول قد - وزن شرکت بیمه عمر متropolitn، مقیاس نسبتاً مناسبی در برآورده وزن مطلوب بدن جامعه تحقیق می‌باشد. با توجه به اینکه بیشتر روش‌های ارزیابی ترکیب بدن، پیچیده و به تجهیزات گران قیمت نیاز دارند، همچنین اندازه گیری با این روش‌ها نیز بدون خطأ و اشتباه نیست و حتی ممکن است سنجش چگالی بدن با $0/01\% \pm 0/03\%$ خطأ همراه باشد (۸)، بنابراین به کارگیری روش‌های ساده‌ای همچون جدول قد - وزن می‌تواند توسط عموم مردم بخصوص ورزشکاران دارای ارزش بسیاری باشد. از آنجایی که در این جداول، جنسیت و نوع استخوان‌بندی مورد نیاز می‌باشد، برآورده دقیق‌تری را به دست می‌دهد (۱۰). با اینکه این جداول بر اساس جامعه ویژه‌ای تهیه شده و نمایانگر کل جامعه نیست، در مورد جامعه تحقیق حاضر از اعتبار بالای برخوردار می‌باشد (۱۲).

- ۲- فرمول‌های استاندارد مقیاس نسبتاً مناسبی در برآورده وزن مطلوب بدن جامعه تحقیق می‌باشد. در این جامعه ارتباط معنی دار نسبتاً بالایی بین فرمول‌ها و روش معیار به دست آمده است. فرمول‌ها اطلاعات معتبری را در مورد وزن مطلوب بدن در اختیار قرار می‌دهد. روش‌های ساده‌ای همچون جدول قد - وزن و فرمول‌ها، می‌توانند بیشتر مورد استفاده افراد بخصوص ورزشکاران قرار گیرد

(۱۲)

۳- شاخص توده بدنی (BMI) مقیاس نسبتاً مناسبی در برآورد وزن مطلوب بدن جامعه تحقیق می باشد. در تحقیق حاضر، برای هر دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار، ارتباط معنی داری، بین روش معیار و (BMI) مشاهده شد. باید توجه داشت که نتایج تحقیقاتی که در دسترس هستند، در ارزیابی چاقی، شاخص توده بدن (BMI) را نسبت به جدول قد - وزن از اعتبار بیشتری برخوردار می دانند (۲).

۴- بر خلاف انتظار محقق، در گروه زنان ورزشکار تیم های ملی نیز ارتباط معنی داری میان جدول قد - وزن با روش معیار به دست آمد. همان طور که در نتایج تحقیق اشاره شد، میزان همبستگی جدول قد - وزن و فرمول های استاندارد با روش معیار در برآورد وزن مطلوب رشته های ورزشی والیبال و شنا کمتر از سایر رشته های ورزشی بوده است. این موضوع، مطابق با ادبیات تحقیق که اگر اضافه وزن فرد کم باشد، با مراجعه به جدول قد - وزن می توان وجود یا عدم چاقی را دریافت، ولی اگر حجم عضلات فرد از حد معمول بیشتر بوده و نسبت حجم عضلات به چربی او بالا باشد (عضلانی)، همچنین اگر حجم عضلات فرد کمتر از حد معمول باشد یعنی نسبت چربی به عضلات از حد طبیعی بالاتر باشد، (۴) جدول قد - وزن برآورد صحیحی از وزن مطلوب افراد بسیار عضلانی (ورزشکاران) یا لاغر ارائه نمی کند.

۵- ارتباط معنی داری بین برآورد درصد چربی بدن با روش معیار و اندازه گیری دور اندام ها برای گروه زنان غیر ورزشکار وجود دارد. البته در گروه زنان ورزشکار تیم های ملی بخصوص در رشته والیبال، ارتباط معنی داری مشاهده شد. با توجه به این نکته که اندازه گیری دور اندام ها کاربرد بیشتری نسبت به جدول قد - وزن دارد (۲). نتیجه مذکور برای تعیین درصد چربی بدن، با توجه به اینکه دسترسی به وسایل برآورد درصد چربی نیاز به وسایل تخصصی و آزمایشگاه و ... دارد، برای افراد از جمله مریبان و ورزشکاران بسیار با اهمیت می باشد. زیرا در این روش فقط با استفاده از یک متر نوار براحتی می توان ابعاد بدن را مورد اندازه گیری قرار داد و با استفاده از معادلات این اندازه ها را تبدیل به درصد چربی نمود. به طور خلاصه، با مرور پیشینه تحقیق و نتایج حاصل از این پژوهش، به نظر می رسد که استفاده از جدول قد - وزن و فرمول های استاندارد، برای برآورد وزن مطلوب بدن افراد ورزشکار و غیر ورزشکار دارای اعتبار می باشد و همچنین با اندازه گیری ابعاد بدن بخصوص برای غیر ورزشکاران، می توان برآورد نسبتاً صحیحی از درصد چربی بدن به دست آورد.

منابع و مأخذ

- ۱- ایز نمان . ۱. پار تیسا و جانسون، دنیس. «تغذیه و کترول وزن»، ترجمه محمود اسماعیلی، انتشارات مستکران، ۱۳۷۷.
- ۲- رحمانی نیا، فرهاد. «تعیین اعتبار معیاری جدول قد - وزن و فرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب با استفاده از روش ارزیابی ترکیب بدن»، دانشگاه گیلان، ۱۳۷۴.
- ۳- شیور، لاری جی. «فیزیولوژی ورزش»، ترجمه خسرو ابراهیم، انتشارات سازمان تربیت بدنی دفتر تحقیقات، ۱۳۶۷.
- ۴- صارمی، علی و خمسه، اکبر و اروین دانیال، جمیل. «چاقی، علل و رابطه آن با بیماری ها و ورزش». تهران. انتشارات چهره، ۱۳۷۰.
- ۵- صدیق، گیتی و امین پور، آزاده. «تغذیه درمانی»، چاپ حیدری، ۱۳۷۰.
- ۶- فاکس، ماتیوس. «فیزیولوژی ورزشی»، ترجمه علی اصغر خالدان، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۵
- 7- Costill, DI and Wilmore, jh."Physiology of Sport and Exercise." Champaign IL: Human Kinetics, Publications,. 1995.
- 8- Eisenman, P , and et al. "Coaches Guide to Nutrition and Weight Control". Champaign IL,Human Kinetics, 1987.
- 9- Hey ward,V.H."Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription". Champaign, IL, Human Kinetics, 1991.
- 10- Hortobagyi, T, and et al. "The Comparison of Four Methods to Assess Body Composition in Black and White Athletes". International Journal of sport nutrition , 1992 . 2(1), PP . 60-74.
- 11- Nieman, D."Fitness and Your Health". California Bull publishing, 1993.
- 12- Offerle, S. M. "Acomparison of Five Methods Utilized to Determine the Body Composition of Adolescent Females". Micro form publications Int'l Institute for sport and Human performance, univ of oregon, 1994.
- 13- Stout, J.R, and et al. "Validity of Methods For Estimating Percent Body Fat in

Black Males". Journal of strength and conditioning research (champaign, 11), 1994, 8(4), PP. 243-246.

14- Stout, J.R, and et al "Validity of Percent Body Fat Estimations in Males". Journal Medicine and science in sports and exercise, 1994, 26(5), PP. 632-636.

15- Stout, J.R, and et al ."The Validity of Skinfold Equations For Estimating Body Density in Youth Wrestlers". Medicine and science - in sports - and exercise, 1995, 27(9), PP. 1321-1326.





پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتمال جامع علوم انسانی