

## حرکت

شماره ۱۰ - ص ص : ۳۰-۱۹

تاریخ دریافت : ۲۸/۸/۸۰

تاریخ تصویب : ۲۶/۹/۸۰

# بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار<sup>۱</sup>

دکتر سید رضا عطارزاده حسینی<sup>۲</sup> - احمد حسن نیا - دکتر مهدی طالب پور

اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

## چکیده

نمونه آماری این پژوهش توصیفی - میدانی ۱۸۲ نفر از دانشجویانی است که واحد درسی تربیت بدنی یک را به تازگی انتخاب کرده بودند. به منظور تعیین نمونه آماری برای دامنه سنی ۲۲ سال و کمتر ۶۶ نفر و برای دامنه سنی ۲۳ سال ۵۶ نفر و برای دامنه سنی ۲۴ سال و بیشتری ۵۱ نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از تعیین نمونه آماری و اجرای تست‌های منتخب به عملکرد دانشجویان بر روی هر کدام از مواد یک نمره خام اختصاص داده شد و سپس شاخص‌های آماری هر سه گروه سنی تحقیق با یکدیگر و با نتایج پژوهش‌های مشابه در داخل و هنجارهای خارج از کشور مقایسه شد و با مقایسه میانگین نتایج تست‌های مشترک بین هر سه گروه سنی ملاحظه گردید که با افزایش سن از ۲۲ به ۲۴ سال و بیشتر در تمامی مواد حد نصاب‌ها به تدریج افت داشته‌اند به ویژه روند افت در تست‌های دراز و نشست، دوی رفت و برگشت، دوی سرعت و دوی یک مایل محسوس‌تر بوده است. از مقایسه نتایج با نتایج پژوهش‌های مشابه داخل چنین استنباط شده است که عملکرد گروه نمونه در سطح پائین‌تری قرار داشته که شاید علت آن زمان اجرای تست‌ها باشد. چراکه، در این تحقیق برخلاف تحقیقات مشابه داخلی به دلیل هدف هنجاریابی و کسب معیاری مناسب برای مقایسه وضعیت دانشجویان قبل و بعد از تدریس، زمان اجرای تست‌ها در ابتدای دوره و شروع واحد آمادگی جسمانی بوده است.

۱- این پژوهش با اعتبار معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده و بر اساس نظر نهایی شورای پژوهشی حائز رتبه عالی گردیده است.

۲- Email: attarzadeh@ferdowsi.ut.ac.ir

## واژه‌های کلیدی

تربیت بدنی عمومی، آمادگی جسمانی - حرکتی، استقامت قلبی - تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت انفجاری، سرعت و چابکی.

## مقدمه

زندگی ماشینی و توسعه امکانات و تسهیلات رفاهی، بشر امروزی را به سمت شرایطی مغایر با طبیعت و سرشت او سوق داده است، به طوری که امروزه شاهد بسیاری از بیماری‌های ناشی از نبود فعالیت و فقر حرکتی هستیم. تبلی و تنپروری و دوری جستن از فعالیت‌های مناسب جسمانی و حرکتی، موجب بروز ناهنجاری‌های استخوانی - عضلانی، بی‌تناسبی و نامتقارنی اندام، دردهای استخوانی، بیماری‌های قلبی - تنفسی و ... شده است. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مسائل و مشکلات، ترویج و گسترش ورزش در بین آحاد مردم به ویژه دانشجویان به عنوان یکی از راه‌های کنترل‌کننده و نجات‌بخش، پیشنهاد می‌شود. با قبول این مطلب که برنامه‌های حرکتی و ورزشی آثار مفید و سازنده‌ای بر تندرسی و سلامت جسمانی و روانی افراد دارد، شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، واحد تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲ (هر کدام به ارزش یک واحد عملی) را در برنامه‌های درسی تمامی رشته‌های دانشگاهی گنجانیده است. در این راستا، ارائه بهینه واحد تربیت بدنی عمومی ۱ (آمادگی جسمانی و حرکتی) از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده مطلوب از تمامی امکانات و تسهیلات ورزشی، ارائه برنامه‌های حرکتی و ورزشی مناسب با قابلیت‌ها و علایق دانشجویان و بهبود شیوه‌های تدریس و ارزشیابی، نه تنها موجبات رضایتمندی دانشجویان را فراهم می‌سازد، بلکه زمینه را برای تحقق اهداف پژوهشی و آموزشی مهیا می‌نماید.

در پی چنین اعتقادی که پژوهش به عنوان بخش مهم و جدانشدنی فرایند آموزشی می‌تواند به بهینه‌سازی واحد تربیت بدنی عمومی ۱ کمک کند و با تأکید بر این مطلب که جمع‌آوری اطلاعات دقیق مستلزم بهره‌گیری آزمون‌های معتبر و پایاست، تحقیق درباره هنگاریابی آزمون‌های آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان و ساخت وسیله‌ای معتبر و مبتنی بر اصل پژوهش علمی برای ارزشیابی محتوای آموزش، تعیین قابلیت‌های جسمانی و حرکتی دانشجویان و تبیین برنامه‌های مناسب با سطوح سنی، نیازها و علایق آنها و ارائه معیاری دقیق برای عینی تر ساختن ارزشیابی پایانی واحد تربیت بدنی عمومی، ضروری است.

## روش و اجرای تحقیق

روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی - میدانی است.

### الف - جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی، دانشجویانی (۹۰۰ نفر) است که واحد درسی تربیت بدنی عمومی ۱ را انتخاب کرده بودند. حجم نمونه آماری تحقیق ۱۸۲ نفر در نظر گرفته شد و به منظور تعیین نمونه آماری که بتواند معرف واقعی جامعه باشد، برای دامنه های سنی ۲۲ و کمتر، ۲۳ و ۲۴ سال و بیشتر، به ترتیب ۶۵، ۵۱ و ۵۶ نفر به طور تصادفی انتخاب و گزینش شدند. شایان ذکر است دانشجویانی که به لحاظ سلامت جسمانی و روانی در شرایط مطلوب نبودند و نیز کسانی که علاوه ای به شرکت در طرح تحقیق نداشتند، از فهرست نمونه آماری حذف و به جای ایشان افراد دیگری به صورت تصادفی انتخاب و جایگزین شدند.

### ب - متغیرهای تحقیق و مواد آزمون

با توجه به موضوع تحقیق، قابلیت های آمادگی جسمانی و حرکتی شامل استقامت عضلات بازو و کمر بند شانه ای، استقامت عضلات شکمی، قدرت انفجاری عضلات پاها، چابکی عمومی، سرعت عمومی و استقامت قلبی - تنفسی، متغیرهای این تحقیق هستند که برای اندازه گیری هر کدام از آنها، به ترتیب از آزمون های کشش بارفیکس اصلاح شده (بوم گارتز، ۱۹۷۸)، دراز و نشست اصلاح شده، پرش در جا (سارجنت، ۱۹۲۱)، دو رفت و برگشت ۲×۱۵ متر، دو ۵۰ یارد (۴۵/۷۲ متر) سرعت و یک مایل (۱۶۰۹ متر) دویدن - راه رفتن استفاده شده است.

### ج - روش های آماری

پس از اجرای آزمون ها بر اساس ضوابط و مقررات، به عملکرد دانشجویان بر روی هر کدام از مواد شش گانه آزمون های آمادگی جسمانی و حرکتی یک نمره خام به عنوان حد نصاب اختصاص داده شد. سپس داده های حاصل از ابزارهای پژوهشی این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS-PC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، به طوری که از آمار توصیفی و استنباطی برای محاسبه نما، میانه، میانگین، دامنه تغییرات، انحراف استاندارد و نیز تهیه جداول هنجار سنی، نقطه ها و رتبه های درصدی، نمره استاندارد  $T$  و رسم منحنی و نمودارها استفاده شد.

## نتایج و یافته‌های تحقیق

نتایج و یافته‌های تحقیق هر گروه سنی و کل گروه‌ها، در جداول ۱، ۲، ۳ و ۴ خلاصه شده است.

جدول ۱- توصیف شاخص‌های مرکزی و پراکندگی متغیرهای اندازه گیری شده بر روی

دانشجویان گروه سنی ۲۲ ساله و کمتر

$X_H$	$X_L$	R	دامتہ تغییرات	انحراف استاندارد	میانه	میانگین	شاخص
				SD	MD	MN	متغیر
۱۹۰	۱۶۲	۳۳		۷/۴۰	۱۷۴	۱۷۴	قد (cm)
۹۰	۵۰	۴۰		۸/۴۷	۶۴/۵	۶۴/۹	وزن (Kg)
۴۰/۰	۸/۰	۲۲		۷/۶	۱۸	۱۹	کشش بارفیکس (N)
۵۱	۱۸	۲۳		۶	۳۹	۳۸	دراز و نشست (N)
۵۵	۳۲	۲۳		۶	۴۴	۴۴	پرش در جا (Cm)
۶/۶۶	۵/۰۳	۱/۰۳		۰/۲۹	۵/۹۴	۵/۹۷	دورفت و پرگشت $15 \times 2$ (Sec)
۸/۰۹	۰/۷۸	۲/۲۱		۰/۴۴	۶/۳۵	۶/۶۲	دو ۵۰ یارد سرعت (Sec)
۹/۵۰	۶/۰۰	۳/۰۰		۰/۸۲	۷/۳۷	۷/۰۰	یک مایل دویدن و راه رفتن (Min)-(Sec)

جدول ۲- توصیف شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای اندازه گیری شده بروی

دانشجویان گروه سنی ۲۳ ساله ( $N=65$ )

حداکثر $S_H$	حداقل $X_L$	R	دامنه تغییرات	انحراف استاندارد SD	میانه MD	میانگین MN	شاخص
							متغیر
۱۸۶	۱۰۳	۳۳		۶/۲۵	۱۷۳	۱۷۴	قد (cm)
۹۹	۵۰	۴۹		۱۰/۲۰	۶۴	۶۵/۳	وزن (Kg)
۳۰	۵	۲۵		۰/۹	۱۷	۱۷	کشش بارفیکس (N)
۵۵	۲۳	۳۲		۷	۳۷	۳۶	دراز و نشست (N)
۵۶	۲۸	۲۸		۶	۴۲	۴۱	پرش در جا (Cm)
							دو رفت و برگشت $15 \times 2$
۷/۳۴	۵/۵۳	۱/۸۱		۰/۳۹	۶/۲۱	۶/۲۵	(Sec)
۸/۳۸	۶/۰	۲/۳۸		۰/۰	۷/۰۲	۶/۹۵	دو ۵۰ یارد سرعت (Sec)
۱۰/۴۰	۶/۳۰	۴/۱۰		۰/۹۳	۷/۳۷	۷/۷۰	یک مایل دویدن و راه رفتن (Min)-(Sec)

جدول ۳- توصیف شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای اندازه گیری شده بروی

دانشجویان گروه سنی ۲۴ ساله و بیشتر ( $N=51$ )

حداکثر $X_H$	حداقل $X_L$	R	دامنه تغییرات	انحراف استاندارد SD	میانه MD	میانگین MN	شاخص
							متغیر
۱۸۴	۱۶۰	۲۴		۶/۲۰	۱۷۳	۱۷۳	قد (cm)
۸۳	۴۶	۳۷		۸/۸۷	۶۶	۶۳	وزن (Kg)
۳۲	۸	۲۴		۰/۶	۱۸	۱۸	کشش بارفیکس (N)
۵۱	۲۱	۳۰		۷	۳۳	۳۳	دراز و نشست (N)
۵۴	۲۰	۳۴		۶	۴۰	۴۲	پرش در جا (Cm)
							دو رفت و برگشت $15 \times 2$
۸/۳۷	۵/۱۴	۳/۲۳		۰/۶۵	۶/۴۴	۶/۵۳	(Sec)
۸/۱۲	۶/۱۷	۱/۹۰		۰/۴۳	۹/۹۵	۶/۹۹	دو ۵۰ یارد سرعت (Sec)
۹/۰۱	۶/۱۹	۳/۳۹		۰/۷۷	۷/۴۵	۷/۶۶	یک مایل دویدن و راه رفتن (Min)-(Sec)

جدول ۴- توصیف شاخص‌های مرکزی و پراکندگی متغیرهای اندازه گیری شده بر روی  
دانشجویان گروه سنی ۲۲ ساله و کمتر تا ۲۴ سال و بیشتر ( $N=182$ )

$X_H$	$X_L$	R	دامتنه تغییرات	انحراف استاندارد	میانه	میانگین	شاخص متغیر
۱۹۰	۱۰۳	۴۲		۶/۷۰	۱۷۳	۱۷۴	قد (cm)
۹۹	۴۶	۵۳		۹/۲۵	۶۴/۰	۶۴/۵	وزن (Kg)
۴۰	۰	۳۵		۶/۴	۱۸	۱۸	کشش بارنیکس (N)
۵۵	۱۸	۳۷		۷	۳۶	۳۶	دراز و نشست (N)
۵۶	۳۶	۲۰		۶	۴۲	۴۲	پرش در جا (Cm)
							دورفت و برگشت $15 \times 2$
۸/۳۸	۰/۱۴	۳/۲۴		۰/۰	۶/۱۲	۶/۲۳	(Sec)
۸/۳۸	۰/۷۸	۲/۶۰		۰/۴۹	۶/۷۹	۶/۸۶	دو ۵۰ یارد سرعت (Sec)
۱۰/۴۰	۶/۰	۴/۴۰		۰/۸۵	۷/۴۰	۷/۶۲	یک مایل دویدن و راه رفتن (Min)-(Sec)

بر اساس یافته‌های جدول ۴، میانگین تست اصلاح شده دراز و نشست ۳۶ و انحراف استاندارد آن ۷ گزارش شده است. با توجه به مقایسه آن با نتایج تحقیقات مشابه در جدول ۵ میانگین نتایج آزمون دراز و نشست این تحقیق از میانگین نتایج آزمون دراز و نشست تحقیقات دیگر کمتر است. به علاوه حد نصاب دراز و نشست در هنجار جایزه کانادا برای سطوح آمادگی جسمانی ۲۰، ۲۱ و ۲۳ به ترتیب ۴۴، ۳۷ و ۵۲ تکرار در نظر گرفته شده است (۱۶). در هنجار بهترین بدن آهپرد (۱۹۸۸)، حد نصاب ۴۴ دراز و نشست به عنوان شاخص مطرح شده است (۴). در هنجار آمادگی نگار، حد نصاب ۴۰ تکرار، بر آمادگی استقامت عضلات شکم تأکید دارد (۴).

جدول ۵ - توصیف شاخص‌های مورخی و پراکنگی تحقیقات انجام شده

YMCA	AHPERD	نمایزی‌زاده	محروم‌زاده - حسین‌زاده	حکمی زنجانی	آفریدش	اهوری‌ش	امیر‌شاپش	تحقیقات
1989	1980	۷۵-۷۶	۷۴-۷۵	۱۱۷۰	۱۳۶۶	۱۲۶۳		
۳۷	۴۶	۳۰	۴۱	۴۰	۳۵	۳۶	۳۶	میانگین
-	-	-	۸	-	-	-	-	انحراف استاندارد
۱۷	۲۰	۱۵	۱۰	۱۴	۱۶	۷		حداقل
۵۵	۶۲	۴۵	۵۰	۵۸	۵۵	۴۴		حداکثر

جدول ۶ - هنگار درصدی آزمون‌های جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد

درصد	یک مايل	پاره سرعت	۱۰×۲ متر	پرش درجہ	دراز و نشست	کشش بارفیکس	درصد
۱۰۰	۶/۰	۵/۷۸	۵/۱۴	۵۶	۵۵	۴۰	۱۰۰
۹۰	۶/۳۲	۶/۱۶	۵/۰۹	۵۴	۴۷	۳۰	۹۰
۹۰	۶/۰۴	۶/۲۶	۵/۰۱	۵۱	۴۴	۲۷	۹۰
۸۰	۷/۰۰	۶/۳۴	۵/۰۰	۵۰	۴۳	۲۳	۸۰
۸۰	۷/۱۰	۶/۴۱	۵/۰۱	۴۸	۴۲	۲۲	۸۰
۷۰	۷/۱۴	۶/۴۷	۵/۰۰	۴۶	۴۱	۲۲	۷۰
۷۰	۷/۱۹	۶/۰۳	۵/۰۲	۴۰	۴۰	۲۰	۷۰
۶۰	۷/۲۲	۶/۰۶	۶/۰۰	۴۰	۴۰	۲۰	۶۰
۶۰	۷/۲۸	۶/۶۴	۶/۰۰	۴۴	۳۸	۱۹	۶۰
۵۰	۷/۳۱	۶/۷۴	۶/۰۰	۴۳	۳۷	۱۸	۵۰
۵۰	۷/۴۰	۶/۷۹	۶/۱۲	۴۲	۳۶	۱۸	۵۰
۴۰	۷/۴۴	۶/۸۳	۶/۰۰	۴۲	۳۵	۱۷	۴۰
۴۰	۷/۰۰	۶/۹۴	۶/۰۰	۴۰	۳۴	۱۶	۴۰
۳۰	۷/۷۹	۷/۰۰	۶/۳۰	۴۰	۳۳	۱۰	۳۰
۳۰	۸/۱۰	۷/۰۰	۶/۴۴	۳۹	۳۳	۱۴	۳۰
۲۰	۸/۲۰	۷/۱۶	۶/۰۱	۳۸	۳۲	۱۳	۲۰
۲۰	۸/۳۰	۷/۲۶	۶/۰۳	۳۸	۳۰	۱۲	۲۰
۱۰	۸/۴۳	۷/۳۹	۶/۶۲	۳۵	۲۸	۱۱	۱۰
۱۰	۸/۰۱	۷/۰۹	۶/۹۱	۳۵	۲۰	۱۰	۱۰
۰	۹/۳۳	۷/۶۰	۷/۱۱	۳۲	۲۳	۸	۰

## بحث و نتیجه گیری

- ۱- بر اساس یافته های جدول ۴، میانگین قد نمونه آماری این تحقیق ۱۷۴ و انحراف استاندارد آن ۶/۶ سانتی متر است که در مقایسه با تحقیق مشابه بر روی دانشجویان علوم پزشکی زنجان (۵) و دانشجویان دانشگاه ارومیه ( $\bar{X} = ۱۷۱/۶۴$ ) (۶)، دانشجویان نمونه آماری قد بلندتر بوده اند.
- ۲- یافته های جدول ۴ نشان می دهد، میانگین وزن نمونه آماری این تحقیق ۶۴/۵ و انحراف استاندارد آن ۹/۲ کیلوگرم است که در مقایسه با تحقیق مشابه بر روی دانشجویان علوم پزشکی زنجان (۵) و دانشجویان دانشگاه ارومیه ( $\bar{X} = ۶۵/۴۸$ ) (۶)، دانشجویان نمونه آماری سبک وزن تر بوده اند.
- ۳- بنابر یافته های جدول ۴، میانگین و نقطه ۵۰ درصدی هنجار آزمون اصلاح شده کشش بارفیکس، ۱۸ و انحراف استاندارد آن ۶/۴ گزارش شده که کمترین حد نصاب ۵ و بیشترین ۴۰ تکرار بوده است. در حالی که در جداول هنجار درصدی، نقطه ۵۰ متعلق به مردان و زنان دانشگاهی به ترتیب ۳۰ و ۱۱ تکرار بوده است (۱۷).
- ۴- مقایسه نتایج نشان می دهد که دانشجویان نمونه آماری از قابلیت استقامت عضلات کمر بند شانه ای ضعیف تری برخوردار بوده اند. در هر حال، به دلیل اینکه کمترین حد نصاب در این آزمون ۵ تکرار بوده است، این آزمون در مقایسه با آزمون کشش بارفیکس (AAHPERD) از قدرت تمیز بالایی برخوردار است (۱۷).
- ۵- بر اساس یافته های جدول ۴، میانگین از مون پرش درجا ۴۲ و انحراف استاندارد آن ۶ سانتی متر است، این مورد در تحقیق مشابه بر روی دانشجویان دانشگاه ارومیه (۶)،  $\bar{X} = ۴۹$ ،  $SD = ۸$  گزارش شده است (۶). بنابراین هنجار ارائه شده توسط Friermood. H.T. درصدی ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ برای مردان ۱۸ تا ۳۴ سال به ترتیب ۲۳، ۳۳، ۴۰، ۴۸، ۵۸ و ۶۱ سانتی متر گزارش شده است (۱۷). بر اساس یافته های تحقیق جدول ۶، حد نصاب معادل با نقطه های درصدی فوق به ترتیب ۳۹، ۴۵، ۴۴، ۴۲، ۴۰، ۳۹ و ۴۸ سانتی متر گزارش گردیده است. نتایج نشان می دهد که دانشجویان نمونه آماری در مقایسه با دانشجویان دانشگاه ارومیه از قابلیت قدرت انفجاری پایین تری برخوردار بوده اند، علاوه بر این، دانشجویان نمونه آماری در نقاط درصدی پایین تر از ۵۰، وضعیت بهتری داشته اند و در نقاط درصدی بیش از ۵۰ وضعیت مناسبی استنباط نمی شود (۱۷).

۶- بر اساس یافته‌های جدول ۴، میانگین تست دو رفت و برگشت  $15 \times 2$  متر،  $15 \times 2 / 23$  ثانیه و انحراف استاندارد آن  $5 / 0$  ثانیه گزارش شده است. بنابر یافته‌های جدول ۶، مرتبه‌های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصدی به ترتیب با  $5 / 85$ ،  $6 / 12$  و  $5 / 51$  ثانیه برابر است. از آنجا که توزیع نمرات تست دو رفت و برگشت به سمت راست متمایل است، چنین استنباط می‌شود که قابلیت چابکی عمومی بیش از ۵۰ درصد افراد نمونه آماری کمتر از شاخص میانگین است.

۷- بر اساس یافته‌های جدول ۴ میانگین تست دو  $50$  یارد سرعت  $6 / 86$  دقیقه و انحراف استاندارد آن  $49 / 0$  ثانیه است. برابر با یافته‌های جدول ۶، مرتبه‌های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصدی به ترتیب با  $7 / 16$ ،  $6 / 79$  و  $6 / 47$  ثانیه برابر است. حال آنکه بر اساس هنجار تست آهپر، حد نصاب برابر با مرتبه‌های فوق به ترتیب عبارتند از:  $7 / 0$ ،  $6 / 6$  و  $6 / 3$  ثانیه (۱۷). به علاوه مطابق با هنجار جایزه کانادا برای سطوح آمادگی جسمانی ۲، ۱ و ۳، به ترتیب  $1 / 7$ ،  $5 / 6$  و  $2 / 6$  ثانیه در نظر گرفته شده است (۱۶). با مقایسه نتایج چنین استنباط می‌شود که دانشجویان نمونه آماری از نظر سرعت عمومی ضعف داشته‌اند.

۸- بر اساس یافته‌های جدول ۴، میانگین تست ۱ مایل دویدن - راه رفتن  $7 / 62$  دقیقه و انحراف استاندارد آن  $15 / 0$  دقیقه گزارش شده است. در تحقیق مشابه بر روی دانشجویان دانشگاه ارومیه  $\bar{X} = 7 / 37$  و  $SD = 0 / 97$  دقیقه گزارش شده است (۶). مقایسه یافته‌های جدول ۶ و هنجار آهپر، نشان می‌دهد که دانشجویان نمونه آماری از استقامت قلبی - عروقی خوبی برخوردار نبوده‌اند. در هنجار آهپر، مرتبه‌های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصدی به ترتیب با  $26 / 8$ ،  $25 / 7$  و  $36 / 6$  دقیقه، حال آنکه در هنجار نمونه آماری، این مرتبه‌ها به ترتیب  $25 / 8$ ،  $40 / 7$  و  $14 / 7$  دقیقه برابرند (۱۷).

۹- با مقایسه میانگین نتایج تست‌های مشترک بین هرسه گروه سنی شرکت‌کننده، ملاحظه گردید که با افزایش سن از ۲۲ به ۲۴ سال و بیشتر، در تمامی مواد حد نصاب تست‌ها به تدریج افت داشته‌اند. به‌ویژه، روند افت در تست‌های دوراز و نشست، دو رفت و برگشت، دو سرعت و دو یک مایل محسوس‌تر بوده است.

به‌طور کلی، نتایج تحقیق بیانگر آن است که عملکرد گروه نمونه ما بر روی تست‌های آمادگی جسمانی و حرکتی در مقایسه با هنجارهای داخلی (هنجار درصدی آزمون عملی داوطلبان ورود به دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی) و خارجی در سطح پایین‌تر قرار دارند. این یافته‌ها بیش از هر چیز، توجه به اهمیت آمادگی جسمانی و حرکتی و نقش آن در سلامت روحی و جسمی را متجلی می‌سازد.

## منابع و مأخذ

- ۱- آفرینش، اکبر. «بررسی وضعیت آمادگی جسمانی داوطلبان ورود به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی»، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۰.
- ۲- آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی.
- ۳- اشرفی، منصور. «ارزش طبی ورزش». اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، چاپ سوم، اسفند ۱۳۶۶.
- ۴- بوم گارتner، تد ای. جکسون، آندرواس. «سنجهش و اندازه گیری در تربیت بدنی» (ج ۱ و ۲)، حسین سپاسی و پریوش نوربخش، انتشارات سمت، ۱۳۷۶.
- ۵- حکمی، محمود. «بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی زنجان»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۷۴-۷۵.
- ۶- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، نشریه حرکت، سال دوم، شماره ۴، بهار ۱۳۷۹.
- ۷- دبورآ، وست. بوجر، چارلز. «مبانی تربیت بدنی و ورزش»، احمد، آزاد، کمیته ملی المپیک، چاپ اول، بهار ۱۳۷۴.
- ۸- ستاری، اسفندیار. یلدایی، سرخدرون. آزاد، حسین. نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم، شماره سوم، بهار ۱۳۵۷.
- ۹- عطارزاده حسینی، رضا. «جزوه درسی سنجهش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی»، واحد چاپ و تکثیر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مهر ماه ۱۳۷۸.
- ۱۰- فرویلی. «اعتبار نمره آزمون عملی در پیش بینی موفقیت تحصیلی تمامی دانشجویان پذیرفته شده دوره کارشناسی دانشکده تربیت بدنی در سال ۱۳۵۶، ۱۳۶۲». ۱۳۶۲.
- ۱۱- گائینی، عباسعلی. «تهیه و تدوین نورم ملی دو ۵۴۰ متر دور زمین والیبال و ارزیابی آمادگی قلبی و تنفسی دانش آموزان»، ۱۳۷۰.
- ۱۲- مظفری، احمد. «مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه»، تربیت بدنی عمومی، انتشارات سمت، ۱۳۶۷.
- ۱۳- نمازی زاده، مهدی. سلحشور، بهمن. «تربیت بدنی»، انتشارات سمت، ۱۳۶۶.

- ۱۴- ورزش دانشگاه انقلاب. ماهنامه علمی - تحلیلی، آموزشی، شماره ۱۴۵، آبان و آذر ۱۳۷۷.
- ۱۵- هادوی، فریده. «بررسی وضعیت آمادگی جسمانی و قابلیت حرکتی داوطلبان ورود به دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم»، ۱۳۶۵.

**16- Mathews, D.K. "Measurment in Physical Education Sander Company", 1978.**

**17- Safrit, M.J "Measurment in Physical Education & Exercise Science". Mosby College Publishing, 1986.**

