



نقش متغیرهای خانوادگی در پدیده آیی اختلال کاربرد نابجای مواد

دکتر محمد علی بشارت^{*}، دکتر محمود میرزمانی^{**}، دکتر رضا پور حسین^{***}

چکیده

هدف: با توجه به نقش مؤثر متغیرهای خانوادگی در پدیده آیی، تداوم و درمان اختلالهای روان شناختی و سامیت ارتباط آنها با اختلال کاربرد نابجای مواد و نظر به اهمیت این ارتباط در برنامه ریزی های درمانی و راهبردهای پیشگیری آن، بررسی حاضر انجام شده است. روش: در این پژوهش ویژگیهای خانوادگی و نقش این متغیرها در پدیده آیی اختلال مصرف مواد در ۲۴ مرد معتاد به مواد مخدر که طی یک دوره دو ساله به پک مطب خصوصی مراجعه کرده اند، بررسی شده است. یافته ها: این بررسی نشان داد که اختلالهای مصرف مواد با کیفیت روابط خانوادگی، فزون حمایتگری پدر و مادر و وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده ارتباط دارند. همچنین آزمودنیهایی که با پدر و مادر هر دو زندگی می کنند از نظر متغیرهای فزون حمایتگری مادر، سر شروع، نخستین تجربه های مصرف مواد، سر اعتیاد به مواد و حرمت خود تفاوت معنی داری با آزمودنیهایی داشته اند که تنها با مادر خود زندگی می کرده اند. نتایج: بر اساس نتایج این پژوهش، تحمل واقعی یا نمادین بار سنگین مستولیهای زندگی بزرگسرا به دلیل نبود پدر و وجود مادر فزون حمایتگر از یک سو و تقویت اعتماد به نفس (خود) کاذب وی به دلایل پیش گفته یا بر اثر موقعیت نسبتاً ممتاز اقتصادی - اجتماعی پدر (خانواده) از سوی دیگر از ویژگیهای خانوادگی معتادان جوان به شمار می رود.

Andeesheh
Va
Raftar
اندیشه و رفتار
۴۶

کلید واژه: اعتیاد، اختلال مصرف مواد، خانواده، فزون حمایتگری

درمان اختلال کاربرد نابجای مواد تأثیر

مقدمه می گذارند. در پژوهشها بالینی متغیرهای چندی

متغیرهای گوناگونی بر پدیده آیی، تداوم و به منزله متغیرهای پیش بین در زمینه اختلال

* دکتری تخصصی روانشناسی بالینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه روانشناسی، تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۴۵۶

** دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، گروه روانشناسی، تهران، خیابان ملاصدرا، بیمارستان بقیه ا.

*** دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۴۵۶

۳- پیوندهای ضعیف خانوادگی.
 اقتدارگرایی و انضباط متناقض و سنت
 والدین، کیفیت ضعیف و نامناسب، تعامل والدین
 با فرزندان و آرزوها و انتظارات پایین برای
 فرزندان از ویژگیهای مدیریت ضعیف خانوادگی
 به شمار می‌رسند و احتمال گرایش جوان به مواد
 را افزایش می‌دهند. تعارض خانوادگی نیز به
 شکل‌های متفاوت ناهمسازی و درگیریهای
 زناشویی و جدایی را افزایش داده، اعتماد شخصی
 و مهارتهای اجتماعی فرزندان را کاهش می‌دهد و
 آنها را با خطر پناه بردن به مواد در رویارویی با
 این استرسها روبرو می‌سازد (RiecharDSon, ۱۹۹۳؛
 نیوکام و هارلو^{۱۳}, ۱۹۸۶). این ویژگیهای
 خانوادگی تشکیل پیوندهای میان والدین -
 کودک را بازداری نموده، آسیب پذیری کودکان
 را افزایش می‌دهند. یافته‌های بالینی مصرف بیشتر
 مواد را میان اعضای خانواده‌هایی که دارای
 روابط صمیمی میان پدر و مادر و فرزندان نیستند
 و پیوندهای ایمن را تجربه نکرده‌اند، تأیید
 می‌کنند (جسور^{۱۴} و جسور، ۱۹۷۷؛ کندل^{۱۵},
 ۱۹۸۰). روابط خانوادگی گرم، صمیمی و
 حمایتگر فرزندان را از افتادن به دام مواد دور می
 کنند (NioKam و RiecharDSon, ۲۰۰۰). در پژوهش
 حاضر نقش حمایت بیش از حد مادر، وضعیت
 اقتصادی - اجتماعی خانواده و کشمکش‌های

کاربرد نابجای مواد بررسی شده‌اند (NioKam^۱ و
 RiecharDSon^۲, ۲۰۰۰). لستیری^۳ (۱۹۸۵) این
 متغیرها را به چهار دسته تقسیم کرده است:
 ۱- محیط فرهنگی - اجتماعی،
 ۲- عوامل بین شخصی (خانواده، مدرسه و
 همسالان)،
 ۳- متغیرهای روانی - رفتاری (شخصیت،
 بازخوردها و فعالیتها)،
 ۴- تأثیرات زیستی - ژنتیکی (Lstiriy, ۱۹۸۵؛
 NioKam, ۱۹۹۵؛ هاکینز^۴، کاتالانو^۵، میلر^۶,
 ۱۹۹۲).

یافته‌های پژوهشی نقش بینایین متغیرهای
 گوناگون مربوط به کنش وری و رفتار خانوادگی
 را در دو زمینه پیشگیری و پدید آیی اختلالهای
 کاربرد نابجای مواد نشان داده‌اند (NioKam, ۱۹۹۲).
 گستره و ژرفای نفوذ و تأثیرگذاری متغیرهای
 خانوادگی بر حسب اهمیت آنها از زاویه‌های
 گوناگون بررسی شده‌اند. این متغیرها از راه
 فرایندهای اجتماعی شدن درون خانوادگی،
 سرمشق گیری و تقلید از رفتار والدین، تقویت
 اجتماعی، درونی سازی ارزشها و رفتارهای
 خانواده، شیوه‌های کنترل اجتماعی و انضباطی
 والدین برآمادگی فرزندان برای کاربرد نابجای
 مواد اثر می‌گذارند (NioKam و RiecharDSon, ۲۰۰۰).
 گستگی خانواده، کیفیت روابط والدین -
 کودک، حمایت والدین، بازخوردها و
 محدودسازیهای والدین در مورد کاربرد نابجای
 مواد نیز از متغیرهای شناخته شده هستند
 (جانسون^۷، پندیانا^۸, ۱۹۹۱؛ نیدل^۹، سو^{۱۰},
 دوهرتی^{۱۱}, ۱۹۹۰؛ NioKam و بتلر^{۱۲}, ۱۹۸۸a, b,
 ۱۹۸۸). هاکینز و همکاران (۱۹۹۲) برای
 خانواده سه وضعیت قائل شده‌اند:

- ۱- مدیریت ضعیف، متناقض و ناپایدار خانواده،
- ۲- درگیریهای خانوادگی،

برای ترک مواد مخدر مورد استفاده آنها و پیامدهای کاربرد مواد است.

مصاحبه بالینی: این مقیاس یک مصاحبه نیمه ساخت دار است که با الهام از مصاحبه بالینی خانوادگی کینستن^۱ و لودر^۲ (۱۹۸۴) و بر پایه اصول مصاحبه گری سیستمی تدوین شده است. این مصاحبه با هدف آشکارسازی الگوی تعامل درون سیستمی، اعضای خانواده را به تعاملهای خودخواسته بر می انگیزد. مجموعه‌ای از پرسشها، این فرصت را در اختیار اعضای خانواده فراهم می‌دهند تا نگرشها، شباهت‌ها، نفاوت‌ها، تعارضها، نقش‌ها، مسئولیت‌ها، درجات استقلال و وابستگی، مشکلات، راه حل‌ها، سلسله مراتب، مرزها، ائتلاف‌ها، فاصله‌ها، رابطه‌ها و تعامل‌های درون خانوادگی را توصیف کنند. این مقیاس در راستای دو محور اصلی فاصله و سلسله مراتب، زیر مقیاسهای فرزون حمایتگری، تعارض و اعتماد به نفس (خود)^۳ و اقتدارگرایی اعضای خانواده را می‌سنجد.

یافته‌ها

ویژگیهای بالینی و خانوادگی آزمودنیها نشان می‌دهند که ۵۸٪ از معتادان (۱۶ نفر) بدون پدر و ۸/۳٪ (۲ نفر) بدون مادر، ۳۳/۳٪ (۸ نفر) با پدر و مادر خود زندگی می‌کنند. وضعیت اقتصادی ۸/۴۵٪ خانواده‌ها (۱۱ نفر) ضعیف؛ ۳/۲۳٪ نفر) متوسط و ۸/۲۰٪ (۵ نفر) خوب تا عالی است (جدول ۱).

خانوادگی در افزایش احتمال اختلالهای کاربرد نابجای مواد بررسی شده است.

روش

آزمودنیهای پژوهش ۲۴ مرد معتاد به مواد مخدر (تریاک و هروئین) بودند که به همراه ۳۵ عضو خانواده (۲۲ مادر، ۱۰ پدر، ۳ همسر) برای دریافت خدمات درمانی طی یک دوره دو ساله به یک مطب خصوصی در تهران مراجعه کردند. معیار شرکت آزمودنیها در پژوهش، داشتن معیارهای تشخیصی DSM-IV (۱۹۹۴، انجمان روانپزشکی امریکا) در مورد اختلال وابستگی به مواد بود. جدول ۱ ویژگیهای بالینی و خانوادگی آزمودنیها را نشان می‌دهد. میانگین سنی آزمودنیهای پژوهش ۲۶/۹ (انحراف معیار ۳/۹۹ و دامنه ۲۱-۳۵ سال)، میانگین سن شروع مصرف مواد ۱۹ سال (انحراف معیار ۱/۱۷، با دامنه ۱۷-۲۲ سال) و میانگین سن شروع اعتیاد، ۲۲/۹ (با انحراف معیار ۱/۹۴ و دامنه ۲۰-۲۷ سال) بوده است.

برای گردآوری داده‌ها در مرحله نخست با بررسی ویژگیهای فردی و خانوادگی آزمودنیها به کمک تکمیل پرسشنامه اختلال کاربرد نابجای مواد و اجرای مصاحبه با خانواده آغاز شد. پس از بررسیهای مقدماتی تشخیصی و بالینی، جلسه‌های خانواده درمانگری سیستمی و شناخت درمانگری تحلیلی با فاصله یک هفته تا ۴ جلسه ادامه یافت. ابزار به کار برده شده در این پژوهش

به شرح زیر بود:

پرسشنامه اختلال کاربرد نابجای مواد: این پرسشنامه دارای پرسش‌هایی در زمینه ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها (از جمله سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و شغل)، نوع مواد، میزان مصرف، مدت مصرف، اقدامات قبلی

جدول ۱- ویژگیهای بالینی و جمعیت شناختی افراد مبتلا به اختلالهای مصرف مواد

متغیر	متغیر	فراوانی	درصد
اقدامات درمانی قبلی	-	۱۷	۷۱
اولین مراجعه	-	۷	۲۹/۲
زندگی همراه با	مادر	۱۴	۵۸
پدر	پدر	۲	۸/۳
پدر و مادر	پدر و مادر	۸	۳۲/۳
همسر	همسر	۳	۱۲/۰
وضعیت اقتصادی	ضعیف	۱۱	۴۰/۸۳
متوسط	متوسط	۸	۳۳/۳
عالی	عالی	۶	۲۰/۸۳
وضعیت تحصیلی	بالاتر از دیپلم	۴	۱۷/۷
دیپلم	دیپلم	۷	۲۹/۱۶
وضعیت شغلی	زیردیپلم	۱۳	۵۶/۱۶
بیکار	بیکار	۸	۳۳/۳
پاره وقت	پاره وقت	۱۳	۵۶/۱۶
محصل	محصل	۳	۱۲/۰
وضعیت تأهل	مجرد	۱۹	۷۹
متاهل	متاهل	۳	۱۲/۰
مطلقه	مطلقه	۲	۸/۳

مقایسه دو گروه بر حسب نمره اعتماد به نفس(خود) آزمودنی ها نشان داد که میانگین نمره اعتماد به نفس(خود) گروه اول (انحراف معیار = ۱/۰۹ و میانگین = ۴/۱۴) از گروه دوم (انحراف معیار = ۱/۰۳ و میانگین = ۳/۷۵) بیشتر بود، اما تفاوت میانگین ها از نظر آماری معنی دار نبود. با توجه به ناهمگن بودن گروه دوم از نظر وضعیت اقتصادی آزمودنیهای سه گروه اقتصادی ضعیف، متوسط و عالی بر حسب نمره اعتماد به نفس مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمره اعتماد به نفس(خود) در اعضای گروه های اول و سوم(ضعیف و عالی) از نظر آماری معنی دار نیست. اما تفاوت میانگین نمره اعتماد به نفس(خود) گروه دوم با هر یک از این دو گروه

نتایج تحلیل واریانس (MANOVA) برای مقایسه دو گروه آزمودنیهایی که تنها با مادر زندگی می کنند و آزمودنیهایی که با پدر و مادر هر دو زندگی می کنند در مورد متغیرهای فزون حمایتگری مادر، من شروع نخستین تجربه های مصرف مواد، من اعتیاد به مواد و حرمت خود نشان داد که بین دو گروه در سه متغیر نخست (P<0/01) تفاوت معنی دار وجود دارد. (فزوون حمایتگری مادر: P<0/01 و df=۱ و ۲۰ و F=۸/۸۵؛ من اعتیاد: P<0/01 و df=۱ و ۲۰ و F=۲۶/۱ و df=۱ و ۲۰ و F=۷/۹۱). مادران شروع اول بیش از مادران گروه دوم نسبت به گروه اول بیش از مادران گروه دوم نسبت به فرزندان حمایتگر بوده اند و من شروع مصرف مواد و من اعتیاد در گروه اول پایین تر از گروه دوم می باشد (جدول ۲).

جدول ۲- نتایج تحلیل واریانس نمرات آزمودنیهایی که تنها با مادر زندگی کرده‌اند و آزمودنیهایی که با پدر و مادر زندگی کرده‌اند در مورد متغیرهای بالینی و خانوادگی

منبع	مجموع مجذورات	درجات آزادی	میانگین مجذورات	F	سطح معنی‌داری
فروزن حمایتگری مادر	۴/۹۱	۱/۲۰	۴/۹۱	۸/۸۵	.۰/۰۰۷
سن شروع مصرف مواد	۷/۹۵	۱/۲۰	۷/۹۵	۶/۹۱	.۰/۰۱
سن اعیاد	۳۸	۱/۲۰	۳۸	۲۶/۱	<.۰/۰۰۱
اعتماد به نفس(خود)	۰/۷۸	۱/۲۰	۰/۷۸	۰/۶۷	N.S.

خانوادگی، فروزن حمایتگری پدر و مادر و وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده ارتباط دارند. این یافته‌ها با یافته‌های سایر پژوهشها (جانسون و پنديانا، ۱۹۹۱، نيدل و همکاران، ۱۹۹۰، نيوکام و بنتلر، ۱۹۸۸b، ۱۹۸۸a) همسویی دارند. چند تبیین احتمالی در مورد نقش فروزن حمایتگری والدین، به ویژه فروزن حمایتگری مادر در نبود پدر، مطرح می‌شود. نخستین احتمال این است که در نبود پدر، حمایتهاي بيشتر و جبرانی مادر وابستگی‌های کودک را تقویت می‌کند و تحول بهنجار فرآيند جدایی - استقلال را مختل می‌سازد. اين پدیده به خودی خود در سنین استقلال و سنولیت پذیری، زمانی که فشار چشمداشتهای خانواده و اجتماع افزون می‌شود، فرد را شدیداً آسیب پذیر می‌سازد. وابستگی به مواد یکی از پاسخهای وی به این فشارها می‌باشد. پاسخی که فرد را هرچند به صورت زودگذر به آرامش پیش تر تجربه شده در سایه فروزن حمایتگری‌های مادر می‌رساند. این فرض با تبیین‌های نوین روان پویشی در مورد نقش کنش تعادلی وابستگی به مواد در بازگردنان تعادل روانشناختی به هنگام روپارویی با این فشارها نیز همخوانی دارد (برم^۱ و کانزیان^۲، ۱۹۹۷).

معنی دار بود (با گروه اول: $P<0/02$ و $F=11$ و $df=7/10$ ؛ با گروه سوم: $P<0/001$ و $F=15/98$ و $df=11$). آزمون همبستگی پرسون بین نمره‌های فروزن حمایتگری مادر و اعتماد به نفس(خود) آزمودنی‌ها در گروه‌های سه گانه اقتصادی بین این دو متغیر در گروه اقتصادی ضعیف همبستگی مشبت معنی دار نشان داد ($P<0/05$ و $r=0/65$)، اما در دو گروه دیگر همبستگی دو متغیر معنی دار نبود.

نتایج آزمون همبستگی پرسون همچنین نشان داد که بین نمره فروزن حمایتگری مادر با سن شروع مصرف مواد ($P<0/05$ و $r=0/45$) و سن اعیاد آزمودنیها ($P<0/01$ و $r=0/52$) همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. فروزن حمایتگری مادر با سن پایین تر شروع مصرف مواد و اعیاد ارتباط داشت.

ضریب‌های همبستگی پرسون میان نمره‌های آزمودنیها در مقیاس تعارض والدین با اعتماد به نفس(خود)، سن شروع مصرف مواد و سن اعیاد فرزندان نشان داد که تعارض والدین با هیچیک از این متغیرها رابطه معنی دار ندارد.

بحث

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که اختلالهای مصرف مواد با کیفیت روابط

پیشین را مبنی بر وجود همبستگی میان کشمکش‌های پدر و مادر و اختلالهای مصرف مواد را توجیه می‌کند.

به طور کلی یافته‌های بررسی حاضر نشان داد که فراتر از آنچه به عنوان نقش مؤثر متغیرهای خانوادگی از جمله مصرف مواد در والدین (نوع مصرف مواد در والدین، بازخورد والدین در مورد مواد، رفتار کنترل والدین در مورد مواد و مانند آن) و سایر رفتارهای پدر و مادر و خانواده (مديربیت ضعیف، تعارض خانوادگی، پیوندهای ناپایدار و مانند آن) بر اختلالهای مصرف مواد مطرح شده است. این متغیرها از زاویه‌های دیگر نیز بر پدیدآیی اختلالهای مصرف مواد تأثیر می‌گذارند. اعتماد به نفس (خود) کاذب، خواه دستاورد فروزن حمایتگریهای مادر را باشد، خواه دستاورد بازخوردها و چشمداشت‌های خانواده و اجتماع، یا برخاسته از توانمندیهای اقتصادی-اجتماعی خانواده، یکی از مکانیزم‌های اصلی پدید آیی اختلالهای مصرف مواد به شمار می‌رود. این یافته جایگاه و اهمیت نقش متغیرهای خانوادگی را در گرایش به این مشکل مهم اجتماعی نشان می‌دهد. در این راستا بررسی در زمینه راهبردهای پیشگیری مرکز بر متغیرهای خانوادگی تأثیرگذار بر اختلالهای مصرف مواد و راهکارهای درمانی مبتنی بر رویکردهای سیستمی (خانواده درمانگری سیستمی) نقش مهمی در این یافته پیشگیری و درمان گرایش به کاربرد ناجای مواد به ویژه در جوانان خواهد داشت. نداشتن ابزار سنجش استاندارد شده، نبود گروه گواه و کوچک بودن حجم نمونه با دامنه سنی محدود از جمله محدودیتهای این پژوهش هستند.

احتمال دوم این است که فروزن حمایتگری‌های مادر در نبود پدر صرفاً ماهیتی جبرانی ندارند، بلکه به منزله نیازها و چشمداشت‌های شخصی مادر و نشانگر نیاز وی به کودک به عنوان یک جانشین پدر است. این چشمداشت نیز فشار روانی زودهنگامی را به کودک تحمیل می‌کند که می‌تواند واکنشی در برابر آن باشد. وابستگی به موادساز و کاری است برای انکار ناکارآمدی و ناتوانی شخصی (میلو و گلد^۱، ۱۹۸۹)؛ و کوششی برای برقراری مجدد تعادل روانشناختی (برم و کانزیان، ۱۹۹۷).

این شیوه تبیین که سازوکارهای تأثیرگذاری فروزن حمایتگری پدر و مادر را بر اختلالهای مصرف مواد فرزندان بررسی می‌کند با یافته‌های مربوط به آن دسته از آزمودنیها که با پدر و مادر هر دو زندگی می‌کنند و اوضاع اقتصادی عالی برخوردار هستند نیز همواری دارد. نبود همبستگی معنی‌دار میان فروزن حمایتگری مادران و اعتماد به نفس (خود) فرزندان در این دسته از آزمودنیها در تأیید این تبیین است.

میزان کشمکش میان پدر و مادر، کمترین همبستگی را با اعتماد به نفس (خود) و همچنین با سن شروع مصرف مواد و اعتیاد فرزندان نشان می‌دهد. در تبیین این یافته می‌توان گفت که در سایه متغیرهای تعیین کننده و مهمی مانند فروزن حمایتگری والدین و وضعیت اقتصادی-اجتماعی از یک سو و شمار اندک آزمودنیهایی که با پدر و مادر هر دو زندگی کرده‌اند (یک سوم نمونه پژوهش) از سوی دیگر، کمتر امکان بروز تأثیرات کشمکش‌های پدر و مادر بر اعتماد به نفس (خود) کودک به وجود می‌آید. همین احتمال، تفاوت این یافته با یافته‌های پژوهش‌های

منابع

- American Psychiatric Association (1994). **Diagnostic and statistical manual of mental disorders** (4th ed.). Washington, DC: A.P.A.
- Brehm, N. M., & Khantzian, E. J. (1997). Psychodynamics. In J. H. Lowinson, R. Ruiz, R. B. Millman, & J. G. Langrod (Eds.). **Substance abuse: A comprehensive textbook**. Baltimore: Williams & Wilkins.
- Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse problems. **Psychological Bulletin**, 112, 64-105.
- Jessor, R., & Jessor, S. L. (1977). **Problem behavior and psychosocial development**. New York: Academic Press.
- Johnson, V., & Pandina, R. J. (1991). Effects of the family environment on adolescent substance use delinquency, and coping styles. **American Journal of Drug and Alcohol Abuse**, 17, 71-88.
- Kandel, D. B. (1980). Drug and drinking behavior among youth. **Annual Review of Sociology**, 6, 235-285.
- Kinston, W., & Loader, P. (1984). Eliciting whole-family interaction with a standardized clinical interview. **Journal of Family Therapy**, 6, 347-363.
- Lettieri, D. J. (1985). Drug abuse: A review of explanations and models of explanation. **Advances in Alcohol and Substance Abuse**, 4, 9-40.
- Miller, N. S., & Gold, M. S. (1989). Suggestions for changes in DSM-III-R criteria for substance use disorders. **American Journal of Drug and Alcohol Abuse**, 15, 223-230.
- Needle, R. H., Su, S. S., & Doherty, W. J. (1990). Divorce, remarriage, and adolescent substance use: A prospective longitudinal study. **Journal of Marriage and the Family**, 52, 157-169.
- Newcomb, M. D. (1992). Substance abuse and control in the United States: Ethical and Legal issues. **Social Science and Medicine**, 35, 471-479.
- Newcomb, M. D. (1995). Identifying high - risk youth: Prevalence and patterns of adolescent drug abuse. In E. Rahdert, D. Czechowicz, & I. Amsel (Eds.). **Adolescent drug abuse: Clinical assessment and therapeutic intervention**. Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse.
- Newcomb, M. D., & Bentler, P. M. (1988a). Impact of adolescent drug use and social support on problems of young adults: A longitudinal study. **Journal of Abnormal Psychology**, 97, 64-75.
- Newcomb, M. D., & Bentler, P. M. (1988b). The impact of family context, deviant attitudes, and emotional distress on adolescent drug use: Longitudinal latent variable analyses of mothers and their children. **Journal of Research in Personality**, 22, 154-176.
- Newcomb, M. D., & Harlow, L. L. (1986). Life events and substance use among adolescents: Mediating effects of perceived loss of control and meaninglessness in life. **Journal of Personality and Social Psychology**, 51, 564-577.
- Newcomb, M. D., & Richardson, M. A. (2000). Substance use disorders. In M. Hersen, R. T. Ammerman (Eds.), **Advanced abnormal child psychology**. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Richardson, M. A. (1993). **Psychological predictors and consequences of recent drug use among anglo and hispanic children and adolescents: An evaluation of social development theory**. Unpublished doctoral dissertation, University of California, Los Angeles.

Andesheb
Va
Raftari
نهضه و رفاه