

## هنجاريابي مقیاس تجدید نظر شده حافظه و کسلر در شهر شیراز

مریم اورتگی<sup>\*</sup>، دکتر محمد کاظم عاطف وحید<sup>\*\*</sup>، دکتر حسن عثایری<sup>\*\*\*</sup>

### چکیده

**هدف:** هدف اصلی این پژوهش آندازه سازی انتلاق و هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه و کسلر در شهر شیراز، بررسی پایایی و روایی، تهیه جدولها و نمرات هنجاری آن در سنین ۱۶-۶۴ سال بوده است. روش: پس از انجام پژوهش مقدماتی، فرم فارسی پرسشنامه یاد شده تهیه شد. آزمودنیهای پژوهش را ۲۰۵ آزمودنی بهنجار تشکیل داده اند که در چهار گروه سنی ۱۶ سال تمام تا ۶۴ سال و ۱۱ ماه با استفاده از مقیاس یاد شده مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه: داده های به دست آمده از عملکرد آزمودنیهایا به پنج نمره ترکیبی، نمرات استاندارد و پنج شاخص ترکیبی تبدیل گردید. همچنین رتبه های درصدی منطبق با پنج نمره ترکیبی در هر گروه سنی تهیه گردید. پایایی مقیاس به شیوه بازآزمایی محاسبه شد. ضریب های بازآزمایی برای خرد آزمونها و ترکیبها از ۰/۹۸ تا ۰/۹۱ به دست آمد که در حد رضایت بخش می باشد. همچنین خطای معیار اندازه گیری محاسبه شد که پایاترین شاخص، شاخص توجه/تمرکز و سپس شاخص حافظه کلامی بود. به منظور بررسی روایی مقیاس، اجرای مقیاس روی گروه بالینی دارای آسیب حافظه با مشکوک به آن، صورت گرفت. این گروه در پنج شاخص با نمونه هنجاریابی مقایسه شد که نمرات پایین در شاخصهای مقیاس برای گروه بالینی به دست آمد.

### کلید واژه: مقیاس حافظه و کسلر، هنجاریابی، حافظه

\* کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، شیراز، خیابان قرآن، بیمارستان ابن سينا (نویسنده مسئول).

\*\* دکری تخصصی روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. تهران، خ طالقانی، کوچه جهان، پلاک ۱، آنسیتو روانپزشکی تهران.

\*\*\* نورلوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، دانشکده علوم توانبخشی.

## مقدمه

بالینی سودمندی برای ارزیابی ابعاد اساسی کارکردهای حافظه در جوانان و بزرگسالان و به عنوان یک وسیله مرنده<sup>۱۷</sup> تشخیصی در معاینه عصب شناختی عمومی در نظر گرفته شده است (وکسلر، ۱۹۸۷) و بررسیها ساده بودن و کاربردی بودن آنرا در زمینه حافظه عملی برای تفکیک اختلالات عضوی و کنشی حافظه نشان داده‌اند.

فرم تجدید نظر شده مقیاس حافظه وکسلر ادامه نخستین فرم مقیاسهای وکسلر یعنی فرم‌های I و II می‌باشد که توسط استون<sup>۱۸</sup> و همکاران (۱۹۴۶) وکسلر (۱۹۴۵)، وکسلر و استون (۱۹۷۴، ۱۹۹۵) انتشار یافته است. این تجدید نظر تلاش برای از میان برداشتن نارسایی‌های ویرایش اول آزمون یعنی: ۱) نمره بهر حافظه (MQ) ۲) ارزیابی ناکافی حافظه بینایی/غیر کلامی<sup>۱۹</sup> ۳) فقدان سنجش یادآوری تأخیری و ۴) نمونه هنجاری و روش‌های هنجاری‌بایی ناکافی بوده است. تغییرات ایجاد شده در تجدید نظر جدید شامل موارد زیر می‌باشد:

- تهیه هنجارهای طبقه بنده شده در نه سطح سنی.
- تعویض خلاصه عنوان کلی واحد (بهر حافظه با MQ) با پنج شاخص ترکیبی.
- افزودن خرده آزمونهای اندازه‌گیری حافظه شکلی<sup>۲۰</sup> و فضایی<sup>۲۱</sup>.

ارزیابی ویژگیهای رفتاری و روانی یکی از عوامل مؤثر در پیدایش روانشناسی علمی و پیشرفت آن بوده است و امروزه ارزیابی بالینی یکی از جنبه‌های مهم کار بالینی به شمار می‌رود (آناستازی<sup>۲۲</sup>، ۱۳۷۱). گردآوری داده‌های اولیه در روانشناسی به ویژه در بررسی‌های مربوط به تفاوت‌های گروهی و نقش عوامل زیستی و فرهنگی نیازمند به کارگیری آزمونها است. آزمونهای روانشناسی در عین حال به تشخیص نیز کمک نموده و برای درمان نیز راهنمایی کننده هستند (کابلان<sup>۲۳</sup>، سادوک<sup>۲۴</sup>، گرب<sup>۲۵</sup>، ۱۳۷۵).

برای ارزیابی عملکرد حافظه در بیماران روانپزشکی و عصب شناختی نیز ابزارهای گوناگونی در دسترس می‌باشد. این ابزارها برای تشخیص بیماری و پیگیری دراز مدت بیماران در زمینه عملکرد حافظه کاربرد دارند، مانند مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر<sup>۲۶</sup> که وسیله سودمندی برای سنجش حافظه است (اسکوپر<sup>۲۷</sup> و مک کی<sup>۲۸</sup>، ۱۹۹۶). بررسیها نشان داده‌اند که نمره بهر حافظه<sup>۲۹</sup> این مقیاس برای جداکردن بیماران بدون بدکاری<sup>۳۰</sup> مفرزی از بیماران دارای بدکاری مفرزی کاربرد دارد (کوهن<sup>۳۱</sup>، ۱۹۵۰). تلاش‌های بسیاری برای تهیه نظام نمره گذاری ویژه‌ای از نمره‌های خرده آزمونهای WMS-R به متوجه افزایش اعتبار این آزمون به عنوان یک ابزار غربالگری بدکاری مفرزی انجام شده است (بچراج<sup>۳۲</sup>، مایتز<sup>۳۳</sup>، ۱۹۷۴؛ هاوارد<sup>۳۴</sup>، ۱۹۶۶؛ کابلان و همکاران، ۱۳۷۵؛ کیسر-کالول<sup>۳۵</sup>، ۱۹۷۳).

همچنین شیوه مقایسه درصد یادآوری تأخیری در برابر یادآوری فوری کلامی (حافظه منطقی) و تصویری (بازآفرینی بینایی) اطلاعات سودمندی را برای شناسایی برخی بیماران با بدکاری مفرزی فراهم نموده است (بروکس<sup>۳۶</sup>، ۱۹۷۶؛ راسل<sup>۳۷</sup>، ۱۹۷۵a).

مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر ابزار

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل جوانان و بزرگسالان بهنجرار دارای ۱۶ سال تمام تا ۶۴ سال و ۱۱ ماه ساکن شیراز بود که هیچ گونه اختلال روانپزشکی یا نورولوژی در گذشته یا در حال را گزارش نکردند.

نمونه مورد نظر این پژوهش در گروه سنی ۱۶-۱۷ سال از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز و در ۵ گروه سنی دیگر از مناطق شش گانه شهرداری انتخاب گردیدند، تعداد افراد مورد نظر در هر کدام از گروههای سنی با در نظر گرفتن نسبت جمعیت هر ناحیه به جمعیت کل تعیین شد (جدولهای ۱ و ۲).

برای سالین ۱۹-۱۸، ۳۴-۲۵، ۵۴-۴۵ که در آزمون هنجراریابی حضور نداشتند، هنجرارها با شیوه درونیابی<sup>۰</sup> تخمین زده شدند، بنابراین هنجرارهای نهایی جداگانه برای ۷ گروه سنی بین ۱۶ و ۶۴ سال قابل استفاده است.

در نمونه هنجراریابی همانند سایر بررسیهای انجام شده در این زمینه، تقریباً به تعداد مساوی از مرد و زن در هر گروه سنی انتخاب و آزمون شدند (۱۰۷ مرد، ۹۸ زن). وضعیت تحصیلی آزمودنیها، در سه سطح: تا ۱۱ سال تحصیلی، ۱۲ سال و ۱۳ سال یا بیشتر و همچنین

بر اساس سن و جنسیت مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین آزمودنیها پس از اجرای WMS-R به کمک بخشی از مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر بزرگسالان<sup>۱</sup> (وکسلر، ۱۹۸۷) که توسط نصری و همکاران (وکسلر، ۱۳۷۰) ترجمه و آماده گردیده بود، آزمون شدند\*. جدول ۳ میانگین و انحراف معیار هوشی مقیاس WAIS-R را در گروههای سنی نمونه هنجراریابی نشان داده است.

1-delayed recall      2- Prigatano  
3- temporal lobe      4- hippocampal areas  
5- interpolation

6- Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R)

\* لازم به ذکر است که به علت عدم وجود نرم ایرانی برای گروه ۶۴-۵۵، تست وکسلر بر روی این گروه انجام نشد.

- افزودن اندازه‌گیریهای یادآوری تأخیری.
- تجدیدنظر در روش‌های محاسبه نمره برای چند خرده آزمون در جهت بهبود دقت نمره گذاری (وکسلر، ۱۹۸۷).

اگرچه انتقاداتی بر این مقیاس وارد شده است (پریگاتانو، ۱۹۷۸) اما هنوز این مقیاس برای پژوهشگران و متخصصان بالینی در ارزیابی بدکاری حافظه کاربرد گسترده‌ای دارد.

این آزمون اغلب تأثیر آشتفتگی‌های یادزدایی را که مرتبط با آسیب نیمکره مغزی چپ است نشان می‌دهد، به ویژه هنگامی که آسیبها در بخش‌های قطعه گیجگاهی<sup>۲</sup> یا نواحی هیپوکامپ<sup>۳</sup> باشد (همانجا).

همچنین برای ارزیابی کارکردهای حافظه در موقعیتها گوناگون مانند تعیین محل آسیب عضوی مغز و تهیه اطلاعات مفید برای تشخیص بدکاری مغز، پیگیری درمان و تغییرات در وضعیت بیماری و تهیه اطلاعات مناسب برای آموزش و توانبخشی بیماران در نظر گرفته شده است.

از آنجا که آزمونهای روانی وابسته به فرهنگ می‌باشند باید بر پایه فرهنگ حاکم بر آن جامعه ساخته شوند (آناستازی، ۱۳۷۱). مقیاس حافظه وکسلر فرم I (وکسلر، ۱۳۷۰) در ایران ترجمه و تنظیم گردیده و بر روی جمعیت ساکن در شهر تهران در ۹ گروه سنی ( $N=1007$ ) با قابلیت اعتماد ۰/۸۵ هنجراریابی گردیده است (صرامی، ۱۳۷۱). اما در زمینه انطباق و هنجراریابی این مقیاس تا کنون در ایران گزارشی منتشر نگردیده است. بنابراین این پژوهش به منظور هنجراریابی (بررسی اعتبار، پایایی و تهیه جدولهای هنجراری) آزمون تجدید نظر شده حافظه وکسلر بر روی گروهی از جمعیت ایرانی ساکن در شهر شیراز صورت گرفته است.

**روش**  
بررسی حاضر از نوع بررسیهای آزمون سازی است.

جدول ۲- توزیع فراوانی مطلق و نسبی  
آزمودنیهای پژوهش بر حسب نواحی شهرداری  
شهر شیراز، جنس و سن.

گروه سنی						
۷۰-۷۴	۶۵-۶۹	۵۵-۶۴	۳۵-۴۴	۲۰-۲۴	نواحی	
ناحیه ۱						
۵	۵	۶	۴	۵	مرد	
۵	۵	۵	۴	۴	زن	
۱۰	۱۰	۱۱	۸	۹	جمع	
۲۰	۱۹	۲۲	۱۵	۱۸	درصد	
ناحیه ۲						
۸	۸	۷	۶	۷	مرد	
۷	۷	۶	۶	۶	زن	
۱۵	۱۵	۱۳	۱۲	۱۳	جمع	
۳۰	۲۹	۲۵	۲۴	۲۶	درصد	
ناحیه ۳						
۶	۶	۶	۷	۶	مرد	
۵	۵	۵	۶	۶	زن	
۱۱	۱۱	۱۱	۱۳	۱۲	جمع	
۲۲	۲۲	۲۲	۲۵	۲۳	درصد	
ناحیه ۴						
۴	۵	۵	۵	۴	مرد	
۴	۴	۴	۴	۴	زن	
۸	۹	۹	۹	۸	جمع	
۱۵	۱۷	۱۷	۱۸	۱۶	درصد	
ناحیه ۵						
۳	۳	۳	۳	۴	مرد	
۲	۲	۲	۳	۳	زن	
۵	۵	۵	۶	۷	جمع	
۱۰	۱۰	۱۰	۱۲	۱۴	درصد	
ناحیه ۶						
۱	۱	۱	۲	۱	مرد	
۱	۱	۱	۱	۱	زن	
۲	۲	۲	۳	۲	جمع	
۳	۳	۴	۶	۳	درصد	

جدول ۱- توزیع فراوانی مطلق و نسبی  
آزمودنیهای پژوهش در گروه سنی ۱۷-۱۶ سال بر  
حسب جنس و ناحیه های آموزش و پژوهش شهر  
شیراز.

ناحیه ها	تعداد نمونه درصد	پسران (n=۲۶)	
		دختران (n=۲۴)	انتخاب شده
ناحیه ۱	۳۲	۸	۳۵ ۹
ناحیه ۲	۲۳	۵	۲۰ ۵
ناحیه ۳	۲۴	۶	۲۳ ۶
ناحیه ۴	۲۱	۵	۲۲ ۶
کل	۱۰۰	۲۶	۱۰۰ ۲۶

ابزار اندازه گیری بکار رفته در این پژوهش  
به شرح زیر است:

۱- مصاحبه نیمه ساخت دار؛ برای بررسی  
سلامت عمومی آزمودنیها و تشخیص گروه  
بهنجار از گروه بالینی و اینکه افراد دارای هیچ  
گونه اختلال پزشکی، عصب شناختی و  
روانپزشکی نیستند پیش از اجرای آزمون و پس از  
برقراری ارتباط<sup>۱</sup> پرسشهایی در این زمینه از  
آزمودنیها پرسیده شد که در صورت وجود  
اختلال آزمودنی از گروه بهنجار حذف می گردید.

۲- مقیاس تجدید نظر شده حافظه و کسلر  
و کسلر کار خود را روی فرم تجدید نظر شده  
حافظه و کسلر در اوخر سال ۱۹۷۰ آغاز کرد، اما  
توانست تغییرات لازم را پیش از درگذشتن در  
سال ۱۹۸۱ به پایان برساند. مقیاس شامل  
مجموعه ای از خرد های آزمونها (۱۳ خرد ه آزمون)  
است که هر یک جنبه مختلفی از حافظه را  
می منجذد.

تکالیف در مجموعه ای با یک خرد ه آزمون،  
شامل سؤالاتی که به عنوان بخشی از معاینه  
وضعیت روانی<sup>۲</sup> (اطلاعات و جهت یابی) می باشد

ج) تغییر در نام افراد و مکانها، حذف چند ماده در خرده آزمون حافظه منطقی (دانستان A و B) که از نظر فرهنگی با جامعه ایرانی تناسب نداشت و جایگزین کردن ماده‌هایی مطابق با فرهنگ ایرانی.

د) تغییر چهار ماده خرده آزمون تداعی زوجهای کلامی. افزون بر آن ملاک نمره گذاری ماده‌های مقیاس ترجمه و بر پایه تغییرات انجام شده در ماده‌های مقیاس، تغییر داده شد تا با آنها سازگار گردد. کل امتیازات ماده‌های خرده آزمونهای مقیاس با امتیازات و ملاکهای نمره گذاری WMS-R (وکسلر، ۱۹۸۷) منطبق شد.

هیج ماده‌ای از خرده آزمونهای مقیاس حذف نگردید و ماده جدیدی به آن اضافه نشد، و تنها برخی تغییرات لازم منطبق با فرهنگ ایرانی صورت گرفت.

پس از تهیه فرم فارسی WMS-R با در نظر گرفتن دو هدف یعنی:

- ۱- بررسی روش نمونه گیری به کار گرفته شده.
- ۲- بررسی سیزان سازگاری ماده‌های مقیاس با جامعه و فرهنگ ایرانی، مقیاس فراهم آمده روی ۲۲ نفر آزمودنی در تمام گروههای سنی (۱۶-۷۴ ساله) اجرا گردید و پس از آن بررسی اصلی انجام شد.

با انتخاب تصادفی دو دیبرستان پسرانه و دخترانه در هر منطقه آموزش و پرورش و انتخاب تصادفی دانش آموزانی از این مدارس و نیز انتخاب تصادفی یک خیابان اصلی از نواحی شش گانه شهرداری و مراجعه به اولین خیابان فرعی و نخستین خانه در آن خیابان، نمونه‌های اصلی پژوهش انتخاب گردیدند.

داده‌های اولیه به دست آمده از عملکرد آزمودنیها به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. داده‌های اولیه به پنج نمره ترکیبی، نمرات

گنجانیده شده و از آن برای مقاصد سرنده کردن استفاده شده است. هشت خرده آزمون بعد که به دنبال هم می‌آیند بادگیری کوتاه مدت و بادآوری مواد کلامی و تصویری را می‌سنجند. پس از اجرای هشت خرده آزمون، فوراً کوشش‌های بادآوری تأخیری برای چهار تا از خرده آزمونهای دنبال می‌شوند. دو تا از این چهار کوشش نگهداری مواد کلامی و دو خرده آزمون، نگهداری مواد بینایی را آزمون می‌کنند.

در این پژوهش، پس از ترجمه ماده‌های مقیاس، به منظور بررسی مطابقت آن با فرهنگ ایرانی و قوانایی در درک ماده‌ها چند تغییر در

ماده‌های مقیاس به شرح زیر انجام شد:

الف) تغییر در ماده یک و شش خرده آزمون اطلاعات و پرسش‌های جهت یابی که عبارت‌های جایگزین به کار برده شد تا منطبق با فرهنگ ایرانی باشد.

ب) تغییر در ماده دوم خرده آزمون کنترل ذهنی، که در WMS-R اصلی وظیفه آزمودنی بیان حروف الفبای انگلیسی می‌باشد و به گفتن ماههای سال تغییر یافت.

جدول ۳- توزیع فراوانی آزمودنیها پژوهش بر حسب گروه سنی، میانگین سنی و هوشیار کل

#### مقیاس بر پایه فرم کوتاه آزمون WAIS-R

##### هوشیار مقیاس کل

گروه سنی	میانگین سنی	فرافانی	میانگین معیار	اعتراف
۱۶-۱۷	۱۴/۲	۱۰۶	۵۰	۱۰/۱
۲۰-۲۴	۲۱/۸	۱۰۸	۵۴	۱۳/۶
۳۵-۴۴	۳۹	۱۱۶	۵۱	۱۵/۶
۵۵-۶۴	۵۹	—*	۰	—*
تمام سینه	۱۴	۱۱۰	۲۰۵	—

\* برای این گروه سنی آزمون هوشی انجام نشد

## یافته‌ها

پس از انجام تغییر و اصلاحات لازم در ماده‌های مقیاس و انجام بررسی مقدماتی، پاسخنامه فارسی تهیه و مقیاس بر روی نمونه انتخاب شده اجرا شد که نتایج بدست آمده به شرح زیر بوده است:

تهیه جدول هنجار برای سینم ۱۶-۶۴ سال، تعیین ساختار مقیاس، نمرات شاخص برای پنج ترکیب حافظه عمومی، توجه/تمرکز، حافظه کلامی، حافظه بصری و یادآوری تأخیری. دوفرم نمره‌گذاری اصلی که نتایج WMS-R را خلاصه می‌کند برای ترکیب حافظه عمومی و ترکیب توجه و تمرکز در نظر گرفته شد.

شاخصها با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ برای نمرات ترکیب حافظه عمومی و توجه/تمرکز گزارش شدند. این عمل اجازه می‌دهد که ترکیب‌های اصلی WMS-R با هوشپرهاي WAIS-R مقایسه شوند.

میانگین و انحراف معیارهای نمره‌های خام خردۀ آزمونهای WMS-R در گروههای سنی نمونه هنجاریابی در جدول ۴ نشان داده شده است. برای ترکیب نمره‌های خام خردۀ آزمونها، توسط وکسلر (۱۹۸۷) ضرایبی به نمرات خام داده شده و سپس نمرات ترکیب شده‌اند.

مجموع نمره‌های خام برای پنج ترکیب برای اعضاء نمونه هنجاریابی محاسبه گردید و فراوانی توزیع نمرات ترکیبها به طور جداگانه برای چهار گروه سنی نمونه آماده شد. میانگین و انحراف معیارهای ترکیب‌های نمرات خام در گروههای سنی در جدول ۵ داده شده است.

به منظور بهنجارسازی نمرات خام ترکیبها همانطور که گفته شد تبدیل خطی به کار گرفته شد و نمرات معیارهای شاخصهای نهایی در جدول ۵ برای چهار گروه سنی که به عنوان بخشی از نمونه هنجاریابی WMS-R آزمون شدند نشان داده شده است.

استاندارد و پنج شاخص ترکیبی، رتبه‌های درصدی و برآورد درونی نمرات ترکیبی سه گروه سنی ۱۸-۱۹، ۲۰-۳۴ و ۴۵-۵۴ تبدیل گردید.

برای به دست آوردن پنج نمره ترکیبی (حافظه کلامی، حافظه بصری، حافظه عمومی، توجه و تمرکز، یادآوری تأخیری)، نمرات خام خردۀ آزمونها در هر گروه سنی به روش زیر با هم ترکیب گردید.

ترکیب حافظه کلامی: خردۀ آزمون حافظه منطقی I+تداعی زوجهای کلامی I.

ترکیب حافظه بصری: حافظه تصویری+تداعی زوجهای بینایی I+بازآفرینی بینایی I.

ترکیب حافظه عمومی: حافظه کلامی+حافظه بصری. ترکیب توجه/تمرکز: کترل ذهنی+فراخنای اعداد+فراخنای حافظه بینایی.

ترکیب یادآوری تأخیری: حافظه منطقی II+تداعی زوجهای بینایی II+تداعی زوجهای کلامی II+بازآفرینی II+بینایی II.

بررسی پایایی نمرات مقیاس از طریق بازآزمایی روی ۵۰ نفر از آزمودنیها در سینم مختلف با فاصله زمانی چهار تا شش هفته اجرا گردید.

برای تهیه نمرات استاندارد و نمرات شاخص برای پنج ترکیب در هر گروه سنی (چهار گروه سنی) شیوه تبدیل خطی (مگنوسون، ۱۳۷۰) به کار برده شد و رتبه‌های درصدی منطبق با نمرات ترکیبی در هر گروه سنی نیز تهیه شد.

اجرای WMS-R روی یک نمونه بالینی شامل ۳۰ بیمار دارای تشخیص آسیب به حافظه و یا مشکوک به آن صورت گرفت. این افراد با تشخیص‌های افسردگی، دماسن، صرع، سکته و ضربه سر توسط متخصصان نوروولوژی و اعصاب و روان‌مراکز درمانی شهر شیراز معرفی شده بودند و از نظر مدت بستری و بیماری، دارو، شدت بیماری و زیر گروههای تشخیصی کترول شده بودند. این گروه در زمینه پنج شاخص با نمونه هنجاریابی مقایسه شدند.

**جدول ۲- میانگین و انحراف معیار نمودهای خام خوده آزمونها در گروه هنرجاری‌ای بر حسب گروههای سنی مختلف**

گروه سنی	۷۱-۵۰	۵۱-۳۰	۳۱-۱۰	۲۱-۱۱	خوده آزمون
(n=۶۰)	(n=۵۰)	(n=۱۱)	(n=۱۱)	(n=۱۰)	اطلاعات و مسؤولات جهت پذیری
انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین
میانگین	۰/۷	۰/۸	۰/۹	۰/۹	۰/۹
۱/۱	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷
۲	۰/۹	۰/۹	۱	۱	۱
۰/۳	۱/۱	۱/۲	۱/۲	۱/۲	کترل دهن
۰/۱	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	حافظه تصوری
۰/۸	۰/۹	۰/۷	۰/۷	۰/۷	حافظه مطابق
۰/۲	۰/۹	۰/۷	۰/۷	۰/۷	تدابعی زیجای پیمانه
۰/۰	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	تدابعی زیجای کلامی
۰/۲	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	بازآوری پیمانه
۰/۳	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	فراختای اعداد
۰/۰	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	دو به جلو
۰/۱	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	دو به عقب
۰/۲	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	فراختای حافظه پیمانه
۰/۳	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	دو به جلو
۰/۰	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	دو به عقب
۰/۱	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	حافظه مطابق
۰/۲	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	تدابعی زیجای پیمانه
۰/۳	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	تدابعی زیجای کلامی
۰/۰	۰/۷	۰/۷	۰/۷	۰/۷	بازآوری پیمانه

جدول ۵- سیانگین و انحراف معیار شاخصهای ترکیب شده نهایی در آزمودنیهای گروه هنجاریابی بر حسب گروههای سنی

گروههای سنی										خرده آزمونها حافظه عمومی
۵۵-۶۴ (n=۵۰)		۳۵-۴۴ (n=۵۰)		۲۰-۲۴ (n=۵۰)		۱۶-۱۷ (n=۵۰)				خرده آزمونها حافظه عمومی
انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	خرده آزمونها حافظه عمومی						
۱۰/۶	۹۹/۴	۱۶/۵	۹۹/۴	۱۶/۴	۹۸/۶	۱۶/۱	۹۷/۴	۱۷/۶	۹۷	خرده آزمونها حافظه عمومی
۱۶/۰	۹۹/۳	۱۸/۳	۱۰/۱/۲	۱۷/۳	۹۸/۱	۱۷/۶	۹۷	توجه/تمرکز	خرده آزمونها حافظه عمومی	
۱۶/۸	۱۰۰/۲	۱۷/۵	۹۵/۸	۱۷/۵	۹۷/۷	۱۸/۹	۹۷/۹	حافظه کلامی	خرده آزمونها حافظه عمومی	
۱۵/۰	۹۹/۴	۱۷/۳	۹۷	۱۹/۱	۹۶/۶	۱۹/۳	۹۷/۷	حافظه بصری	خرده آزمونها حافظه عمومی	
۱۶/۱	۹۹/۵	۱۶/۱	۹۸/۳	۱۶/۱	۹۷/۴	۱۷/۶	۹۷/۷	پادآوری تأخیری	خرده آزمونها حافظه عمومی	

Andeeshi  
Va  
Rafdar  
اندیشه و رفخار

۶۳

آزمونها شده‌اند و در تفسیر نتایج آزمون باید پایایی‌های پایین و در نتیجه خطاهای معیار اندازه‌گیری بزرگتر این خرده آزمونها را در نظر گرفت.

ارزیابی روایی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر نتایج زیر را نشان داد:

پنج شاخص، برای تفاوت‌های جنسی با استفاده از آزمون  $\alpha$  محاسبه شد. تفاوت بین شاخصهای WMS-R در زنان و مردان به جز شاخص حافظه بصری معنی دار بود. همچنین خرده آزمون اطلاعات و جهت یابی در زنان و مردان تفاوت معنی داری نشان داد ( $P < 0.001$ ). همچنین تحلیل واریانس یک متغیری نمره‌های خام پنج ترکیب WMS-R در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری را در این زمینه نشان داد ( $P < 0.05$ ). این یافته نشان می‌دهد که استفاده کننده از آزمون باید تأثیر سن را در تفسیر نمرات

همان گونه که بیان گردیده‌نچار شاخصهای برای سه گروه سنی ۱۹-۱۹، ۴۵-۴۴، ۲۵-۳۴ که در آزمون هنجاریابی حضور نداشتند با روش برآورد درونی آماده شد.

نتایج هنجار شاخصهای در تمام گروههای سنی دامنه‌ای از ۵۶ تا ۱۳۴ ( $\pm 2\frac{1}{3}$  انحراف معیار از میانگین) را دربر گرفته است. چون افراد بسا بدکاریهای حافظه به طور فراوان نمره زیر محدوده این هنجارها را دارند، هنجارها به طور نزولی<sup>۱</sup> به شاخصهای ۵۰ یا ۳ انحراف معیار زیر میانگین برآورد برونوی<sup>۲</sup> شدند. هنجارهای شاخصهای برای مجموع نمرات خام (نمرات ترکیبی) در چهار گروه سنی تهیه گردید.

بررسی پایایی نمرات مقیاس به کمک بازآزمایی روی ۵۰ نفر از آزمودنیها ضریب‌های پایایی برای خرده آزمونها و ترکیبها را از ۰/۲۸ تا ۰/۹۸ در نوسان نشان داد. گفتگی است که چندین خرده آزمون دامنه نمرات محدود داشتند که موجب کاهش ضرایب پایایی برای این خرده

جدول ۶- میانگین و انحراف معیار شاخصهای پنجگانه برای گروههای بالینی و بهنچار

شاخص	گروه بهنچار		گروه بالینی		نمره *	انحراف معیار	میانگین
	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار			
حافظه عمومی	۸۹/۹	۲۴/۱	۶۲/۱	۲۸/۰	۷/۴۷*		
توجه/تمرکز	۲۸/۶	۸/۶	۱۷/۷	۸/۹	۷۲۸*		
حافظه کلامی	۴۷/۳	۱۲/۲	۲۸/۶	۱۴/۴	۷/۴۷*		
حافظه بصری	۵۱/۶	۱۳/۵	۳۳/۵	۱۶/۱	۷/۵۶*		
یادآوری تأخیری	۶۷/۷	۲۱/۸	۳۷/۲	۲۵/۴	۷/۰۹*		

\*  $P<0.001$

مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر، بررسی پایانی و روایی آن و تهیه جداول و نمرات استاندارد در سالین ۱۶-۶۴ سال در شهر شیراز بوده است.

برای تهیه جدولهای نمرات هنجاری در مورد نمرات ترکیبی و شاخصها و به منظور به دست آوردن پنج نمره ترکیبی (ترکیب حافظه کلامی، حافظه بصری، حافظه عمومی، توجه/تمرکز و یادآوری تأخیری) بر پایه شیوه کار وکسلر نمرات خام خردۀ آزمونها ترکیب شد و پنج نمره ترکیبی به دست آمد که این روش معایب موجود در یک نمره بهر حافظه واحد را از میان می‌برد (پریگاتانو، ۱۹۷۸).

برای بهنچارسازی نمرات خام ترکیبها، تبدیل خطی (مگنوسون، ۱۳۷۰) به کار برده شد و نمرات با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ تبدیل گردید که با استفاده از این روش که شیوه کار وکسلر می‌باشد پنج شاخص ترکیبی به دست آمد.

هنچار شاخصها برای سه گروه سنی ۱۸-۱۹، ۱۸-۳۵، ۲۵-۳۵ که در آزمون هنجاریابی حضور نداشتند با روش درونیابی آماده شد. میتن برگ<sup>۱</sup> و همکاران (۱۹۹۲) برای ارزیابی این شیوه

شاخص در نظر داشته باشد. در نمونه هنجاریابی، سالهای تحصیل به طور معنی داری با تمام پنج شاخص ارتباط داشت ( $P<0.001$ ).

همبستگی با حافظه عمومی، توجه/تمرکز، حافظه بصری، حافظه کلامی و یادآوری تأخیری به ترتیب ۰/۷۲، ۰/۶۸، ۰/۷۵، ۰/۵۴، ۰/۷۳ بود. در بررسی بیشتر ارتباط میان سطح تحصیلات و نمرات WMS-R، تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معنی داری را در سطوح مختلف تحصیلی نشان داد ( $P<0.001$ ).

میانگین و انحراف معیار شاخصهای پنج گانه برای نمونه بالینی و بهنچار در جدول ۶ آرائه شده است. این بررسی نمرات به دست آمده در زمینه شاخصهای WMS-R را در گروه بالینی پایین نشان داد. همچنین گروه بالینی در خرده آزمون اطلاعات و پرسش‌های جهت یابی با استفاده از آزمون t با گروه بهنچار مقایسه شد که تفاوت دو گروه معنی دار بود ( $P<0.001$ ).

هوشبهر کلامی بالاترین همبستگی را با شاخص حافظه کلامی و هوشبهر عملی بالاترین همبستگی را با شاخص حافظه بصری داشت.

Andeeshesh  
Va  
Raffar  
الدبه و رفشار

۶۴

هدف اصلی پژوهش، انطباق و هنجاریابی

بحث

رضایت‌بخش نشان می‌دهد.

همچنین خطای معیار اندازه‌گیری در واحد شاخصها ارائه گردید. پایاترین شاخص، شاخص توجه/تمرکز و سپس شاخص حافظه کلامی بود. این یافته‌ها با یافته‌های وکسلر (۱۹۸۷) همخوانی دارد.

معنی داربودن تفاوت میان شاخص‌های WMS-R در زنان و مردان به جز شاخص حافظه بصری و تفاوت معنی دارمیان خرده آزمون اطلاعات و سؤالات جهت‌یابی در زنان و مردان با یافته‌های پژوهش وکسلر (۱۹۸۷) که تفاوت معنی داری میان شاخصها در زنان و مردان گزارش نکرده است همسو نیست. در زمینه ارتباط نمرات WMS-R با سن و میزان تحصیلات نسایع پژوهش حاضر با نتایج ارائه شده توسط وکسلر (۱۹۸۷) همخوانی داشته و تأثیر معنی دار سن و سالهای تحصیل روی نمرات ترکیبی را نشان داده است، از این رو استفاده کننده آزمون باید تأثیر سن را در تفسیر نمرات شاخص در نظر داشته باشد. همچنین هنگامی که کارکرد حافظه چندان مشخص نباشد گرفتن سطح تحصیل برای تفسیر مهم خواهد بود.

برای ارزیابی روایی مقیاس، WMS-R روی گروههای بالینی نیز اجرا شد و در پنج شاخص با نمونه هنجاریابی مقایسه شد. این مقایسه میانگین نمرات خام گروه بالینی را کمتر از میانگین نمرات خام گروه بهنجار نشان داد ( $P < 0.001$ ).

همچنین مقایسه گروه بالینی در خرده آزمون اطلاعات و سؤالات جهت بایی با گروه بهنجار نتایج معنی داری را ( $P < 0.01$ ) نشان داد. این یافته با نتایج ارائه شده توسط وکسلر (۱۹۸۷) در بررسی روایی مقیاس همخوانی داشته و بیانگر روایی ساختار مناسب این مقیاس می‌باشد.

(درون یابی) نمرات شاخصهای گروه سنی ۲۵–۳۴ را برآورد کردند یعنی هنجاریابی روی افراد این گروه صورت گرفت و نتایج نشان داد که نمرات شاخص متشر شده توسط وکسلر که با شیوه برآورد درونی انجام شده بود سودمند است.

نمرات هنجار شاخصهای مقیاس پژوهش حاضر در تمام گروههای سنی، در دامنه‌ای از ۵۰ تا ۱۴۰ (از سه و یک سوم انحراف معیار زیر میانگین تا دو و دو سوم انحراف معیار بالای میانگین) مشابه کار وکسلر (۱۹۸۷) گستردۀ بوده است. این نمرات در کل دامنه خود، واحدهای یکسانی هستند و تفاوت در عملکرد بین نمرات هنجاری ۱۰۰ و ۱۱۵ مشابه تفاوت در عملکرد میان نمرات ۱۳۰ و ۱۴۵ می‌باشد.

در پیشتر نمرات خرده آزمونها و ترکیهای دومین آزمون افزایشی نسبت به نمره های خرده آزمونهای نخست دیده شد. در تبیین این افزایش باید گفت که آشنا شدن با روش‌های آزمون و یادگیری، نمره‌های آزمودنیها را افزایش داده است.

همچنین رتبه‌های درصدی شاخصها تعیین شد. اگر چه نمرات هنجاری از نظر روانسنجی برتر از رتبه‌های درصدی هستند اما به آسانی درک نمی‌شوند. بنابراین رتبه‌های درصدی در درک مفهوم نمرات هنجاری کمک می‌کنند.

همانطور که بیان گردید، به منظور بررسی پایایی خرده آزمونها و ترکیهای مقیاس روش بازآزمایی به کار گرفته شد. ضرایب پایایی برای خرده آزمونها و ترکیهای در پژوهش حاضر از ۰/۲۸ تا ۰/۹۸ گستردۀ شده است. در پژوهش وکسلر (۱۹۸۷) متوسط ضرایب پایایی در میان گروههای سنی برای خرده آزمونها و ترکیهای از ۰/۹۰ تا ۰/۹۶ یا مقدار متوسط ۰/۷۴ بوده است. مقایسه ضرایب پایایی بازآزمایی پژوهش حاضر با ضرایب پایایی بازآزمایی فرم اصلی (وکسلر، ۱۹۸۷)، ضرایب پایایی این مقیاس را در حد

## سپاسگزاری

از همکاران و دوستانی که زینه اجرای این پژوهش را فراهم کردند نهایت تشکر و قدردانی را می‌نماید. از شادروان دکتر محمد نقی براهی استاد راهنما که با گرسی و صمیمیت راهنمایی‌های لازم را نمودند، از آقای محمد جعفر بهره‌دار که در اجرای پژوهش همکاری لازم را داشتند، آقای هوشنج فرهنگی که در طول اجرای پژوهش همکاری خود را دریغ ننمودند، از همکاران مرکز بهداشت شهدای والجیر، آموزش و پرورش کل شیراز، همچنین مسئولین مرکز درمانی شرکت نفت شیراز تشکر و قدردانی می‌شود.

همچنین از همکاران در انتیتو روانپزشکی تهران که در اجرای این پژوهش یاری لازم را نمودند نیز تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم.

Anderehsh  
Va  
Raftar  
الدینه و رفعت نمودند نیز تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم.

۶۶

## مظاung

- آناستازی، ای. (۱۳۷۱). روان آزمایش. ترجمه محمد نقی براهی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- صرامی، غلامرضا (۱۳۷۱). منجربیابی آزمون حافظه وکسلر بر روی جمعیت ساکن در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
- کاپلان، هارولد؛ سادوک، بچاین؛ گرب، جک (۱۳۷۵). خلاصه روانپزشکی. ترجمه نصرت... پورانکاری، تهران: شهرآب.
- مکتوسون، داوید (۱۳۷۰). مبانی نظری آزمونهای روانی. ترجمه محمد نقی براهی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- وکسلر، دیوید (۱۳۷۰). مقیاس حافظه وکسلر (فرم الف).
- ترجمه صادق نصری، سید عباس باقری بزدی، انتیتو روانپزشکی تهران، گزارش منتشر نشد.
- Bachrach, H., & Mintz, J. (1974). The Wechsler Memory Scale as a tool for the detection of mild cerebral dysfunction. *Journal of Clinical Psychology*, 30, 58-60.
- Brooks, D. N. (1976). Wechsler Memory Scale performance and its relationship to brain damage
- after severe closed head injury. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 39, 593-601.
- Cohen, J. (1950). Wechsler Memory Scale performance on psychoneurotic, organic and schizophrenic groups. *Journal of Consulting Psychology*, 14, 371-372.
- Howard, A. R. (1966). A fifteen-Year follow-up with the Wechsler Memory Scale. *Journal of Consulting Psychology*, 30, 175-176.
- Kear-Colwell, J. J. (1973). The structure of the Wechsler Memory Scale and its relationship to brain damage. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 12, 384-392.
- Lezak, M.D. (1995). *Neuropsychological assessment* (3<sup>rd</sup> ed.). New York: Oxford University Press.
- Mittenberg, W., Burton, D. B., Darrow, E., & Thompson, G. B. (1992). Normative data for the Wechsler Memory Scale - Revised: 25-to 34-year olds. *Psychological Assessment*, 4, 363-368.
- Prigatano, G. P. (1978). Wechsler Memory Scale: A selective review of the literature. *Journal of Clinical Psychology*, 34, 816-832.
- Russell, E.W. (1975). A Multiple scoring method for the assessment of complete memory functions. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 43, 800-809.
- Squire, L. R., & McKee, R. D. (1996). Biology of memory. *Comprehensive textbook of psychiatry* (6<sup>th</sup> ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.
- Stone, C. P., Girdner, J., & Alberch, R. (1946). An alternate form of Wechsler Memory Scale *Journal of Psychology*, 22, 199-206.
- Wechsler, D. (1945). A standardized memory scale for clinical use. *Journal of Psychology*, 19, 87-95.
- Wechsler, D. (1987). Wechsler Memory Scale-Revised manual. New York: Psychological Cooperation Inc.