



اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس، عقلانی - عاطفی الیس و آرامسازی بر کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان

دکتر اسماعیل ییاپاکرده*

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش‌های درمانی چندوجهی لازاروس، عقلانی - عاطفی الیس، آرامسازی و دارونما بر کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان اجرا شد. روش: از مراجعتان مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی دانشآموزان آموزش و پرورش شهر تهران و مرکز خدمات مشاوره‌ای مرکز ملی جوانان در سطح شهر تهران ۸۲ نفر دانشآموز دبیرستانی مبتلا به اضطراب انتخاب و با استفاده از روش تصادفی ساده در پنج گروه درمانی زیر گنجانده شدند: چندوجهی لازاروس (۱۷ انفر)، عقلانی - عاطفی الیس (۱۷ انفر)، آرامسازی (۱۵ انفر)، دارونما (۱۵ انفر)، و گروه گواه (۱۶ انفر). پس از اعمال ده جلسه درمان بر هر یک از گروه‌ها به صورت هفت‌نایی دو جلسه و هر جلسه ۵۰ دقیقه، دوباره مقیاس اضطراب امتحان روی آزمون‌ها اجرا شد. **یافته‌ها:** تحلیل داده‌ها با استفاده از طرح آزمایشی پیش‌آزمون - پس‌آزمون چندگره‌ی و تحلیل واریانس نشان داد که هر چهار روش درمانی در کاهش اضطراب امتحان اثربخش‌تر از گروه گواه بوده است. بین روش درمان چندوجهی لازاروس و روش عقلانی - عاطفی الیس تفاوت معنی‌داری دیده نشد. روش درمان چندوجهی لازاروس از روش‌های آرامسازی، دارونما و گروه گواه در کاهش اضطراب امتحان به طور معنی‌داری اثربخش‌تر بود. بین روش درمانی آرامسازی و روش دارونما در کاهش اضطراب امتحان تفاوت معنی‌داری دیده نشد. **نتیجه:** هر چهار روش درمانی در درمان اضطراب امتحان به طور معنی‌داری اثربخش‌تر از گروه گواه بود.

Andeasbeh
Va
Raftari
اندیشه و رفخار

۳۶

کلید واژه: اضطراب امتحان، آرامسازی، درمان عقلانی - عاطفی الیس، درمان چندوجهی لازاروس

مقدمه

تحصیلی میلیون‌ها دانشآموز و دانشجو در مراکز آموزشی دارد (هیل^۱، ۱۹۸۴). قدمت این موضوع به اندازه قدمت آزمون‌هایی است که برای ارزیابی اضطراب امتحان^۲ یکی از انواع اضطراب‌های موقعیتی است که رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت

* دکترای روان‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، خیابان کارگر جنوبی، پایین‌تر از چهارراه لشکر، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.

تریون^۹ (۱۹۹۰) فراتحلیلی را روی نتایج نوزده برسی انجام داد که در آن‌ها روش‌های گوناگون حساسیت‌زدایی منظم^۱ و یا غرقه‌سازی^{۱۱} به کاربرده شده بود. در بسیاری از این برسی‌ها کاهش اضطراب امتحان در پس‌آزمون و یا کاهش آن برای گروه‌های حساسیت‌زدایی و غرقه‌سازی، در مقایسه با گروه‌های کنترل بدون درمان، گزارش شده است.

حساسیت‌زدایی منظم و یا غرقه‌سازی به طور معنی‌داری پیشرفت تحصیلی را در افراد در پس دارد. این پیشرفت برای گروه‌های گواه بدون درمان از هر پنج برسی دو مورد بوده است. برسی‌های دیگر نشان می‌دهند حساسیت‌زدایی منظم افزایش معنی‌دار پیشرفت تحصیلی را در کسانی به دنبال دارد که در شاخص‌های اضطراب عمومی نمره‌های پایینی به دست می‌آورند. گرچه اسمیت^{۱۲} و نای^{۱۳} (۱۹۷۳) دریافتند که حساسیت‌زدایی از غرقه‌سازی خیالی به طور معنی‌داری در پیشرفت تحصیلی اثربخش تر است، آنان هشت برسی بهبودی یا پیشرفت پیش و پس از درمان را با توجه به کنترل دیگر شاخص‌های پیشرفت مورد برسی قرار دادند. تنها سه برسی پیشرفت در عملکرد را نشان داد. یکی از دو مطالعه که پاسخ‌های فیزیولوژیکی آزمودنی‌ها را اندازه‌گیری می‌کرد در مقایسه با گروه گواه به پیشرفت معنی‌داری انجامید (تریون، ۱۹۹۰). این یافته پژوهشی که حساسیت‌زدایی منظم، غرقه‌سازی خیالی و حتی آرام‌سازی به تنها در کاهش اضطراب امتحان و نه پیشرفت تحصیلی مؤثرند، گویای آن است که این درمان‌ها به مؤلفه هیجان‌پذیری اضطراب امتحان کمک می‌کنند تا مؤلفه نگرانی. به باور وین^{۱۴} (۱۹۸۰) مؤلفه نگرانی مهم‌ترین ویژگی اضطراب امتحان است.

عملکرد تحصیلی ساخته شده است. اسپیل‌برگر^۱، گانزالس^۲، تیلور^۳، الگاز^۴، آتون^۵ (۱۹۸۸) به مقاله‌های درباره ماهیت اضطراب امتحان مربوط به ۵۰ سال پیش اشاره می‌کنند، اما برسی اضطراب امتحان به طور جدی با پژوهش ساراسون^۶ و مندلر^۷ (۱۹۵۲) آغاز شد که اکنون پژوهش‌گران نام‌آوری در زمینه اضطراب و یادگیری به شمار می‌روند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که سالانه نزدیک به ۱۰ میلیون دانش‌آموز دیسترانی و ۱۵ درصد از دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا چار اضطراب امتحان هستند (هیل، ۱۹۸۴) و نمره‌های اضطراب امتحان در دبستان‌ها با افزایش سن ییشتر می‌شود. در زمینه میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش‌آموزان ایرانی گزارشی در دست نیست. اما می‌توان بر پایه برخی پژوهش‌ها مانند ابوالقاسمی (۱۳۷۴) برآورد کرد که نزدیک به ۲۰ تا ۳۰٪ موارد افت تحصیلی به علت اضطراب امتحان است (بیبانگرد، ۱۳۷۸). به باور واتسون (۱۹۸۸) آزمودنی‌های بزرگتر، در آزمون اضطراب پیشرفت نمره‌های بیشتری دریافت می‌دارند. گرچه در آغاز تحصیل ارتباط میان اضطراب و عملکرد تحصیلی پایین می‌باشد، هر چه دانش‌آموزان به پایه‌های بالاتر می‌روند و سن آن‌ها افزایش می‌یابد، این رابطه ییشتر می‌شود.

آلن (۱۹۸۰) دوازده پژوهش از درمان رفتاری اضطراب امتحان را برسی کرد و دریافت که ییشتر آن‌ها دارای روش شناسی ضعیف و ادعاهایی در مورد رابطه علت و معلولی بین درمان و نتایج آن می‌باشند. بسیاری از برسی‌ها دارای گروه گواه، و یا گروه گواه همتا نبوده‌اند و روش‌های دارونمای معتبر یا برسی‌های پی‌گیری نداشته‌اند. بسیاری از برسی‌ها از یک درمانگر برای تمام روش‌های درمانی بهره برده‌اند و مرتکب خطاهایی شده‌اند که آلن آن را "خصوصه درمانگر"^۸ یا اشتباه‌شدن درمانگر و درمان می‌نامد.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1- Spilberger | 2- Gonzalez |
| 3- Taylor | 4- Algaz |
| 5- Anton | 6- Sarason |
| 7- Mandler | 8- therapist specificity |
| 9- Tryon | |
| 10- systematic desensitization | |
| 11- flooding | 12- Smith |
| 13- Nye | 14-Wine |

اضطراب امتحان تشخیص داده می‌شد، در گروه نمونه وارد می‌شد. بدین ترتیب ۸۳ نفر آزمودنی به عنوان اعضاًی گروه نمونه انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در پنج گروه درمانی لازاروس (n=۱۷)؛ عفلاتی عاطفی الیس (n=۱۷)؛ آرام‌سازی (n=۱۸)؛ دارونما (n=۱۵) و گروه گواه (n=۱۶) گنجانده شدند. مقیاس اضطراب امتحان (ابوالقاسمی و همکاران، ۱۳۷۵) دارای ۲۵ ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار درجه‌ای (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات) به آن پاسخ می‌دهد.

ابوالقاسمی و همکاران (۱۳۷۵) برای سنجش همسانی درونی^۱، ضریب آلفای کرونباخ^۲ را به کار برده‌اند. براساس نتایج حاصل از ضرایب آلفا برای کل نمونه و به تفکیک آزمودنی‌ها دختر و پسر به ترتیب برای برآورده با ۰/۹۴، ۰/۹۵ و ۰/۹۲ بود.

برای سنجش پایایی^۳ مقیاس نیز، این آزمون دوباره پس از چهار هفته تا شش هفته به ۹۱ نفر آزمودنی پسر و ۹۰ نفر آزمودنی دختر شرکت کننده در مرحله نخست،دادند. میانگین و انحراف معیار نمره کل آزمودنی‌ها، و به تفکیک آزمودنی‌های دختر و پسر در مقیاس اضطراب امتحان در مرحله بازآزمایی به ترتیب $m=34/24$ ($sd=17/26$)، $m=32/28$ ($sd=17/26$)، $m=36/2$ ($sd=15/18$)، $m=36/44$ ($sd=19/44$) بود. ضرایب همبستگی بین نمره‌های آزمودنی‌ها در دو نوبت بعضی آزمون و بازآزمون برای کل آزمودنی‌ها، آزمودنی‌های دختر و پسر به ترتیب ۰/۷۷، ۰/۸۸، ۰/۷۷ و ۰/۶۷ بدست آمد. به منظور سنجش روانی این مقیاس، مقیاس ۵۸ ماده‌ای عزت نفس به کار برده شد. ضرایب همبستگی نمره‌های کل آزمودنی‌ها، آزمودنی دختر و پسر از مقیاس

او پژوهشگران بعدی را به استفاده از درمان‌های شناختی توصیه می‌کند.

هالرید^۴ (۱۹۷۶) در پژوهشی به نام "شناخت و حساسیت‌زدایی در درمان گروهی اضطراب امتحان" ۸۴ نفر آزمودنی داوطلب مبتلا به اضطراب امتحان را به طور تصادفی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد شناخت درمانی در کاهش اضطراب در موقعیت‌های امتحان فرضی و افزایش نمره‌های درسی از دیگر روش‌های درمانی و گروه گواه اثربخش‌تر است. حساسیت‌زدایی منظم، ترکیب حساسیت‌زدایی منظم و شناخت درمانی و گروه گواه با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نداشتند. این نتایج گویای اهمیت رویکرد شناختی در درمان اضطراب امتحان بود.

مسئله مهم این پژوهش یافتن روش درمانی بود که بیشترین تأثیر را بر درمان و کاهش اضطراب امتحان دارد. به همین منظور اثربخشی سه روش درمانی عفلاتی- عاطفی^۵ الیس، درمان چندوجهی^۶ لازاروس و آرام‌سازی^۷ بر کاهش اضطراب مورد مقایسه قرار گرفت.

روش

این پژوهش از نوع پژوهش‌های آزمایشی^۸ است. جامعه آماری این پژوهش را مراجعتان "مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی دانش‌آموذان" آموزش و پرورش شهر تهران و "مراکز خدمات مشاوره‌ای سازمان ملی جوانان" در سطح شهر تهران تشکیل می‌دهد. برای نمونه‌گیری از میان مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی، دو مرکز یادشده و از میان مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از مرکز ملی جوانان شش مرکز به تصادف انتخاب شدند. از میان مراجعتان به مراکز منتخب آن دسته دانش‌آموذان دبیرستانی، که براساس تشخیص اولیه درمانگران دچار اضطراب امتحان بودند، شناسایی و مقیاس اضطراب امتحان (ابوالقاسمی، شناسایی و مقیاس اضطراب امتحان (ابوالقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان، شکرکن، ۱۳۷۵) روی آن‌ها اجرا شد. چنانچه براساس نمره این آزمون مراجع مبتلا به

درمانگر وظیفه اخلاقی خود داشت که برای آزمودنی‌های گروه گواه و دارونما نیز جلسه‌های درمانی پیش‌بینی کند تا به آن‌ها کمکی شده باشد و بدون درمان رها نشده باشد.

یافته‌ها

در جدول ۲ شاخص‌های آماری محاسبه شده برای مقایسه میزان اثربخشی روش‌های درمانی آمده است.

جدول ۲- شاخص‌های آماری محاسبه شده برای اضطراب امتحان با روش‌های درمانی

شاخص‌های آماری	تعداد	مبالغین	انحراف	خطای استاندارد	D	گروه‌ها
لازاروس	۱۷	۲۸۷۴۷	۳/۹۳	۰/۹۵		
عقلانی- عاطفی‌البس	۱۷	۲۳/۰۲	۷۱۴	۱/۴۹		
آرامسازی	۱۸	۱۸/۸۳	۷۵۳	۱/۰۴		
دارونما	۱۵	۱۳/۰۶	۴/۰۲	۱/۱۶		
گواه	۱۶	۳/۷۸	۷/۱۵	۱/۷۸		
کل	۸۳	۱۷/۸	۱۰/۲۸	۱/۱۲		

D= تفاصل پیش آزمون و پس آزمون

جدول ۲ نشان می‌دهد که بین روش‌های درمانی مورد بررسی در کاهش اضطراب امتحان، تفاوت وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده‌های بالا به کمک تحلیل واریانس در زمینه میزان اثربخشی این روش‌ها نشان معنی‌داری میان آن‌ها نشان داد. ($F=44/7$, $P<0/01$). از این‌روی، می‌توان گفت که بین اثربخشی روش‌های درمانی چندوجهی لازاروس، عقلانی- عاطفی‌البس، آرامسازی و دارونما در درمان اضطراب امتحان دانش آموزان تفاوت معنی‌دار وجود دارد (جدول ۳).

عزت نفس کوپر اسمیت^۱ با مقیاس اضطراب امتحان به ترتیب ۰/۵۷، ۰/۷۸ و ۰/۴۳ به دست آمد.

ابوالقاسمی و همکاران هم چنین هنجارهای نمره‌های آزمودنی‌های نمونه (n=۵۸۱) را به صورت رتبه‌های درصدی محاسبه و با مقایسه نمره‌های آزمودنی‌های دختر و پسر در مقیاس اضطراب امتحان با آزمون^۲ نتیجه گرفتند که نمره‌های آزمودنی‌های دختر در مقیاس اضطراب امتحان به طور معنی‌داری بیشتر از نمره‌های آزمودنی‌های پسر می‌باشد. در پایان پژوهشگران نتیجه گیری می‌کنند که مقیاس اضطراب امتحان دارای شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناسی و تشخیص اضطراب امتحان در کودکان و نوجوانان در مدارس می‌باشد.

برای اجرای این پژوهش طرح آزمایش پیش آزمون- پس آزمون چندگروهی به کار گرفته شد (جدول ۱).

جدول ۱- نمایی از طرح پیش آزمون- پس آزمون چندگروهی پژوهش

گروه‌ها	انتخاب	پس	متغیر	تصادفی	آزمون	مستقل آزمون
چندوجهی	T _۱	A	T _۱	R _۱		
عقلانی- عاطفی	T _۱	B	T _۱	R _۱		
آرامسازی	T _۱	C	T _۱	R _۲		
گواه (بدون عمل درمانی)	T _۱	-	T _۱	R _۴		
گواه (دارونما)	T _۱	-	T _۱	R _۵		

مدت زمان هر روش درمانی ده جلسه (هر هفته دو جلسه و هر جلسه ۵۰ دقیقه) بود که درمانگر در هر جلسه برآسم راهنمای درمانی تهیه شده برای هر یک از روش‌ها عمل می‌کرد. در پایان درمان، دوباره مقیاس اضطراب امتحان روی آزمودنی‌ها اجرا شد و نمره‌های آن‌ها با نمره‌های آزمون اول مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گفتنی است که در پایان درمان،

جدول ۳- نتایج تحلیل واریانس بین نمره اضطراب امتحان با روش‌های درمانی

منابع	کل	۸۲	۷۸	۰	۶۰۳۵/۵۷	۱۵۰۸/۸۹	۴۴/۷	۰/۰۰۱	شاخص‌های آماری	درجات آزادی	مجموع مجذورات	میانگین مجذورات	نمره F	سطح معنی‌داری	
واریانس بین گروهی															
واریانس درون گروهی															

۶- روش درمانی عقلانی- عاطفی الیس از روش دارونما در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان به طور معنی‌داری اثربخش‌تر بود.

۷- روش درمانی آرام‌سازی از روش دارونما در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان به طور معنی‌داری اثربخش‌تر نبود.

۸- بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی منفی معنی‌داری ($r=-0.76$) به دست آمد.

۹- میزان اضطراب امتحان دانش آموزان رشته ریاضی و علوم تجربی به طور معنی‌داری بیشتر از دانش آموزان رشته علوم انسانی بود.

۱۰- میزان اضطراب امتحان دانش آموزان پیش‌دانشگاهی به طور معنی‌داری بیشتر از دانش آموزان سال اول، دوم و سوم بود.

بحث

بنابر نتایج پژوهش حاضر، میان یافته‌های این بررسی و دیگر بررسی‌های مربوطه، هماهنگی و همخوانی دیده می‌شود.

لازاروس (۱۹۸۱) باور دارد که درمان چندوجهی برای علاقه‌مندان به پیشرفت در سطوح بالا مناسب است. این روش درمانی کل شخصیت فرد را در نظر می‌گیرد، آن را ارزیابی و درمان می‌کند. بنابراین، هماهنگ با نتایج این پژوهش طبیعی است که

به‌منظور روش‌ساختن این‌که بین کدام روش‌ها تفاوت معنی‌دار وجود دارد، آزمون تعقیبی شفه^۱ به کار برده شد. نتایج نشان داد که میان میانگین‌های نمره اضطراب امتحان در روش ۱ (چندوجهی لازاروس) با ۳ (آرام‌سازی)، ۴ (دارونما)، ۵ (گواه)؛ ۲ (عقلانی- عاطفی الیس) با ۴ و ۵ با ۳ و ۴ با ۵ تفاوت معنی‌داری وجود دارد ($P<0.05$). بنابراین، با توجه به داده‌های گردآوری شده می‌توان گفت که:

Andeesheh
Va
Raftar
اندیشه و رفتار

۴۰

۱- هر چهار روش درمانی یعنی درمان چندوجهی لازاروس، درمان عقلانی- عاطفی الیس، آرام‌سازی و دارونما در درمان اضطراب امتحان به‌طور معنی‌داری اثربخش‌تر از گروه گواه بود.

۲- بین روش درمانی چندوجهی لازاروس و روش عقلانی- عاطفی الیس در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان تفاوت معنی‌داری از نظر آماری دیده نشد.

۳- روش درمانی چندوجهی لازاروس به‌طور معنی‌داری اثربخش‌تر از روش آرام‌سازی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان بود.

۴- روش درمان چندوجهی لازاروس از روش دارونما در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان به‌طور معنی‌داری اثربخش‌تر بود.

۵- روش درمانی عقلانی- عاطفی الیس مؤثرتر از روش آرام‌سازی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان نبود.

افزایش نمره‌های درسی مؤثر است. آلن (۱۹۸۰) دریافت که ترکیب مهارت‌های مطالعه و آرام‌سازی در افزایش عملکرد تحصیلی اثربخش‌تر از هر یک از آن‌ها به‌نهایی است. یک روش دارونمای معنیر به اندازه روش حساسیت‌زدایی، آرام‌سازی، مهارت‌های مطالعه و ترکیب آن‌ها در کاهش اضطراب امتحان مؤثر بود.

بنابر بررسی‌های هولندورث^۴، گلازسکی^۵، کرکلند^۶ و ون‌نورمن^۷ (۱۹۸۹) و هالرید، وستبروک^۸، ولف^۹ و بدھورن^{۱۰} (۱۹۸۸) افراد دارای اضطراب امتحان بالا در مقایسه با افراد دارای اضطراب امتحان پایین از نظر ارزیابی و تفسیری که از برانگیختگی فیزیولوژیکی هم در پیش از امتحان و هم در طی آن متفاوت نیستند، اما از نظر ارزیابی و تفسیری که از برانگیختگی می‌کنند متفاوت هستند. برای مثال، آزمودنی‌های مضطرب برانگیختگی خود را به صورت بازدارنده معنی می‌کنند؛ در حالی که آزمودنی‌های غیرمضطرب آن را فرایندی برای اعمال تلاش بیشتر در امتحان تفسیر می‌کنند.

بازیبینی بررسی‌های انجام‌گرفته درباره اضطراب امتحان نشان می‌دهد که تقریباً تمام روش‌های درمانی حتی دارونمای در کاهش اضطراب امتحان مؤثر هستند. بنابراین، چنانچه درمانگری با یک دانش‌آموز یا دانشجوی مبتلا به اضطراب امتحان رویه‌رو شود می‌تواند برای درمان آن درمان چندوجهی لازوس، عقلاتی- عاطفی الیس، آرام‌سازی خودآموزش دهنی مایکن‌بام و درمان شناختی بک^{۱۱} را به کار برد.

منابع

- ایوالقالاسی، عباس (۱۳۷۴). ساخت و اختبار یکی از پرشنشهای اضطراب امتحانی پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

اثربخش‌ترین روش در کاهش اضطراب امتحان نیز باشد.

روش آرام‌سازی به‌طور گسترده‌ای در درمان اضطراب امتحان به کار گرفته شده است. گرچه برخی از بررسی‌ها دریافت‌های این روش، به‌ویژه در کاهش اضطراب امتحان، سودمند است، شواهد متناقضی در مورد تغییر در شاخص‌های رفتاری اضطراب امتحان وجود دارد. افزون بر این، نتایج مقایسه‌ای آرام‌سازی با روش‌های کنترلی دارونمای نشان می‌دهد که روش آرام‌سازی چه بسا از روش دارونمای اثربخش‌تر نباشد (آلن^۱، الیس^۲ و زلولو^۳، ۱۹۹۰).

یکی از تبیین‌های ممکن درباره نتایج محدود به دست آمده از آرام‌سازی، ناتوانی آن در اصلاح و درمان مؤلفه‌های مهم اضطراب امتحان است. هرچند که روش آرام‌سازی به روشنی بر کاهش برانگیختگی ناشی از موقعیت‌های امتحانی تأثیر دارد، فرمولبندی‌های اخیر نشان می‌دهد که کاهش عملکرد آزمودنی‌های دارای اضطراب امتحان به میزان زیادی تابعی از پاسخ‌های شناختی و توجهی غیرانطباقی است تا افزایش برانگیختگی هیجانی. از این‌رو، آلن و همکاران (۱۹۹۰) در بازیبینی ادبیات پژوهش نتیجه‌گیری می‌کنند که «به نظر می‌رسد، برانگیختگی هیجانی رابطه پایداری با عملکرد در تکالیف هوشی یا شناختی ندارد، در حالی که "تگرانی" رابطه پایدار و منفای ای با عملکرد دارد» (همان‌جا، ص ۱۰۰). آلن و همکاران (۱۹۹۰) فرضیه دیگری را می‌افزایند که «تگرانی» عملکرد تکلیف را بازداری می‌کند. زیرا توجه را از تکلیف در دست انجام منحرف می‌سازد. از سوی دیگر، برانگیختگی هیجانی ممکن است انجام تکلیف را عملاً آسان کند، مگر این که موضوع آموخته‌شده توجه را به‌سوی تجلیبات خاص از برانگیختگی هدایت کند.

محجنبین بررسی‌های آلن (۱۹۷۳ و ۱۹۸۰) نشان داده‌اند که ترکیب آرام‌سازی یا حساسیت‌زدایی و مهارت‌های مطالعه هم در کاهش اضطراب امتحان و هم

1- Allen	2- Elias
3- Zlotlow	4- Hollandworth
5- Glazeski	6- Kirkland
7- Van Norman	8- Westbrook
9- Wolf	10- Badhorn
11- Beck	

- Holroyd,K.A.,Westbrook.,T.Wolf, M., & Badhorn, E.(1988).Performance,cognition and physiological responding in test anxiety.*Journal of Abnormal Psychology*, 87, 442-451.
- Lazarus,A.(1981).*The practice of multimodal therapy*. New York: Donnelly and Sons Inc.
- Sarason,S.,& Mandler,G.(1952). Some correlates of test anxiety. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 47, 810-817.
- Smith, R. E., & Nye,S.L. (1973). A comparison of impulsive therapy and systematic desensitization in treatment of test anxiety. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 41, 37-42.
- Spilberger,C.,Gonzalez, H. P.,Taylor, C.J., Algaze, B.,& Anton,W.D.(1988).Examination stress and test anxiety, *Journal of Stress and Anxiety*, 35, 45-53.
- Tryron,G.S.(1990). The measurement and treatment of test anxiety. *Review of Educational Research*, 80, 585-591.
- Watson, J.M. (1988). Achievement anxiety test. *Journal of Education Psychology*, 80, 585-591.
- Wine, J. (1971). Test anxiety and direction of attention. *Psychological Bulletin*, 76, 72-104
- Wine,J. (1980). *Cognitive attentional theory of test anxiety*. University of Waterloo press.
- ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی متدم، عزیزه؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین (۱۳۷۵). ساخت و اعتباریابی مفباصی برای سنجش اضطراب امتحان. *فصلنامه علمی-پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی*، دانشکده روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، شماره ۴، ۶۱-۷۶.
- پیاپانگرد، اسماعیل (۱۳۷۸). *روش‌های پیشگیری از افت تعصیل*. تهران: انجمن اولیاء و مریبان.
- Allen, G. J. (1974). The behavioral treatment of test anxiety: Recent research and future trends. *Behavior Therapy*, 13, 253-262.
- Allen,G.J.(1980).Effect of three conditions of administration on "trait" and "state" measures of anxiety. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 34, 355-359.
- Allen,G.J.,Elias, M. J., & Zlotlow, S. (1990). *Behavioral interventions for alleviating test anxiety*. Hillsdale, N. J.: Lawrence.
- Hill,K.T.(1984).*Debilitation motivation and testing*. New York: Academic Press.
- Hollandsworth,J.G.,Glazesski,R.C., Kirkland, Jones, G. & Van Norman, L. (1989). An analysis of the nature and effects of test anxiety. *Cognitive Therapy and Research*, 3, 165-180.
- Holroyd,K.A. (1976). Cognition and desensitization in the group treatment of test anxiety.*Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 44, 991-1001.