



غربالگری اختلال‌های روانی در دوران بارداری

مصطفویه متکلی^{*}، طاهره رمضانی^{**}، سکینه محمد علیزاده^{***}

چکیده

هدف: بررسی حاضر به منظور غربالگری موارد مشکوک به اختلال‌های روانی در دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی - درمانی، درمانگاه‌های خصوصی زنان و زایمان شهرستان شهریار انجام شده است.

روش: داده‌ها به کمک پرسشنامه *SCL-90-R* از ۴۰۰ زن باردار گردآوری شد و با بهره‌گیری از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های نی، من و بقیه، آنالیز واریانس پک‌طرفه و کرویسکال والبیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: این بررسی شیوع لحظه‌ای برای کل اختلال‌ها ۱۳٪ نشان داد. پیشترین و کمترین میزان شیوع به ترتیب مربوط به ابعاد حساسیت در روابط مقابله (۴۶٪) و روان پریشی (۱۰٪) بود. در مقایسه میانگین نمرات ابعاد مختلف *SCL-90-R* برحسب متغیرهای سن بارداری، رتبه بارداری، شغل، تحصیلات، تعداد نرزندان، تاخو استنیدن بارداری، ساقه نازابی، اهمیت جنس نوزاد برای زن باردار و همسر او، شغل و تحصیلات همسر، تگرانی در زمبنه زیبایی، برخوردار نبودن از حمایت اطرافیان، دسترسی نداشتن به مراقبت‌های بهداشتی، وجود حادثه استرس آور و پرخاطریدن بارداری بست کم در بک بعد تفاوت معنی‌داری دیده شد.

نتیجه: شیوع اختلال‌های روانی در زنان باردار از میانگین آن در جامعه بیشتر است.

کلید واژه: شیوع، بارداری، اختلال روانی، *SCL-90-R*

مقدمه

بنابر تعریف سازمان جهانی بهداشت، صلامتی حالت بهزیستی کامل بدنی، روانی و اجتماعی است (معتمدی،

نیکان، تاریزی، ۱۳۷۸) و سلامت روان عبارت از

قابلیت برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، اصلاح محیط و حل تضادها می‌باشد (میلانی فر،

* کارشناس ارشد پرستاری (داخلی - جراحی)، شهر بابک، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه پرستاری (نویسنده مسئول).

** کارشناس ارشد پرستاری (روان‌پرستاری)، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان، کرمان، خیابان شهداء، سه راه مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی رازی.

*** کارشناس ارشد پرستاری (اطفال)، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان، کرمان، خیابان شهداء، سه راه مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی رازی.

کوزیمرسیکم^{۲۰} و نیکولبندس^{۲۱} (۱۹۹۸) ارتباط بین نگرانی در مورد زیبایی و افزایش افسردگی اختلال‌های روانی؛ باری (۱۹۹۶) ارتباط بین دسترسی نداشتن به امکانات مراقبتی و افزایش پرخاشگری، سکین^{۲۲}، (۱۹۹۵) و هانفلد^{۲۳}، ولادیمیروف^{۲۴}، ورهیج^{۲۵} و پاسیچر^{۲۶} (۱۹۹۵) ارتباط بین رویارویی با رویداد استرس آور و افزایش افسردگی و سوگ و پرخاشگری، اسمیت^{۲۷}، دنت^{۲۸}، کولز^{۲۹} و فالک^{۳۰} (۱۹۹۲)، بوجلی^{۳۱} و کولب^{۳۲} (۱۹۹۳) و لونارد^{۳۳} (۱۹۹۸) ارتباط بین پرخطر بودن بارداری و افزایش اضطراب، روان‌پریشی، گوشه‌گیری، اختلال در خواب و خوراک، ترس مرضی و احساس تنهایی و سرانجام دمی‌تشار^{۳۴}، لئارتس^{۳۵}، نجس^{۳۶} و ون^{۳۷} (۱۹۹۵)، مککی^{۳۸}، کان‌هنگام^{۳۹}، جان‌کوسکی^{۴۰} و زایس^{۴۱} (۲۰۰۱) ارتباط بین پرخوردار نبودن از حمایت اطرافیان و افزایش جنبه‌های مختلف اختلال روانی در زنان باردار.

بررسی دریاره شیوه اختلال‌های روانی در زنان باردار ایرانی چندان چشمگیر نیست. برآساس برخی بررسی‌ها شیوه افسردگی در ۲۸/۸٪ (بداع آبادی و همکاران، ۱۳۷۹) و اضطراب در ۱۵٪ زنان باردار ایرانی گزارش شده است (صحنی، ۱۳۷۹). مشکلات روانی

(۱۳۷۳). برایه آمار سازمان جهانی بهداشت ۱٪ مردم جهان از بیماری روانی شدید و ۱۵-۵٪ از بیماری خفیف آن رنج می‌برند (معتمدی، یاسمی، کرباسی، بنی‌واهاب، ۱۳۷۶). شیوه مقطوعی اختلال‌های روانی در ایران ۲۲٪-۱۸٪ گزارش شده است (احسان‌مشن، ۱۳۸۰).

علی‌رغم پیشرفت‌های علمی در زمینه درمان مشکلات جسمی دوران بارداری، مشکلات روانی همچنان موضوعی مهم در بهداشت زن باردار به شمار می‌آید (لیتل‌وود^۱ و مک‌هاگ^۲، ۱۹۹۷). بارداری برای بسیاری از زنان دوره‌ای پر استرس و نیازمند نوعی سازگاری روانی است (یانگ‌کین^۳ و دیویس^۴، ۱۹۹۸). افسردگی، گوشه‌گیری، اضطراب، ترس مرضی، سوء‌صرف مواد، بی‌ثباتی عاطفی، تحریک‌پذیری، اختلال در خواب و خوراک، تمرکز و روابط جنسی از جمله اختلال‌های روانی هستند که ممکن است همراه با بارداری دیده شوند (دیکاسون^۵، سیلورمن^۶ و کاپلان^۷، ۱۹۹۸). با این حال واکنشی که یک زن نسبت به بارداری نشان می‌دهد به ویژگی‌های فردی و اجتماعی او بستگی دارد (بروجز^۸، ۱۹۹۷).

بررسی‌ها نشان می‌دهند که شیوه کلی اختلالات روانی در زنان باردار ۱۵٪ می‌باشد (کمبل^۹ و لس^{۱۰}، ۲۰۰۰). هم‌چنین شیوه اختلال‌های وسوسی در ۱۳٪-۱۳٪، مصرف الکل در ۱۸/۸٪ و افسردگی در ۴٪-۲۵٪ از زنان باردار آمریکایی گزارش شده است (کاسپر^{۱۱}، ۱۹۹۸). همچنین در بسیاری از بررسی‌ها بر ارتباط بین متغیرهای مختلف و اختلال روانی در زنان باردار تأکید شده است: پیچ^{۱۲}، (۲۰۰۰) ارتباط بین افزایش سطح تحصیلات همسر زن باردار و کاهش پرخاشگری؛ کیتامورا^{۱۳}، ساگاوارا^{۱۴}، تودا^{۱۵} و شیما^{۱۶} (۱۹۹۶) و نصیری (۱۳۷۹) ارتباط بین ناخواسته‌سودن بارداری و وضعیت نامناسب روانی؛ کامل^{۱۷}، احمد^{۱۸}، عیسی^{۱۹} و ابوالعبیون^{۲۰} (۱۹۹۹) ارتباط بین اهمیت جنس نوزاد برای زن باردار و همسر او و افزایش شکایات جسمانی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، حساسیت در روابط متقابل و ترس مرضی؛ نیکویسک^{۲۱}

1- Littlewood	2- McHugh
3- Youngkin	4- Davis
5- Dikson	6- Silverman
7- Kaplan	8- Burroughs
9- Campbell	10- Less
11- Casper	12- Page
13- Kitamura	14- Sugawara
15- Toda	16- Shima
17- Kamel	18- Ahmad
19- Eissa	20- Abol-oyoun
21- Nickevic	22- Kucznierekazykm
23- Nicolides	24- Seguen
25- Hunfeld	26- Wlademiroff
27- Verhage	28- Passchier
29- Smith	30- Dent
31- Coles	32- Falek
33- Buchley	34- Kulb
35- Leonard	36- Demyttenare
37- Lenaretes	38- Nijs
39- Van	40- McKee
41- Cunnhngham	42- Jankowski
43- Zayas	

دوران بارداری می‌تواند پیامدهای مهمی از جمله زایمان زودرس، عوارض بارداری و زایمان، تأخیر رشد جنین و افسردگی پس از زایمان را به دنبال داشته باشد (پل سلتمن^۱، ۱۹۹۸). در بسیاری از مناطق ایران، به ویژه شهرستان‌های کوچک، آشنایی اندکی درباره مراقبت‌های بهداشت روانی در دوره بارداری وجود دارد. اهمیت موضوع و کمبودهای آشکار در زمینه بررسی‌های روانی زنان در دوران بارداری انجام بررسی حاضر شد.

روش

این بررسی نوعی پژوهش توصیفی - مقطعي است. آزمودنی‌های پژوهش را ۴۰۰ نفر زنان باردار مراجعه کننده به مرکز خدمات بهداشتی درمانی، درمانگاه‌های خصوصی زنان و زایمان شهرستان شهر باپک تشکیل داده‌اند. نمونه گیری به روش غیرتصادفی و متواالی انجام گرفت. در این پژوهش دو پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها به کار رفت: پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی و اجتماعی مربوط به زنان باردار، فهرست تجدیدنظر شده علائم نود سوالی (SCL-90-R)^۲ که پایابی و روایی آن در ایران توسط میرزاei (۱۳۵۹) و باقری‌بزدی، بوالهی و شاه‌محمدی (۱۳۷۳) گزارش گردید. آزمون SCL-90-R شامل ۹۰ ماده در مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای شامل (۰=هیچ، ۱=کمی، ۲=ناحدی، ۳=زیاد، ۴=به شدت) می‌باشد. این ابزار نه بعد اختلال‌های روانی دربرگیرنده شکایات جسمانی، وسوسات فکری و عملی، حساسیت میان‌فردي، افسردگی، اضطراب، خصومت و پرخاشگری، هراس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان‌پریشی می‌باشد. در این آزمون هفت ماده اضافی نیز قرار دارد که در هیچ یک از ابعاد یادشده طبقه‌بندی نشده و با عنوان بعد سایر از آن‌ها یاد می‌شود. این آزمون حالت‌های فرد را از یک هفته پیش مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نمره گذاری و

تفسیر آزمون براساس سه شاخص کلی علائم مرضی (GSI)، معیار ضریب ناراحتی (PSDI)^۳ و جمع علائم مرضی (PST)^۴ صورت می‌گیرد.

داده‌های لازم توسط افراد آموزش‌دیده و آگاه به پرسشنامه (کارشناس ارشد پرستاری، کارشناس روان‌شناسی بالینی و کارشناس پرستاری) و به کمک مصاحبه در مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان شهربابک شامل مرکز بهداشت ۱، ۲ و ۳ و درمانگاه‌های خصوصی زنان و زایمان گردآوری شد.

برای تعیین شیوع هر یک از ابعاد اختلال روانی از نقطه برش ۱ (مساوی یک و بزرگتر از آن) استفاده شد و میانگین نمره‌های یک و بالاتر از یک در هر بعد به عنوان حالت مرضی به شمار رفت. در بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در ایران نیز همین نقطه برش به کار رفته است که از آن جمله می‌توان به معتمدی و همکاران (۱۳۷۶ و ۱۳۷۸)، اشاره کرد.

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین میزان شیوع اختلال‌های روانی، روش‌های آمار توصیفی و برای مقابله میانگین نمرات اختلال‌های روانی بر حسب ویژگی‌های فردی، اجتماعی، آزمون‌های آماری تی، من ویتنی، کرومسکال والیس و آنالیز واریانس یک‌طرفه به کار برده شد.

یافته‌ها

در این پژوهش ۴۰۰ زن باردار ۱۶ تا ۴۰ ساله که در ماه اول تا نهم بارداری به سر می‌بردند، شرکت کردند (جدا اول ۱ و ۲).

در بررسی میزان شیوع اختلال‌های روانی مشخص شد که بالاترین و کمترین میزان شیوع موارد مشکوک به بیماری به ترتیب مربوط به ابعاد حساسیت در روابط

1- Paulselten

2- Symptom Check List - 90- Revised

3- Global Severity Index (GSI)

4- The Positive Symptom Distress Index (PSDI)

5- The Positive Symptom Total (PST)

جدول ۲- توزیع فراوانی برخی از متغیرهای مورد بررسی در گروه نمونه

متغیر	بلی	خبر	فرابانی (%)
صرف سیگار	۱	(۰/۳)	۹۹/۷(۳۹۹)
سابقه مشکل جسمی	۲۶	(۷/۵)	۹۳/۵(۳۷۴)
ناخواسته‌بودن بارداری از طرف زن	۸۶	(۲۱/۵)	۷۸/۵(۳۱۴)
سابقه سقط یا مرده‌زایی	۵۱	(۱۲/۸)	۸۷/۳(۳۴۹)
سابقه از دستدادن فرزند	۱	(۰/۳)	۹۹/۷(۳۹۹)
سابقه نازایی	۲۸	(۷)	۹۳/۳(۳۷۲)
از دستدادن والدین در کودکی	۲۷	(۷/۸)	۹۳/۲(۳۷۳)
اهمیت جنس نوزاد برای زن	۳۳	(۸/۳)	۹۱/۷(۳۷)
نگرانی در خصوص زیبایی	۱۰۲	(۲۵/۰)	۷۴/۵(۲۹۸)
ناخواسته‌بودن بارداری از طرف همسر	۷۷	(۱۹/۲)	۸۰/۸(۳۲۲)
اهمیت جنس نوزاد برای همسر	۴۸	(۱۲/۴)	۸۸/۳(۳۵۲)
اهمیت جنس نوزاد برای اعضاء خانواده	۴۹	(۱۲/۳)	۸۷/۷(۳۵۱)
عدم برخورداری از حمایت اطرافیان	۶۵	(۱۱/۱)	۸۸/۹(۳۵۵)
عدم مراجعه منظم به مراکز بهداشتی	۳۸	(۹/۵)	۹۰/۵(۳۵۶)
عدم دسترسی به مراقبت‌های بارداری	۲۷	(۷/۸)	۹۳/۲(۳۷۳)
عدم رضایت از برخورد پرسنل مراکز	۱۹	(۶/۷)	۹۵/۳(۳۸۱)
وجود حادثه استرس آور	۲۷	(۷/۸)	۹۳/۲(۳۷۳)
پرخطر بودن بارداری	۱۲	(۳)	۹۷/۳(۳۸۸)

فردی- اجتماعی شامل سن بارداری، رتبه بارداری، شمار فرزندان، شغل، تحصیلات، ناخواسته‌بودن بارداری، سابقه نازایی، پرخطر بودن بارداری، وجود حادثه استرس آور، بهره‌مند بودن از حمایت اطرافیان، نگرانی در مورد زیبایی، اهمیت جنس نوزاد برای زن باردار و همسر او، دسترسی نداشتن به مراقبت‌های بهداشتی و شغل و تحصیلات همسر دست کم در یکی از ابعاد نگاهه آزمون به کار برده شده، تفاوت معنی داری دیده شد.

در زمینه متغیرهای سن، مصرف سیگار، ناخواسته‌بودن بارداری از سوی همسر، مراجعه نامنظم به مراکز بهداشتی و نارضایتی از شیوه برخورد کارکنان مراکز بهداشتی، فاصله بارداری فعلی تا زایمان پیشین و سابقه مشکل جسمی، سابقه سقط یا مرده‌زایی و از دستدادن والدین در کودکی در هیچ‌کدام از ابعاد نگاهه آزمون تفاوت معنی داری دیده نشد.

متقابل (۴۴/۳) و روانپریشی (۱۰/۳) است (جدول ۳).

جدول ۱- توزیع فراوانی برخی ویژگی‌های فردی و اجتماعی گروه مورد بررسی

متغیر	درصد	فرابانی
سن	۱۶-۲۰	۱۱/۸
تحصیلات	۲۱-۲۵	۳۴/۵
توسطه	۲۶-۳۰	۳۳/۲
بالاتر از دیپلم	۳۱-۴۰	۲۰/۵
سدهماهه اول	سوم راهنمایی و قبل از آن	۲۸/۷
سدهماهه دوم	۴۱	۱۶۴
سدهماهه سوم	۱۱۵	۱۲۱
اول	۲۲۰	۵۵
تعداد فرزندان	۰	۶۰/۳۰
۱	۹۳	۲۴۱
بیشتر از ۱	۶۶	۱۷۴
فاصله بارداری	کمتر از ۳ سال	۶۱
فعلی تا زایمان قبل	۳ سال با بیشتر	۱۰۰
بدون جواب	۲۳۹	۵۹/۷
شغل	شاغل	۱۳۰
خانه‌دار	۲۷۰	۶۷/۵

شیوه لحظه‌ای برای کل ابعاد ۳۲٪ به دست آمد. به منظور بررسی شدت اختلال روانی، جدول درجه‌بندی شده GSI (شاخص کلی علایم مرضی) به کار بوده شد که نتایج آن در جدول ۴ آورده شده است. در مقایسه میانگین نمره‌ها بر حسب برخی ویژگی‌های

جدول ۳- توزیع فراوانی مطلق و نسبی اختلالات روانی، میانگین، انحراف معیار و فاصله اطمینان ۹۵٪ در گروه مورد بررسی

مقیاس	فراوانی	شیوع (درصد)	فاصله اطمینان	میانگین	انحراف معیار
شکایات جسمانی	۱۵۰	۳۷/۵	۳۲/۸-۴۲/۰	۱/۳۷۵	۰/۴۸۰
وسواس و اجبار	۱۱۶	۲۹	۲۶/۷-۳۳/۸	۱/۲۹۰	۰/۴۰۴
حساسیت در روابط متقابل	۱۷۷	۴۶/۳	۳۹/۲-۴۹/۳	۱/۴۴۲	۰/۴۹۷
افردگی	۱۳۷	۳۶/۳	۲۹/۶-۳۹/۲	۱/۳۴۳	۰/۴۷۵
اضطراب	۱۷۱	۴۲/۸	۳۷/۹-۴۷/۸	۱/۴۲۷	۰/۴۹۰
پرخاشگری	۱۱۴	۲۸/۰	۲۶/۲-۳۳/۲	۱/۲۸۰	۰/۴۰۲
ترس مرضی	۸۷	۲۱/۸	۱۷/۹-۲۷/۲	۱/۲۱۸	۰/۴۱۳
افکار پارانوییدی	۱۴۱	۳۰/۳	۳۰/۶-۴۰/۲	۱/۳۰۳	۰/۴۷۸
روان‌پریشی	۴۱	۱۰/۳	۷/۵-۱۳/۷	۱/۱۰۳	۰/۳۰۴
سایر	۱۶۳	۳۰/۸	۳۱/۱-۴۰/۷	۱/۳۷۵	۰/۴۸۰
GSI	۱۱۹	۲۹/۸	۲۰/۱-۳۴/۷	۱/۷۴۶	۰/۴۸۰
PST	—	—	—	۳۷/۲۱۸	۱۹/۱۷۸
PSDI	—	—	—	۱/۷۲۸	۰/۴۸۱

Andesheh
Va
Raftari
اندیشه و رفتار

۴۹

شیوع وسوس و اجبار در این بررسی ۲۹٪ به دست آمد که نسبت به آمار شیوع ۲ تا ۰/۵٪ گزارش شده در پژوهش گریب^۷ و همکاران (۲۰۰۰) روی جمعیت عمومی بالاتر است. این یافته با نتیجه بررسی‌های ایانکو^۸، لپکیفکر^۹، دانسون^{۱۰} و کوتلر^{۱۱} (۱۹۹۵) و آتشولر^{۱۲}، هندریک^{۱۳} و کوهن^{۱۴} (۱۹۹۸) همسوی دارد.

شیوع اختلال حساسیت در روابط متقابل در این بررسی ۰/۴۴٪ است که در مقایسه با یافته‌های پژوهش اولری^{۱۵} و همکاران (۱۹۹۹)، که شیوع این اختلال را در زنان ۳۲٪ و در مردان ۲۵٪ گزارش می‌کند، بالاتر است. ایکسو^{۱۶} (۱۹۹۴) نیز شیوع بیشتر این اختلال را در زنان باردار تأیید می‌کند. این شیوع با توجه به تفسیرات تصویر ذهنی از بدن خویشتن و نوسان‌های

جدول ۴- توزیع فراوانی شدت اختلال روانی براساس شاخص کلی علایم مرضی (GSI) در گروه مورد بررسی

علایم مرضی	درصد	فراوانی	
مالم (۰-۱)	۷۰/۲	۲۸۱	
خفیف (۱-۱/۹۹)	۲۷/۵	۱۱۰	
متوسط (۲-۲/۲۲)	۲۷/۳	۹	
شدید (۳+ بزرگتر از آن)	۰	۰	
مجموع	۱۰۰	۴۰۰	

بحث

با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر که شیوع شکایات جسمانی ۳۷/۵٪ نشان می‌دهد، نسبت به رقم به دست آمده از شیوع این اختلال در جمعیت عمومی (۰/۳۰٪) در بررسی فینیک^۱، سورنسون^۲، انگریگ^۳، هولم^۴ و بورج^۵ (۱۹۹۹) بیشتر می‌باشد. نتایج بررسی فاوا^۶ و همکاران (۱۹۹۰) نیز این تفاوت را تأیید می‌کند. این یافته با توجه به تفسیرات فیزیولوژیک، هورمونی و روانی دوران بارداری قابل توجیه است.

- | | |
|--------------|---------------|
| 1- Fink | 2- Sorenson |
| 3- Engberg | 4- Holm |
| 5- Jorge | 6- Fava |
| 7- Grabe | 8- Iancou |
| 9- Lepkifker | 10- Danon |
| 11- Kotler | 12- Altshuler |
| 13- Hendrick | 14- Cohen |
| 15- Oleary | 16- Xu |

فورمارک^۷ و همکاران (۱۹۹۸) که شیوع آن در جمعیت عمومی ۱۰/۶٪ گزارش کرده‌اند، بالاتر است. چمبرلین^۸ و سیم کیتز^۹ (۲۰۰۰) براین باورند که نرس مرضی در دوران بارداری افزایش می‌یابد. ترس از پیامدهای جسمی، اقتصادی و اجتماعی بارداری و زایمان را می‌توان از دلایل افزایش این اختلال‌ها در این دوران دانست (قطبی، نیکروش، سلیمانی، ۱۳۷۷). میزان شیوع افکار پارانوئیدی در این بررسی ۳۵/۳٪ است که در مقایسه با پژوهش‌های معتمدی و همکاران (۱۳۷۸) و (۱۳۷۸) که شیوع این اختلال را در جمعیت روستایی و دانشجویی به ترتیب ۵۳/۳٪ و ۵۳/۵٪ گزارش کرده‌اند، کمتر است. مادوکس^{۱۰}، پری روت^{۱۱}، ریپلین^{۱۲}، پلوکس^{۱۳} و کوژنت^{۱۴} (۱۹۹۱) نیز در بررسی خود به کاهش افکار پارانوئیدی در دوران بارداری دست یافته‌اند. افزایش نیازهای وابستگی در دوران بارداری و جنسیت آزمودنی‌ها را می‌توان از دلایل این کاهش پرشعرده (هابر^{۱۵}، ۱۹۹۷).

شیوع اختلال روان‌پریشی در این بررسی ۱۰/۳٪ است که با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های معتمدی و همکاران (۱۳۷۸) و (۱۳۷۸) در جمعیت‌های روستایی و دانشجویی (۴۷/۱٪ و ۱۹/۹٪) شیوع پایین‌تری دارد. کاسپر (۱۹۹۸)، کمبل و ولس (۲۰۰۰) معتقدند اختلال روان‌پریشی در دوران بارداری کاهش می‌یابد. آن‌ها دلیل این را تحریک‌گیرنده‌های بلوک‌کننده

خلقی زنان در این دوران توجیه‌پذیر است (یانگ‌کین و دیویس، ۱۹۹۸).

شیوع افسردگی در این بررسی (۳۴/۳٪) از میزان شیوع این اختلال در زنان باردار و در جمعیت عمومی در بررسی‌های انجام شده (کرکی^{۱۶}، هیلسما^{۱۷}، ریاسلو^{۱۸}، مانپلا^{۱۹} و یلیکورکالا^{۲۰}؛ شاو، ۱۹۹۹) که به ترتیب ۳۰٪ و ۱۴٪ گزارش شده، بیشتر است. استینز^۷ (۱۹۹۸) براین (۲۰۰۱) نیز در بررسی‌های خود به میزان بالاتر افسردگی در دوران بارداری دست یافته‌اند. اثرات سرکوب‌کننده پروژسترون روی سامانه عصبی مرکزی، اختلال در روابط جنسی، تغییرات جسمی و محدودیت حرکات زن باردار در ایجاد این اختلال نفسی دارند (شرون^{۲۱}، سولونو^{۲۲} و وین‌گارتمن^{۲۳}، ۱۹۹۹).

شیوع موارد مشکوک به اضطراب در این بررسی ۴۲/۸٪ است. آمار بدست آمده از شیوع این اختلال در زنان باردار و جمعیت عمومی به ترتیب ۲۳٪ و ۱۶٪ است (کلی^{۲۴}، راسو^{۲۵} و کاتن^{۲۶}، ۲۰۰۱، باروفول^{۲۷} و تیلمانی^{۲۸}، ۱۹۹۳). آتشولر (۱۹۹۸) و براین (۲۰۰۱) نیز چنین تفاوتی را تأیید می‌کنند. نگرانی در مورد بارداری، زایمان و وضعیت جنین، پذیرش تعهد و مستولیت و افزایش سطع استرادیول از دلایل بالابودن اضطراب در زنان باردار می‌باشد (می^{۲۹}، میل‌مستر^{۳۰}، ۱۹۹۴).

شیوع پرخاشگری در نمونه مورد بررسی ۲۸/۵٪ به دست آمد. ال‌زیبرگ^{۳۱}، پنا^{۳۲}، هررا^{۳۳}، لیلیجستراند^{۳۴} و وینکویزیت^{۳۵} (۲۰۰۰) شیوع این اختلال را در ۳۱٪ زنان باردار و معتمدی و همکاران (۱۳۷۸) در ۱۵/۵٪ دانشجویان گزارش می‌کنند. اوچت^{۳۶}، کاری^{۳۷} و آدام^{۳۸} (۱۹۹۹) نیز در بررسی خودشان بالاترین شیوع پرخاشگری در زنان باردار را نسبت به سایر گروه‌ها گزارش کردند. نوسان‌های خلقی و عصبانیت‌های این دوران را می‌توان دلیلی براین امر شمرد.

ترس مرضی در این بررسی از شیوعی برابر ۲۱/۸٪ برخوردار است که نسبت به یافته‌های پژوهش

1- Kurki	2- Hillesmaa
3- Raitasalo	4- Mattila
5- Ylikorkala	6- Show
7- Steiner	8- Brown
9- Sherwen	10- Soloveno
11- Weingarten	12- Kelly
13- Russo	14- Katon
15- Baruffol	16- Thilmany
17- May	18- Mallemister
19- Ellsberge	20- Pena
21- Herrera	22- Liljestrand
23- Winkvisit	24- Otchet
25- Carey	26- Adam
27- Furmark	28- Chemberlin
29- Simpkins	30- Madoux
31- Prerost	32- Repellin
33- Pailleux	34- Couzthnt
35- Haber	

افسردگی، پرخاشگری و ترس مرضی) اهمیت جنس نوزاد برای همسر (تمام ابعاد به جز روان پریشی و سوالات اضافی) نگرانی در مورد زیبایی (در تمام ابعاد)، رویارویی یا حادثه استرس آور (در تمام ابعاد به جز روان پریشی، ترس مرضی و مایر)، پرخطر بودن بارداری (در تمام ابعاد به جز شکایات جسمانی، وسوسات و اجبار و مایر) و برخوردار نبودن از حمایت اطرافیان (تمام ابعاد به جز ترس مرضی) نیز تفاوت معنی داری دیده شد.

بررسی های انجام شده بهمنظور بررسی عوامل مرتبط با وضعیت روانی زن باردار با یافته های بررسی حاضر همسویی دارند. چنانچه لوین^۱، گاردنر^۲ و راس^۳ (۱۹۷۵) ارتباط بین افزایش سطح تحصیلات زن باردار و کاهش اضطراب را تأیید کردند.

وجود تفاوت معنی دار در بعد پرخاشگری بر حسب متغیرهای رتبه بارداری و تعداد فرزندان احتمالاً با ناخواسته بودن بارداری در گروه های بارداری دوم و به بعد و یا دارای بیش از یک فرزند در ارتباط است. تفاوت معنی دار مشاهده شده در بعد سایر بر حسب متغیر سن بارداری را می توان با افزایش اختلال های خواب در سه ماهه سوم بارداری مرتبط دانست که در بررسی میندل^۴ و جکوبسون^۵ (۲۰۱۰) نیز تأیید شده است (اغلب ماده های این بعد مریبوط به اختلال های خواب می باشد). نتایج به دست آمده از این بررسی در مورد متغیرهای شغل زن باردار و سابقه نازایی به ترتیب با یافته های پژوهش های گرجی زاده و مکوندی (۱۳۷۶) و کلای^۶ و گرینفیلد^۷ (۲۰۰۰) همخوانی ندارد. دلیل چنین مغایرتی احتمالاً به نگرش فرهنگ های مختلف نسبت به شاغل یا خانه دار بودن خانم ها و مسئله نازایی باز می گردد که در جامعه مورد بررسی این پژوهش، زنان شاغل از احترام، ارزش و اعتماد به

دوپامین به دنبال افزایش سطح استرادیول در دوره بارداری می دانند.

میانگین ابعاد مختلف اختلال روانی به دست آمده در بررسی حاضر (۳۲٪) بالاتر از میانگین ارائه شده در گزارش بازنگری احسان منش (۱۳۸۰) از همه گیرشناصی بیماری های روانی در ایران، با استفاده از ایساز SCL-90-R است. در این بازنگری، بالاترین میزان در مطالعه جوانشانی (۱۳۷۴) دیده شد که برابر با ۲۹٪ بوده است.

لیپس^۸ (۱۹۸۰)، ایکسو (۱۹۹۴) و اوچت و همکاران (۱۹۹۹) نیز در مقایسه وضعیت روانی زنان باردار و مایر گروه ها این نتیجه را تأیید می کنند. تغییرات قابل ملاحظه جسمی و روانی و آساده شدن برای پذیرش نقش جدید را می توان از دلایل افزایش اختلال روانی در دوران بارداری بر شمرد (باری^۹، ۱۹۹۶).

در مقایسه میانگین نمره ها بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی از جمله متغیرهای زیر تفاوت معنی دار در برخی ابعاد دیده شد: رتبه بارداری، تعداد فرزندان، تحصیلات همسر (در بعد پرخاشگری)، تحصیلات (در بعد اضطراب و پرخاشگری)، شغل همسر (در بعد اضطراب)، سن بارداری (در بعد سایر) و شغل (در ابعاد وسوسات و اجبار، حساسیت در روابط مقابل، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری). همچنین نمره بالاتر در زنان دارای ویژگی های زیر دیده شده: بارداری دوم و به بعد، دارای بیش از یک فرزند، تحصیلات پایین تر خود و یا همسر، شغل غیردولتی همسر، قرار گرفتن در سه ماهه سوم بارداری و خانه دار بودن. افزون بر آن، در متغیرهای دسترسی نداشتن به مراقبت های بهداشتی (در بعد پرخاشگری)، ناخواسته بودن بارداری (در بعد حساسیت در روابط مقابل، افسردگی؛ پرخاشگری)، سابقه نازایی (در ابعاد حساسیت در روابط مقابل، اضطراب و مایر)، اهمیت جنس نوزاد برای زن باردار (در ابعاد شکایات جسمانی، حساسیت در روابط مقابل،

استینو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

صاحب کتاب، حمید: *الماضی*، فریبا (۱۳۷۲). بهداشت دوران بارداری، تهران: نشر اشارت.

صحتی، فهیمه (۱۳۷۹). بررسی ۴۲ مورد افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعت کننده به بیمارستان‌های زنان-مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۷۷. *مجله علمی دانشکده پرستاری و معلمی*، ۹-۵۶.

قطبی، نادر؛ نیکروش، افتشین؛ سلیمانی، محمد رضا (۱۳۷۷). *بیماری‌های زنان*. تهران: مؤسسه انتشاراتی تیمور زاده.

گرجی‌زاده، محمد حسن؛ مکوندی، بهنام. بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و ترس مرضی در دوران بارداری در شهر آهواز در سال ۱۳۷۶. *نشریه علوم پزشکی*، ۷۷-۶۵.

معتمدی، هادی؛ یاسمن، محمد تقی؛ کرباسی، حسن؛ بشی واهب، میزان شیوع اختلالات روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. *مجله دانشکده علوم پزشکی کرمان*، دوره ششم، شماره ۳، ۱۵۶-۱۴۹.

معتمدی، هادی؛ یاسمن، محمد تقی؛ کرباسی، حسن؛ بشی واهب، قدسیه (۱۳۷۶). تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در دو روزتای استان کرمان. *مجله دانشکده علوم پزشکی کرمان*، دوره پنجم، شماره ۱، ۳۶-۳۱.

میرزاپی، رقبه (۱۳۵۹). *ارزیابی و انتبار آزمون SCL-90*. فرایران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران.

میلاتی فر، بهروز (۱۳۷۳). *بهداشت روانی*. تهران: نشر قومی. نصیری، محمود (۱۳۷۹). *بهداشت روانی دوران بارداری و زایمان*. تهران: نشر و تبلیغ بشری.

Altshuler,L.L.,Hendrick, & Cohen,L.S.(1998). Course of mood and anxiety disorders during pregnancy and post partum period. *Clinical Psychiatry*, 2, 29-33.

Barry,P.D.(1996).*Psychosocial Nursing*, Philadelphia: Lippincott Raven Publisher.

Barufel,E.,& Thilmany,M.C.(1993).Anxiety; depression; somatization and alcohol abuse prevalence

نفس بالایی برخوردار بوده‌اند و مشکل نازلی برای آن‌ها نارسانی مهم و برجسته‌ای به شمار نمی‌رفته است. برخلاف تصور اغلب افراد که بارداری را دورانی آرام و نشاط‌برانگیز می‌دانند، نتایج این بررسی نشان داد که احتمال بروز اختلال‌های روانی در زنان باردار در بسیاری از ابعاد نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر می‌باشد و ویژگی‌های فردی اجتماعی در این زمینه نفس عمده‌ای ایفا می‌کنند. چنین نتیجه‌ای ضرورت ارائه خدمات بهداشت روانی برای این گروه از افراد جامعه و شناخت و پیمود عوامل مرتبط با اختلال‌های روانی دوران بارداری را مطرح می‌سازد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از آقایان دکتر غفاری نژاد، دکتر اسلامی، مهندس شهابی و خانم دکتر سجادی که در انجام مراحل مختلف این پژوهش یاریگر پژوهشگران بوده‌اند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

منابع

احسان منش، مجتبی (۱۳۸۰). *همه گیرشناختی بیماری‌های روانی در ایران: بازنگری برخی بررسی‌های انجام شده*. *فصلنامه اندیشه و رفتار* سال ششم، شماره ۴، ۶۹-۵۰.

باقری‌یزدی، سیدعباس؛ سوالهی، جعفر؛ شاه‌محمدی، داوود (۱۳۷۳). *همه گیرشناختی اختلال‌های روانی در مناطق روستایی میبد بزد*. *فصلنامه اندیشه و رفتار* سال اول، شماره اول، ۴۱-۳۲.

بداغ‌آبادی، مهین؛ بهنام و شایی، حمید‌رضا؛ بهنامی‌فر، نسرین؛ اکبری، فاطمه؛ فاخرد‌بی‌اوندی، میترا؛ جوی پای تاجی، اعظم؛ عباس‌زاده لیلا؛ رحمانی، فاطمه (۱۳۷۹). بررسی میزان شیوع افسردگی، عوامل مرتبط با آن در خانم‌های باردار. *مجله پیو* سال ششم، شماره اول، ۳۸-۳۲.

جوافشانی، محمدعلی (۱۳۷۴). بررسی میزان شیوع بیماری‌های روانی نوروفیک مر تهر صکونی الوند و صفتی قزوین و رابطه افسردگی زنکن، همچرخ از روتای شهو و وضع اجتماعی-اقتصادی. پایان‌نامه درجه تحصیلی رشته اپسلوبیلوژی دانشکده بهداشت و

- rates in general Belgian community sample. *Acta Psychiatry Belge*, 93, 136-153.
- Brown,C.S.(2001). Depression and anxiety disorders. *Obstetric Gynecology Clinic North American*, 28, 241-268.
- Buchley,K.,& Kulb,N.(1993).*High risk maternity nursing manual*.Baltimore: Williams, & Wilkins.
- Burroughs,A.(1997). *Maternity nursing*, Philadelphia: WB Saunders Company.
- Campbell,S.,& Less,C.(2000).Obstetrics by ten teacher .New York: Arnold.
- Casper,R.(1998). *Women's health*, USA: Cambridge University Press.
- Chamberlin,G.,& Simpkins, B.P.(2000). *A practice of obstetrics and gynecology*,Edinburgh: Churchill Living Stone.
- Demyttenare,K.,Lenaretes,H.,Nijs,P.,&Van,F.A.(1995). Individual coping style and psychological attitudes during pregnancy and post partum. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 91, 95-102.
- Dickason,E.J.,Silverman,B.L.& Kaplan,J.A. (1998). *Maternal infant nursing care*, St Louis Mosby.
- Ellsbergh,M.,Pena,R.,Herrera,A.,Liljestrand,J., & Winkivisit,A.(2000). Candies in hell: women's experiences of violence in Nicaragua. *Social Science Medicine*, 51, 1595-1610.
- Fava,G.A.,Grandi,S.,Michelacci,L.,Saviotti,F.,Conti, S.,Bovicelli,L.,& Trombini,G.(1990). Hypocondrial fears and belief in pregnancy. *Acta Psychiatrica Scandinavica*,82,70-72.
- Fink,P.,Sorenson,L.,Engberg,M.,Holm, M.,& Jorge. (1999). Somatization in primary care prevalence health care utilization general practitioner recognition .*Psychosomatic Researches*, 40, 330-338.
- Furnmark,T.,Tillfors,M.,Everz,P.,Marteins,D.,Gefvert, O., & Fredrikson,M.(1998). Social phobia in the general population; prevalence and sociodemographic profile. *Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology*, 34, 418-424.
- Grabe,H.J.,Meyer,C.,Hapke,U.,Rumpf,H.J.,Freyberger, H.J.,Dilling,H.& John,U.(2000). Prevalence quality of life and psychosocial function in obsessive compulsive disorder in Northern Germany. *European Archive Psychiatry and Clinical Neurosociology*, 250, 262-268.
- Haber,J.H.(1997).*Comprehensive psychiatric nursing*, St Louis: Mosby.
- Hunfeld,J.A.,Wlademiroff,J.W.,Verhage,F.,& Passchier,J.(1995). Previous stress and acute psychological defense as prediction prenatal grief: an explanatory study. *Social Science Medicine*, 40, 829-835.
- Iancou,I.,Lepkifker,E.,Dannon,P.,& Kotler M. (1995). Obsessive compulsive disorder limited to pregnancy.*Psychotherapy Psychosomatic Researches*, 64, 100-112.
- Kamel,H.S.,Ahmed,H.N.,Eissa,M.A.,& Abol-oyoun, S.M.(1999).Psychological and obstetrical responses of mothers following antenatal fetal sex identification.*Obstetric & Gynecology Research*,25, 43-50.
- Kelley,R.H.,Russo,J.,& Katon,W.(2001).Somatic complaints among pregnant women cared for in obstetrics: normal pregnancy or depressive and anxiety symptom amplification revisited. *General Hospital Psychiatry*, 23, 107-113.
- Kitamura,T.,Sugawara,M.,Sugawara,K.,Toda,A., & Shima,S.(1996). Psychosocial of depression in early

- pregnancy. *British Journal of Psychiatry*, 168, 732-738.
- Klock,S.C.,& Greenfeld,D.A.(2000). Psychological status of in vitro fertilization patients during pregnancy: a longitudinal study. *Fertility Sterility*, 73, 1159-1164.
- Kurki,T.,Hillesmaa,V.,Raitasalo,R.,Mattila,H., & Ylikorkala,O.(2000). Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia. *Obstetrics and Gynecology*, 95,487-490.
- Leonard,L.G.(1998). Depression and anxiety disorders during multiple pregnancy and parenthood. *Obstetrics and Gynecology Neonatal Nursing*, 27, 329-337.
- Lips,H.M.(1985). A longitudinal study of the reporting of emotional and somatic symptom during pregnancy and after pregnancy. *Social Science Medicine*, 21, 631-640.
- Littlewood,J.,& McHugh,N.(1997). *Maternal distress and postnatal depression*, Houndsills: Macmillan Press Ltd.
- Lubin,B.,Gardner,S.H.,& Roth,A.(1975). Mood and somatic symptoms during pregnancy. *Psychosomatic Medicine*, 37(2):136-146.
- Madoux,M.,Prerost,P.,Repellin,F.,Pailleux,J.M., & Couzhnt,N.(1991). Course of chronic paranoid delusions during pregnancy and post partum. *Anniversary Medicine Psychology*, 149,730-733.
- May,K.M., & Malmister,I.R.(1994). *Maternal neonatal nursing*, Philadelphia: J-B Lippincott Company.
- McKee,M.D.,Cunningham,M.,Jankowski,K.R., & Zayas,L.(2001). Health related functional status in pregnancy: relationship to depression and social support in a multi - ethnic population *Obstetrics and Gynecology*, 97, 988-993.
- Mindell,J.A.,& Jacobson,B.J.(2000).Sleep disturbances during pregnancy.*Journal of Obstetrics and Gynecology Neonatal Nursing*, 26, 590-597.
- Nikcevic,A.,Kuczmarczykm,A.R.,& Nicolides, K. H.(1998). Personal coping resources, responsibility, anxiety and depression after early pregnancy loss. *Obstetric and Gynecology*, 19,145-145.
- Oleary,K. D., Barling, J., Arias, I., Rosenbaum, A., Malone, J., & Tyree, A. (1999). Prevalence and stability of physical aggression between spouses. *Journal of Consulting Clinical Psychology*, 57, 263-268.
- Otchet,F.,Carey,M.S., & Adam.L.(1999).General health and psychological symptom status in pregnancy and the peripartum: what is normal? *Obstetrics and Gynecology*, 94, 935-941.
- Page,L.A.(2000).*The New midwifery*. Edinburg: Churchill Living Stone.
- Paulselten,J.(1998). Prenatal exposure to maternal stress and subsequent schizophrenia.*British Journal of Psychiatry*, 172, 324-326.
- Seguier,L.(1995). Chronic stressors; social support; and depression during pregnancy.*Obstetric and Gynecology*,85, 533-539.
- Sherwen,L.N.,Soloveno,M.A.,& Weingarten,C.T. (1999).*Maternity Nursing*, Stamford:Appleton and Lange.
- Show,C.M.,Creed,F.,Tomenson,B.,Rister,L., & Cruhckshank, J. K. (1999). Prevalence of anxiety and depressive illness and help seeking behavior in African Caribbean and white Europeans:two phase general population survey. *British Medical Journal*, 30, 302-305.
- Smith,L.E.,Dent,D.Z.,Coles,C.D.,& Falek,A. (1992). A comparison study of treated and untreated preg-

- nant and post partum cocaine-abusing women. *Substance Abuse Treatment*, 9, 343-348.
- Steiner,M.(1998).Perinatal mood disorders: position paper. *Psychopharmacology Bulletin*, 34,301-306.
- Xu,P.F.(1994).Study of the psychological character of pregnant women. *Zhong Hua hulization*, 29, 515-518.
- Younghkin,E.Q., & Davis,M.S.(1998).*Women's health: primary care clinical guide*, Stanford: Appleton and Lange.

Andeasheh
Va
Raftari
اندیشه و رفتار

۵۵

