

مقایسه فعالیت سیستم‌های مغزی/رفتاری و ابعاد کمال‌گرایی

در بیماران کرونری قلب و افراد سالم

Comparison of brain/behavioral systems activity and dimensions of perfectionism in coronary heart disease and normal subjects

تاریخ پذیرش: ۸۸/۳/۸

تاریخ دریافت: ۸۷/۹/۲

Moazen S. MSc[✉], Azad-Fallah P. PhD, Safi M. PhD

سمیه موذن[✉]، پرویز آزاد فلاح^۱، مرتضی صافی^۲

Abstract

Introduction: The present research compared two personality characteristics of BAS/BIS activity and perfectionism in coronary heart disease (CHD) and normal male subjects.

Method: 50 married male by mean age of 53 with CHD diagnosis from Modarres hospital compared with 50 healthy male (with the same including criteria) according to the Carver & White's BIS/BAS and multidimensional perfectionism scales.

Results: In men with CHD the activity of BAS were higher than healthy men. Also, in subjects with CHD self-oriented perfectionism and other-oriented perfectionism were higher than healthy men. There were significant differences between correlations of BAS's subscales and dimensions of perfectionism in CHD and healthy subjects.

Conclusion: Activity of BAS system and dimensions of perfectionism are good components of type A behavioral pattern for psychological analysis of CHD.

Keywords: Brain/Behavioral Systems, Perfectionism, Coronary Heart Diseases

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان فعالیت سیستم‌های مغزی/رفتاری و ابعاد کمال‌گرایی در مردان مبتلا به بیماری کرونری قلب و افراد سالم، برای توصیف دقیق‌تر نیمرخ روانی بیماران کرونری قلب به اجرا درآمد.

روش: ۵۰ مرد متأهل با میانگین سنی ۵۳ سال دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر از آن و مبتلا به بیماری کرونری قلب که برای اولین بار در بخش قلب یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بودند؛ و ۵۰ مرد مراجعه‌کننده به یک کلینیک دندانپزشکی که از نظر متغیرهای گروه سنی، تأهل و سطح تحصیلات با گروه بیماران یکسان شده بودند، پرسش‌نامه‌های بازداری/روی‌آوری کارور و وايت و کمال‌گرایی چندگانه هویت و فلت را تکمیل کردند.

یافته‌ها: مردان مبتلا به بیماری کرونری قلب در مقایسه با افراد سالم، سیستم فعال‌ساز رفتاری غالب و فعال‌تری داشتند. همچنین مردان مبتلا به بیماری کرونری قلب در دو بعد کمال‌گرایی خویشنده مدار و کمال‌گرایی دیگر مدار به طور معنی‌دار بیش از افراد سالم واحد و بیزگی‌های کمال‌گرایی بودند. در گروه مردان مبتلا به بیماری کرونری قلب، همبستگی میان خرده‌مقیاس‌های سیستم فعال‌ساز رفتاری و ابعاد سه‌گانه کمال‌گرایی بیشتر از افراد گروه سالم بود.

نتیجه‌گیری: اجزای خاصی از ساختار الگوی رفتاری ریخت A با اختلالات کرونری قلب به صورت اختصاصی رابطه دارند. بنابراین فعالیت سیستم فعال‌ساز رفتاری و ابعاد کمال‌گرایی می‌توانند مؤلفه‌های مناسبی در تحلیل‌های روان‌شناسی بروز بیماری کرونری قلب باشند.

کلیدواژه‌ها: سیستم‌های مغزی/رفتاری، ابعاد کمال‌گرایی، بیماری کرونری قلب

[✉]**Corresponding Author:** Department of Psychology, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
Email: smoazen@gmail.com

^۱ گروه روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

^۲ گروه روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

^۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

مقدمه

توصیف می‌شوند که معیارهای بالایی را در نظر می‌گیرند، سرسختانه این معیارها را دنبال کرده و ارزش خود را نیز بر حسب نیل به این معیارها تعریف می‌کنند.

هویت، فلت و دی‌روسا [۸] کمال‌گرایی را سازه‌ای چند بعدی شامل کمال‌گرایی خویشن‌مدار، کمال‌گرایی دیگرمدار و کمال‌گرایی هنجارمدار می‌دانند که مؤلفه‌های گوناگون رفتار ریخت A، به طور مثبت و معنی‌دار با هر سه بُعد آن ارتباط دارند. کمال‌گرایی خویشن‌مدار عبارت است از تمایل به وضع معیارهای غیرواقع‌بینانه برای خود، تمرکز بر نقص‌ها و شکست‌ها در عملکرد، همراه با خودناظارت‌گری‌های دقیق [۹، ۸]. این شکل از کمال‌گرایی، نزدیکترین بُعد به سازه‌ای است که غالباً به عنوان کمال‌گرایی شناخته می‌شود [۱۰، ۸]. کمال‌گرایی دیگرمدار، بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران است و کمال‌گرایی هنجارمدار، به احساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده ساختن انتظارات القا شده از سوی افراد مهم به منظور کسب تأیید، اطلاق می‌شود [۹].

ارایه تبیینی روان‌زیست‌شناختی در مورد ارتباط ویژگی‌های الگوی رفتاری ریخت A و اختلالات کرونری با استفاده از سیستم‌های عصبی-مفهومی، راهبردی مناسب است. چرا که برای سازه‌های روان‌شناختی، زیرساخت‌های عصبی و زیستی رافراهم می‌سازد [۱۱]. بر اساس این راهبرد، سه سیستم عصبی-مفهومی اصلی در نظریه "حساسیت به تقویت" جفری‌گری عبارتند از: سیستم پاداش یا سیستم فعل ساز رفتاری، سیستم جنگ/گریز و سیستم بازداری رفتاری.

برون‌داد سیستم فعل ساز رفتاری که توسط محرك‌های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه فعل می‌شود، عبارت است از: روی آوردن، جستجوی فعالانه پاداش، اجتناب فعل و اجتناب از تنبیه [۱۲، ۱۳]. این سیستم دلیل بنیادی صفت زودانگیختگی است و با برон‌گردی و تحیریک‌طلبی مرتبط است [۱۴، ۱۳]. فعالیت سیستم بازداری رفتاری با احساس اضطراب، نگرانی و نشخوار فکری مطابقت دارد [۱۴] و این سیستم به نشانه‌های شرطی تنبیه و حذف پاداش و محرك‌های بدیع و تازه حساس است که در پاسخ به تنبیه و نشانه‌های ناکامی بدون پاداش، فعل می‌شود. دو مؤلفه رفتاری آن، اجتناب فعل پذیر (اجتناب از طریق عدم فعالیت یا تسليم و خاموشی) و توقف رفتارهای بدون پاداش است. درون‌دادهای غیرشرطی تنبیه و فقدان پاداش در سیستم جنگ/گریز نیز، برون‌دادهای گریز و جنگ را برمی‌انگیزنند و حساسیت و فعالیت زیاد این سیستم با روان‌گسسته‌گرایی ارتباط دارد [۱۵]. در تجدید نظر اخیر، گریز سیستم جنگ/گریز/بهت را جایگزین سیستم قبلی نمود که هم به محرك‌های آزارنده شرطی و هم به محرك‌های آزارنده غیرشرطی حساس است [۱۶].

بر اساس نظریه گریز [۴] افراد با الگوی رفتاری ریخت A بایستی در بین محورهای برون‌گردی و زودانگیختگی قرار گیرند و این نکته

بیماری کرونری قلب یکی از انواع بیماری‌های قلبی است که اساساً دارای ماهیت روان‌تنی بوده و نقش عوامل روان‌شناختی (به‌ویژه شخصیتی) در ظهور آن روشن شده است. این عوامل به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با تأثیرگذاری بر عوامل خطر فیزیولوژیک، خطر وقوع بیماری کرونری قلب را افزایش می‌دهند. این عوامل شامل تندیگی اجتماعی و شغلی، الگوی رفتاری ریخت A، خشم و خصوصت و ... هستند. تحقیقات روزنمن و فریدمن [۱] در جهت یافتن ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و بیماری قلبی به شناسایی الگوی رفتاری ریخت A انجامید و نتایج این تحقیقات باعث توجه هرچه بیشتر محققان به ارتباط بین شخصیت و بیماری شد. رفتار ریخت A با ویژگی‌هایی چون خشم، خصوصت، کوشش‌های جاهطلبانه برای پیشرفت، ناآرامی، الگوی‌های گفتاری و حرکتی تند و شدید مشخص می‌شود [۲] که رقابت‌جویی و احساس فوریت زمانی، پرخاشگری، سلطه‌جویی و تلاش زیاد برای دستیابی به اهداف در زمانی کوتاه از مشخصه‌هایی باز آن است [۳]. این الگو به عنوان عامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های مختلف کرونری قلب از قبیل آثربین، تصلب شرایین و انفارکتوس می‌تواند در نظر گرفته شده است [۴].

در سه دهه گذشته این الگوی رفتاری، موفقیت‌هایی در پیش‌بینی اختلال کرونری قلب داشته است [۳] اما سؤال اساسی درباره نقش الگوی رفتاری ریخت A در بیماری قلبی این است که: آیا تمام جنبه‌های این الگوی رفتاری در پیش‌بینی اختلال کرونری قلب سودمند هستند؟

یکی از رویکردهای مهم پژوهشی الگوی رفتاری ریخت A، الگوی تحلیل مؤلفه‌ای است [۵] که به مشخص کردن اجزای روان‌شناختی خاصی از این الگوی رفتاری (آنها) که به صورت اختصاصی با اختلالات کرونری قلب رابطه دارند) می‌پردازد. پژوهش حاضر نیز در این حوزه، به بررسی ابعاد کمال‌گرایی و فعالیت سیستم‌های مغزی / رفتاری در بیماران کرونری قلب می‌پردازد.

شروعی، برتون و لونتها [۶] بیان می‌کنند که الگوی رفتاری ریخت A، نشأت گرفته از استانداردهای بالای فردی در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها است. بر اساس نظر مارتین، کوئیپر و وسترا [۷] الگوی رفتاری ریخت A، برگرفته از شناخت‌های نامتناسب و پابرجایی است که بر نیاز به موفقیت و کسب استانداردهای بالای فردی تأکید می‌کند. پرایس [۳] نیز اظهار می‌دارد که رفتار ریخت A، معنکس‌کننده یک سیستم شناختی با این موضوع اصلی است که هر فردی بایستی به طور مداوم خود را از طریق موفقیت‌ها ثابت کند و این امر تبیین‌کننده تلاش مفترطی است که مشخصه فرد ریخت A است. نیاز دستیابی به ملاک‌های بالا، با نگرانی فزون یافته نسبت به ارزیابی خود در موقعیت‌های مبهم و نیز میل به انتقاد از خود همراه است و نیاز به موفقیت و داشتن استانداردهای بالای فردی، از ویژگی‌های کمال‌گرایی است. کمال‌گرایان، افرادی

جامعه آماری شامل کلیه مردان بسته شده در بخش قلب یکی از بیمارستان‌های تهران است که از ابتدای اسفند ۱۳۸۶ تا پایان تیرماه ۱۳۸۷ به این مرکز درمانی مراجعه و بستری شده‌اند که تعدادشان حدود ۵۰۰ نفر است. جامعه مردان سالم نیز شامل مردان مراجعه‌کننده به یک کلینیک دندان‌پزشکی و تعدادشان بالغ بر ۳۸۰ نفر بود. گروه نمونه شامل دو گروه بیماران مبتلا به CHD و افراد سالم با حجم ۵۰ نفر در هر گروه بود. گروه بیماران، مردان مبتلا به CHD و دارای حداقل تحصیلات دیپلم با میانگین سنی ۵۳ سال بودند که برای اولین بار در بیمارستان بستری شده بودند. گروه افراد سالم از نظر متغیرهای گروه سنی، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل با گروه بیمار یکسان بودند. همچنین این افراد از نظر عدم سابقه بیماری‌های جسمانی مهم و اختلالات روان‌شناختی مورد بازبینی قرار گرفتند. افراد هر دو گروه از طریق مشارکت داوطلبانه و به روش نمونه‌گیری در دسترس، مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به اینکه حداقل افراد نمونه در هر گروه در مطالعات علی- مقایسه‌ای ۵۰ نفر است، این تعداد در هر گروه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش عبارتند از:

(الف) تشخیص پزشک: گروه بیماران با تشخیص پزشک متخصص قلب و عروق و انجام آنتیوگرافی انتخاب شدند.

(ب) فرم مشخصات جمعیت‌شناختی: این فرم شامل اطلاعاتی از قبیل تاریخ اجرای آزمون، سن، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل و سابقه بیماری است.

(ج) مقیاس بازداری اروی‌آوری کارور و واایت [۲۰]: این مقیاس شامل ۲۴ ماده است که هر کدام روى مقیاس ۴ درجه‌ای لیکرت درجه‌بندی می‌شوند. خردۀ مقیاس BIS با ۷ ماده، حساسیت سیستم بازداری رفتاری را اندازه می‌گیرد. خردۀ مقیاس BAS نیز شامل سه خردۀ مقیاس پاسخ‌دهی به پاداش (۵ ماده)، کشاننده (۴ ماده)، BIS جستجوی سرگرمی (۴ ماده) است. ثبات درونی خردۀ مقیاس BIS ۰/۷۴ است و ثبات درونی سه خردۀ مقیاس پاسخ‌دهی به پاداش، کشاننده و جستجوی سرگرمی به ترتیب ۰/۷۳، ۰/۷۶ و ۰/۶۶ است [۱۹]. در مطالعه عطری فرد [۲۱] ثبات درونی خردۀ مقیاس BIS ۰/۴۷ و ثبات درونی BAS و خردۀ مقیاس‌های پاسخ‌دهی به پاداش، کشاننده و جستجوی سرگرمی به ترتیب ۰/۴۷، ۰/۷۳، ۰/۷۰ و ۰/۶۰ و ۰/۱۸ است.

(د) مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی هویت و فلت [۲۲، ۱۳]: یک پرسش‌نامه خودسنجی شامل ۴۵ گزاره است که هر کدام بر روی یک مقیاس ۷ درجه‌ای لیکرت درجه‌بندی می‌شوند. خردۀ مقیاس‌ها عبارتند از: کمال‌گرایی خویشتن‌مدار، کمال‌گرایی دیگرمدار و کمال‌گرایی هنجارمدار. نمره خردۀ مقیاس‌های این آزمون با جمع بستن ۱۵ ماده مربوط به هر بُعد کمال‌گرایی به دست می‌آید. برای هر خردۀ مقیاس، دامنه نمرات بین ۱۵ تا ۱۰۵ است و نمره کمال‌گرایی کل محاسبه نمی‌شود و هر چه نمره کل در یک از خردۀ مقیاس‌ها پایین‌تر باشد،

بر افزایش پاسخ‌دهی انتخابی به نشانه‌های پاداش دلالت دارد. BAS به عنوان یک سیستم انگیزشی ترغیب‌کننده، موجب برانگیختن رفتار در پاسخ به محرک‌های پاداش می‌گردد و فعالیت آن در افزایش ضربان قلب منعکس می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش ضربان قلب در هنگام مواجهه با استرس یا شرایط هیجانی تحریک‌کننده با فعالیت BAS ارتباط دارد. فعالیت رفتارهایی را ترغیب می‌کند که هنگام دریافت پاداش، انگیزش و فعالیت را کاهش می‌دهند اما برای افراد ریخت A هیچگاه دریافت پاداش به اندازه کافی نمی‌رسد و آنها مدام در پی اهداف جدید هستند که به ارزیابی‌های آنها وابسته است. نتیجه این جستجوی بی‌پایان برای غلبه و کسب پاداش، فعالیت بیش از حد قلبی- عروقی است [۱۷].

با فعالیت سیستم‌های مغزی/رفتاری، عاطفه و رفتار تنظیم و تعدیل می‌شوند. بنابراین منطقی است که آنها در علت‌شناسی کمال‌گرایی نیز سهیم باشند [۱۸]. فلت، هویت، دی‌روس [۸] بیان کردند که دو بعد کمال‌گرایی دیگرمدار و کمال‌گرایی هنجارمدار با BIS ارتباط دارند و کمال‌گرایی خویشتن‌مدار با خرده مقیاس‌های کشاننده و پاسخ‌دهی به پاداش BAS ارتباط دارد. در پژوهش اوکانر و فورگن [۱۸] کمال‌گرایی خویشتن‌مدار و کمال‌گرایی دیگرمدار با BAS و کمال‌گرایی هنجارمدار با BIS همبستگی داشتند. در مطالعه چنگ و همکاران [۱۹] (که کمال‌گرایی را با مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی فراست سنجیدند) مشخص شد که چهار بعد کمال‌گرایی شامل: توجه بیش از حد به اشتباها، انتظارات بالای والدین، انتقادات والدین و سازماندهی با خرده مقیاس کشاننده BAS و دو بعد تردید در عمل و استانداردهای بالای فردی با BIS ارتباط دارند. طبق نتایج تحقیقات پیشین، افراد با الگوی رفتاری ریخت A، افرادی کمال‌گرا هستند که سیستم غالب مغزی آنها، سیستم فعل ساز رفتاری است. همچنین ساختار رفتار ریخت A با مؤلفه‌های گوناگون خود، یکی از عوامل مهم خطرساز در ظهور و بروز بیماری کرونری قلب است. به نظر می‌رسد که این دو سازه (کمال‌گرایی و سیستم‌های مغزی/رفتاری) در بیماران مبتلا به CHD ارزیابی نشده و درباره چگونگی ارتباط این دو ساختار نیز توافق عمده‌ای وجود ندارد. در این پژوهش، دو ساختار مذکور به صورت مقایسه‌ای در افراد مبتلا به CHD و افراد سالم ارزیابی شد.

روش

طرح پژوهش حاضر یک طرح پس‌رویدادی یا علی- مقایسه‌ای است و فعالیت سیستم‌های مغزی/ رفتاری و ابعاد کمال‌گرایی، دو متغیر پیش‌بین هستند که رابطه آنها با بیماری کرونری قلب به عنوان متغیر ملاک (در دو گروه افراد بیمار و سالم) مقایسه می‌شود. با توجه به بروز بیشتر بیماری‌های قلبی در مردان نسبت به زنان، در این پژوهش فقط مردان مورد بررسی گرفتند.

جدول (۲) آزمون t مستقل بین دو گروه بیمار و سالم از نظر فعالیت سیستم فعال‌ساز رفتاری						
انحراف مقدار درجه سطح سیستم گروه میانگین استاندارد t آزادی معنی‌داری						
		بازداری	بیمار	۱۶/۳۸	۴/۹۳	انحراف مقدار درجه سطح
.۰/۶۹	۹۸	-۱/۸۳	۴/۸۵	۱۴/۵۸	۴/۸۵	بازداری
.۰/۰۲۱	۹۸	-۲/۳۵	۲/۵۷	۸/۶۴	۲/۶۰	رفتاری
.۰/۰۵۴	۹۸	-۱/۹۵	۹/۵۰	۹/۵۰	۱/۶۵	کشاننده
.۰/۰۴۱	۹۸	-۲/۰۷	۱۱/۷۲	۱۱/۶۹	۱/۶۹	جستجوی سرگرمی
			۱۰/۲۰	۱/۹۱	۱/۹۱	پاسخ‌دهی به پاداش
			۱۲/۵۰	۲/۰۵	۱/۶۹	به پاداش

بر اساس نتایج و میزان t به دست آمده ($t = -2/35$) بین دو گروه افراد مبتلا به بیماری کرونری قلب و افراد سالم از لحاظ خرده مقیاس کشاننده سیستم فعال‌ساز رفتاری تفاوت معنی‌دار وجود دارد ($p < 0.05$) و این خرده مقیاس در افراد بیمار بیشتر از افراد سالم است. در خرده مقیاس جستجوی سرگرمی، با توجه به میزان سطح معنی‌داری ($p < 0.05$) و گرد کردن مقدار آن، سطح مطلوب معنی‌داری ($p < 0.05$) به دست می‌آید که تفاوت معنی‌داری است. بیماران کرونری قلب این مطالعه، در خرده مقیاس جستجوی سرگرمی نسبت به افراد سالم، BAS فعال‌تری دارند. سیستم فعال‌ساز رفتاری این بیماران در خرده مقیاس پاسخ‌دهی به پاداش نیز فعال‌تر از گروه سالم است و با توجه به نتایج به دست آمده ($t = -2/07$) بین دو گروه از نظر خرده مقیاس پاسخ‌دهی به پاداش نیز تفاوت معنی‌دار ($p < 0.05$) وجود دارد. با توجه به مجموع نتایج می‌توان اظهار داشت که فعالیت سیستم فعال‌ساز رفتاری در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب، بیشتر از گروه افراد سالم است.

جدول (۳) ماتریس همبستگی سیستم‌های مغزی/رفتاری و ابعاد کمال گرایی در بیماران کرونری قلب و افراد سالم

پاسخ‌دهی	جستجوی	گروه کشاننده	متغیرها	بازداری	بیمار	۰/۶۵۸***
به پاداش			سرگرمی			۰/۴۲۴***
	کمال گرایی	بیمار				۰/۷۳۸***
	خویشتن‌مدار	سالم				۰/۰۳۲۵***
	کمال گرایی	بیمار				۰/۰۳۵۷***
	دیگرمدار	سالم				۰/۰۱۵۴
	کمال گرایی	بیمار				۰/۰۵۹۷***
	هنچارمدار	سالم				۰/۰۳۸۶***

**p<0.01 *p<0.05

برای بررسی میزان همبستگی فعالیت سیستم فعال‌ساز رفتاری با ابعاد کمال گرایی در بیماران کرونری قلب و افراد عادی، ابتدا ضرایب همبستگی پیرسون دو گروه در متغیرهای سیستم‌های مغزی/رفتاری و ابعاد کمال گرایی ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد که خرده مقیاس کشاننده با کمال گرایی خویشتن‌مدار در هر دو

نشان دهنده کمال گرایی بیشتر است [۲۳]. به گزارش هویت و فلت [۲۴] تمام خرده مقیاس‌های آزمون دارای روانی و اعتبار مناسبی بوده و ضریب همسانی درونی آنها در یک گروه بهنجار [۱۸] برای خرده مقیاس‌های کمال گرایی خویشتن‌مدار، دیگرمدار و هنجارمدار به ترتیب $0/089$, $0/078$ و $0/083$ است. در اعتباریابی مقدماتی فرم ایرانی این مقیاس [۲۵] آلفای کرونباخ پرسش‌ها برای خرده مقیاس کمال گرایی خویشتن‌مدار $0/92$, برای کمال گرایی دیگرمدار $0/87$ و برای کمال گرایی هنجارمدار $0/84$ بود که نشان دهنده همسانی درونی بالای مقیاس است.

شیوه تکمیل مقیاس‌های بازداری و روی‌آوری کارور و وايت و کمال گرایی چند بعدی هویت و فلت انفرادی است. برای جلوگیری از تأثیر خستگی احتمالی آزمودنی‌ها، ترتیب ارایه مقیاس‌ها متغیر بود. به منظور مقایسه ابعاد کمال گرایی و میزان فعالیت سیستم‌های معنی‌زی/رفتاری در بیماران کرونری قلب و افراد سالم از آزمون t برای گروه‌های مستقل، همبستگی پیرسون و آزمون معنی‌داری Z فیشر استفاده شد.

یافته‌ها

بر اساس میزان t به دست آمده ($t = -2/06$), بین دو گروه افراد مبتلا به بیماری کرونری قلب و افراد سالم، از نظر بُعد کمال گرایی خویشتن‌مدار تفاوت معنی‌داری ($p < 0.05$) وجود دارد و میزان کمال گرایی خویشتن‌مدار در بیماران کرونری قلب و افراد سالم از دست آمده است. از نظر کمال گرایی دیگرمدار نیز بین دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود دارد ($t = -2/10$) و بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب بیش از افراد سالم واجد صفت کمال گرایی دیگرمدار هستند ($p < 0.05$). اگر چه تفاوت میان دو گروه از نظر کمال گرایی هنجارمدار، معنی‌دار نیست ولی با توجه به سطح معنی‌داری به دست آمده ($p < 0.059$), می‌توان با اختیاط بیشتری تفاوت بین دو گروه را در این شاخص مورد توجه قرار داد. با توجه به مجموع نتایج مابین افراد مبتلا به بیماری کرونری قلب و افراد عادی از نظر صفت کمال گرایی تفاوت معنی‌دار وجود دارد و می‌توان گفت کمال گرایی در افراد مبتلا به CHD بیشتر از افراد سالم وجود دارد. با توجه به جدول ۲، دو گروه بیماران CHD و افراد سالم از نظر فعالیت سیستم بازداری رفتاری با هم تفاوت معنی‌داری ندارند و فعالیت سیستم بازداری رفتاری در بیماران، متفاوت از فعالیت این سیستم در افراد سالم نیست.

جدول (۱) آزمون t مستقل بین دو گروه بیمار و سالم از نظر ابعاد کمال گرایی

اع Vad	گروه میانگین استاندارد t آزادی معنی‌داری	انحراف مقدار درجه سطح
کمال گرایی	بیمار	۸/۸۸
خویشتن‌مدار	سالم	۴۰/۰۶
کمال گرایی	بیمار	۹/۳۷
دیگرمدار	سالم	۴۰/۶۶
کمال گرایی	بیمار	۸/۷۴
هنچارمدار	سالم	۴۶/۲۴

همان‌گونه که مشاهده می‌شود همبستگی میان خردۀ مقیاس کشاننده و کمال‌گرایی خویشن‌مدار در گروه بیماران به‌طور معنی‌دار ($p < 0.05$) بیش از گروه افراد سالم است. خردۀ مقیاس پاسخ‌دهی به پاداش نیز در ارتباط با کمال‌گرایی خویشن‌مدار در هر دو گروه بیمار و سالم دارای همبستگی معنی‌دار است و تفاوت بین این دو ضریب همبستگی نیز معنی‌دار به دست آمد. بنابراین، میان کمال‌گرایی خویشن‌مدار و پاسخ‌دهی به پاداش در بیماران کرونری قلب بیش از افراد سالم همبستگی وجود دارد. خردۀ مقیاس پاسخ‌دهی به بُعد کمال‌گرایی هنجارماندار ارتباط دارد و تفاوت میان این همبستگی‌ها در دو گروه افراد بیمار و سالم در ارتباط میان پاسخ‌دهی به پاداش هم‌متقارن شد، بنابراین همبستگی بین ابعاد کمال‌گرایی و سیستم روابط معنی‌دار به دست آمد. با توجه به اینکه در چهار مورد فقط روابط همبستگی دو سازه تنها در گروه بیماران معنی‌دار به دست آمد و در سه مورد نیز در گروه افراد بیمار تفاوت معنی‌دار همبستگی‌ها با گروه افراد سالم مشاهده شد، بنابراین همبستگی بین ابعاد کمال‌گرایی و سیستم روابط معنی‌دار به دست آمد. با توجه به اینکه در جدول ۴ ارایه شده است.

بحث

همان‌گونه که یافته‌های پژوهش نشان داد، بیماران کرونری قلب بیش از افراد سالم دارای ویژگی‌های کمال‌گرایی خویشن‌مدار و کمال‌گرایی دیگرماندار هستند و سیستم فعال‌ساز رفتاری، سیستم غالب مغزی/رفتاری در بیماران کرونری قلب است. در گروه بیماران کرونری قلب، همبستگی بین ابعاد کمال‌گرایی و خردۀ مقیاس‌های سیستم فعال‌ساز رفتاری در بیماران کرونری قلب بیشتر از افراد عادی است.

بیماران مبتلا به CHD در موقعیت‌های مختلف زندگی، ویژگی‌های کمال‌گرایی را ظاهر می‌سازند. آنها برای خود و افراد مهم زندگی‌شان همچون همسر، فرزندان و دوستان نزدیک، معیارهای بالا، غیرواقع‌بینانه و نامتناسب در نظر می‌گیرند و هیچ وقت نیز از عملکرد خود و آنها رضایت ندارند. فرد کمال‌گرایی خویشن‌مدار با تعمیم‌دادن بیش از حد شکست‌ها و عدم رضایت از عملکرد خویش، خود را به سمت روان‌آزربادگرایی سوق می‌دهد که اساس بروز سیاری از اختلالات روان‌تنی است. فرد با کمال‌گرایی دیگرماندار، به علت داشتن استانداردهای کمال‌گرایانه و بالا برای افراد مهم زندگی خود و همچنین ابراز توقعات و انتظارات نامتناسب، موجب تعمیم تعارض‌ها و خصومت بین فردی می‌شود. خصومت یکی از علل شناخته‌شده بروز بیماری کرونری قلب و از دیگر مؤلفه‌های الگوی رفتاری ریخت A است. برخی تحقیقات [۱، ۲] ارتباط میان خصومت، به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم الگوی رفتاری ریخت A و بروز بیماری کرونری قلب را تصدیق کردند. پژوهش حاضر، در حوزه رویکرد تحلیل مؤلفه‌ای قرار دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیماران مبتلا به اختلال کرونری قلب، به‌طور معنی‌دار و واضح بیش از افراد سالم واجد ابعاد کمال‌گرایی خویشن‌مدار و دیگرماندار هستند.

گروه بیمار و سالم همبستگی معنی‌دار و مثبت دارد ($p < 0.01$). این خردۀ مقیاس BAS در گروه بیمار، با کمال‌گرایی دیگرماندار ($p < 0.01$) و کمال‌گرایی هنجارماندار ($p < 0.05$) همبستگی مثبت و معنی‌دار ندارد. خردۀ مقیاس جستجوی سرگرمی با کمال‌گرایی خویشن‌مدار نیز در گروه بیمار همبستگی مثبت و معنی‌دار ($p < 0.01$) دارد و در هیچ یک از دو گروه افراد بیمار و سالم، با بُعد کمال‌گرایی دیگرماندار ارتباط معنی‌دار ندارد. خردۀ مقیاس جستجوی سرگرمی در هر دو گروه افراد بیمار و سالم با بُعد کمال‌گرایی هنجارماندار همبستگی مثبت و معنی‌دار ($p < 0.01$) دارد. خردۀ مقیاس پاسخ‌دهی به پاداش در گروه بیماران با کمال‌گرایی خویشن‌مدار ($p < 0.01$)، کمال‌گرایی دیگرماندار ($p < 0.01$) و کمال‌گرایی هنجارماندار ($p < 0.01$) همبستگی معنی‌دار و مثبت دارد و در گروه افراد سالم با کمال‌گرایی خویشن‌مدار و کمال‌گرایی هنجارماندار ($p < 0.01$) دارای همبستگی است. در ادامه برای ضرایبی که دارای ارتباط مثبت و معنی‌دار بودند، شاخص Z فیشر محاسبه شد که نتایج در جدول ۴ ارایه شده است.

برای آزمون معنی‌داری، تفاوت میان ضریب‌های Z فیشر دو گروه بیمار و سالم، از آزمون معنی‌دار بودن Z فیشر استفاده شد. با مقایسه مقادیر Z_{ob} با Z_{cr} ($1/96$) تفاوت‌های معنی‌دار بین ضرایب همبستگی میان خردۀ مقیاس‌های میزان رفتاری سیستم فعال‌ساز رفتاری و ابعاد کمال‌گرایی به دست آمد که در جدول ۵ ارایه شده است. در سه مورد، مقادیر همبستگی دو گروه تفاوت معنی‌دار ($p < 0.05$) دارند و در گروه افراد بیمار میزان همبستگی میان خردۀ مقیاس‌های سیستم فعال‌ساز رفتاری و ابعاد کمال‌گرایی بیشتر از افراد سالم است.

جدول ۴ مقادیر Z فیشر رابطه سیستم‌های مغزی/رفتاری و ابعاد کمال‌گرایی در بیماران کرونری قلب و افراد سالم

متغیرها	گروه کشاننده	سرگرمی	پاسخ‌دهی
کمال‌گرایی	بیمار	۰/۹۴۶	۰/۴۲۵
خویشن‌مدار	سالم	۰/۴۴۲	۰/۷۸۹
کمال‌گرایی	بیمار	۰/۳۱۸	۰/۳۳۷
دیگرماندار	سالم	-	۰/۳۷۳
کمال‌گرایی	بیمار	۰/۲۹۹	۰/۸۸۱
هنجارماندار	سالم	-	۰/۴۰۷

جدول ۵ ماتریس Z_{ob} رابطه سیستم‌های مغزی/رفتاری و ابعاد کمال‌گرایی در بیماران کرونری قلب و افراد سالم

متغیرها	کشاننده	پاسخ‌دهی	جستجوی
(کمال‌گرایی)	سرگرمی	به پاداش	خویشن‌مدار
خویشن‌مدار	-	*۲/۱۹	*
دیگرماندار	-	-	*
هنجارماندار	-	۱/۶۹	*۲/۳۰

* $p < 0.05$

انتخاری [۱۸، ۳۳]، عزت نفس پایین [۳۳] و انواع اختلالات اضطرابی [۵، ۷، ۳۴] هستند. علاوه، در تجدید نظر اخیر نظریه BAS، RST نیز در بروز و ادراک هیجان‌های منفی دخیل است [۱۲، ۳۵]. هنگامی که سیستم روی‌آوری در پیشروی به سمت هدف مطلوب، دچار شکست و ناکامی شود باعث بروز هیجان‌های منفی، ناراحتی و شکست می‌شود [۳۶].

با توجه به تحقیقات پیشین هویت، فلت و دی‌روسما [۸] ماین کمال‌گرایی خویشن‌مدار و دو خرد مقیاس کشاننده و پاسخ‌دهی به پاداش، ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد که در پژوهش حاضر، این ارتباط در گروه بیمار به دست آمد. علاوه بر این، همبستگی در گروه بیماران به گونه معنی‌داری بیش از گروه افراد سالم بود. همچنین کمال‌گرایی دیگر مدار نیز با خرد مقیاس کشاننده BAS در گروه بیمار ارتباط مثبت و معنی‌داری داشت که همان‌گه با یافته‌های چنگ و همکاران [۱۹] است که چهار بعد از مقیاس کمال‌گرایی فرست در پژوهش آنها با خرد مقیاس کشاننده ارتباط مثبت و معنی‌دار داشت.

نتیجه‌گیری

در مجموع، نتایج پژوهش حاضر در توصیف نیمرخ روانی دقیق‌تر بیماران کرونری قلب کمک شایانی خواهد نمود. همچنین پژوهش‌های بیشتری برای روشن‌تر شدن ارتباط ابعاد کمال‌گرایی و فعالیت سیستم‌های مغزی/رفتاری، مورد نیاز است. بررسی این دو سازه در گروه‌های خاص مانند بیماران روان‌تنی و اختلالات روان‌شناختی می‌تواند آثار آسیب‌شناختی این دو سازه را در بروز بیماری‌های روان‌تنی مشخص‌تر سازد.

تشکر و قدردانی: با سپاس فراوان از پروفسور گوردون فلت استاد دانشگاه یورک کانادا و با تشکر از استاد گرانقدر آقای دکتر آزادفلاح به خاطر راهنمایی‌های ارزنده‌شان و قدردانی از آقای دکتر مرتضی صافی و همکاران.

منابع

- سارافینو ادوارد. روان‌شناسی سلامت. میرزابی‌الهه، و همکاران، مترجمان. تهران: انتشارات رشد؛ ۱۳۸۴.
- Contrada RJ. Type A behavior, personality hardiness and cardiovascular responses to stress. Journal of Personality & Social Psychology. 1989;57:895-903.
- Espnes GA. The type behavior pattern and coronary heart disease: A critical and personal look at the type A behavior pattern at the turn of the century. International Congress Series. 2002;1241:99-104.
- پورمحمدی‌رضای تجربی‌شنی مصصومه. تأثیر موقعیت و شکست بر شاخص‌های فیزیولوژیک بر اساس مؤلفه‌های شخصیتی [رساله دکتری]. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی؛ ۱۳۸۴.
- Flett GL. Personality theory and research. Canada: John Wiley & Sons; 2008.


بنابراین کمال‌گرایی می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های الگوی رفتاری ریخت A برای پژوهش و توجیه بروز CHD، به عنوان یک عامل پیش‌بینی‌کننده عمل کند. یافته‌های این پژوهش، همراه با یافته‌های پژوهش علی‌پور و حاجی‌زادگان [۲۶] که نشان‌دهنده سطح بالای کمال‌گرایی منفی در بیماران کرونری قلب است، مؤید اثر منفی و زیان‌بار تفکر و رفتار کمال‌گرایانه بر دستگاه قلبی-عروقی است.

با توجه به یافته‌های این پژوهش، در مردان مبتلا به بیماری کرونری قلب، فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری، بیشتر از افراد گروه سالم است و تفاوتی ما بین دو گروه از لحاظ فعالیت سیستم بازداری رفتاری مشاهده نمی‌شود. سیستم فعال ساز رفتاری، به عنوان یک سیستم انگیزشی ترغیب‌کننده تعریف شده است [۱۳] که موجب برانگیختن رفتار در پاسخ به محرك‌های پاداش می‌شود و فعالیت آن در افزایش ضربان قلب منعکس می‌گردد. منطقی به نظر می‌رسد که فعالیت بیشتر سیستم فعال ساز رفتاری، باعث تحریک و فعالیت مداوم دستگاه قلبی-عروقی گردد. آنچه در اصل باعث بخشی از ارتباط الگوی رفتاری ریخت A و به تبع آن سیستم فعال ساز رفتاری با CHD می‌شود، و هله‌های مکرر برپایی است که منجر به رهاسازی هورمون‌های خاصی از قبیل ادرنالین و نور‌آدرنالین می‌شود و افزایش سطح این هورمون‌ها به خودی خود می‌تواند به قلب و رگ‌های خونی آسیب بزند [۴]. بنابراین زودانگیختگی که از ویژگی‌های افراد با BAS فعل است، خود به عنوان عاملی در افزایش فعالیت قلبی-عروقی است که می‌تواند در برخی مواقع به عنوان یک عامل خطرساز و منفی بر سلامت جسمانی مطرح شود. همچنین با توجه به نقش غیرقابل تردید خشم در بروز بیماری کرونری قلب [۱۴، ۱۷، ۲۲، ۲۷] می‌توان نتایج به دست آمده را بهتر تبیین نمود. مهم‌ترین نتایج در این زمینه، مربوط به پژوهش هارمون-جونر [۶] است که بر اساس آن BAS ارتباط مثبت و معنی‌داری با پرخاشگری جسمانی و صفت خشم دارد. با توجه به اینکه عامل خشم، به عنوان مهم‌ترین مؤلفه الگوی رفتاری ریخت A و از نمادهای رفتاری BAS است، بنابراین کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم غالب مغزی/رفتاری در بیماران کرونری قلب باشد.

ابعاد کمال‌گرایی و فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری در گروه بیماران بیشتر از افراد گروه سالم است. بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که این دو سازه همبستگی بیشتری در گروه بیماران نیز داشته باشند. بیماران کرونری قلب، پیش و پس از ابتلاء، مجموعه‌ای از هیجان‌ها و عواطف منفی را تجربه می‌کنند که شامل خصومت مزمن، خشم، پرخاشگری، افسردگی، استرس و کمبود حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی است [۲۶، ۲۸، ۲۹]. از سوی دیگر، کمال‌گرایی سازه‌ای با بسیاری از پریشانی‌های هیجانی ارتباط قوی و معنی‌دار دارد که شامل افسردگی [۱۰، ۳۱، ۳۰، ۲۲، ۳۲]، نامیدی و افکار و رفتار دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸

- ۲۱- عطری‌فرد مهدیه. رابطه بین فعالیت سیستم‌های مغزی/رفتاری و مستعد بودن به احساس شرم و گناه [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه تربیت مدرس؛ ۱۳۸۳.
- ۲۲- Kawachi I, Sparrow D, Spiro AA. Prospective study of anger and coronary heart disease: The normative aging study. *Circulation*. 1996;94:2090-5.
- ۲۳- پناهی حلیمه. اثر موقیت و شکست بر پاسخ‌های فیزیولوژیک در افراد کمال‌گرا و غیرکمال‌گرا [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه تربیت مدرس؛ ۱۳۸۳.
- ۲۴- Hewitt PL, Flett GL. Dimensions of perfectionism in unipolar depression. *Journal of Abnormal Psychology*. 1991;100:98-101.
- ۲۵- بشارت محمدعلی. ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی. فصل‌نامه پژوهش‌های روان‌شناسی. ۱۳۸۶؛۱۰(۲۹):۴۹-۶۷.
- ۲۶- علی‌پور احمد، حاجی‌زادگان مرضیه. مقایسه کمال‌گرایی در بیماران مبتلا به اختلال کرونری قلبی و افراد سالم. *محله علوم روان‌شناسی*. ۱۳۸۵؛۱۶(۱۹):۱۹۵-۲۰۲.
- ۲۷- Strube M, Boland SM, Manfredo PA, Al-Falaj A. Type A behavior pattern and the self-evaluation of abilities: Empirical tests of the self-appraisal model. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1987;52:956-74.
- ۲۸- Kuper H, Marmot M, Hemingway H. Systematic review of prospective cohort studies of psychological factors in the etiology and prognosis of coronary heart disease. *Seminar Vascular Medicine*. 2002;2:267-314.
- ۲۹- Strike P, Steptoe A. Psychological factors in the development of coronary artery disease. *Progress in Cardiovascular Diseases*. 2004;46(4):337-47.
- ۳۰- Hewitt PL, Flett GL. Dimensions of perfectionism, daily stress and depression: A test of the specific vulnerability hypothesis. *Journal of Abnormal Psychology*. 1993;102:58-65.
- ۳۱- Lynd-Stevenson RM, Hearne CM. Perfectionism and depressive affect: The pros and cons of being a perfectionist. *Personality & Individual Differences*. 1991;26:549-62.
- ۳۲- Molnar DS, Reker DL, Clup NA, Sadana SW, DeCourville NH. A mediated model perfectionism, affect and physical health. *Journal of Research in Personality*. 2006;40:482-500.
- ۳۳- Donaldson D, Spirito A, Farnett E. The role of perfectionism and depressive cognition in understanding the hopelessness experienced by adolescent suicide attempters. *Child Psychiatry and Human Development*. 2000;31:99-111.
- ۳۴- Gabbay FH, Krantz DS, Kop WJ. Triggers of myocardial ischemia during daily life in patients with coronary artery disease: Physical and mental activities, anger and smoking. *Journal of American Collection Cardiology*. 1996;27:585-92.
- ۳۵- Linden D, Taris T, Debby GJ, Beckers KBK. Reinforcement sensitivity theory and occupational health: BAS and BIS on the job. *Personality & Individual Differences*. 2007;42:49-59.
- ۳۶- Carver CS. Negative affects deriving from the behavioral approach system. *Emotion*. 2004;4(1):3-22.
- ۶- Harmon-Jones E. Anger and the behavioral approach system. *Personality & Individual Differences*. 2002;32:1247-53.
- ۷- Hewitt PL, Flett GL. Perfectionism in the self and social context: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1991;60:456-70.
- ۸- Flett GL, Hewitt PL, DeRossa T. Dimensions of perfectionism, psychological adjustment and skills. *Personality and Individual Differences*. 1996;20:143-50.
- ۹- Hill RW, McIntire K, Bacharach VR. Perfectionism and the big five factors. *Journal of Social Behavior & Personality*. 1997;12:257-70.
- ۱۰- Blatt SJ, Quinlan DM, Pilkonis PA, Shca MT. Impact of perfectionism and need for approval on the brief treatment of depression. *Journal of Consulting & Clinical Psychology*. 1995;63:125-32.
- ۱۱- Flores TD, Valdes M. Behavior pattern A: Reward, fight or punishment? *Personality & Individual Differences*. 1986;7(3):319-26.
- ۱۲- Corr PJ. Gray's reinforcement sensitivity theory: Test of the joint subsystems hypothesis of anxiety and impulsivity. *Personality & Individual Differences*. 2002;33(4):511-32.
- ۱۳- Knyazev GG, Slobodskoj-Plusnin JYU. Behavioral approach system as a moderator of emotional arousal elicited by reward and punishment cues. *Personality & Individual Differences*. 2007;42:49-59.
- ۱۴- Naughton N, Corr PJ. A two-dimensional neuropsychology of defense: Fear/anxiety and defensive distance. *Neuroscience & Biobehavioral Review*. 2004;28:258-305.
- ۱۵- آزادفلاح پرویز. سیستم‌های مغزی/رفتاری: ساختارهای زیستی شخصیت. مجله مدرس. ۱۳۷۹؛۱۴(۱):۸۱-۶۳.
- ۱۶- Corr PJ. Reinforcement sensitivity theory and personality neuroscience and biobehavioral reviews. *Personality & Individual Differences*. 2004;28:317-32.
- ۱۷- Heponiemi T, Keltikangas-Jarvinen L, Puttonen S, Ravaja N. BIS/BAS sensitivity and self-rated affects during experimentally induced stress. *Personality & Individual Differences*. 2003;34:943-57.
- ۱۸- O'Connor RC, Forgan G. Suicidal thinking and perfectionism: The role of goal adjustment and behavioral inhibition/activation systems (BIS/BAS). *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*. 2007;25(4):321-41.
- ۱۹- Chang EC, Zumberg KM, Sanna LJ, Girz Ip, Kade AM, Shair SR, et al. Relationship between perfectionism and domains of worry in a college student population: Considering the role of BIS/BAS motives. *Personality & Individual Differences*. 2007;43(4):925-36.
- ۲۰- Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation and affective responses pending reward and punishment: The BIS/BAS scales. *Journal of Personality & Social Psychology*. 1994;67:319-33.

یادداشت:



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات زبانی
پرستال جامع علوم انسانی