

مقاله پژوهشی
اصیل
Original
Article

هوش هیجانی در زنانی که به روش مسمومیت اقدام به خودکشی کردند

دکتر مجید برتکین^{*}، ماهکل توکلی^{**}، دکتر حمید طاهر نشاطدوست^{***}

چکیده

هدف: نظر به ارتباط هوش هیجانی با توانایی حل مسأله و انتخاب خودکشی به عنوان یک روش انطباقی با مشکلات، این پژوهش، با هدف بررسی هوش هیجانی در زنان اقدام کننده به خودکشی به روش مسمومیت انجام شده است.

روش: در یک طرح پژوهشی پس رویدادی (علی - مقابسه‌ای) و شبه آزمایشی^{۱۰} نظر از زنان اقدام کننده به خودکشی به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان مراجعه کنندگان به اورژانس مسمومین بیمارستان نور اصفهان به عنوان گروه آزمایشی و^{۱۰} نظر از زنان عادی از میان ملاقات کنندگان بیماران بخش داخلی بیمارستان نور اصفهان، به عنوان گروه گواه به روش تصادفی انتخاب و به کمک پرسش‌نامه هوش هیجانی بار-ان بررسی شدند. برای تحلیل داده‌ها، روش تحلیل واریانس چند متغیره و روش تحلیل تمايزات به کار برده شد.

یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که نمره کل هوش هیجانی و زیرمقیاس‌های آن در گروه خودکشی کنندگان در مقایسه با گروه گواه به شکل معنی‌داری پایین‌تر بوده است ($p < 0.001$). همچنین بر پایه نتایج تحلیل تمايزات، همراه با تعطیه برش ۲۵۳/۸۶ برای تفکیک دو گروه اقدام کننده به خودکشی و سالم، حساسیت و ویژگی هر دو به طور جداگانه برابر با ۱۰۰٪ محاسبه گردید.

نتیجه‌گیری: هوش هیجانی در زنان اقدام کننده به خودکشی باین تراز زنان عادی است. پایین‌بودن هوش هیجانی می‌تواند به عنوان یک عامل خطر اقدام به خودکشی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه: هوش هیجانی، اقدام به خودکشی، مسمومیت

* روانپرداز، استادیار گروه روانپردازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، خیابان استانداری، بیمارستان نور. دورنگار: ۰۳۱۱-۲۲۲۲۱۳۵
E-mail: barekatain@med.mui.ac.ir (نویسنده مسئول)

** دانشجوی دکترا روانپردازی دانشگاه اصفهان.

*** دکترا تخصصی روانشناسی، دانشیار گروه روانپردازی دانشگاه اصفهان.

مقدمه

و اقدام به آن از نشانه‌های افسردگی است، اما افسردگی تنها علت خودکشی نیست. دامنه گسترده‌ای از اختلال‌های روانی همچون اضطراب، خود بیمارانگاری و گرایش‌های ضداجتماعی، هیستریایی و پارانوییدی در بروز خودکشی مؤثّرند (садوک^۳ و سادوک، ۲۰۰۳).

مفهوم خودکشی می‌تواند از نظر شدت، دامنه گسترده‌ای داشته باشد که در یک سر آن تنها افکار و انگاره‌هایی در زمینه خودکشی وجود دارد و در انتهای دیگر آن، رفتارهایی به شکل اقدام قاطع با احتمال بسیار زیاد مرگ (لوینسون^۴، روهد^۵ و سیلی^۶، ۱۹۹۶؛ ماسکیکی^۷، اکارول^۸ و لاک^۹، ۱۹۸۹). شیوع اقدام به خودکشی در فرهنگ‌های گوناگون، متفاوت است. برای نمونه میزان خودکشی در نیجریه چهار مورد در ۱۰۰۰۰۰ نفر و در سویس ۲۲۷ مورد در ۱۰۰۰۰ نفر می‌باشد (نوسا^{۱۰} و اوتسانی^{۱۱}؛ لاهارپ^{۱۲}، ۱۹۹۵).

از دیدگاه بهداشت روان، «اقدام به خودکشی» دارای پیامدهای فردی، اجتماعی، روان‌شناختی، فرهنگی و اقتصادی است (گیلدر^{۱۳}، مهیور و کاث، ۱۳۶۹؛ کلیتون^{۱۴} و بارسل^{۱۵}، ۱۹۹۹). در آمریکا سالانه ۳۰۰ هزار نفر خودکشی می‌کنند و برآورد می‌شود که ۲۵٪ بیماران افسرده، دست کم یک بار در طول زندگی خود اقدام به خودکشی می‌کنند (مالون^{۱۶}، سزانتو^{۱۷}، کوربیت^{۱۸} و مان^{۱۹}، ۱۹۹۵). در ایران نیز هر چند در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی، میزان خودکشی کمتر است، اما بررسی‌های انجام شده در دو دهه اخیر نشان داده‌اند که خودکشی و اقدام به آن در ایران رو به افزایش است (جانقرسانی، ۱۳۶۶؛ محسنی، ۲۰۰۵)؛ اقدام به خودکشی در جوانان و زنان بیش از سایر گروه‌ها است و مسابقه مانند اختلافات زناشویی، درگیری باستگان، اختلال‌های روانی و بی‌کاری از دلایل مهم اقدام به خودکشی گزارش شده‌اند.

هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی‌های شناختی و هیجانی به هم پیوسته است (کیاروچی^۱، فورگاس^۲ و میر^۳، ۲۰۰۱) که به فرد کمک می‌کند تا با دریافت، ارزیابی و بیان دقیق هیجان‌ها، از احساساتی که افکار را تسهیل می‌نمایند آگاهی یابد (مایر^۴ و کاروسو^۵، ۱۹۹۹؛ مایر، سالووی^۶ و کاروسو، ۲۰۰۱) و با برقراری توازن میان افکار و هیجان‌های خود، تصمیم‌گیری‌های عاقلانه و رفتاری مسئولانه داشته باشد (اکرامی، ۱۳۸۰). بار-ان^۷ (۲۰۰۷) هوش هیجانی را یک رشته توانمندی‌ها و مهارت‌های غیرشناختی می‌داند که توانایی‌های فرد را در برخورد با فشارهای محیطی افزایش می‌دهند و آن را در پسنج مقوله کلی بهره هیجانی درون‌شخصی و بین‌شخصی، توانمندی‌های سازش‌یافتنگی، مدیریت تنیدگی و خلق عمومی تعریف می‌کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰). سالوی (۱۹۹۰)، هوش هیجانی را با سلامت روان در ارتباط می‌داند. وی دریافت که افراد دارای هوش هیجانی بالا، توانایی بهتری برای مقابله با استرس دارند. از سوی دیگر افراد دارای هوش هیجانی پایین، پیوسته احساس پوچی و فروپاشی نموده، واکنش‌های عاطفی نامناسب نشان می‌دهند. از این رو هوش هیجانی پایین می‌تواند از عوامل خطرساز در ابتلا به بیماری‌های روانی و ایجاد مشکلات در سازگاری افراد با محیط به شمار آید (تیلر^۸، پارکر و بگبی^۹، ۱۹۹۹). در افراد با هوش هیجانی پایین، توانایی حل مسئله به میزان چشم‌گیری پایین تر است و این افراد در بهره‌گیری از مهارت‌های مقابله‌ای در رویارویی با فشارهای روانی زندگی، توانایی زیادی ندارند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰). پژوهش‌ها نشان داده‌اند، افرادی که توانایی ایجاد سازگاری لازم را در زندگی خود دارند (افراد بهنجار) در برخورد با مشکلات، مهارت‌های مقابله‌ای کارآمد را به کار می‌گیرند که می‌توان آنها را به دو دسته کلی «مهارت‌های مقابله‌ای متمرکز بر مسئله» و «مهارت‌های مقابله‌ای متمرکز بر هیجان» تقسیم نمود (نوروزی، ۱۳۷۳).

از سوی دیگر، در زمینه روانشناسی شناختی بر نقش «مسئله گشایی نارسا» در ساختار شناختی مبتلایان به افسردگی تأکید شده (پیکل^{۱۰}، پروسوف^{۱۱} و مهیر^{۱۲}، ۱۹۷۵) و نقش کبود مهارت‌های «مسئله گشایی» در افراد افسرده دارای انگاره‌پردازی خودکشی مورد توجه قرار گرفته است (کاویانی، رحیمی درآباد و نقوی، ۱۳۷۸). هر چند خودکشی

- | | |
|--------------|---------------|
| 1- Ciarrochi | 2- Forgas |
| 3- Myer | 4- Mayer |
| 5- Caruso | 6- Salovey |
| 7- Bar-on | 8- Taylor |
| 9- Bagby | 10- Paykel |
| 11- Prusoff | 12- Myers |
| 13- Sadock | 14- Lewinsohn |
| 15- Rohde | 16- Seeley |
| 17- Moscicki | 18- O'Carroll |
| 19- Locke | 20- Nwosa |
| 21- Odesanmi | 22- La Harpe |
| 23- Gilder | 24- Clayton |
| 25- Barcel | 26- Malon |
| 27- Szanto | 28- Corbitt |
| 29- Mann | |

نمونه‌گیری در دسترس از میان زنانی که به دلیل اقدام به خودکشی با خوردن دارو، مواد مخدر، سفیدکننده‌ها یا سموم آفت کش طی شهربیور و مهر ۱۳۸۳ در اورژانس مسمومین بیمارستان نور اصفهان پذیرش شده بودند، انتخاب گردیدند. از میان ۱۱۳ نفر از زنان بستری شده طی مدت یادشده، هشتاد و پنج نفر که وضعیت هوشیاری مناسبی برای پرسش‌گری و تمايل به همکاری داشتند، به بررسی وارد شدند. با کنارگذاشتن پنج پرسش‌نامه ناقص و محدودش، داده‌های هشتاد پرسش‌نامه تحلیل شدند. هشتاد نفر افراد گروه گواه نیز به روش نمونه‌گیری تصادفی از میان زنان ملاقات کننده بیماران بخش داخلی بیمارستان نور اصفهان که هرگز افکار خودکشی نداشتند، با رعایت همگن‌سازی از نظر سن، وضعیت تأهل، اشتغال و داشتن مدرک تحصیلی دیپلم انتخاب شدند.

ابزار سنجش به کار برده شده در این پژوهش، پرسش‌نامه هوش هیجانی بار-ان (۱۹۹۷) بود که در آخرین تجدید چاپ ۹۰ پرسش منتشر شد. این پرسش‌نامه دارای ۱۵ زیرمقیاس است. بار-ان (همان‌جا) این پرسش‌نامه را هنجاریابی و روایی و پایابی آن را مورد تأیید قرار داده است. در پژوهش حاضر، فرم کوتاه این پرسش‌نامه به کار برده شد. سمعوعی (۱۳۸۱) پایابی آن را به روش آلفای کرونباخ، $\alpha = .93$ ، به دست آورد و روایی محتوایی آن را برابر پایه نظر پنج تن از متخصصان روانشناسی تأیید نمود. پرسش‌های این پرسش‌نامه دارای پنج گزینه، کاملاً موافق (نمره پنج) تا کاملاً مخالف (نمره یک) می‌باشد. نمره هر پرسش عبارت از نمره هر گزینه انتخاب شده و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمره‌های پرسش‌ها می‌باشد (در برخی پرسش‌ها نیز گزینه کاملاً موافق دارای امتیاز یک و گزینه کاملاً مخالف دارای امتیاز پنج است) (همان‌جا).

گردآوری داده‌ها در گروه آزمایش پس از ثبیت وضعیت پژوهشکی ایشان انجام شد. برای کمترکردن مقاومت پاسخ‌گویان در پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه با توجه به ویژگی‌های خاص آنان پس از خودکشی، پس از جلب اطمینان آزمودنی‌ها و پیش از تکمیل پرسش‌نامه، هدف از اجرای پژوهش برای پاسخ‌گویان توضیح داده می‌شد و به آنها گفته می‌شد که برای نوشتن نام خود بر روی پرسش‌نامه آزاد هستند و اطلاعات گردآوری شده محترمانه تلقی می‌شود. هم‌چنین از ایشان رضایت کتبی آگاهانه گرفته شد.

(جانقیانی، ۱۳۶۹؛ آزاد، ۱۳۷۲؛ پورمند و داویدیان، ۱۳۶۹؛ جلالی و ترابی، ۱۳۷۳؛ رنجبر، ۱۳۶۷؛ محسنی، ۱۳۶۶؛ حسن‌زاده و رجالی، ۱۳۶۳).

بررسی‌های انسان می‌دهند تنها گروه کوچکی از اقدام کنندگان به خودکشی قصد از بین بردن خود را داشته و بیشتر آنها انگیزه‌های دیگری برای این عمل خود عنوان می‌نمایند. خودکشی با نیازهای برآورده شده، احساس یأس و درمان‌گری، کشمکش‌ها و فشارهای روانی شدید، محدودبودن گزینه‌ها از دیدگاه شخص و نیاز به فرار از مشکلات ارتباط دارد (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳). کیاروچی و همکاران (۲۰۰۱) بر این باور است که برخی از مؤلفه‌های هوش هیجانی، افراد را در برابر فشارهای روانی حفظ می‌کنند؛ هم‌چنین افرادی که در تنظیم عواطف، مهارت دارند، از حمایت اجتماعی بالایی برخوردارند و همین حمایت اجتماعی، شخص را از ابتلاء به افسردگی و اندیشه خودکشی دور می‌کند. به بیان دیگر کسی که اقدام به خودکشی می‌کند در آن شرایط، مرگ را بهترین راه حل مسئله خود می‌داند، حال آن که بیشتر افراد جامعه تصویری بر خلاف او دارند (مدرسی و مسعودزاده، ۱۳۷۲). نقش مؤثر هوش هیجانی در اقدام کنندگان به خودکشی، به عنوان عامل مؤثر در توانمندی افراد در زمینه شناخت هیجان‌های خود و دیگران و مدیریت افکار و عمل نشان داده شده است (کلینیکا، ۲۰۰۴). هم‌چنین کیاروچی، دیان^۱ و اندرسون^۲ (۲۰۰۲) دریافتند که هوش هیجانی سهم منحصر به فردی در درک رابطه میان استرس‌ها و سه مؤلفه سلامت روان: افسردگی، ناکامی و افکار خودکشی دارد.

از آن‌جا که بررسی‌های انسان داده‌اند که توانایی حل مسئله، افزون بر هوش‌بهر با مقوله‌ای به نام «هوش هیجانی» نیز در ارتباط است (بار-ان، ۲۰۰۰)، به نظر می‌رسد که بررسی هوش هیجانی در اقدام کنندگان به خودکشی و مقایسه آن با افراد عادی تفاوت‌هایی را نشان دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ویژگی‌های هوش هیجانی در «زنان عادی» و «زنان اقدام کننده به خودکشی» انجام شد.

روش

این پژوهش پس رویدادی (علی - مقایسه‌ای) است. آزمودنی‌ها $n=80$ نفر بودند. گروه آزمایش به روش

جدول ۲- تحلیل روابی سوالات و نمره کل پرسش‌نامه هوش هیجانی بار- آن در دو گروه بهنجار ($n=10$) و اقدام کننده به خود کشی ($n=10$)

میزان تفاوت	ضریب F	مجموع مجذورات**	شماره پرسش
.0/.939	* $25.6/4.85$	98.8/289	حل مسأله
.0/.980	* $82.41/4.14$	127.18/127	خوبیختی
.0/.871	* $11.8/6.36$	55.40/247	استقلال
.0/.940	* $25.50/5.43$	91.88/102	تحمل فشار روانی
.0/.909	* $16.47/8.25$	65.65/880	خودشکوفایی
.0/.898	* $14.41/10.23$	70.13/500	خودآگاهی هیجانی
.0/.938	* $24.85/10.23$	95.48/681	واقع گرایی
.0/.846	* $9.00/7.03$	50.98/795	روابط بین فردی
.0/.949	* $16.29/3.51$	89.7/566	خوشبینی
.0/.879	* $11.87/8.47$	62.42/916	عزت نفس
.0/.929	* $21.43/11.0$	95.94/241	کنترل تکانش
.0/.935	* $22.34/9.18$	97.92/922	انعطاف پذیری
.0/.808	* $6.91/2.37$	47.93/157	مسئلیت پذیری
.0/.819	* $7.42/4.46$	46.12/199	همدلی
.0/.762	* $5.24/6.60$	58.44/729	خودابرایی
.0/.983	* $9.43/3/141$	169.37/70	نمره کل

* $p<0.001$; **df=1

سیزده نفر (16/3) از زنان در گروه بیماران و ۱۷ نفر (3/21) در گروه گواه شاغل بودند (جدول ۱). همان‌گونه که جدول ۱ نشان می‌دهد میانگین نمره کل هوش هیجانی و زیرمقیاس‌های آن در گروه گواه بالاتر از گروه آزمایشی است. مقایسه نمرات کل و زیرمقیاس‌های هوش هیجانی دو گروه به روش تحلیل واریانس چندمتغیره محاسبه شد. ضریب همبستگی چندگانه (کانونی) بین نمره کل پرسش‌نامه هوش هیجانی دو گروه بهنجار و اقدام کننده خود کشی ۰/۹۹۱ به دست آمد که از نظر آماری معنی دار بود ($p<0.001$) و به دست آمد که از نظر آماری معنی دار بود ($p<0.001$) و میزان واریانس را تبیین می‌کند. تتابع تحلیل روابی تشخیصی پرسش‌ها و نمره کل پرسش‌نامه هوش هیجانی بار- آن در دو گروه بهنجار و اقدام کننده به خود کشی در جدول ۲ ارایه شده است.

هم‌چنان که جدول ۲ نشان می‌دهد تفاوت میان هوش هیجانی در دو گروه بهنجار و اقدام کننده در کلیه زیرمقیاس‌ها و هم‌چنین نمره کل، معنی دار است ($p<0.001$). هم‌چنین بین

در راستای این هدف، تفاوت میان نمره کل هوش هیجانی و زیرمقیاس‌های آن در دو گروه بهنجار و اقدام کننده به خود کشی بررسی و نقطه برش و توانایی تشخیصی (حساسیت و ویژگی) پرسش‌نامه هوش هیجانی بار- آن (۱۹۹۷) برای تشخیص و احتمال اقدام به خود کشی تعیین گردید.

برای مقایسه دو گروه افراد اقدام کننده به خود کشی و افراد عادی با توجه به ۱۵ زیرمقیاس پرسش‌نامه، از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا) و برای تعیین نقطه برش و حساسیت پرسش‌نامه، تحلیل تمایزات به کار برده شد.

یافته‌ها

میانگین سنی گروه اقدام کننده به خود کشی ۲۵/۴ سال (انحراف معیار ۷/۶۴) و گروه گواه ۲۸/۱ سال (انحراف معیار ۴/۶) بود. در گروه اقدام کننده ۴۵ نفر (۵۶/۳٪) متأهل، ۳۱ نفر (۳۸/۸٪) مجرد، ۳ نفر (۳/۸٪) مطلقه و یک نفر (۱/۳٪) بیوه و در گروه گواه ۴۴ نفر (۵۵٪) متأهل، ۳۱ نفر (۳۸/۸٪) مجرد، چهار نفر (۵٪) مطلقه و یک نفر (۱/۳٪) بیوه بودند.

جدول ۱- مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل پرسش‌نامه هوش هیجانی بار- آن و زیرمقیاس‌های آن در دو گروه اقدام کننده به خود کشی ($n=10$) و بهنجار ($n=10$)

میانگین (انحراف معیار)		بهنجار	اقدام کننده به خود کشی
(۱۰/۲۵)	(۳۵۶/۱۴)	(۱۵/۹۴)	(۱۵۴/۱۲)
(۱/۷۳)	(۲۴/۵۸)	(۲/۱۹)	حل مسأله
(۱/۵۴)	(۲۳/۹۴)	(۰/۸۴)	خوبیختی
(۱/۵۳)	(۲۳/۶۴)	(۲/۷۶)	استقلال
(۱/۵۰)	(۲۳/۸۸)	(۲/۲۲)	تحمل فشار روانی
(۱/۶۱)	(۲۳/۷۶)	(۲/۳۱)	خودشکوفایی
(۱/۶۶)	(۲۳/۷۸)	(۲/۶۴)	خودآگاهی هیجانی
(۱/۸۷)	(۲۳/۵۵)	(۲/۰۴)	واقع گرایی
(۱/۵۵)	(۲۳/۶۱)	(۲/۹۸)	روابط بین فردی
(۱/۹۵)	(۲۳/۷۳)	(۲/۶۶)	خوشبینی
(۱/۷۲)	(۲۳/۷۵)	(۲/۷۴)	عزت نفس
(۱/۸۵)	(۲۳/۹۲)	(۲/۳۴)	کنترل تکانش
(۱/۹۲)	(۲۲/۶۷)	(۲/۱۵)	انعطاف پذیری
(۱/۸۵)	(۲۲/۱۳)	(۳/۲۲)	مسئلیت پذیری
(۱/۸۱)	(۲۲/۷۷)	(۳/۰۲)	همدلی
(۱/۹۱)	(۲۲/۶۵)	(۴/۳۱)	خودابرایی

است. هم‌چنان که گفته شد هوش هیجانی توانایی فرد در شناسایی و کنترل هیجان‌ها، برقراری تعادل میان عقل و احساس در برابر خودانگیزشی و توانایی حل مسأله است. از این رو افراد با هوش هیجانی پایین‌تر با توجه به وجود راهکارهای مقابله‌ای ضعیفتر، در رویارویی با کشمکش‌های زندگی بیشتر دست به خودکشی می‌زنند. این یافته‌های کاویانی و همکاران (۱۳۷۸) که در خودکشی کنندگان راه حل‌های کمتر و بی‌ربطتری نسبت به افراد عادی گزارش نمود، همانگ است. یافته‌های پژوهش حاضر هم چنین هم سو با یافته‌های کیاروچی و همکاران (۲۰۰۲) مبتنی بر تأثیر هوش هیجانی بر رابطه میان استرس‌ها، افسردگی، ناکامی و افکار خودکشی است. از سوی دیگر، وجود تفاوت معنی‌دار میان زیرمقیاس‌ها در دو گروه، همانگ با پژوهش کیاروچی و همکاران (۲۰۰۱) مبتنی بر نقش مؤثر مؤلفه‌های هوش هیجانی در سازگاری بهتر افراد در رویارویی با استرس می‌باشد و می‌تواند بعد عنوان عامل حفاظت‌کننده، از بروز مشکلات و پیامدهای چرخان‌ناپذیر هم چون اقدام به خودکشی پیش‌گیری کند.

با توجه به اهمیت توان تشخیصی این پرسشنامه و نقطه برش آن، می‌توان پیش‌بینی نمود که افراد با هوش هیجانی پایین‌تر از ۲۵۳/۸۶، در صورت برخورد با استرس شدید، در معرض خطر اقدام به خودکشی قرار دارند. از آنجا که حساسیت و ویژگی به دست آمده برای آزمون بار- ان بسیار بالا است، بنظر می‌رسد که توانایی تشخیصی این پرسشنامه در جدا کردن افراد سالم از اقدام کنندگان به خودکشی بسیار بالا می‌باشد.

در این پژوهش به دلیل همکاری نکردن مردان اقدام کننده به خودکشی، تنها زنان اقدام کننده بررسی شدند. دومین محدودیت پژوهش، آن است که با وجود شمار زیاد زیرمقیاس‌های هوش هیجانی، آزمون‌های مکمل به کار برده نشده است. البته با توجه به وضعیت پزشکی بیماران ولزوم رعایت حال ایشان امکان پرسشنامه‌گری طولانی مدت وجود نداشت. با این همه، بهره‌گیری از دیگر آزمون‌های هوش هیجانی و اجرای پرسشنامه‌هایی در راستای بررسی متغیرهایی هم چون وضعیت خلقی و عاطفی و سلامت روان و هم‌چنین پی‌گیری بیشتر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی به منظور تشخیص عوامل خطرساز و محافظت‌کننده پیشنهاد می‌گردد. از آنجا که هوش هیجانی برخلاف هوش‌بهر، پدیده‌های پویا و سیال

جدول ۳- میزان حساسیت و ویژگی تشخیصی پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان در دو گروه بهنجار ($n=10$) و اقدام کننده خودکشی ($n=10$)

روایی	فرآوانی	بیمار	۸۰	عضویت	
				پیش‌بینی شده	فرآوانی
تشخیصی	بهنجار	۰	۸۰	۰	۸۰
درصد	بیمار	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
روایی	بهنجار	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰

۹۸ تا ۷۶ درصد واریانس هر یک از زیرمقیاس‌ها مربوط به میزان روایی تشخیصی آن زیرمقیاس (میذور ضریب همبستگی بین نمرات کل هر زیرمقیاس و عضویت گروهی) بوده است. روایی تشخیصی نمرات کل نیز برابر با ۰/۹۸ بود. تعیین نمره برش و میزان توانایی تشخیصی (حساسیت و ویژگی) پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان به روش تحلیل تابیزات به شرح زیر انجام شد.

۰/۰۴۰ = ضریب a (عدد ثابت در معادله)

۰/۰۷۵ = ضریب b (شب خط رگرسیون)

۰/۰۷۵ = نمره کل مقیاس (y' = ۰/۰۷۵)

در صورتی که نقطه برش استاندارد صفر در معادله بالا قرار داده شود ($y' = 0$)، نقطه برش پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان برای پیش‌بینی احتمال اقدام به خودکشی ۲۵۳/۸۶ به دست می‌آید. با براین اگر نمره فردی پایین‌تر از این مقدار باشد، در معرض اقدام به خودکشی قرار دارد.

میزان حساسیت و ویژگی تشخیصی پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان در جدول ۳ ارایه شده است. هم‌چنان که جدول ۳ نشان می‌دهد میزان حساسیت پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان ۱۰۰٪ بوده است. یعنی این پرسشنامه ۱۰۰٪ بیماران را درست تشخیص داده است. به بیان دیگر ۸۰ فرد اقدام کننده مورد بررسی، بیمار تشخیص داده شده‌اند. هم‌چنین ویژگی مقیاس نیز برابر با ۱۰۰٪ به دست آمد (بر پایه نقطه برش ۰/۰۷۵).

بحث

با توجه به تفاوت معنی‌دار میان نمره کل هوش هیجانی و زیرمقیاس‌های آن در دو گروه، می‌توان گفت که هوش هیجانی زنان اقدام کننده به خودکشی پایین‌تر از زنان سالم

- Bar-on, R. (1997). *Bar-on Emotional Quotient Inventory: Technical manual*. Toronto: Multi-Health System.
- Bar-on, R. (2007). The Bar-on model of emotional intelligence: A valid, robust and applicable EI model. *Organizations & People*, 14, 27-34.
- Bar-on, R., & Parker, J. D. A. (2000). *The handbook of emotional intelligence*. San Francisco: Wiley Company.
- Ciarrochi, J., Dean, F. P., & Anderson, S. (2002). Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health. *Personality and Individual Differences*, 32, 197-209.
- Ciarrochi, J., Forgas, J. P., & Myer, J. D. (2001). *Emotional intelligence in everyday life*. London: Psychology Press.
- Clayton, D., & Barcel, A. (1999). The cost of suicide mortality in New Brunswick. *Chronic diseases in Canada*, 20, 89-90.
- Janghorbani, M., & Sharifirad, G. (2005). Completed and attempted suicide in Ilam, Iran (1995-2002): Incidence and associated factors. *Archives of Iranian Medicine*, 8, 119-126.
- Klinika, T. (2004). Connection between personality and emotional intelligence in groups of patients after suicidal attempts and ethanol dependent persons. *Przegad Lekarski*, 61, 287-291.
- Krausz, M., & Degkwitz, P. (1996). Opioid addiction and suicidality. *Crisis*, 14, 175-181.
- La Harpe, R. (1995). Suicide in the Geneva canton (1971-1990). An analysis of forensic medicine autopsy sample. *Archives of Criminology*, 195, 65-74.
- Lewinsohn, P. M., Rohde, P., & Seeley, J. R. (1996). Adolescent suicide ideation and attempts: Prevalence, risk factors, and clinical implication. *Clinical Psychology Science Practice*, 3, 25-46.
- Malone, K. M., Szanto, K., Corbitt, E. M., & Mann, J. (1995). Clinical assessment versus research methods in the assessment of suicidal behavior. *American Journal of Psychiatry*, 152, 1601-1607.
- Mayer, J. D., & Caruso, D. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for an Intelligence. *Journal of Intelligence*, 27, 267-298.
- Mayer, J. D., Salovey, P., &, Caruso, D. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence. *Emotion*, 1, 232-242.
- Moscicki, E. K. (1997). Identification of suicide risk factors using epidemiologic studies. *Psychiatric Clinics of North America*, 20, 499-517.

است، بهتر بود که گروه اقدام کننده به خود کشی مدتی پس از دور شدن از شرایط پرفشار که اقدام به خود کشی را در پی داشته است، دوباره ارزیابی می شلند تا بتوان یافته های بدست آمده را با یافته های پیشین خود و گروه بهنجار مقایسه نمود. آن جا که بررسی صرفاً بر روی اقدام کنندگان به خود کشی به روش مسمومیت انجام شده است، به نظر می رسد اجرای پژوهشی بر روی اقدام کنندگان به خود کشی با سایر روش ها، سودمند باشد.

دربافت مقاله: ۱۳۸۶/۵/۲۲؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۶/۵/۱۴

پذیرش مقاله: ۱۳۸۶/۵/۳۱

منابع

- آزاد، حسین (۱۳۷۲). آسیب شناسی روانی. تهران: انتشارات بخت.
- اکرمی، یاسمن (۱۳۸۰). آیا می دانید هوش هیجانی یا بهره هیجانی چیست؟ *نشریه موفقیت*، شماره ۳۸، ۲۹-۴۶.
- پورمند، دیبا؛ داویدیان، لیون (۱۳۶۹). صد مورد اقدام به خود کشی با مراد سی. مجله دانشکده پزشکی شهید بهشتی، سال چهارم، شماره ۱ و ۲، ۳۲-۳۳.
- جلالی، مهدی؛ ترابی، نیرو (۱۳۷۳). بررسی علل روانی و اجتماعی، موارد اقدام به خود کشی با مراد دارویی و سیمی، مقاله ارائه شده در دومین کنگره روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۲۵-۲۷ آذر.
- حسن زاده، سیدمهدي؛ رجالی، علی (۱۳۶۳). بررسی دویست مورد خود کشی. *مجله دانشکده پزشکی اصفهان*، شماره ۲۲، ۳۸-۴۳.
- رنجر، فرخ دست (۱۳۶۷). مشخصات افراد اقدام کننده به خود کشی در بیکی از بیمارستان های آموزشی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.
- سوزوی، راحله (۱۳۸۱). آزمون هوش-هیجانی اصفهان: روان تجهیز سنا.
- کاویانی، حسین؛ رحیمی درآباد، مهدی؛ تقی، حمبدرخا (۱۳۷۸). نقش حافظه سرگذشتی و مسئله گشایی در افسردگی و انگساره بردازی خود کشی.
- فصلنامه تاریخ های علوم شناختی، شماره ۴، ۱۶-۸.
- گیلدر، مایکل؛ می یور، ریچارد؛ کاث، دنیس (۱۳۶۹). روانپزشکی اکسفورد.
- ترجمه نصرت ا... پورافکاری. تبریز: انتشارات ذوقی.
- محسنی، متوجه (۱۳۶۶). انحرافات اجتماعی. تهران: انتشارات مروی.
- مدرسی، محمد؛ مسعودزاده، علی (۱۳۷۲). بررسی مواردی از اقدام به خود کشی در بخش مسمومیت بیمارستان سور اصفهان. پایان نامه دکترای سرفه ای. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
- نوروزی، سعید (۱۳۷۳). بررسی مقایسه ای مهارت های اقدام کنندگان به خود کشی و افراد بهنجار در مواجهه با شرایط استرس زد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبائی.
- هومن، حیدر علی (۱۳۶۶). اندازه گیری های روانی و تربینی و قن تهیه تست با تجدید نظر کلی و افزوده ها. تهران: انتشارات سلسله.

- Moscicki, E. K., O'Carroll, P. W., & Locke, B. Z. (1989). *Suicide ideation and attempt*. Washington DC: US Government Printing Office.
- Nwosa, S. O., & Odesanmi, W. O. (2001). Pattern of suicide in Ile-Ife, Nigeria. *West Africa Journal of Medicine*, 20, 259-262.
- Paykel, E. S., Prusoff, B. A., & Myers, J. K. (1975). Suicide attempts and recent life events: A controlled comparison. *Archives of General Psychiatry*, 32, 327-333.
- Sadock, B., & Sadock, V. A. (2003). *Comprehensive textbook of psychiatry*. (8th ed.). Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins.
- Solvey, P. (1990). Emotional intelligence imagination. *Cognition and Personality*, 9, 185-211.
- Taylor, G. J., Parker, J. D. A., & Bagby, R. M. (1999). Emotional intelligence and the emotional brain: Points of convergence and implications for psychoanalysis. *Journal of the American Academy of Psychoanalysis*, 27, 339- 354.

