

ارتباط میزان ولع مصرف با ابعاد مختلف شدت اعتیاد در معتادان تزریقی هروئین

دکتر آذرخش مکری^۱، دکتر حامد اختیاری^۱، هانیه عدالتی^۱، حبیب گنجگاهی^۲

Relationship between Degree of Craving and different Dimensions of Addiction Severity in Heroin Intravenous Users

Azarakhsh Mokri¹, Hamed Ekhtiari^{1*}, Hanie Edalati¹, Habib Ganjgahi²

Abstract

Objectives: Considering the importance of demographic factors such as age, sex, education, type of abused substance, method of abuse, the effect of previous treatments and the severity of addiction on craving and subsequent successful treatment, this research was carried out with the aim of examining the relationship between these factors and the severity of craving in intravenous heroin addicts. **Method:** In this study 26 male heroin addicts were selected using snowball sampling from among abusing addicts not seeking treatment, in the city of Tehran, Iran. The subjects entered the study after a primary interview and completed a demographic and Addiction Severity Index (ASI). Thereafter, the severity of cravings were assessed and the subjects were divided into two groups of responders and non-responders to craving symptoms. **Results:** The responders were subjects with lower age, lower addiction durations, higher drug expenditure, higher withdrawal symptoms, and more severe addiction symptoms in many components of ASI. Also, age and education had a negative significant correlation; and duration of abuse, daily cost of abuse and sub-components of substances, and legal and psychiatric problems had a significant correlation with individual reports of craving. **Conclusion:** Some demographic factors can be important predictors of craving in addicts, which is itself a considerable aspect of deviation from treatment. The

چکیده

هدف: نظر به اهمیت نقش عوامل جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات، نوع ماده مصرفی، روش مصرف، سایه درمان‌های پیشین و شدت اعتیاد در شدت ولع مصرف و به دنبال آن موفقیت درمان، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان این عوامل با شدت تجربه ولع مصرف در معتادان به تزریقی هروئین انجام شده است. **روش:** در این بررسی ۲۶ نفر آزمودنی مرد معتاد به هروئین تزریقی، از میان معتادان در حال مصرف غیردرمان جو تهرانی بزرگ‌پایه روش نمونه‌گیری گلوله برخی انتخاب، پس از مصاحبه اولیه وارد بررسی شده و به فرم ویزگی‌های جمعیت شناختی و شخص شدت اعتیاد پاسخ دادند. سپس شدت ولع مصرف فرد ارزیابی گردید که بزرگ‌پایه آن آزمودنی‌ها به دو گروه پاسخ‌گو و غیرپاسخ‌گو به نشانه‌های ولع مصرف تقسیم شدند. **یافته‌ها:** گروه پاسخ‌گو افرادی با سن کمتر، طول مدت اعتیاد کمتر، هزینه روزانه مصرف مواد بالاتر، علایم محرومیت از مواد بیشتر و شدت اعتیاد بیشتر در بسیاری از ابعاد شخص شدت اعتیاد (ASI) بودند. هم‌چنین میزان میزان تحصیلات همبستگی معنی دار منفی و طول دوره سوء‌صرف، هزینه روزانه مصرف و زیرشخص‌های مواد، مشکلات قانونی و مشکلات روانپردازی همبستگی معنی دار با میزان گذارش فردی ولع مصرف داشتند. **نتیجه‌گیری:** برخی عوامل جمعیت شناختی می‌توانند عوامل مهمی در پیش‌بینی میزان ولع مصرف فرد معتاد باشند که

۲۹۸
298

¹ روانپرداز، استاد بار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران، گروه بالینی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران؛ ² پژوهشکار علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران، میانان تزویین، خیابان کارگر جنوبی، شماره ۶۶۹، دورگلزار: ۱۷۷-۵۵۴۲۱۷۷، (نوبنده مسئول). E-mail: h.ekhtiari@gmail.com.

* Corresponding author: GP, Neurocognitive Assessment Laboratory, Iranian National Center for Addiction Studies, Tehran University of Medical Sciences, 669 South Kargar Ave., Gavzini Sq., Tehran, Iran, IR. Fax: +9821-55421177. E-mail: h.ekhtiari@gmail.com;

^a Psychiatrist, Assistant Prof. of Tehran University of Medical Sciences, Clinical Department, Iranian National Center for Addiction Studies;

^b MA. in Psychology, Alzahra University; ^c MA. in Statistics, Department of Statistics and Mathematics, Amirkabir Industrial University.

independent positive significant effects of factors of craving and addiction severity in the linear regression model indicates a reciprocal relationship between substance abuse and craving. The independent negative significant effect of substance abuse duration in the linear regression model in this study can indicate the process of the development of an compulsive behavior from an impulsive behavior in the process of addiction development.

Key words: craving; addiction severity; heroin

[Received: 10 July 2007; Accepted: 21 July 2008]

خود از ابعاد مورد توجه در انحراف از فرآیند درمان است. تأثیرگذاری مستقل مثبت معنی دار عوامل شدت علایم محرومیت و شدت اعتیاد در مدل رگرسیون خطی بیانگر ارتباط دو طرفه سوءصرف مواد و لعل مصرف است. تأثیر مستقل منفی معنی دار طول دوره سوءصرف مواد در مدل رگرسیون خطی در این بررسی می‌تواند بیانگر سیر تبدیل یک رفتار تکاپوشی به یک رفتار جبری در فرآیند پیشرفت اعتیاد باشد.

کلیدواژه: لعل مصرف؛ شدت اعتیاد؛ هروئین

[دریافت مقاله: ۱۳۸۶/۴/۱۹؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۷/۴/۳۱]

اگرچه به کارگیری یک نشانه چندبعدی (مانند ارایه یک لیوان مشروب الکلی یا صحنه واقعی کشیدن تریاک) شامل ابعاد بیوایی، شنیداری و بینایی می‌باشد و از این رو اعتبار بوم‌شناسختی ارایه نشانه را بالا می‌برد، اما سنجش و تحلیل باقته‌ها را دشوار می‌کند و از نظر اخلاقی و قانونی نیز مشکلاتی را به همراه دارد. نشانه‌های تصویری، بعدی را ارایه می‌دهند که به میزان زیادی با تجربه‌های شرطی شده در زندگی واقعی نزدیک است، اما شدت و شکنندگی رویارویی با مواد در محیط واقعی را به ویژه برای افرادی که در خطر بازگشت قرار دارند، به همراه ندارند (کارترا^{۱۴} و تیفانی، ۱۹۹۹).

بررسی‌های انجام شده در ایران در زمینه بررسی نشانه‌های تصویری القاء کننده لعل مصرف در معتادان تزریقی هروئین، نشان داده‌اند که از میان نشانه‌های احتمالی ایجاد کننده لعل مصرف در افراد یادشده، داروی بسته‌بندی شده یا آماده مصرف، سرنگ با سوزن بدون پوشش، بمویژه در شرایط پرشده از مواد، مراحل تهیه ماده تزریقی و تصاویر عمل تزریق، تأثیرگذار ترین شاخص‌های تصویری القاء کننده لعل مصرف می‌باشند (اختیاری و همکاران، ۱۳۸۵). از این رو نویسنده‌گان مقاله حاضر بر پایه یافته‌های پیشین بر آن شدند با بهره‌گیری از نشانه‌هایی که بیشترین تأثیر را در القای و لعل مصرف به همراه دارند بررسی‌های دقیق‌تری را برای سنجش تأثیرگذاری شدت اعتیاد و دیگر عوامل مرتبط با آن در ایجاد لعل مصرف انجام دهن.

مقدمه

ولع مصرف^۱ را می‌توان به یک میل شدید و مقاوم برای مصرف مواد تعریف کرد، میلی که اگر برآورده نشود رنج‌های روان‌شناسختی و بدنی مانند ضعف^۲، بی‌اشتهایی، اضطراب، بی‌خوابی، پرخاشگری و افسردگی را در پی دارد (آدولوراتو^۳، لگیو^۴، آبن‌آلی^۵ و گاسبارینی^۶، ۲۰۰۵). این که چه عواملی در شدت تجربه لعل مصرف دخالت دارند، ذهن بسیاری از متخصصانی را که در زمینه اعتیاد مشغول به کار هستند، در گیر کرده است.

بررسی‌ها نشان داده‌اند که یک نشانه تصویری^۷ یا غیرتصویری برای نمونه، صوتی یا بیوایی در محیط خارجی و یا یک تخیل درونزاد می‌تواند عامل القای لعل مصرف گردد (اختیاری، بهزادی، عقایبان، عدالتی و مکری، ۱۳۸۵). با توجه به این که هر یک از انواع داروها و روش‌های مصرف با شرایط محیطی و روانی بیوایی همراه می‌باشد، نشانه‌هایی که در مصرف کنندگان بنایه نوع روش مصرف، ایجاد لعل می‌کنند نیز متفاوت‌اند. فرض اساسی بررسی‌های بازفعال‌سازی نشانه^۸، این است که الگوی پاسخ‌ها به محرك‌های القای و لعل مصرف، تحت تأثیر تجربیات اولیه هر فرد از آن محرك، به طور متفاوت ایجاد می‌شود. تفاوت در واکنش به محرك‌های مربوط به دارو احتمالاً از تجربیاتی شرطی شده سرچشمه می‌گیرند. از این رو فرض بر این است که میزان بازفعال‌سازی و نوع نشانه محرك، ناشی از تاریخچه مصرف دارو می‌باشد.

ارایه نشانه‌هایی برای القاء و لعل مصرف در ابعاد گوناگون امکان‌پذیر است. این ابعاد در بردارنده ابعاد تصویری، بیوایی، چشمایی، لامسه، شنیداری و خیالی^۹ می‌باشند (درویس^{۱۰} و تیفانی^{۱۱}، پالفی^{۱۲}، ۲۰۰۱، شیفمن^{۱۳} و همکاران، ۲۰۰۳).

1- drug craving	2- asthenia
3- Adolorato	4- Leggio
5- Abenavoli	6- Gasbarrini
7- pictorial cue	8- cue reactivity
9- imaginary	10- Drobis
11- Tiffani	12- Palfai
13- Shifman	14- Carter

پایین تری را گزارش کردند. هم چنین این گروه در مقایسه با دو گروه دیگر سابقه بازداشت و زندان ییشتری داشتند. از آن جا که مهم ترین عامل بازگشت، پس از ترک، ولع مصرف می باشد، چگونگی ارتباط این پدیده با سایر عوامل مرتبط و ویژگی های اختصاصی بیماری اعتیاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آن جا که اعتیاد تزیقی، از مهم ترین عوامل انتقال ویروس نقص ایمنی انسان است و درمان و کنترل آن از مهم ترین هدف های بهداشت و درمان کشور ما به شمار می رود، شناخت ابعاد گوناگون آن و ارتباط آنها با میزان ولع فرد نسبت به این روش مصرف، در راستای کنترل این بیماری دارای اهمیت می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط شدت ولع مصرف با ویژگی های جمیعت شناختی و بالینی معتمدان مصرف کننده هروئین تزیقی بود. بررسی های انجام شده در این زمینه بیشتر بر مصرف الكل و ماری جو آتا متصرکز بوده اند و تاکنون پژوهشی روی ابعاد گوناگون شدت اعتیاد به مواد اوپیوئیدی انجام نشده است. با توجه به کمبود بررسی های انجام شده در این زمینه در جهان، پیرامون اعتیاد به مواد افیونی و تفاوت نوع ویژه اعتیاد و داروهای مصرفی در ایران با کشورهای غربی، نیاز به بررسی های دقیقی در زمینه شدت ولع مصرف و ارتباط آن با سایر متغیرهای مربوط به مصرف مواد افیونی در ایران احساس می شود.

روش

این بررسی توصیفی - مقطوعی بر روی گروهی از معتمدان تزیقی هروئین با بهره گیری از ابزارهای سنجش ولع مصرف و شدت اعتیاد انجام شده است. آزمودنی های پژوهش ۲۶ نفر مرد معتمد به هروئین تزیقی بودند که به روش نمونه گیری گلوله بر قدر از میان معتمدان در حال مصرف غیر درمان جو تهرانی انتخاب شدند. به این صورت که هر معتمد در حال مصرف، فرد

بررسی ها نشان داده اند عوامل جمیعت شناختی مختلف مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات، نوع ماده مصرفی، روش مصرف و سابقه درمان های پیشین، می تواند بر شدت ولع مصرف و به دنبال آن موقیت درمان تأثیر بگذارد. هم چنین زنان مصرف کننده کوکائین نسبت به مردانی که همین ماده را مصرف می کنند، ولع مصرف بالاتر و تعایل بیشتر برای مصرف در طول درمان، نشان می دهند (المان^۱، کارلس گودت^۲ و گاسترفورد^۳، ۲۰۰۱).

یکی از زمینه هایی که بر میزان ولع مصرف فرد تأثیر می گذارد، شدت اعتیاد، طول مدت آن و عوامل دیگر مرتبط با آن مانند سوء مصرف چند دارو می باشد. بررسی ها نشان داده اند که میزان ولع مصرف بالاتر در معتمدان به الكل، با بالاتر بودن نمره شدت مصرف الكل در پرسشنامه شاخص شدت اعتیاد^۴ (ASI) همراه است (ایلهان^۵، دمیرباس^۶ و دوگان^۷، یون^۸، کیم^۹، سوراس^{۱۰}، گرانست^{۱۱} و وستر میر^{۱۲}، ۲۰۰۶). هم چنین نشان داده شده است که نمره وضعیت مواد و وضعیت پزشکی از شاخص ASI، یک پیش بینی کننده قوی برای موقیت درمان می باشد (فرانکن^{۱۳} و هندریکز^{۱۴}، ۱۹۹۹). یکی از زمینه های این ارتباط را می توان دخالت این شاخص ها در میزان ولع مصرف به عنوان مهم ترین عامل شکست درمانی دانست. فاکس^{۱۵}، تالیه^{۱۶}، مالیسون^{۱۷}، اندرسون^{۱۸} و کریک^{۱۹} (۲۰۰۵)، نشان دادند که مدت طولانی تر مصرف در معتمدان به کوکائین، با تجربه ولع مصرف بیشتر همراه است. والسون-موس^{۲۰} و مک کال^{۲۱} (۲۰۰۶)، زنان معتمد به کوکائین که در سابقه درمانی خود دست کم یک بار درمان ناموفق و تجربه بازگشت داشته اند را بازنگی که برای نخستین بار برای ترک مراجعه کرده بودند، مقایسه کردن و نشان دادند که داشتن سابقه درمان ناموفق و تجربه بازگشت، با ولع مصرف بالاتر، مصرف بیشتر مواد، نمره بالاتر وضعیت مصرف الكل، داشتن مشکلات جدی قانونی، تاریخچه دست کم سه بار بارداری و سابقه سوء رفتار جسمانی توسط یک فرد آشنا به طور مستقل ارتباط معنی دار دارد.

گیندالینی^{۲۲}، والا^{۲۳}، برین^{۲۴} و لاران جیرا^{۲۵} (۲۰۰۶)، در مقایسه مصرف کنندگان پودر کوکائین، کوکائین کریستال و کسانی که هر دو ماده را مصرف می کردند، نشان دادند کسانی که هر دو ماده را به کار می بردند، نسبت به دو گروه دیگر سن کمتری داشتند و نسبت به دو گروه کوکائین مصرف می کردند، ولع مصرف بیشتر و تحصیلات

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1- Elman | 2- Karlsgodt |
| 3- Gastfriend | 4- Addiction Severity Index |
| 5- Ilhan | 6- Demirbas |
| 7- Dogan | 8- Yoon |
| 9- Kim | 10- Thuras |
| 11- Grant | 12- Westermeyer |
| 13- Franken | 14- Hendriks |
| 15- Fox | 16- Talih |
| 17- Malison | 18- Anderson |
| 19- Kreek | 20- Walton-Moss |
| 21- McCaul | 22- Guindalini |
| 23- Wallada | 24- Breen |
| 25- Laranjeira | |

مطالعات اعتیاد و بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده است.

۳- آزمون سنجش ولع مصرف: برای سنجش شدت ولع مصرف از آزمون تصویری سنجش ولع مصرف برای معتادان هر دوین تزریقی بهره گرفته شد. نمره کل این پرسش‌نامه از صفر تا ۱۰۰ می‌تواند در نوسان باشد. این آزمون با به کارگیری نشانه‌های تصویری ایجاد‌کننده ولع مصرف می‌تواند میزان ولع مصرف را در فرد اندازه‌گیری کند. در این آزمون، به فرد تصاویر مورد نظر نشان داده می‌شود و از او پرسیده می‌شود که این تصاویر تا چه اندازه می‌توانند در او ایجاد ولع کنند. آزمودنی باید روی خط کشی که توسط آزمونگر به او نشان داده می‌شود، میزان ولع خود را از به‌هیچ وجه تا خیلی زیاد مشخص کند. پشت این خط کش از صفر تا صد درجه‌بندی شده است. با توجه به نقطه‌ای که فرد روی خط کش معین می‌کند، آزمونگر با مراجعه به پشت خط کش عددی بین صفر تا صد را یادداشت می‌نماید. این عدد نشان دهنده میزان ولع فرد است. میانگین نمرات بدست آمده از این ۱۶ تصویر به عنوان نمره کلی آزمون (۰-۱۰۰) در نظر گرفته شد. این آزمون ۱۶ تصویری بر پایه برسی پیشین اختیاری و همکاران (۱۳۸۵) طراحی شده است. اختیاری و همکاران (۱۳۸۷) برای آزمون سنجش ولع مصرف، پایابی و روایی مناسبی گزارش نمودند. تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی و ضربی همبستگی پرسون انجام شد.

مافتیں

میانگین سنی آزمودنی ها ۳۴/۱۹ سال (انحراف معیار ۷/۸۱)، میزان تحصیلات آنان ۱۰/۱۰، دوره سوءصرف ۱۵/۴۶ سال (انحراف معیار ۱۰/۵۹)، و طول دوره اعتیاد ۱۱/۹۲ سال (انحراف معیار ۹/۱۹) بود. آزمودنی ها بر پایه نتایج گزارش فردی ولع مصرف در دو گروه پاسخ گو (۱۶ نفر) به نشانه های تصویری [نموده مقیاس آسالوگ بصری^۳ (VAS) بالای ۶۰] و غیرپاسخ گو (۱۰ نفر) (نموده شاخص آسالوگ بصری زیر ۴۰) جای داده شدند. همان گونه که در شکل ۱ دیده می شود، میزان گزارش ولع مصرف در هیچ یک از تصاویر تفاوت معنی داری با بقیه


دیگری را با همین شرایط به پژوهشگر معرفی می کرد. به آزمودنی ها برای شرکت در این برسی مبلغی به عنوان پاداش پرداخت شد. پس از انجام یک مصاحبه نیمه ساختار یافته و تطبیق با معیارهای DSM-IV¹ (انجمان روانپژوهشکی آمریکا، ۱۹۹۴) در سورد اعتیاد و سنجهش میزان همکاری بیمار، آزمودنی های دارای شرایط وارد برسی شدند.

در مرحله بعد در يك جلسه، با هر آزمودنی پرسش نامه و يزگي های جمعيت شناختي و شاخص شدت اعتياد تكميل شد. سپس در همان جلسه، شدت ولع مصرف فرد ارزيبابي گردید. به آزمودنی ها يادآوری شد که پيش از شرکت در جلسات طرح و ارزيبابي، مصرف داروي خود را به گونه اي تنظيم کنند که در اين جلسات نه در وضعیت محرومیت و نه در وضعیت مسمومیت باشند. قرار گيری فرد در وضعیت مناسب بر پایه چك لیست های بالیني مربوطه و معاینه بالیني توسط پزشك خبره پيش از هر مرحله بررسی سنجیده شد. برای گم دآوري داده ها اندازه های زیر به کار رده شد:

۱- پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی: این پرسش نامه در بردارنده اطلاعاتی همچون سن، سطح تحصیلات، وضعیت سکونت، وضعیت تأهل، شغل، نوع ماده مصرفی، روش مصرف، طول مدت مصرف و سابقه درمان بود که توسط مصاحبه گر طی مصاحبه تکمیل می گردید.

-۲- شاخص شدت اعتیاد (ASI): برای بررسی وضعیت بالینی بیماران، شاخص شدت اعتیاد (ویرایش پنجم) (مکلیلان^۱ و همکاران، ۱۹۹۲) به کار برده شد. ASI، یک مصاحبه نیمه ساختار یافته است که توسط پژوهشگران آموزش دیده، به صورت رو در رو با بیماران اجرا می‌شود. این پرسشنامه مشکلات بیماران را در هر زمینه در طی ۳۰ روز گذشته، در سال گذشته و در طول عمر گردآوری می‌کند. ASI در هر بخش، یک نمره کلی ترکیبی (۰-۱) به دست می‌دهد و چگونگی وضعیت فرد در آن بخش را درجه‌بندی می‌کند.

این پرسش نامه دارای ۱۱۶ پرسش می باشد. هشت پرسش درباره وضعیت پزشکی، ۲۱ پرسش درباره وضعیت شغلی، ۲۴ پرسش در زمینه وضعیت مصرف مواد مخدر و الکل، ۲۷ پرسش پیرامون وضعیت حقوقی، ۲۳ پرسش در زمینه وضعیت خانوادگی و ۱۳ پرسش درباره وضعیت روانی ییمار است. ارزیابی پایابی و روایی نسخه فارسی به کار برده شده در این بررسی، توسط عاطف وحید و همکاران (در دست اجرا) و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و با همکاری مرکز ملی



شکل ۱ - تصاویر ارایه شده در آزمون سنجش ولع مصرف، میانگین و انحراف معیار پاسخ دهنده به هر یک از تصاویر

برخی ویژگی های جمعیت شناختی و سوء مصرف مواد در ۲۱/۸۰±۱۵/۷۱ بود. این تفاوت میان این دو گروه در مورد سن، میزان علایم محرومیت و نمره ترکیبی اختلال های روانی شکی در شاخص ASI معنی دار بود.

در جدول ۲ ارتباط میان شاخص های جمعیت شناختی و شدت اعتیاد با میزان ولع مصرف القاء شده بر پایه ضریب همبستگی پرسون نمایش داده شده است. همان گونه که جدول ۱ نشان می دهد گروه پاسخ گو افرادی با سن کمتر، طول مدت اعتیاد کمتر، هزینه روزانه مصرف مواد بالاتر، علایم محرومیت از مواد بیشتر و شدت اعتیاد بیشتر در بسیاری از ابعاد شاخص شدت اعتیاد (ASI) می باشند. میانگین نمره آزمون سنجش ولع مصرف در گروه پاسخ گو به نشانه های تصویری ولع مصرف ۷۹/۲۵±۱۴/۱۴ و در گروه غیر پاسخ گو

برخی ویژگی های جمعیت شناختی و سوء مصرف مواد در دو گروه در جدول ۱ نشان داده شده است. همان گونه که جدول ۱ نشان می دهد گروه پاسخ گو افرادی با سن کمتر، طول مدت اعتیاد کمتر، هزینه روزانه مصرف مواد بالاتر، علایم محرومیت از مواد بیشتر و شدت اعتیاد بیشتر در بسیاری از ابعاد شاخص شدت اعتیاد (ASI) می باشند. میانگین نمره آزمون سنجش ولع مصرف در گروه پاسخ گو به نشانه های تصویری ولع مصرف ۷۹/۲۵±۱۴/۱۴ و در گروه غیر پاسخ گو

جدول ۱- میانگین و انحراف معیار (داخل پرانتز) برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی و شاخص ثابت اختیاد در دو گروه پاسخ‌گو و غیرپاسخ‌گو به ایجاد ولع مصرف با علایم تصویری به کمک آزمون ۱

	گروه پاسخ‌گو به ایجاد ولع مصرف (n=۱۰)	گروه غیرپاسخ‌گو به ایجاد ولع مصرف (n=۱۶)	
سن (سال)*	(۱۳/۳۱) ۳۹/۵۰	(۷/۴۴) ۳۰/۸۸	
تحصیلات (سال)	(۴/۴۳) ۸/۹۰	(۲/۲۳) ۷/۱۲	
طول دوره سوء‌صرف مواد افیونی (سال)	(۱۴/۲۳) ۱۹/۴۰	(۶/۹۸) ۱۳/۰۰	
طول دوره اختیاد به مواد افیونی (سال)	(۱۱/۹۰) ۱۳/۷۰	(۷/۲۴) ۱۰/۸۱	
هزینه روزانه مصرف هروئین (تومان)	(۲۹۶۱) ۴۹۵۲	(۲۶۶۲) ۶۳۷۰	
فاصله زمانی ارزیابی تا آخرین مصرف هروئین (ساعت)	(۲/۰۶) ۳/۴۵	(۱/۹۱) ۳/۵۹	
نمره علایم محرومیت از مواد**	(۹/۷۷) ۱۷/۴۴	(۲۲/۴۳) ۴۸/۰۶	(۰-۱۰۴)
نمره ترکیبی پزشکی	(۰/۳۵) ۰/۲۱	(۰/۳۲) ۰/۱۴	
نمره ترکیبی اشتغال	(۰/۲۶) ۰/۵۸	(۰/۲۸) ۰/۶۷	اثر نظری
نمره ترکیبی الكل	(۰/۶۱) ۰/۲۸	(۰/۰۷) ۰/۰۴	اثر نظری
نمره ترکیبی مواد	(۰/۱۲) ۰/۴۹	(۰/۱۱) ۰/۳۵	اثر نظری
نمره ترکیبی قانونی	(۰/۰۷) ۰/۰۲	(۰/۲۰) ۰/۱۲	اثر نظری
نمره ترکیبی خانوادگی	(۰/۱۹) ۰/۲۰	(۰/۰۵) ۰/۳۰	اثر نظری
نمره ترکیبی روانپردازشکی *	(۰/۱۵) ۰/۲۸	(۰/۰۹) ۰/۵۱	اثر نظری

* p<0.05; ** p<0.01

معکوس و معنی دار دارد؛ در حالی که با هزینه روزانه مصرف خطی باقی ماندند و بقیه متغیرها از الگو حذف شدند (جدول ۳).

با توجه به بررسی‌های پیشین در زمینه وضعیت دوگانه پاسخ‌گو و غیرپاسخ‌گو در ارتباط با علایم تصویری ایجاد ولع مصرف (بهزادی و همکاران، ۲۰۰۸) و بر پایه بررسی‌های تصویربرداری عملکردی مغزی، به کمک ابزار خوش‌سازی K-Mean با وضعیت پیشنهادی دو گروه، متغیرهای مرتبط با شدت ولع مصرف تحلیل شدند. با این روش، شدت بالاتر علایم محرومیت، نمره ترکیبی مواد و نمره ترکیبی روانپردازشکی بالاتر در شاخص ASI و سن کمتر به صورت معنی دار و طول دوره سوء‌صرف کمتر، نمرات شاخص‌های مشکلات قانونی، خانوادگی و اشتغال بالاتر و طول تحصیل کمتر به صورت غیرمعنی دار عامل جداسازی خوش‌های از یکدیگر می‌باشد (جدول ۴).

مواد، شدت علایم محرومیت و زیرشاخص‌های مواد، مشکلات قانونی و روانپردازشکی از شاخص ASI ارتباط معنی دار مستقیم دارد.

با توجه به ارتباط‌های درونی شاخص‌های مرتبط با میزان ولع مصرف، این پرسش مطرح می‌شود که کدامیک از این ارتباط‌ها مستقل بوده و کدامیک تحت تأثیر این ارتباط‌های درونی شکل گرفته‌اند. در پاسخ به این پرسش، مجموع متغیرهای دارای ارتباط معنی دار در آزمون رگرسیون گام به گام بررسی شدند. از مجموعه متغیرهای مرتبط با گزارش فردی ولع مصرف، اثر سه متغیر شدت علایم محرومیت (اثر مثبت با ضریب ۰/۵۸)، طول دوره سوء‌صرف (اثر منفی با ضریب ۰/۵۱) و نمره ترکیبی مواد در شاخص شدت اختیاد با میزان ولع مصرف (اثر مثبت با ضریب ۰/۲۸) دارای اثر مستقل تشخیص داده شده و در مدل رگرسیون

جدول ۳- ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی‌های جمیعت شناختی و شدت اختیاد با میزان ولع مصرف

شانص شدت اختیاد (ASI)													سن
۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	سن
-0.195													۱
	-0.103												۲
		-0.125**											۳
			-0.187**										۴
				-0.185**									۵
					-0.151*								۶
						-0.127							۷
							-0.194						۸
								-0.127					۹
									-0.167				۱۰
										-0.172			۱۱
											-0.121		۱۲
												-0.172	۱۳
													ولع مصرف +

۱- تحصیلات؛ ۲- طول دوره سوء مصرف مواد افیونی (سال)؛ ۳- طول دوره اختیاد به مواد افیونی (سال)؛ ۴- هزینه روزانه مصرف هروئین (نومان)؛ ۵- فاصله زمانی ارزیابی تا آخرین مصرف هروئین (ساعت)؛ ۶- علایم محرومیت از مواد (-0.104)؛ ۷- نمره ترکیبی پژوهشکی؛ ۸- نمره ترکیبی اشتغال؛ ۹- نمره ترکیبی النکل؛ ۱۰- نمره ترکیبی مواد؛ ۱۱- نمره ترکیبی قانونی؛ ۱۲- نمره ترکیبی خانوادگی؛ ۱۳- نمره ترکیبی روانپردازی؛ ۱۴- بر پایه گزارش فردی (-0.104)

*p<0.05, **p<0.01

جدول ۴- متغیرهای دارای تأثیر مستقل بر پایه رگرسیون گام به گام^۱ از مجموعه متغیرهای مرتبط با گزارش فردی ولع مصرف تحریک کننده به وسیله نشانه های تصویری

متغیرهای باقیمانده در مدل رگرسیون خطی	سطح معنی داری	ضریب بتای معیار	شدت علایم محرومیت از مواد (-0.104)
طول دوره سوء مصرف مواد		-0.0511	0.001
نموده ترکیبی مواد در شاخص ASI		0.282	0.022

1- stepwise regression

جدول ۵- خوشبندی دو گروهه متادان تزریقی هروئین بر پایه میزان ولع مصرف و شاخص های مربوطه، میاتکین شاخص ها در هر خوشبندی و میزان منی داری تفاوت شاخص های ارایه شده در دو گروه بر پایه ابزار خوشسازی K-Mean

نموده ترکیبی مواد در ASI	نموده ترکیبی اختلال های روانپردازی در ASI	سن	طول دوره سوء مصرف مواد	نموده ترکیبی مشکلات قانونی در ASI	نموده ترکیبی مشکلات اشتغال در ASI	نموده ترکیبی مشکلات خانوادگی در ASI	نموده ترکیبی مشکلات اشتغال در ASI
گزارش فردی ولع مصرف (۰ تا 100)							
شدت علایم محرومیت از مواد (0-104)							
نموده ترکیبی مواد در ASI							
نموده ترکیبی اختلال های روانپردازی در ASI							
سن							
طول دوره سوء مصرف مواد							
نموده ترکیبی مشکلات قانونی در ASI							
نموده ترکیبی مشکلات اشتغال در ASI							
نموده ترکیبی مشکلات خانوادگی در ASI							
نموده ترکیبی مشکلات اشتغال در ASI							

* non-significant

بحث

آزمودنی‌ها پدیدید می‌آورد و دلیل اصلی بازگشت در افرادی است که به صورت فردی اقدام به ترک می‌کنند. با این وجود در این زمینه تناقضاتی وجود دارد. بررسی‌ها نشان داده‌اند که ولع مصرف تا مدت‌های پس از درمان نیز ممکن است وجود داشته باشد. رایت^۱، بک^۲، نیومن^۳ و لیز^۴ (۱۹۹۳) ولع مصرف ناشی از عالیم محرومیت را از سایر انواع ولع مصرف جدا نموده و به تعریف چهار گونه ولع مصرف پرداخته‌اند:

الف- ولع مصرف در پاسخ به عالیم محرومیت، ب- ولع مصرف در پاسخ به فقدان لذت، خلق پایین و اضطراب، ج- ولع مصرف در پاسخ به مواجهه با نشانه شرطی شده ماده مصرفی، د- ولع مصرف در پاسخ به سائق لذت طلبانه. به نظر می‌رسد در این بررسی، با توجه به جامعه آماری مورد بررسی، ولع مصرف مورد سنجش، ترکیبی از موارد الف و ج باشد. ارتباط میان ولع مصرف و ابعاد پرشنّامه ASI نشان می‌دهند که ولع مصرف با نمره بالاتر در ابعاد مختلف ASI همراه می‌باشد. ضریب همبستگی پیرسون، بین شدت ولع مصرف با زیراخصس‌های مواد، مشکلات قانونی و روانپژشکی ارتباط معنی دار مستقیم نشان داد. ارتباط میان ولع مصرف بیشتر با ابعاد مختلف ASI در بررسی‌های دیگر نیز نشان داده شده است (برای نمونه ایلهان و همکاران، ۲۰۰۶؛ یون^۵ و همکاران، ۲۰۰۶).

روش نمونه‌گیری و شمار نسبتاً کم حجم نمونه را باید از محدودیت‌های پژوهش حاضر داشت. در این بررسی، روش گلوله‌برفی به کار برده شده است تا امکان دسترسی به معتادان تزریقی هروین فراهم شود. با توجه به شیوع مصرف کراک تدخینی که روشنی آسان و ایمن تر برای رسیدن به لذت دلخواه در معتادان می‌باشد، مصرف تزریقی هروین تا اندازه‌ای کاهش یافته است. این روش نمونه‌گیری، امکان تعیین بافته‌ها را با محدودیت رویه‌رو می‌کند.

از آن‌جاکه مهم‌ترین عامل بازگشت پس از ترک، ولع مصرف می‌باشد، شناسایی هر چه بیشتر این پدیده و سایر عوامل مرتبط با آن از اهمیت ویژه درمانی برخوردار است. با توجه به تفاوت ویژگی‌های اعتیاد و داروهای مصرفی در ایران و سایر کشورها، بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر در زمینه شدت ولع مصرف نسبت به این مواد در نمونه‌های ایرانی، ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از پیش آیندهای مهم بازگشت به مصرف مواد پس از پایان دوره سم زدایی، ولع مصرف است. بررسی‌های انجام‌شده در ایران در زمینه بررسی نشانه‌های تصویری القاء کننده ولع مصرف در معتادان تزریقی هروین، نشان داده‌اند که از میان نشانه‌های احتمالی ایجاد کننده ولع، داروی بسته‌بندی شده یا آماده مصرف، سرنگ با سوزن بدون پوشش، بهویژه در شرایط پرشده از مواد، مراحل تهیه ماده تزریقی و تصاویر عمل تزریق، تأثیر گذارترین شاخص‌های تصویری القاء کننده ولع مصرف می‌باشند (اختیاری و همکاران، ۱۳۸۵). هم‌چنین برخی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات، نوع ماده مصرفی، روش مصرف و سابقه درمان‌های پیشین می‌توانند بر شدت ولع مصرف و بدنبال آن موقیت درمان تأثیر بگذارند.

این بررسی نشان داد که ولع مصرف بالاتر با ویژگی‌های سن، طول مدت اعتیاد و تحصیلات کمتر و هزینه روزانه مصرف بیشتر در آزمودنی‌های معتاد به هروین تزریقی در ارتباط است. این یافته در هر چهار زمینه با یافته‌های گیندالینی و همکاران (۲۰۰۶) در مورد کوکائین و نیز بررسی اوانتز^۶، مارگولینی^۷، کاستن^۸ و کونی^۹ (۱۹۹۵) در زمینه طول مدت مصرف کوکائین، هم‌خوانی دارد. فاکس و همکاران (۲۰۰۵) نشان دادند که طول مدت مصرف بالاتر در معتادان به کوکائین، با تجربه ولع مصرف بیشتر همراه است. این تناقض در زمینه مصرف طولانی تر کوکائین می‌تواند به دلیل ماهیت وابستگی به این ماده باشد که نسبت به مواد افیونی مانند هروین وابستگی بدنی کمتری ایجاد می‌کند. نکته دیگری که می‌تواند به توجیه کاهش میزان ولع مصرف با افزایش سن کمک نماید نظریه‌های جدید تحلیل رفتارهای معتادان بر پایه تبدیل فرایند تکائشی مصرف مواد به یک فرایند جبری است. بر پایه این رویکرد، جنبه‌های لذت بخش و پاداش مصرف مواد در سیر پیشرفت اعتیاد، کاهش یافته و فرد معتاد در گیر فرآیندی وسوسی-اجباری برای کاهش اضطراب ناشی از عدم مصرف مواد می‌گردد.

هم‌چنین این بررسی نشان داد که مصرف کنندگان هروین تزریقی که ولع مصرف بیشتری را تجربه می‌کنند و نسبت به نشانه‌های مربوط به آن پاسخ‌گو هستند، عالیم محرومیت بیشتری را نیز تجربه کرده‌اند. عالیم محرومیت که به دنبال فاصله‌افتادن بین دفعات مصرف رخ می‌دهد، افزون بر ایجاد ناراحتی‌های بدنی و ذهنی، میل شدیدی برای مصرف را در

سپاسگزاری

این بررسی با بهره‌گیری از بودجه پژوهشی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در آزمایشگاه ارزیابی عصبی-شناختی مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران انجام شد. هم‌چنین همکاری‌های صمیمانه مدیر پژوهشی آزمایشگاه آقای دکتر هومن صفائی و مشاور آمار و روش پژوهش طرح آقای دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید در اجرای پژوهش، شایسته قدردانی است.

منابع

- اختیاری، حامد؛ بهزادی، آرین؛ عقایان، محمدعلی؛ عدالی، هایه؛ مکری، آذرخشن (۱۳۸۵). نشانه‌های تصویری القاء کشنه و لع مصرف در معنادان تربیتی هروین. *لطفه‌های علوم شناختی*، سال هشتم، شماره ۳، ۵۲-۴۳.
- اختیاری، حامد؛ عدالی، هایه؛ بهزادی، آرین؛ صفائی، هومن؛ نوری، مهری؛ مکری، آذرخشن (۱۳۸۷). ساخت و بررسی کارآبی پنج آزمون تصویری ارزیابی لع مصرف در معنادان مواد افیونی. *محله روانپردازی و روانشناسی ایران*، سال چهاردهم، شماره ۳، ۳۶۹-۳۷۷.
- عاطف‌وحید، محمد‌کاظم؛ زارعی‌دوست، الهام؛ پناغی، نیلی (در دست انجام). *بررسی پایابی و روایی ISI*. تهران: مرکز ملی مطالعات اعتیاد.
- Addolorato, G., Leggio, L., Abenavoli, L., & Gasbarrini, G. (2005). Neurobiochemical and clinical aspects of craving in alcohol addiction: A review. *Addictive Behaviors*, 30, 1209-1224.
- American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th. ed.). Washington, DC: APA.
- Avants, S. K., Margolin, A., Kosten, T. R., & Coonney, N. L. (1995). Differences between responders and non-responders to cocaine cues in the laboratory. *Addictive Behaviors*, 20, 215-224.
- Behzadi, A., Ekhtiari, H., Mokri, A., Edalati, H., Bakhtiari, M., Rabii, N., & Oghabian, M. A. (2008). *Nonresponding heroin addicts to drug-related cues show similar fMRI activations as normal subjects in their brains*, Unpublished manuscript.
- Carter, B. L., & Tiffany, S. T. (1999). Meta-analysis of cue-reactivity in addiction research. *Addiction*, 94, 327-340.
- Drobes, D. J., & Tiffany, S. T. (1997). Induction of smoking urge through imaginal and in vivo procedures: Physiological and self-report manifestations. *Journal of Abnormal Psychology*, 106, 15-25.
- Elman, I., Karlsgodt, K. H., & Gastfriend, D. R. (2001). Gender differences in cocaine craving among non-treatment-seeking individuals with cocaine dependence. *American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 27, 193-202.
- Fox, H. C., Talih, M., Malison, R., Anderson, G. M., & Kreek, M. J. (2005). Frequency of recent cocaine and alcohol use affects craving and associated responses to stress and drug-related cues. *Psychoneuroendocrinology*, 30, 880-891.
- Franken, I. H., & Hendriks, V. M. (1999). Predicting outcome of inpatient detoxification of substance abusers. *Psychiatric Services*, 50, 813-817.
- Guindalini, C., Wallada, H., Breen, G., & Laranjeira, R. (2006). Concurrent crack and powder cocaine users from São Paulo: Do they represent a different group? *BMC Public Health*, 6 (10).
- Ilhan, I. O., Demirbas, H., & Dogan, Y. B. (2006). Validation study of the Turkish version of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale for heavy drinking in a group of male patients. *Drug and Alcohol Review*, 25, 357-360.
- McLellan, A. T., Kushner, H., Metzger, D., Peters, R., Smith, I., Grissom, G., Pettinati, H., & Argeriou, M. (1995). The Fifth edition of the Addiction Severity Index. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 9, 199-213.
- McRae, A. L., Hedden, S. L., Malcolm, R. E., Carter, R. E., & Brady, K. T. (2007). Characteristics of cocaine- and marijuana-dependent subjects presenting for medication treatment trials. *Addictive Behaviors*, 32, 1433-1440.
- Palfai, T. P. (2001). Individual differences in temptation and responses to alcohol cues. *Journal of Studies on Alcohol*, 62, 657-666.
- Wrigh, F. D., Beck, A. T., Newman, C. F., & Liese, B. S. (1993). Cognitive therapy for substance abuse: Theoretical rationale. *NIDA Research Monograph*, 137, 123-147.
- Shiffman, S., Shadel, W. G., Niaura, R., Khayrallah, M. A., Jorenby, D. E., Ryan, C. F., & Ferguson, C. L. (2003). Efficacy of acute administration of nicotine gum in relief of cue-provoked cigarette craving. *Psychopharmacology*, 166, 343-350.
- Walton-Moss, B., & McCaul, M. E. (2006). Factors associated with lifetime history of drug treatment among substance dependent women. *Addictive Behaviors*, 31, 246-253.
- Yoon, G., Kim, S. W., Thuras, P., Grant, J. E., & Westermeyer, J. (2006). Alcohol craving in outpatients with alcohol dependence: Rate and clinical correlates. *Journal of Studies on Alcohol*, 67, 770-777.