

رویدادهای تنش‌زای کودکان سن دبستان: یک بررسی کیفی

دکتر محمد نادی سخویدی^۱، دکتر ایوب مالک^۲، دکتر حیدرعلی عابدی^۳، دکتر فاطمه رنجبر^۴

Experience of Stressful Daily Life Events of School-age Children: A Qualitative Study

Mohammad Nadi Sakhvidi*, Ayub Malek ^a, Heidarali Abedi ^b, Fatemeh Ranjbar ^c

Abstract

Objectives: Understanding the nature and types of stressful events in life of school age children. **Method:** In this qualitative study, using an open interview, the description of stressful life events by 29 schoolchildren in Tabriz, Iran, were recorded and analyzed. **Results:** 223 stressful events derived from the interviews, were classified into 17 basic categories. In the end, four themes were assumed for these categories: 1- non-supplied demands, 2- loss, 3- threatening events, 4- stimulating events. **Conclusion:** The categorization derived from this study was similar to other categorizations. Due to their developmental stage and cognitive level, childhood stressful life events are different from adulthood stressful life events to some extent.

Key words: stressful events; qualitative assessment; childhood

[Received: 18 October 2009 ; Accepted: 20 February 2010]

چکیده

هدف: شناخت ماهیت و انواع رویدادهای تنش‌زای زندگی کودکان دبستانی. **روش:** در این پژوهش کیفی با استفاده از روش مصاحبه باز، روایت ۲۹ کودک دبستانی شهر تبریز از رویدادهای تنش‌زای زندگی خسته و بررسی شد. **یافته‌ها:** ۲۲۳ رویداد تنش‌زای برگرفته از مصاحبه‌ها در ۱۷ طبقه اصلی جای داده شد و درنهایت چهار موضوع کلی برای این طبقات در نظر گرفته شد: تأمین نیازها، از دست دادن‌ها، رویدادهای تهدید کننده و رویدادهای تحریک کننده عواطف. **نتیجه‌گیری:** طبقه‌بندی به دست آمده از این پژوهش با دیگر طبقه‌بندی‌ها مشابه بوده، رویدادهای تنش‌زای دوران کودکی به دلیل مرحله رشدی و سطح شناختی آنها تا حدودی با رویدادهای تنش‌زای دوران بزرگسالی متفاوت است.

کلیدواژه: رویدادهای تنش‌زای؛ بررسی کیفی؛ دوران کودکی

[دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۷/۲۶؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۸/۱۲/۱]

^۱ متخصص بیماری‌های اعصاب و روان، یزد، تفت، مرکز جامع روانپژوهی. دورنگار: ۰۳۵۲-۶۲۳۳۵۵۵ (نویسنده مسئول). E-mail: drnadi@yahoo.com. ^۲ فوق تحصیل روانپژوهی کودک و نوجوان، دانشیار بیمارستان رازی تبریز؛ ^۳ دکترای پرستاری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ ^۴ متخصص بیماری‌های اعصاب و روان، دانشیار بیمارستان رازی تبریز.

* Corresponding author: Psychiatrist, General Center for Psychiatry, Taft, Yazd, Iran, IR. Fax: +98352 6233555, E-mail: drnadi@yahoo.com;

^a Child and Adolescent Psychiatrist, Associate Prof. in Razi Hospital, Tabriz; ^b PhD. in Nursing, Associate Professor of Isfahan University of Medical Sciences; ^c Psychiatrist, Associate Professor of Razi Hospital, Tabriz .

مقدمه

کیفی و از دیدگاه خود کودک به بررسی تجارت تنفس زای دوران کودکی پردازد، یافت نشد.

روش

جامعه این پژوهش کیفی، کودکان سینه دبستان بودند. حجم نمونه از قبل تعیین نشد و تا زمان اشباع اطلاعات ادامه یافت. هدف از بررسی کیفی، درک پدیده مورد نظر است؛ بنابراین از نمونه گیری هدفمند^۱ استفاده می شود. در روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان مهم ترین نوع نمونه گیری غیر تصادفی، شرکت کنندگان بر اساس هدف مطالعه انتخاب می شوند (الالوی^۲ و ولر^۳، ۱۳۸۵). بر این اساس از میان داش آموزان دبستان های مختلف شهر تبریز، کودکانی که درباره پدیده موردنظر تجربه داشتند، مورد مصاحبه قرار گرفتند. در صورت کسب موافقت اولیه، یک رضایت نامه کتبی به واحدهای مورد پژوهش و خانواده کودکان داده می شد که حاوی اطلاعات کامل در مورد اهمیت و روش پژوهش، روش جمع آوری داده ها، شیوه گزارش پژوهش و حقوق شرکت کنندگان در پژوهش بود. پس از امضای این برگه، روند جمع آوری داده ها آغاز می شد: با استفاده از روش مصاحبه عمیق و باز از کودکان درخواست می شد موارد تنفس زای و ناراحت کننده ای را که برای آنها اتفاق افتاده است، به صورت داستان بیان کنند. این روش را روایت^۴ یا روش بیان داستان نامیده اند (همانجا). زمان هر مصاحبه با توجه به اطلاعات ارایه شده توسط شرکت کننده و همچنین با توجه به تمایل وی تعیین می شد. سعی می شد سوالات بدون جهت و از متن زندگی کودکان باشد. نکات کلیدی داستان مجدداً به صورت سوالات کاوشی مورد بررسی قرار می گرفت.

1- Sadock	2- Meyer
3- Pohl	4- Olmstead
5- Wynne-Edwards	6- Harkness
7- Menard	8- Schechter
9- Leserman	10- Li
11- Hu	12- Drossman
13- Cerel	14- Fristad
15- Verducci	16- Weller
17- Evans	18- English
19- Murray	20- Liang
21- Boyce	22- Miller
23- el-Masri	24- Allodi
25- Qouta	26- Martsolf
27- Rutter	28- Taylor
29- The Psychological Assessment of Childhood Experience	30- purposeful sampling
31- Holloway	32- Wheeler
33- narrative	

استرس (تنفس) به طور کلی به عنوان یک حالت یا موقعیت برهم زننده عملکرد بهنجار روان شناختی یا جسمانی تعریف می شود. در تعریف تنفس زابودن یک واقعه، معنی ذهنی آن رویداد تنفس زا برای فرد، بسیار مهم است (садوک^۱ و سادوک^۲، ۲۰۰۷). میر^۳ (۱۹۵۷) نشان داد وقایع آسیب زای زندگی، لزوماً فاجعه آمیز یا به طور خاص غیر معمول نیستند (به نقل از همانجا). یک واقعه برای یک فرد خاص، می توند بر اساس سن، جنسیت، شخصیت، خانواده، جامعه و فرهنگ تنفس زا باشد یا نباشد. در بررسی نقش استرس های تکرار شونده دوره کودکی و نوجوانی بر بروز اختلالات افسردگی و اضطراب، اهمیت تجارت اوایل زندگی در ایجاد آسیب روان شناختی در هر دو جنس مورد تأکید قرار گرفته است که این امر به تجربه اولیه و تفاوت های جنسیتی وابسته است (پل^۴، اولمستد^۵، وین-ادواردز^۶، هارکنس^۷ و منارد^۸، ۲۰۰۷). در بررسی های مختلف سوء استفاده جنسی، فقر، از دست دادن پدر و مادر، بیماری همشیرها، بیماری کودک، تجربیات جنگ^۹ و سوء رفتار در کودکی به عنوان وقایع تنفس زا در کودکان گزارش شده اند (شچتر^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۰؛ لزرمن^{۱۱}، لی^{۱۲}، هو^{۱۳} و دراسمن^{۱۴}، ۱۹۹۸؛ لزرمن، ۲۰۰۵؛ سرل^{۱۵}، فریستند^{۱۶}، وردوچی^{۱۷}، ولر^{۱۸} و ولر^{۱۹}؛ ایوانز^{۲۰} و انگلیش^{۲۱}، ۲۰۰۲؛ مورای^{۲۲}، ۱۹۹۹؛ لیانگ^{۲۳} و بویس^{۲۴}، ۱۹۹۳؛ میلر^{۲۵}، ۲۰۰۷؛ ال-مسری^{۲۶}، آلدی^{۲۷} و کوتا^{۲۸}، ۱۹۹۹؛ مارت سلف^{۲۹}، ۲۰۰۴). (۲۰۰۴).

راتر^{۳۰} و تیلور^{۳۱} (۲۰۰۲) در بررسی روان شناختی تجربیات کودکی^{۳۲} (PACE)، رویدادهای تنفس زای دوره کودکی را در پنج دسته کلی قرار داده اند: ۱- از دست دادن یکی از اشکال دلبستگی (مانند پدر و مادر یا یک دوست نزدیک)، ۲- از دست دادن یک فکر و ایده ارزشی (احساس حقارت یا نامیدی عمدی)، ۳- مخاطره جسمی (در معرض خطر جسمی بودن به علت تصادف و غیره)، ۴- آسیب به عنوان مشاهده کننده (شاهد وقایع تهدید کننده دیگران بودن) و ۵- برانگیختگی یا چالش روان شناختی (عهده دار شدن یک نقش جدید یا یک مسئولیت جدید).

هدف این پژوهش شناخت ماهیت و انواع رویدادهای تنفس زای زندگی کودکان دبستانی با استفاده از روش کیفی بود. تا آن جا که جست و جو به عمل آمد، پژوهشی که با روش

خانوادگی- اجتماعی) و ۳- ازدستدادن‌های عاطفی (خود شامل سه زیرگروه الف) جدایی، ب) فوت نزدیکان و ج) عوض کردن خانه و مدرسه) بود.

رویدادهای تهدیدکننده به ۱۰ زیرگروه اصلی تقسیم شد: حوادث طبیعی، مشاهده صحنه‌های جنگ در تلویزیون، زخمی شدن و مشاهده خون، دیدن دعواه اطرافیان، تنهاماندن در خانه، عوامل ترسناک، تنبیه توسط معلم، تنبیه و سرزنش توسط پدر و مادر، مشاجره با خواهر و برادر، استرس‌های درسی.

رویدادهای تحریک‌کننده عواطف، یعنی شاهد ناراحتی دیگران بودن، شامل دو زیرگروه الف) مشاهده رویداد ناگوار برای دیگران و ب) شنیدن یا خواندن رویداد ناگوار برای دیگران بود.

بحث

آسیب‌های^۲ تهدیدکننده کودکان (تر^۳، ۱۹۹۱)، مشکلات خانوادگی و مشکلات مدرسه (پایپی لارسکا^۴ و همکاران، ۱۹۸۷)، عوامل ترساننده و تهدیدکننده (کواس^۵، کاریک^۶، آلكون^۷، گلدستین^۸ و بویس، ۲۰۰۶)، مرگ پدر یا مادر (سرل و همکاران، ۲۰۰۶)، دیدن صحنه‌های آسیب‌زای تلویزیون مانند درگیری و کتک‌زدن (فریبام^۹، ۲۰۰۵؛ آته^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۵)، فقر و بیماری (ایوانز و انگلیش، ۲۰۰۲؛ هالپرن^{۱۱} و فیگویراس^{۱۲}، ۲۰۰۴)، زندگی در خانه‌های زیر استاندارد، سر و صدا، جدایی در اوایل کودکی، آشفتگی‌های خانوادگی و خشونت اجتماعی (ایوانز و انگلیش، ۲۰۰۲)، بیماری اعضای خانواده (مورای، ۱۹۹۹)، سرزنش، غفلت و سوءاستفاده (شر^{۱۳}، جرشونی^{۱۴}، پیترسون^{۱۵} و راسکین^{۱۶}، ۱۹۹۷)، از مواردی است که در بررسی حاضر نیز به دست آمده‌اند و از سوی کودکان به عنوان عامل تشنگی تجربه شده، بیان شده‌اند.

مصاحبه ضبط می‌شد و پس از بررسی یک مصاحبه و استخراج نکات آن، مصاحبه بعدی با کودک دیگر انجام می‌شد. این روند تا زمانی که اطلاعات ارایه‌شده تکراری شدند و دیگر داده جدیدی به دست نیامد (اشباع اطلاعات)، ادامه یافت. نمونه‌گیری از دانش آموزان مناطق مختلف شهر که از لحاظ اجتماعی- اقتصادی تفاوت‌هایی با هم داشتند و نیز از دانش آموزان دختر و پسر به طور مساوی انجام شد.

تحلیل داده‌ها به روش دیکلمان^۱ و همکاران (۱۹۸۹) (بنقل از هالووی، ۱۳۸۵) انجام گرفت. این روش هفت مرحله دارد: ۱- خواندن مصاحبه‌ها برای دریافت یک ایده کلی، ۲- نوشتن خلاصه‌های تفسیری و جستجو برای موضوعات بالقوه، ۳- تجزیه و تحلیل نوار پیاده‌شده به عنوان یک کار گروهی برای رسیدن به یک تفسیر تیمی، ۴- رجوع به متن یا شرکت کنندگان برای روشن نمودن موضوعات معین، ۵- مقایسه متون برای تعیین معانی رایج و اعمال مشترک، ۶- تعیین الگوهای مرتبط با موضوعات و ۷- سؤال از گروه مفسر و دیگر همکاران برای پیشنهادات در طرح نهایی. برای تأمین مقبولیت پژوهش، نتایج تحت بررسی چهار نفر از همکاران آشنا با موضوع و پژوهش کیفی قرار گرفت و مصاحبه‌ها با هدایت مشارکت کننده انجام شد.

یافته‌ها

در تجزیه و تحلیل مستمر و جداگانه هر یک از ۲۹ مصاحبه انجام گرفته، ۲۲۳ رویداد تنش زای استخراج شده از مصاحبه‌ها در ۱۷ طبقه اصلی قرار گرفتند. در نهایت چهار موضوع کلی برای این طبقات در نظر گرفته شد: ۱- تأمین نشدن نیازها، ۲- از دستدادن‌ها، ۳- رویدادهای تهدیدکننده و ۴- رویدادهای تحریک‌کننده عواطف. تأمین نشدن نیازها شامل سه زیرگروه ۱- تأمین نشدن نیازهای مادی یا فیزیکی، ۲- تأمین نشدن نیازهای روان‌شناختی و ۳- تأمین نشدن نیازهای عاطفی بود.

از دستدادن‌ها شامل سه زیرگروه ۱- از دستدادن‌های مادی یا فیزیکی، ۲- از دستدادن‌های روان‌شناختی (خود شامل چهار زیرگروه: الف) بی‌نظمی در محیط، ب) از دستدادن سلامت [بیمارشدن و بیماری اعضای خانواده]، ج) از دستدادن موقعیت یا امتیاز و احترام به نفس [ارتكاب رفتار سرزنش آمیز، مورد تمسخر قرار گرفتن، ناتوانی در گرفتن حق خود]، د) برچسب‌های جسمی- روانی و

- 1- Diekelman
- 3- Terr
- 5- Quas
- 7- Alkon
- 9- Pfefferbaum
- 11- Halpern
- 13- Sher
- 15- Peterson
- 2- traumas
- 4- Popielarska
- 6- Carrick
- 8- Goldstein
- 10- Otte
- 12- Figueiras
- 14- Gershuny
- 16- Raskin

است؛ طبقه اصلی از دست دادن های مادی ظاهرآ با توجه به سطح متفاوت رشدی، هم چنان در مقیاس های مربوط به بزرگسالان نیز وجود دارد. از دست دادن های روان شناختی که در بیماری های خود و افراد خانواده نمایان می شود، تقریباً به طور مشابه در مقیاس های مربوط به بزرگسالی نیز مطرح می شود. از دست دادن های عاطفی (شامل جدایی، فوت نزدیکان و نقل مکان) نیز تا حد زیادی هم چنان در مقیاس های مربوط به بزرگسالان وجود دارد (سرل و همکاران، ۲۰۰۶). موضوع رویدادهای تهدید کننده در مقیاس های مربوط به بزرگسالان دیده نمی شود. به نظر می رسد این تفاوت به طور اساسی به تفاوت های سنی بر می گردد (آنه و همکاران، ۲۰۰۵؛ فربام، ۲۰۰۵). موضوع رویدادهای تهدید کننده (شامل زیر گروه های تنبیه و سرزنش توسط پدر و مادر، تنبیه توسط معلم، استرس های درسی و مشاجره با خواهر و برادر) را شاید بتوان هر چند کمرنگ با برخی از استرس های دوران بزرگسالی متناظر کرد؛ برای مثال مسائل مربوط به استرس های درسی را شاید بتوان تا حدی با استرس های شغلی دوران بزرگسالی برابر دانست. موضوع رویدادهای تحریک کننده نیز از مواردی است که کمتر در مقیاس های مربوط به بزرگسالان به چشم می خورد، در صورتی که شاهد صحنه های رقت انگیز بودن و ناراحتی دیگران را دیدن یکی از موارد شایع تنفس زا در کودکان است.

همان طور که اشاره شد نبود پژوهش های مشابه که رویدادهای تنفس زای مربوط به کودکان را از دید خودشان و به روش کیفی موربد بررسی قرار دهن، از محدودیت های بررسی حاضر بود. یافته های این پژوهش می تواند شروعی برای پژوهش های بیشتر در این زمینه و از جمله تهیه مقیاس های درجه بندی شده رویدادهای تنفس زای دوران کودکی باشد.

سپاسگزاری

از همکاری تمامی پدرها و مادرها و کودکانی که در اجرای این پژوهش به ما کمک کردند، هم چنین کمک های آقای دکتر فرامرز غیاثی صمیمانه قدردانی می شود.
[بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایت مالی از پژوهش و تعارض منافع وجود نداشته است.]

همان طور که بیان شد در بررسی روان شناختی تجربیات کودکی (PACE)، رویدادهای تنفس زای کودکی در پنج موضوع کلی ۱- از دست دادن یکی از اشکال دلبرستگی، ۲- از دست دادن یک فکر و ایده ارزشی، ۳- مخاطره جسمی، ۴- آسیب به عنوان مشاهده کننده و ۵- برانگیختگی یا چالش روان شناختی طبقه بندی شدند (راتر و تیلور، ۲۰۰۲). در بررسی حاضر، رویدادهای آسیب زا در چهار طبقه کلی قرار گرفتند: ۱- تأمین نشدن نیازها، ۲- از دست دادن ها، ۳- رویدادهای تهدید کننده و ۴- رویدادهای تحریک کننده عواطف. در کل به نظر می رسد هر چند در ظاهر و بیشتر در موضوعات نهایی، تفاوت های نه چندان بارزی وجود دارد، ولی در اجزای قرار گرفته در این دو نوع طبقه بندی تشابه وجود دارد: موضوع از دست دادن در هر دو بررسی مشترک است. از دست دادن یک ایده ارزشی در طبقه بندی PACE معادل زیر گروه از دست دادن احترام به نفس در بررسی حاضر است. به نظر می رسد موضوع مخاطره جسمی در طبقه بندی PACE اجزائی از دو موضوع از دست دادن ها (طبقه اصلی از دست دادن های روان شناختی) و رویدادهای تهدید کننده را در بر می گیرد. اجزای موضوع چهارم از طبقه بندی آسیب به عنوان مشاهده کننده، را نیز می توان در دو موضوع رویدادهای تهدید کننده و رویدادهای تحریک کننده عواطف از بررسی حاضر جست وجو کرد.

هنگام مقایسه رویدادهای تنفس زا برای کودکان و رویدادهای تنفس زا برای بزرگسالان تفاوت های بارزی به چشم می خورد؛ در مقایسه یافته های سه مقیاس مربوط به رویدادهای تنفس زای بزرگسالان، یعنی مقیاس هولمز^۱ و راهه^۲ (هولمز و راهه، ۱۹۶۷)، مقیاس پیکل^۳ (پیکل، پروساف^۴ و يولنهاث^۵، ۱۹۷۱) و مقیاس رتبه بندی رویدادهای تنفس زای زندگی در جمعیت عمومی تبریز (مالک،داداشزاده، پورافکاری و صفائیان، ۱۳۸۷) با یافته های پژوهش حاضر، می توان به این موارد اشاره کرد: موضوع تأمین نشدن نیازها در هر دو گروه مشابه است. طبقه اصلی تأمین نشدن نیازهای روان شناختی از موضوعاتی است که در مقیاس های مربوط به بزرگسالان کمتر به چشم می خورد. طبقه اصلی تأمین نشدن نیازهای عاطفی، با در نظر گرفتن سطح رشدی و سنی، تا حدی هم چنان در مقیاس های مربوط به بزرگسالان دیده می شود؛ نیازهایی که تأمین نشدن آنها در تنفس زا بودن مواردی چون جدایی از همسر و اختلافات زناشویی بازتاب می یابد. در مورد موضوع از دست دادن ها، شباهت ها بیشتر از تفاوت ها

منابع

- Otte, C., Neylan, T. C., Pole, N., Metzler, T., Best, S., Henn-Haase, C., Yehuda, R., & Marmar, C. R. (2005). Association between childhood trauma and catecholamine response to psychological stress in police academy recruits. *Biological Psychiatry*, 57, 27-32.
- Paykel, E. S., Prusoff, B. A., & Uhlenhuth, E. H. (1971). Scaling of life events. *Archives of General Psychiatry*, 25, 340-347.
- Pfefferbaum, B. J. (2005). Aspect of exposure in childhood trauma: The stressor criterion. *Journal of Trauma & Dissociation: The Official Journal of the International Society for the Study of Dissociation (ISSD)*, 6, 17-26.
- Pohl, J., Olmstead, M. C., Wynne-Edwards, K. E., Harkness, K., & Menard, J. L. (2007). Repeated exposure to stress across the childhood-adolescent period alters rats' anxiety- and depression-like behaviors in adulthood: The importance of stressor type and gender. *Behavioral Neuroscience*, 121, 462-474.
- Popielarska, A., Komender, J., Golczyk-Wojnar, A., Tomaszewicz-Libudzic, C., Popielarska, M., & Fabisiak, A. (1987). Mental disorders in children with epilepsy. *Neurologia i neurochirurgia Polska*, 21, 319-323.
- Quas, J. A., Carrick, N., Alkon, A., Goldstein, L., & Boyce, W. T. (2006). Children's memory for a mild stressor: The role of sympathetic activation and parasympathetic withdrawal. *Developmental Psychobiology*, 48, 686-702.
- Rutter, M., & Taylor, E. (2002). *Child & adolescent psychiatry*. Blackwell Publishing: Oxford.
- Sadock, B.J., & Sadock, V.A. (2007). *Synopsis of psychiatry*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Schechter, D. S., Marshall, R., Salmon, E., Goetz, D., Davies, S., & Liebowitz, M. R. (2000). Ataque de nervios and history of childhood trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 13, 529-534.
- Sher, K. J., Gershuny, B.S., Peterson, L., & Raskin, G. (1997). The role of childhood stressors in the intergenerational transmission of alcohol use disorder. *Journal of Studies on Alcohol*, 58, 414-427.
- Terr, L. C. (1991). Childhood traumas: An outline and overview. *The American Journal of Psychiatry*, 148, 10-20.
- مالک، ایوب؛ داداش زاده، حسین؛ پورافکاری، نصرت‌ا...؛ صفائیان، عبدالرسول (۱۳۸۷). رتبه‌بندهای رویدادهای تنش‌زای زندگی در جمعیت عمومی تبریز. *مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز*، سال سی ام، شماره ۴، ۷۳-۸۰.
- هالووی، ایمی؛ ویلر، استفانی (۱۳۸۵). *روش‌های تحقیق کیفی در پرستاری*. ترجمه حیدرعلی عابدی، مریم روانی‌پور، منصوره کریم‌الهی و حجت‌الله یوسفی. تهران: انتشارات بشری.
- Cerel, J., Fristad, M. A., Verducci, J., Weller, R. A., & Weller, E. B. (2006). Childhood bereavement: Psychopathology in the 2 years post-parental death. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 45, 681-90.
- Evans, G. W., & English, K. (2002). The environment of poverty: Multiple stressor exposure, psycho-physiological stress, and socio-emotional adjustment. *Child development*, 73, 1238-1248.
- Halpern, R., & Figueiras, A. C. (2004). Environmental influences on child mental health. *Journal de Pediatric*, 80, 104-110.
- Holmes, T. H., & Rahe, R.H. (1967). The social readjustment rating scale. *Journal of Psychosomatic Research*, 11, 213-218.
- Leserman, J. (2005). Sexual abuse history: Prevalence, health effects, mediators, and psychological treatment. *Psychosomatic Medicine*, 67, 906-915.
- Leserman, J., Li, Z., Hu, Y. J., & Drossman, D. A. (1998). How multiple types of stressors impact on health? *Psychosomatic Medicine*, 60, 175-181.
- Liang, S. W., & Boyce, W. T. (1993). The psychobiology of childhood stress. *Current Opinion in Pediatrics*, 5, 545-551.
- Martolf, D. S. (2004). Childhood maltreatment and mental and physical health in Haitian adults. *Journal of Nursing Scholarship*, 36, 293-299.
- Miller, T., el-Masri, M., Allodi, F., & Qouta, S. (1999). Emotional and behavioral problems and trauma exposure of school-age Palestinian children in Gaza: some preliminary findings. *Medicine, Conflict, and Survival*, 15, 368-378.
- Murray, J.S. (1999). Siblings of children with cancer: A review of the literature. *Journal of Pediatric Oncology Nursing: Official Journal of the Association of Pediatric Oncology Nurses*, 16, 25-34.