

## بررسی نقش تکنونیک در شکل‌گیری و تحول مخروط افکنه‌ها

( مطالعه‌ی موردی: مخروط افکنه‌های دامنه تاقدیس قلاجه )

دکتر مهران مقصودی (استادیار دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران، نویسنده مسؤل)

Maghsoudi@ut.ac.ir

سجاد باقری (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران)

مسعود مینائی (دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS&RS) - دانشگاه تهران)

Minaij.Gis@gmail.com

### چکیده

تاقدیس قلاجه در جنوب استان کرمانشاه با روند شمال غربی - جنوب شرقی کشیده شده است. با توجه به استمرار فعالیت‌های تکنونیک در دوران کواترنر و عصر حاضر در منطقه‌ی مورد مطالعه، مخروط افکنه‌های منطقه شواهد خوبی برای بررسی این گونه حرکات اند. با توجه به این که ویژگی‌های مورفولوژی مخروط افکنه‌ها در کنار سایر عوامل تأثیرگذار بر آنها، به شدت تحت تأثیر فعالیت‌های تکنونیک قرار دارند، هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تکنونیک در شکل‌گیری و تحول مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه است. در این پژوهش نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، عکس‌های هوایی و تصاویر سنجنده IRS منطقه، به عنوان داده‌های اصلی تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه از نزدیک و به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک ( $Lat^4$ ,  $Smf^3$ ,  $Vf^2$ ,  $Sl^1$ ) میزان فعالیت‌های تکنونیک در منطقه بررسی شد و سپس فرمول  $\beta$  و  $Af^8$  مخروط افکنه‌های منطقه محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تکنونیک منطقه (گسل‌ها) نقش اصلی را در شکل‌گیری و تحول مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه دارند. به گونه‌ای که با حذف سازند آسماری و رخنمون شدن سازندهای سست گورپی - پابده، توسط راندگی گیلان غرب، بیشتر مخروط افکنه‌های منطقه در امتداد این گسل شکل گرفته اند. نحوه‌ی قرار گرفتن مخروط افکنه‌ها با فعالیت‌های تکنونیک دوران پلیو - کواترنر منطقه هم‌خوانی کامل دارد. در سطح مخروط افکنه‌های منطقه سه فاز نهشته گذاری قابل

تشخیص است که نشان دهنده‌ی سه فاز بالا آمدگی در دوران کوتاه‌تر در منطقه می باشد. ویژگی‌های مورفومتری و مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه توسط تکنیک کنترل می شود.

**کلید واژه‌ها:** تکنیک، مخروط افکنه، تاق‌دیس قلاجه، مورفوتکنیک

## درآمد:

از لندفرم‌های معمول در جبهه‌ی کوهستان‌ها، مخروطه افکنه‌ها هستند که در اثر کاهش ناگهانی قدرت رودخانه در نتیجه تغییر شیب توپوگرافیک به وجود می آیند (بول<sup>۱</sup>؛ ۱۹۷۹) به نقل از (ویلاز<sup>۲</sup> و رویز<sup>۳</sup>: ۲۰۰۰: ۱۲۷). رودخانه‌ها هنگام عبور از دره‌های پرشیب و باریک و ورود به دره‌های بزرگتر و بازتر و یا ورود به دشت، مقداری از بار رسوبی خود را به صورت عارضه‌ی مخروطی شکل به جا می نهند که راس آن به سمت بالادست رودخانه بوده و مخروط افکنه نامیده می شود (اسمال<sup>۴</sup> و ویتریک<sup>۵</sup>، ۱۹۹۱) به نقل از (عباس نژاد: ۱۳۷۵: ۱۴۹). پژوهشگران زیادی در جهان و ایران نقش تکنیک در شکل گیری و تحول مورفولوژی مخروطه افکنه‌ها را مورد توجه قرار داده اند که از جمله‌ی آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: بول و هاروی<sup>۶</sup> ۱۹۸۹؛ فراسر و دکلسی<sup>۷</sup> ۱۹۹۲؛ سیلو<sup>۸</sup> ۱۹۹۲؛ کالواچ و همکاران<sup>۹</sup> ۱۹۹۷؛ ابراهام<sup>۱۰</sup> ۲۰۰۰؛ هاروی<sup>۱۱</sup> ۲۰۰۱؛ ویسرس و همکاران<sup>۱۲</sup> ۲۰۰۲؛ نوآ<sup>۱۳</sup> ۲۰۰۳؛ عباس نژاد<sup>۱۴</sup> ۱۳۷۵؛ پمانی و مقصودی ۱۳۸۲؛ مخماری ۱۳۸۲؛ کی نژاد ۱۳۸۲؛ کرمی و رجایی ۱۳۸۳؛ رضایی مقدم و همکاران ۱۳۸۴؛ عابدینی و رجایی ۱۳۸۵.

- 1- Bull
- 2- Villar
- 3 - Ruiz
- 4- Small
- 5 -Witherick
- 6 - Bull and Harvey
- 7 - Fraser and Decelles
- 8 - Silva
- 9 - Calvache
- 10 - Abraham
- 11 - Harvey
- 12 - Viseras
- 13 - Nah


سطوح آبرفتی می‌توانند به عنوان خطوط زمانی، هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرند تا زمان حرکت گسل‌ها و رخداد زلزله‌های قدیمی را مشخص کنند (بول<sup>۱</sup>: ۱۹۹۶) به نقل از (لی و همکاران<sup>۲</sup>: ۱۹۹۸: ۲۹۹). مخروط افکنه‌ها به عنوان یکی از بارزترین اشکال آبرفتی، مورفولوژی و تحویل آنها به شدت تحت تأثیر حرکات تکتونیک قرار می‌گیرند. حرکات تکتونیک سطح اساس فرسایش را تغییر داده و فرایندهای فعال در سطح مخروط افکنه‌ها و تکامل آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند (یانگ<sup>۳</sup>: ۱۹۸۵: ۱۰). با توجه به وجود حرکات تکتونیک فعال در دوران پلیو - کواترنر و ادامه‌ی این حرکات در عهد حاضر (هولوسن)، در زاگرس و منطقه‌ی مورد مطالعه، مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه می‌تواند راهنمای خوبی برای شناسایی این حرکات باشند. هدف از این پژوهش بررسی نقش تکتونیک در شکل‌گیری و تحویل مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه و اثبات وجود حرکات تکتونیک در دوران کواترنر و ادامه‌ی آنها در زمان حاضر در منطقه‌ی مورد مطالعه می‌باشد.

منطقه‌ی مورد مطالعه، در زاگرس شمال غربی و از لحاظ زمین‌شناسی در زون چین‌های برگشته (شدیدا چین خورده) واقع شده است. با توجه به شواهد مورفوتکتونیک و تئوتکتونیک وجود و تداوم فعالیت‌هایی تکتونیک در منطقه در محدوده‌ی زمانی کواترنر آشکار بوده و حداقل سه فاز بالا آمدگی در منطقه قابل تشخیص است (میرشکرائی<sup>۳</sup>: ۱۳۷۶: ۹۳). دگرریختی حاصل از هم‌گرایی صفحه عربی - اوراسیا در زاگرس شمال غربی به وسیله‌ی ترکیبی از کوتاه شدگی شمال شرق - جنوب غرب و حرکات امتداد لغز راست بر گسل‌های معکوس (راندگی‌ها) نمود دارد (بالاکک<sup>۴</sup>: ۲۰۰۳: ۴۰۱). میزان کوتاه شدگی در زاگرس شمال غربی ۳ تا ۵ میلی‌متر در سال است (ورنر<sup>۵</sup>: ۲۰۰۴) به نقل از (حسامی و همکاران<sup>۶</sup>: ۲۰۰۶: ۱۴۳).

منطقه‌ی مورد مطالعه در غرب کشور در جنوب استان کرمانشاه و شمال استان ایلام واقع شده است و منطبق بر محدوده‌های سیاسی شهرستان گیلان غرب و شهرستان شیروان چرداول است. منطقه‌ی مورد مطالعه بین عرض‌های جغرافیایی ۵۲° ۳۳' تا ۱۳° ۳۴' شمالی و طول‌های جغرافیایی ۴۶° ۳۰' تا ۴۶° شرقی واقع شده است (شکل ۱). مهم‌ترین شهرهای نزدیک به منطقه‌ی مورد مطالعه عبارت‌اند از:

- 1 - Bull
- 2 - Li
- 3 - Yang

گیلان غرب در غرب منطقه، اسلام آباد در ۲۵ کیلومتری شمال منطقه و شهر سرابله در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی. همچنین راه ارتباطی گیلان غرب و ایلام به اسلام آباد از منطقه‌ی مورد مطالعه عبور می‌کند.



شکل ۱: نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه

### مواد و روش‌ها:


به منظور مطالعه و بررسی نقش تکتونیک در شکل‌گیری و تحول مورفولوژی مخروط افکنه‌های دامنه‌های طاق‌دیس قلاجه، با توجه به اهداف تحقیق شازده مخروط افکنه شاخص منطقه‌ی انتخاب شد، سپس با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، موقعیت مخروط افکنه‌ها و حوضه‌ی آبریز آنها مشخص گردید. نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، عکس‌های هوایی ۱:۵۵۰۰۰ سال ۱۳۳۵، نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ و تصاویر سنجنده IRS منطقه، به عنوان ابزار اصلی تحقیق در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به پیچیدگی نقش تکتونیک در شکل‌گیری و تحول نقش مخروط افکنه‌ها، بازدیدهای میدانی مکرر به منظور بررسی ویژگی تک تک مخروط افکنه‌های منطقه انجام گرفت و از ویژگی‌های مورفولوژی و سطوح انباشتی - کاوشی مخروط افکنه‌های منطقه عکس برداری به عمل آمد.


جهت برآورد میزان فعالیت‌های تکتونیک منطبقه از شاخص‌های ژئومورفولوژیکی Lat.Smf، Vf، Sl استفاده شد. شاخص  $\beta$  به منظور محاسبه‌ی خمیدگی مخروط افکنه‌های منطقه تحت تأثیر تکتونیک محاسبه گردید. با استفاده از نرم افزارهای SPSS، ArcGIS 9.3 و ENVI 4.3 روابط آماری مورد نظر تعیین و نقشه‌ها و نیمرخ‌های لازم ترسیم گردید.

### یافته‌های تحقیق

#### ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌ها در هر منطقه متأثر از ویژگی‌های حوضه‌های تغذیه کننده خود هستند. نتایج تحلیل‌های تفکیک کننده بر اساس متغیرهای مخروط افکنه‌ها و حوضه‌ی آبریز آنها نسبت به بررسی‌هایی که تنها بر اساس تحلیل متغیرهای مخروط افکنه‌ها صورت گرفته اند، پراهمیت‌اند. این بدان معنی است که تعیین اختلافات مابین ویژگی مخروط افکنه‌ها و حوضه‌ی آبریز بسیار بهتر از تفاوت‌های بین ویژگی‌های خود مخروط افکنه‌ها است. (والو و همکاران؛ ۱۹۹۷: ۱۶۹). ویژگی مورفومتری مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه و حوضه‌های آبریز آنها در جدول (۱) آمده است. رسوبات مخروط افکنه‌های منطقه به صورت ترکیبی از قطعه سنگ، قلوه سنگ، شن، ماسه، رسوبات ریز دانه، رس و سلیت می باشد. شکل شماره ۲ نقشه‌ی پراکندگی مخروط افکنه‌ها را در منطقه‌ی مورد مطالعه نشان می‌دهد و شکل شماره ۳ نقشه‌ی ژئومورفولوژی منطقه‌ی مورد مطالعه را ارائه نموده است.





شکل ۲: نقشه موقعیت مخروط افکنه‌ها در منطقه‌ی مورد مطالعه و موقعیت مخروط افکنه‌ها نسبت به گسل‌های منطقه



شکل ۳: نقشه ژئومورفولوژی منطقه‌ی مورد مطالعه و موقعیت پدیده‌های مختلف موجود در منطقه

جدول ۱. ویژگی‌های مورفومتریک و مورفولوژیک مخروط افکنه‌ها و حوضه‌ی تغذیه‌کننده‌ی آنها در منطقه‌ی مورد مطالعه

شماره مخروط افکنه	موقعیت مخروط افکنه	موقعیت زلزلی مخروط افکنه	مساحت مخروط افکنه (km <sup>2</sup> )	شیب مخروط افکنه (درج)	نسبت طول به عرض مخروط افکنه	شیب مخروط افکنه (درج)	شیب حوضه‌ی آبریز (درج)	مساحت حوضه‌ی آبریز (km <sup>2</sup> )	شیب حوضه‌ی آبریز (درج)	رسم‌نگار حوضه‌ی آبریز	نوع گدازه
۱	شمال غرب دشت چله	۱۱۲۰-۱۱۶۰	۱۳۶	۸۱	۰.۴۵	۷۰.۱	۳۶۹	۱۹	سازند گوری- پلده	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۲	شمال غرب دشت چله	۱۱۳۰-۱۱۵۰	۰.۶۸	۶۳	۰.۱۵	۴۱۱	۲۱۵۷	۲۱	سازند گوری- پلده	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۳	شمال غرب دشت چله	۱۱۴۰-۱۱۷۰	۰.۷۴	۷۲	۰.۶۳	۴۸۹	۲۱۲۷	۲۱۶	سازند گوری- پلده	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۴	شمال غرب دشت چله	۱۱۴۰-۱۱۸۰	۱.۶۸	۶۳	۰.۶۰	۹۳۰	۴۱۱	۲۲	سازند گوری- پلده	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۵	شمال غرب دشت چله	۱۱۸۰-۱۲۱۰	۱.۲۸	۵۴	۰.۶۰	۷۵۳	۲۱۲۶	۲۷	سازند گوری- پلده	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۶	شمال غرب دشت چله	۱۲۱۰-۱۲۶۰	۱.۶۰	۹	۰.۴۹	۸۳۲	۳۱۰۵	۲۱۶	سازند گوری- پلده	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۷	شمال غرب دشت چله	۱۲۳۰-۱۲۷۰	۰.۲۳	۱۲۵	۰.۳۶	۳۹۱	۱۱۱۴	۳۱	سازند گوری- پلده	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۸	شمال دشت چله	۱۲۵۰-۱۲۸۰	۰.۸۲	۵۴	۰.۴۷	۵۹۳	۷۴۲	۱۹	سازند آسماری	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۹	شمال دشت چله	۱۲۹۰-۱۳۲۰	۰.۹۳	۵۴	۰.۴۳	۶۱۳	۷۱۴	۳۳۴	سازند آسماری	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۱۰	شمال دشت چله	۱۳۳۰-۱۳۸۰	۰.۴۵	۵۴	۰.۳۰	۴۷۴	۵۲۶	۲۰	سازند آسماری	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۱۱	شمال دشت چله	۱۳۶۰-۱۳۹۰	۰.۹۰	۳۶	۰.۶۶	۵۲۵	۴۱۷	۱۹	سازند آسماری	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۱۲	شمال دشت چله	۱۳۸۰-۱۴۰۰	۰.۶۰	۷۲	۰.۸۲	۵۱۰	۴۹۱	۲۰	سازند آسماری	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در غرب مخروط افکنه
۱۳	شمال آسمان آید	۱۲۹۰-۱۳۳۰	۰.۲۲	۵۴	۱.۰۲	۲۵۲	۱۷۵	۳۹	سازند آسماری	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در وسط مخروط افکنه
۱۴	جنوب گاور	۱۴۸۰-۱۵۲۰	۰.۲۱	۹	۰.۹۲	۲۱۴	۰.۶۴	۳۱۵	سازند آسماری	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در وسط مخروط افکنه
۱۵	جنوب گاور	۱۵۵۰-۱۶۰۰	۰.۱۳	۳۶	۰.۹۳	۱۸۵	۲۶۷	۲۵۲	سازند آسماری	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در وسط مخروط افکنه
۱۶	جنوب گاور	۱۰۸۰-۱۲۰۰	۱.۸۸	۵۴	۱.۱۶	۷۱۶	۱۷۸	۲۹۷	سازند آسماری	کواترن	تندرتو، قسمت قفل در وسط مخروط افکنه

### نقش تکتونیک در شکل گیری و توسعه‌ی مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه:

پژوهشگران زیادی با دیدگاه‌های متفاوت عوامل مؤثر در شکل گیری مخروط افکنه‌ها را بررسی نموده‌اند. چینه‌شناسی، رسوب‌شناسی و ژئومورفولوژی مخروط افکنه‌ها به وسیله‌ی سلسله‌ای از عوامل محیطی شامل رژیم آب و هوایی و نوسان آنها، میزان و نوع فعالیت‌های تکتونیکی، سنگ‌شناسی و

ژئومورفولوژی حوضه‌های بالادست آنها و طبیعت محیط‌های پیوسته کنترل می‌شود (ریتر و همکاران، ۲۰۰۱: ۶۴). تکنونیک مسؤول اصلی ایجاد ناهمواری‌های تأثیر گذار در تشکیل مخروط افکنه‌هاست و بالا آمدگی مداوم منطقه موجب فراهم آوری رسوب زیاد و مداوم خواهد بود. (هاروی و همکاران؛ ۱۹۹۹). عوامل تکنونیک، بافت، زمینه و جایگاه مخروط افکنه‌ها را متأثر می‌سازند (سیلو ۲: ۱۹۹۲) همچنین به طریقی بالا آمدگی، شیب و ویژگی‌های سطح اساس را متأثر می‌سازند (کالواج ۳ و همکاران: ۱۹۹۷) به نقل از (هاروی: ۲۰۰۰: ۶۸). بالا آمدگی کوهستان در مناطقی که جبهه‌ی کوهستان گسلی می‌باشد، باعث تغییر شیب مخروط افکنه‌ها و تغییر مکان رسوب گذاری و تغییر مساحت مخروط افکنه می‌شود. در نواحی تکنونیک فعال، تکنونیک تشکیل ناهمواری‌ها و در نتیجه موقعیت و تا اندازه ای تمام شکل مخروط افکنه را کنترل می‌کند (هاروی ۴؛ ۲۰۰۱: ۶۸). تکنونیک عامل اصلی در شکل گیری و تکامل مخروط افکنه‌های منطقه مورد مطالعه است. نقش تکنونیک در شکل گیری مخروط افکنه‌های مورد مطالعه را به طور کلی می‌توان به صورت زیر دسته بندی نمود: ۱. نقش گسل‌ها و درزه‌ها ۲. نقش بالا آمدگی

### ۱. گسل‌ها و درزه‌ها

سازند آسماری به عنوان سازند اصلی منطقه به دلیل سخت و شکننده بودن آن، در اثر فشار نیروهای تکنونیک به هنگام چین خوردگی و ادامه‌ی حرکات زمین ساختی گسل خورده و با تراکم گسلی ۰/۶۸ کیلومتر در کیلومتر مربع به صورت زون تکنونیک خرد شده ای در آمده است. راندگی گیلان غرب به دو صورت در شکل گیری مخروط افکنه‌های شماره ۱ الی ۷ که وسیع ترین مخروط افکنه‌های منطقه‌اند، تأثیر گذار بوده است:

۱. حذف سازند آسماری و رخنمون ساختن سازندهای سست گورپی و پابده؛

- 1 - Ritter et al., 2000.
- 2 - Silva et al., 1992.
- 3 - Calvache et al., 1997.
- 4 - Harvey. 2001.




۲. بالا آمدگی کوهستان در محل راندگی و افزایش شیب توپوگرافی منطقه و در نتیجه فرسایش بیشتر سازندهای سست منطقه.

بیشتر مخروط افکنه‌های شاخص منطقه در خروجی دره‌های گسلی منطقه شکل گرفته‌اند. شکل (۲) موقعیت مخروط افکنه‌های شاخص و گسل‌های منطقه را نشان می‌دهد. جدول (۲) تعداد و رتبه‌ی آبراهه‌های تغذیه کننده‌ی مخروط افکنه‌های منطقه که از مسیر گسل‌ها پیروی می‌کند را نشان می‌دهد و وضعیت شبکه‌ی هیدروگرافی در شکل شماره ۴ نشان داده شده است. عبور آبراهه‌های اصلی دره‌ها در امتداد بخش دپرسیون خطوط گسل‌ها و از مناطق خرد شده تکتونیک حاصل از فعالیت گسل‌ها زمینه‌ی تدارک مقادیر زیاد رسوب را برای مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه فراهم نموده، به گونه‌ای که رسوبات خرد شده آهکی زاویه دار را می‌توان در سطح مخروط افکنه‌ها به فراوانی مشاهده نمود و این موضوع نقش زیادی در تشکیل و توسعه‌ی این مخروط افکنه‌ها داشته است.

جدول ۲: تعداد و رتبه‌ی آبراهه‌های تغذیه کننده‌ی مخروط افکنه‌ها که از مسیر گسل‌ها پیروی می‌کنند

شماره مخروط افکنه	آبراهه رتبه ۱	رتبه ۲	رتبه ۳
۸	۱	۱	۱
۱۰	۱	-	-
۱۱	-	۲	۱
۱۳	۲	-	-
۱۴	۱	-	-
۱۵	۲	۲	-
۱۶	۲	۱	-



شکل ۴: شبکه هیدروگرافی در منطقه مورد مطالعه و رتبه بندی آن

در تاقدیس فلاجیه خطواره‌ها با جهت  $30^{\circ}N-40^{\circ}E$  بر محور تاقدیس عمود و از نوع درزه‌های کششی و پرمانداند. جهت جغرافیایی این درزه‌ها با امتداد دره‌های گسلی منطقه هم‌خوانی داشته و در نتیجه بر اثر فرایند کریوکلستی درزه‌ها، نقش قابل ملاحظه‌ای در فراهم‌آوری رسوب در منطقه دارند.

## ۲. نقش بالا آمدگی

در مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه، سه فاز بالا آمدگی مربوط به دوران پلیو-کواترنریه صورت سه سطح نهشته گذاری قابل تشخیص‌اند (شکل ۳)

سطح شماره سه به عنوان جدیدترین مرحله‌ی رسوب گذاری با وسعت کم و رسوبات درشت دانه و زاویه‌دار با مساحتی بین ۱۰ تا ۳۰ متر مربع در قسمت رأس مخروط افکنه‌ها با ضخامت یک متر قابل تشخیص است. سطح شماره ۲ با رسوبات درشت دانه با گردشگی متوسط و لایه‌های سیمانی کم با وسعت ۳۰ تا ۷۰ متر مربع و ضخامت ۱٫۵ در قسمت‌های رأس و به طور واضح تر در بخش میانی مخروط قابل تشخیص هستند. سطح ۳ به عنوان قدیمی‌ترین سطح، با رسوبات متوسط تا درشت دانه با گردشگی زیاد با وسعت ۸۰ تا ۱۴۰ متر مربع و ضخامت ۲ متر در امتداد آبراهه اصلی که مخروط افکنه‌ها را بریده‌اند، قابل

شناسایی می‌باشند (شکل ۵). مخروط افکنه‌های منطقه در زمان حاضر در فاز فرسایشی قرار دارند و رسوب‌گذاری در سطح آنها صورت نمی‌گیرد. محاسبه‌ی شاخص  $SI$  رودخانه‌های چله: ۲۳۴، رودخانه‌ی کفرآور: ۱۴۱، گوآور: ۷۴ و آسمان‌آباد: ۷۰ حاکی از ادامه‌ی بالآآمدگی منطقه در زمان حاضر است که نشان‌دهنده‌ی تأثیر این عامل در تحول مخروط افکنه در زمان حاضر است.



شکل ۵. سطوح انباشتگی تشخیص داده شده در سطح مخروط افکنه‌ی شماره ۹، شمال دشت چله (دید روبه شمال).

### تأثیر تکتونیک بر مورفولوژی و ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌های مورد مطالعه:

مورفولوژی مخروط افکنه‌ها، به ویژه شیب آنها، رژیم فرایندهای مسطح را نشان می‌دهد (هاروی و همکاران؛ ۱۹۹۹). تکتونیک در دو حالت بر مخروط افکنه‌ها تأثیر گذار است:

۱. تکتونیک با تأثیر گذاری بر ویژگی‌های مورفومتری حوضه‌های آبریز تغذیه کننده مخروط افکنه‌ها، ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌ها را متأثر می‌سازد. در منطقه‌ی مورد مطالعه تکتونیک با رخنمون کردن سازندهای سست (پابده و گورپی) و خرد کردن سازندهای سخت (آسماری) و همچنین فعالیت‌های نوتکتونیک بر ویژگی‌های مورفومتری مورفولوژی مخروط افکنه‌ها تأثیر گذار بوده است.
۲. تکتونیک می‌تواند به طور مستقیم بر ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه‌ها تأثیر بگذارد. جابه‌جایی و حرکت گسل‌ها باعث انحراف آبراهه‌های تغذیه کننده و در نتیجه متروک شدن قسمت یا کل

مخروط افکنه‌ها می‌شود. تکنونیک با چین دادن مخروط افکنه‌ها و یژگی‌های مورفومتری و مورفولوژی مخروط افکنه‌ها را به شدت تغییر می‌دهد. در زیر به بررسی ویژگی‌های مورفومتری و مورفولوژیکی مخروط افکنه‌های منطقه، که متأثر از فعالیت تکنونیک منطقه است، می‌پردازیم.

### تأثیر تکنونیک بر تغییرات عمودی اندازه رسوبات مخروط افکنه‌ها:

در مخروط افکنه‌ها با توجه به شرایط آب و هوایی، وجود فعالیت‌های تکنونیک و میزان فعالیت‌های تکنونیک اندازه رسوبات در یک مقطع عمودی از پایین به بالا متغیر است. در شرایط تکنونیک فعال اندازه‌ی رسوبات به سمت بالا افزایش می‌یابد (هاوارد؛ ۱۹۸۷) به نقل از (عباس نژاد؛ ۱۳۷۵: ۱۶۷). در منطقه مورد مطالعه در تمامی مقاطع ایجاد شده در مخروط افکنه‌ها به منظور ایجاد کانال و سیل بند اندازه رسوبات در مقطع عمودی به سمت بالا افزایش می‌یابد. همان‌گونه که در شکل ۶ مشاهده می‌شود، رسوبات نزدیک به سطح مخروط افکنه‌ها در حد قلوه و قطعه سنگ‌اند ولی به طرف عمق از اندازه‌های آنها کاسته می‌شود که نشان دهنده وجود حرکات تکنونیک در زمان شکل‌گیری مخروط افکنه‌های منطقه است. به عبارت دیگر وجود فازهای بالا آمدگی ناشی از حرکات تکنونیک منجر به چنین وضعیتی می‌شود. شایان ذکر است که عدد ۱/۵ ارائه شده در شکل ۶ تنها مربوط به یک فاز است که در اواخر آن شدیدتر بوده و توانسته است رسوبات دانه درشت‌تر را به سطح بیاورد.




شکل ۶: نمایی از ترانشه ایجاد شده در مخروط افکنه‌ی شماره ۷ که در آن قرارگیری رسوبات درشت دانه در قسمت بالا قابل مشاهده است

### تأثیر تکتونیک بر تعداد آبراهه‌های تغذیه‌کننده مخروط افکنه‌ها:


برخی از مخروط افکنه‌ها، به ویژه آنها که در امتداد گسل‌های فعال تشکیل می‌شوند، اغلب تنها دارای یک آبراهه‌ی اصلی تغذیه‌کننده‌اند (هاروی؛ ۱۹۸۷) به نقل از (عباس نژاد؛ ۱۳۷۵: ۱۷۹) در نواحی دارای حرکات تکتونیک فعال نهشته‌گذاری در رأس مخروط افکنه‌ها صورت می‌گیرد. که باعث پر شدن جبهه کوهستان (رأس مخروط افکنه) توسط رسوب می‌شود. پر شدن جبهه‌ی کوهستان باعث کاهش رده شاخه‌های کانال‌های تغذیه‌کننده مخروط افکنه می‌شود و علت آن هم پر شدن کانال‌های تغذیه‌کننده قدیمی با رده‌های بالا، به وسیله‌ی رسوب‌گذاری مخروط افکنه‌ها که در نتیجه مخروط افکنه مستقیم‌آبا رده‌های جدید تر برخورد می‌کند (والو و همکاران ۱: ۱۹۹۸: ۱۶۹). تعیین تعداد آبراهه‌های تغذیه‌کننده مخروط افکنه‌ها و رده آنها نشان دهنده تأثیر تکتونیک بر مخروط افکنه‌های منطقه است جدول شماره ۳، تمامی مخروط افکنه‌های منطقه دارای یک آبراهه‌ی تغذیه‌کننده‌ای اصلی هستند (شکل ۷ و ۸).

جدول ۳: تعداد آبراهه‌های تغذیه‌کننده و رتبه‌ی هر آبراهه

شماره مخروط افکنه	تعداد آبراهه تغذیه‌کننده	رتبه‌ی آبراهه‌ی تغذیه‌کننده‌ی جدید	رتبه‌ی آبراهه‌ی تغذیه‌کننده‌ی قدیمی
۱	۱	۲	۳
۲	۱	۳	۴
۳	۱	۳	۴
۴	۱	۳	۵
۵	۱	۲	۳
۶	۱	۱	۳
۷	۱	۲	۳
۸	۱	۲	۳
۹	۱	۲	۳
۱۰	۱	۲	۲
۱۱	۱	۲	۲
۱۲	۱	۲	۲
۱۳	۱	۲	۲
۱۴	۱	۱	۲
۱۵	۱	۲	۲
۱۶	۱	۳	۳



شکل ۷: آبراهه‌های اصلی تغذیه کننده‌ی مخروط افکنه‌های شماره ۸ و ۹ را نشان می‌دهد.



شکل ۸: نمایی از آبراهه اصلی تغذیه کننده، عدم تقارن مخروط افکنه بر اثر حرکات رانندگی گیلانغرب و قرار گرفتن قسمت فعال مخروط افکنه در غرب مخروط در شمال دشت چله (دید روبه شمال)

### تأثیر تکتونیک بر قسمت‌های فعال مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه از نظر شکل جزو مخروط افکنه‌های تودرتو هستند. در مخروط افکنه‌های شماره ۱ الی ۱۲ به دلیل حرکات راستالغز راست‌بر ناشی از راندگی گیلان‌غرب، قسمت فعال مخروط افکنه‌ها و همچنین کانال اصلی قاعده مخروط افکنه در سمت غرب مخروط افکنه‌ها واقع شده‌اند (شکل ۹). ولی در سایر مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه قسمت فعال مخروط افکنه‌ها در وسط مخروط‌ها قرار دارد. به عبارت دیگر واقع شدن در امتداد گسل‌های راست‌الغز در دوازده مورد از مخروط افکنه موجب شده است که بخش فعال آنها به سمت غرب جابجا شود، ولی در دیگر مخروط افکنه‌های موجود به دلیل عدم تأثیرپذیری از گسل‌های راست‌الغز چنین جابه‌جایی مشاهده نشده و بیشتر بالاآمدگی کوهستان جلب توجه می‌نماید.



شکل ۹: قسمت فعال در سمت غرب مخروط افکنه و عدم تقارن مخروط را نشان می‌دهد


## تأثیر تکنونیک بر موقعیت مجرای اصلی مخروط افکنه و ایجاد مخروط افکنه‌های نامتقارن و خمیده در منطقه‌ی مورد مطالعه

یکی از اثرات دیگر فعالیت‌های راست لغز فعال گسل‌ها روی مخروط افکنه‌ها، ایجاد مخروط افکنه‌های نامتقارن و خمیده نسبت به محور طولی کانال اصلی رودخانه است. (سلیمانی، ۱۳۷۷: ۳۱) مخروط افکنه‌های شمال دشت چله (شماره ۱ الی ۱۲) تحت تأثیر حرکات راست لغز راست بر راندگی گیلان غرب دچار خمیدگی و عدم تقارن شده و مجرای اصلی این مخروط‌ها در سمت غرب آنها واقع شده است (شکل ۹۸).

### اثرات تکنونیک بر شکل مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه دارای شکل تودرتو هستند که در آن اجزاء جواتر در بین اجزاء قدیمی‌تر قرار گرفته‌اند. این نوع مخروط افکنه‌ها با رسوب گذاری جدید در داخل نهشته‌های قدیمی‌تر و تقریباً توسعه‌ی شعاعی به سمت قاعده مخروط افکنه‌ها مشخص می‌شوند. هان (۱۹۸۹: ۱) عقیده دارد که این نوع مخروط افکنه‌ها بیشتر در یک محدوده‌ی پایکوهی باریک بین یک واحد کوهستانی شدید و متناوب افزایش یافته و یا یک حوضه‌ی پایین رونده شدید دیده می‌شوند. هر چه نرخ فرسایش قاعده‌ی کوهستان نسبت به نرخ حفر قائم رودخانه و نیز نرخ رسوب گذاری مخروط افکنه بیشتر باشد، عمل نهشتگی در مناطق نزدیک به رأس مخروط افکنه صورت گرفته و جواترین رسوبات مخروط افکنه در این بخش از مخروط افکنه نهشته می‌شوند (کلر و پیتر ۱۹۹۶: ۲) نقل از (سلیمانی، ۱۳۷۷: ۲۹) در بررسی‌های میدانی به عمل آمده از مخروط افکنه‌های منطقه، رسوبات در قسمت رأس مخروط افکنه‌ها از خروجی دره تا نزدیکی بخش میانی نهشته شده‌اند (شکل ۱۰) بنابراین شکل تودرتو و نهشتگی رأس مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه نتیجه‌ی شرایط تکنونیک فعال منطقه است و قسمت فعال مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه در رأس آنها قرار گرفته است.






شکل ۱۰. نمایی از نهشتگی رسوبات در داخل مخروط افکنه شمال دشت چله (دید رو به شمال)

### نقش تکتونیک در تقطیع شدگی مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

شکل‌گیری مخروط افکنه‌های تقطیع شده از مهمترین شواهد حرکات تکتونیکی فعال در هر منطقه است. محیط انتهایی مخروط افکنه سطح اساس مخروط افکنه را کنترل می‌کند. پایین رفتن سطح اساس در حاشیه‌ی انتهایی مخروط افکنه باعث افزایش شیب کانال‌های مخروط شده و در نتیجه کانال مخروط افکنه‌ها در جهت بالا دست مخروط، بستر خود را حفر می‌کند (ریتز و همکاران، ۲۰۰۰: ۶۳).

ویسراس (۲۰۰۲) در بررسی‌هایی که در مخروط افکنه‌های بیتک اسپانیا انجام داد دریافت که در مناطق با فرونشست تکتونیکی فعال کانال‌های حفر شده و گالی در سطح مخروط افکنه شکل نمی‌گیرد و در این گونه مناطق شاخص‌های  $V_f$  و  $S_{mf}$  حاکی از شدت بالاترین شاخص‌های  $V_f$ ،  $S_{mf}$  و  $S_I$  منطقه حاکی از فعالیت‌های تکتونیکی شدید تا بسیار شدید در هر چهار حوضه است (جدول ۴)، منطقه‌ی مورد مطالعه، بر اساس طبقه‌بندی شاخص  $L_{at}$  در کلاس‌های ۱ (چله، کفرور) و کلاس ۲ (گوار، آسمان آباد) قرار می‌گیرند (همدونی و همکاران: ۲۰۰۸: ۱۶۹). مخروط افکنه‌های مورد مطالعه دارای یک کانال فعال اند. تقطیع شدگی مخروط‌ها توسط آبراهه‌ی فعال صورت گرفته که به دلیل شرایط تکتونیکی فعال مسیر آن در طول زمان در سطح مخروط جابه‌جا شده است (شکل ۱۱).



شکل ۱۱. نمایی از تقاطع شدگی مخروط افکنه‌های منطقه‌ی شمال دشت چله

جدول ۴. طبقه بندی شاخص‌های ژئومورفیک با استفاده از طبقه بندی Lat

نام حوضه	Sl	Vf	Smf	Lat
چله	متغیر	۰/۴۵	۱/۲۵	کلاس ۱
کفراور	متغیر	۰/۵۳	۱/۰۷	کلاس ۱
گواور	متغیر	۰/۴۱	۱/۲۰	کلاس ۲
آسمان آباد	متغیر	۰/۵	۱/۲۵	کلاس ۲

بررسی تأثیر تکنونیک بر شکل مخروط افکنه‌ها با استفاده از تحلیل فرمول  $\beta$ :

این فرمول به صورت زیر تعریف می‌شود: (کلر و پیتر، ۱۹۹۶: ۳۰۱)

در این فرمول

$$\beta = \arccos\left(\left(\frac{b}{a}\right)^2 \sin^2 a + \cos^2 a\right)^{0.5}$$

$\beta$ : مقدار خمیدگی مخروط افکنه

$a$ : طول قطر بزرگ

$b$ : طول قطر کوچک

با توجه به این که مخروط افکنه‌ها مخروطی شکل هستند، خطوط منحنی میزان روی مخروط افکنه‌های ساده، که تحت تأثیر فعالیت‌های تکتونیکی قرار نگرفته‌اند، بخشی از دایره را تشکیل می‌دهند؛ اما منحنی میزان در سطح مخروط افکنه‌هایی که تحت تأثیر حرکات تکتونیکی قرار گرفته‌اند، سطوح بیضی شکلی را تشکیل می‌دهند، که نشان دهنده‌ی تأثیر تکتونیک بر مخروط افکنه‌هاست. با استفاده از فرمول بالا، میزان این خمیدگی و عدم تقارن قابل محاسبه است. هر چه خمیدگی مخروط افکنه‌ها در اثر فعالیت تکتونیکی زیاد باشد، ضریب به دست آمده ( $\beta$ ) عدد کوچکی را نشان می‌دهد. جدول (۵) نتایج حاصل از تطبیق منحنی‌های میزان سطح مخروط افکنه‌های منطقه با دایره و بیضی و محاسبه‌ی ضریب  $\beta$  را نشان می‌دهد. با استفاده از داده‌های جدول می‌توان دریافت که تمامی مخروط افکنه‌های مورد مطالعه بیضی شکل‌اند.

#### جدول ۵. نتایج محاسبه ضریب $\beta$ برای مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

شماره مخروط افکنه	شکل	میزان $\beta$
۱	بیضی	۴/۴
۲	بیضی	۴/۳
۳	بیضی	۴/۴
۴	بیضی	۳/۲
۵	بیضی	۲/۸
۶	بیضی	۳/۱
۷	بیضی	۴/۱
۸	بیضی	۳/۳
۹	بیضی	۳/۱
۱۰	بیضی	۲/۹
۱۱	بیضی	۳
۱۲	بیضی	۳/۶
۱۳	بیضی	۴/۷
۱۴	بیضی	۳/۹
۱۵	بیضی	۴
۱۶	بیضی	۴/۱

بیشترین مقدار خمیدگی در مخروط افکنه‌های شمال دشت چله در مخروط افکنه‌ی شماره ۵ می‌باشد، که حاکی از فعالیت راندگی گیلان غرب و بالاآمدگی منطقه در نتیجه‌ی مخروط افکنه‌هاست و کمترین مقدار خمیدگی مخروط افکنه شماره ۱۳ در شمال دشت اسمان آباد است که جبهه‌ی کوهستانی تحت تأثیر فعالیت گسل قرار ندارد. در هر حال بررسی شاخص  $\beta$  برای تمامی مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه نشان دهنده‌ی تأثیر پذیری شکل مخروط‌ها از فعالیت‌های تکتونیکی منطقه و میزان بالاآمدگی بیشتر نسبت به میزان رسوب گذاری است.

### تأثیر تکتونیک در میزان شیب مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

بلیر و مک فرسون (۱۹۹۴) شیب سطح مخروط افکنه‌ها را تابع عوامل مختلفی همچون، نوع فرایند تشکیل دهنده، اندازه رسوبات و میزان تأثیر تکتونیک می‌دانند. بلیسینباخ<sup>۱</sup> (۱۹۵۴) مخروط افکنه‌ها را در مناطق نیمه خشک به سه گروه پر شیب ( $< 5^\circ$ ) شیب ملایم ( $5^\circ$  الی  $20^\circ$ ) و مسطح ( $> 20^\circ$ ) تقسیم کرد. هوک و روهر (۱۹۷۹) دریافته‌اند که شیب مخروط‌ها معمولاً نسبت معکوسی با مساحت و شعاع مخروط افکنه‌ها دارد به نقل از (مقصودی، ۱۳۸۰: ۲۳۰).

بر اساس تقسیم بندی بلیسینباخ مخروط افکنه‌های شماره ۱۱ و ۱۵ در دسته مخروط افکنه‌های با شیب ملایم قرار می‌گیرند و سایر مخروط افکنه‌ها در دسته مخروط افکنه‌های پر شیب جای می‌گیرند. چهارده عدد از مخروط افکنه‌های مورد مطالعه دارای شیب بیش از  $5^\circ$  هستند. مخروط افکنه‌های شماره ۱ الی ۷ در شمال غرب دشت چله به دلیل قرار گرفتن در حریم راندگی گیلان غرب بیشترین شیب را در بین مخروط افکنه‌های منطقه دارند (جدول ۶). ارتباط مشخصی بین شیب مخروط افکنه‌ها و مساحت مخروط‌ها در منطقه‌ی مورد مطالعه وجود ندارد. به طوری که بزرگترین مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه (مخروط‌های شماره ۱۶، ۴، ۱، ۶ و ۵) دارای شیب ( $4^\circ$ ،  $5^\circ$ ،  $6^\circ$ ،  $9^\circ$ ،  $11^\circ$ ،  $14^\circ$ ) هستند. بیشترین شیب مخروط افکنه‌های منطقه مورد مطالعه را مخروط افکنه‌های شماره ۷ با شیب  $13/5^\circ$ ، مساحت  $0/44$  کیلومتر مربع که متأثر از فعالیت راندگی گیلان غرب است و کمترین شیب شماره ۱۵ با شیب  $3/6^\circ$  و وسعت  $0/13$  کیلومتر مربع دارند. هم‌بستگی بین شیب مخروط افکنه‌ها و مساحت آنها ( $r=0/28$ ) که نشان

1. Billar and Mc farssen 1994

2. Blissenbach 1954.

می دهد، رابطه‌ی معناداری بین آنها وجود ندارد. بنابراین تغییرات شیب و وجود شیب‌های بیش از  $5^\circ$  مخروط افکنه‌های منطقه حاکی از فازهای مختلف نهشته گذاری در ارتباط با پدیده بالا آمدگی و فعالیت‌های تکتونیکی است و می توان گفت که شیب مخروط افکنه‌های منطقه مورد مطالعه متأثر از تکتونیک منطقه است.

### جدول ۶. شیب و تقسیم بندی شیب مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه بر اساس تقسیم

#### بندی بلسینباخ

شماره مخروط افکنه	شیب مخروط افکنه (درجه)	طبقه بندی شیب
۱	۸٫۱	پر شیب
۲	۶٫۳	پر شیب
۳	۷٫۲	پر شیب
۴	۶٫۳	پر شیب
۵	۵٫۴	پر شیب
۶	۹	پر شیب
۷	۱۳٫۵	پر شیب
۸	۵٫۴	پر شیب
۹	۵٫۴	پر شیب
۱۰	۵٫۴	پر شیب
۱۱	۳٫۶	شیب ملایم
۱۲	۷٫۲	پر شیب
۱۳	۵٫۴	پر شیب
۱۴	۹	پر شیب
۱۵	۳٫۶	شیب ملایم
۱۶	۵٫۴	پر شیب

### تأثیر تکتونیک بر مساحت مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

اندازه مخروط افکنه‌ها به طور وسیعی به اندازه حوضه‌ی آبریز رودخانه وابسته است و بزرگی مخروط افکنه‌ها از ده‌ها متر تا چندین کیلومتر مربع بالغ می‌شود (سونی و لوب ۲۰۱۱: ۳۳).


از ویژگی‌های مخروط افکنه‌های جبهه‌ی کوهستانی فعال، کم بودن مساحت مخروط افکنه‌هاست. جبهه‌های کوهستانی فعال از نظر تکتونیک، جایی که کوهستان نسبت به حوضه‌های مجاور در حال بالا آمدن است، مخروط‌ها به طور عمودی رسوب‌گذاری می‌کنند و باعث کم شدن مساحت مخروط افکنه‌ها نسبت به مساحت حوضه‌هایشان می‌شود (فریل ۱۹۹۶؛ ۵۶۱). در منطقه‌ی مورد مطالعه، هیچ رابطه‌ی مشخص و منطقی بین مساحت مخروط افکنه و مساحت حوضه آبریز وجود ندارد و هم‌بستگی بین آنها  $0.13 = r$  است، که معنادار نیست. مخروط افکنه شماره ۸ با مساحت  $0.82$  کیلومتر مربع حوضه‌ی آبخیزی به مساحت  $7.42$  کیلومتر مربع دارد، در حالی که مخروط افکنه ۱۶ با وسعت  $1.88$  کیلومتر مربع دارای حوضه‌ی آبخیزی به مساحت  $1.87$  کیلومتر مربع می‌باشد. مقایسه مساحت مخروط افکنه‌ها با وسعت حوضه‌ی آبخیز آنها نشان دهنده کوچک بودن وسعت مخروط‌ها نسبت به حوضه‌های آبریزشان است که حاکی از رسوب‌گذاری عمودی در مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه بر اثر فعالیت‌های تکتونیک است و دلیل مساحت زیادتر مخروط افکنه شماره ۱۶ نسبت به وسعت حوضه‌ی آبخیز خودش دخالت دو گسل امتداد راست لغز راست بر در حوضه‌ی آبخیز آنهاست، که با بریدن ناقدیس قلاجه به صورت عرضی و ایجاد گردنه رسوب فراوان را در اختیار آبراهه‌های تغذیه کننده مخروط افکنه‌ی شماره ۱۶ قرار داده‌اند.

### تأثیر تکتونیک بر نیمرخ طولی مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه:

در سیستم‌هایی که ابتدا به وسیله‌ی تکتونیک کنترل می‌شوند، نیمرخ طولی مخروط افکنه‌ها به صورت معقر است (ویسراس و همکاران: ۲۰۰۲: ۱۶۹). نیمرخ طولی مخروط افکنه‌ها برای درک میزان بریدگی و هموار شدگی مخروط افکنه‌ها تهیه می‌شود (ویلار و رویز؛ ۲۰۰۳: ۱۳۰). نیمرخ طولی هر مخروط افکنه

1. Sweeney and Loope 2000
2. Ferrill 1996.
3. Villarand Raiy 1999.

عوامل مؤثر تأثیر گذار را در مورفولوژی مخروط افکنه‌ها قابل درک می‌نماید. نیمرخ‌های طولی ترسیم شده از مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه، حالت تعقر دارند که نشان دهنده‌ی تأثیر حرکات تکتونیکی بر مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه است (شکل ۱۲).



شکل ۱۲. نیمرخ طولی مخروط افکنه‌های منطقه (الف: مخروط افکنه شماره ۳، ب: مخروط افکنه شماره ۹، ج: مخروط افکنه شماره ۱۳، د: مخروط افکنه شماره ۱۶)

### نتیجه‌گیری

۱. نحوه‌ی پراکندگی مخروط افکنه‌های بزرگ و شاخص منطقه‌ی مورد مطالعه نشان می‌دهد که موقعیت مخروط افکنه‌ها ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های تکتونیکی منطقه در دوران پلیو-کوارترن دارند به گونه‌ای که وسیعترین مخروط افکنه‌های منطقه در امتداد راندگی گیلان غرب شکل گرفته‌اند.
۲. تکتونیک عامل اصلی در شکل‌گیری، توسعه و تحول مخروط افکنه‌های منطقه است که در این میان نقش گسل‌ها بیشتر از سایر عوامل تکتونیکی بوده است و بیشتر مخروط افکنه‌ها در امتداد راندگی گیلان غرب یا خروجی دره‌های گسلی منطقه شکل گرفته‌اند.
۳. مورفولوژی مخروط افکنه‌های منطقه توسط عوامل تکتونیکی کنترل می‌شود.

۴. با توجه به بررسی‌های میدانی به عمل آمده، سه فاز نهشته گذاری در داخل مخروط افکنه‌های منطقه شناسایی گردید. که مربوط به دوران پلیو - کواترنر است و مخروط افکنه‌های منطقه در عصر حاضر در شرایط فرسایشی قرار دارند.
۵. ارتباط معناداری بین شیب مخروط افکنه و مساحت آن و نوع رسوبات آن در منطقه‌ی مورد مطالعه وجود ندارد و شیب مخروط افکنه‌ها توسط عوامل تکتونیکی کنترل می‌شود.
۶. تکتونیک عامل اصلی تأثیر گذار در وسعت مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه است و هیچ ارتباط معناداری بین وسعت مخروط افکنه‌ها با مساحت حوضه‌ی آبریز آنها وجود ندارد.
۷. مخروط افکنه‌ی شماره ۱۶ به عنوان نماینده مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه با فرمول  $AF=3-34 \times Adn0.55$  هم‌خوانی دارد که نشان دهنده‌ی مخروط افکنه‌های شکل گرفته در جبهه‌های کوهستانی فعال است و شاخص‌های  $SL, VF, Smf$  و کفراور ضریب  $\beta$  این مخروط افکنه این موضوع را تأیید می‌کنند. همچنین این مخروط افکنه دارای نسبت عرض به طول  $1/16$  است که با توجه به مطالعات (ویسراس و همکاران: ۲۰۰۲: ۱۹۷) چنین مخروط افکنه‌هایی در شرایط تکتونیکی فعال شکل گرفته‌اند.
۸. نیمرخ مقعر مخروط افکنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه نشان دهنده‌ی فعال بودن حرکات تکتونیکی در زمان شکل‌گیری مخروط افکنه در دوران کواترنر است.

### توضیحات

۱. شاخص گرادبان طول رودخانه (SI) که در برآورد تکتونیک فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد و از رابطه‌ی  $SL = (\Delta H / \Delta L) \cdot L$  به دست می‌آید.
۲. شاخص نسبت پهنای کف دره به عمق دره که از رابطه‌ی  $Vf = 2Vfw / (Eld - Esc) + (Erd - Esc)$  به دست می‌آید.
۳. شاخص سینوسی جبهه کوهستان (smf) که از رابطه‌ی  $Smf = Lmf / Ls$  به دست می‌آید.
۴. شاخص  $Lat$  به وسیله‌ی میانگین کلاس‌های مختلف شاخص‌های ژئومورفیک (S/n) به دست می‌آید.
۵. شاخص عدم تقارن حوضه‌ی آبخیز که از رابطه‌ی  $Af = (Ar / At) \cdot 100$  به دست می‌آید.



## منابع و مأخذ

۱. تصاویر ماهواره IRS- متعلق به سال ۲۰۰۴.
۲. سلیمانی، شهریار، (۱۳۷۷)، رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان "با نگرشی بر مقدمات دیرینه شناسی"، تهران: انتشارات مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، چاپ اول: ۱۲۵.
۳. عباس نژاد، احمد، پژوهش های ژئومورفولوژی دشت رفسنجان. (۱۳۷۵). رساله‌ی دکتری دانشگاه تبریز.
۴. عکس هوایی ۱:۵۰۰۰۰، (۱۳۳۵)، شماره‌های ۸۵۴۱، ۸۵۴۲، ۸۵۴۳، ۸۵۴۴، ۳۵۸-۳۵۶ و ۳۷۰-۳۶۴ منطقه مورد مطالعه.
۵. مقصودی، تهران (۱۳۸۰). ژئومورفولوژی مناطق خشک بررسی متغیرهای مؤثر بر تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه‌های چاله سیرجان؛ پایان نامه‌ی دکتری دانشگاه تهران.
۶. نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ کال کش، (۱۳۷۶)، برگه شماره III ۵۲۵۸، چاپ سوم، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
۷. نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ایوانغرب، (۱۳۸۵)، برگه شماره ۵۲۵۷، سازمان زمین شناسی.
۸. نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ایلام، (۱۳۸۵)، برگه شماره ۵۲۵۷، سازمان زمین شناسی.
۹. نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ کرند، (۱۳۸۴)، برگه شماره ۵۲۵۸، سازمان زمین شناسی.
10. Blance, E , Allen,M , Inger,S, Hassani,H, (2003), *structural styles in the Zagros simple folded zone Iran*, geological society, vol 160, pp: 401-412.
11. Ferrill, D.A., Stakamatos, J.A., Jones, S.M., Rahe, B., McKague, H.L., Martin, R.H., Morris, A.P., 1996. *Quaternary slip history of the Bare Mountain fault (Nevada) from the morphology and distribution of alluvial fan deposits*. Geology 24, 559-562.
12. Hamdouni, R.El. Irigaray, C. Fernandez, T. Chacon, J. Keller, E.A.(2008). *Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (Southern Spain)*. Geomorphology. Vol 96. pp: 150-173.
13. Han, M. (1961). *Tectonic Geomorphology and its application to earthquake prediction in chinain: tectonic geomorphology*, ed by: morisawa & Hach, J.T., unwin Hyman, Boston pp: 367-386.
14. Harvey, A. (2002). *The role of base- level change in the dissection of alluvial fans: Case studies from Southeast Spain and Nevada*. Geomorphology. Vol 45. pp: 67-87.
15. Hessami,KH, Nilfouyoushan, Christopher.J, Tablot,(2006), *active deformation within the Zagros Mountains deduced GPS measurements*, geology society, Vol 163, pp: 143-148.
16. Li, Youli. Yang, Jingchun. Tan, Lihua. Duan, Fengjian (1999). *Impact of tectonics on alluvial landforms in Hexi corridor, Northwest China*. Geomorphology Vol 28. pp: 299-308.

17. M.Harvey, A. G.Silva, P. E.Mather, A. L.Goy, J. Stokes, M. Zazo, Cari.(1999). *The impact of Quaternary sea-level and climatic change on coastal alluvial fans in the Cabo de Gate ranges, southeast Spain*. *Geomorphology*, Vol 28. pp: 1-22.
18. Ritter, J. Miller, J. walforst, J.(2000). *Environmental controls on the evolution of alluvial fans in Buena Vista Valley, North Central Nevada, during late Quaternary time*. *Geomorphology*. Vol 36. pp: 63-87.
19. Sweeney,M. Loope, D. (2001). *Holocene dune- sourced alluvial fans in the Nebraska sand hills*. *Geomorphology*. Vol 38. pp:31-46.
20. Valvo, M. Antronico. Pera, E.(1998). *Controls on modern fan morphology in calabria, Southern Italy*. *Geomorphology*. Vol 24.pp: 169-187.
21. Vilar, G. Ruiz, G (2000). *Surface sediment characteristics and present dynamics in alluvial fans of the central Spanish Pyrenees*. *Geomorphology*. Vol 34. pp: 127-144.
22. Viserase, C. calvache, M. soria, J. Fernandez, J. (2003). *Differential features of alluvial fans controlled by tectonic or eustatic accommodation space. Examples from the Betic Cordillera, Spain*. *Geomorphology*. Vol 50. pp: 181-202.
23. Yang, J.C. (1985). *Geomorphology (in Chinese)*. *High Education press*. Beijing. Pp: 320.

