

علل ارتکاب جرائم

عامل الکل

این مقاله قسمتی از یک رشته مقالات تحقیقی و مستند است که در موضوع « بررسی و تقسیم بندی علمی علل ارتکاب جرائم » در مجله « حقوق امروز » بچاپ میرسد ،

الکل را دانشمندان جرم شناسی هم جزء عامل خارجی و هم جزء عامل داخلی در علل مجرمیت میدانند ، عامل خارجی از آن جهت که الکل جز و بدون نیست و عامل داخلی از آن جهت که در اثر میل شخص مصرف کننده ، نوشیده شده و آنگاه موجب بروز بیماریها و تشنجات و مسمومیت هائی می گردد که باعث بسیاری از جرائم بتوسط معتادین است .

الکل بصورت های مختلف : شراب ، آبجو ، عرق ، سیدرو غیره و یا بصورت الکل صنعتی و یا شیمی ($C_2H_5OH - \text{etylique}$) که بحالت خالص است مشاهده می گردد ،

از نظر بررسی علمی : الکل از طریق خون وارد نسوج بدن مصرف کننده شده و یک قسمت کوچک آن در حدود ۱۰٪ بوسیله کلیه ها و ریه ها بخارج دفع میگردد . هر گاه یک فعالیت شدید بدنی توسط مصرف کننده انجام گیرد ، اثر الکل در هنگام تنفس شدید (بوسیله ریه ها) شدت مییابد ولی بقیه الکل اکسیده شده و میسوزد .

تمرکز الکل در جریان خون در هر لحظه منتج به دو اثر می گردد : الف- در مغز و سلولهای دماغی ب- در ارگانهای مختلف در بدن (مخصوصاً احشاء و کبد) ، اما این آثار در افراد و بمقتضای سنی شان متفاوت است ، در نوجوانان اثرات مضر آن بمراتب بیشتر از افراد مسن تر است مخصوصاً اثرات فیزیولوژیکی آن . در ۳۰ ژوئن ۱۹۵۳ در آکادمی پزشکی فرانسه دانشمندان فرانسوی چون *La roche* ، *Guy* و *Jean Tremolieres* ثابت کردند که الکل حتی بروی حیوانات اثر گذاشته و رشد طبیعی آنان را مختل میسازد .

پروفسور *Bichet* مدال داشت که انرژی حاصله از الکل قابل استفاده (از نظر کار برای عضلات بدن) نیستند و بهمین جهت است که پس از شرب شراب ، یک نوع رخوتی به معتاد دست می دهد ، اما تنها اثر مثبت الکل آن است که کمی مصرف اکسیژن را زیاد نموده و در نتیجه شخص احساس حرارت مینماید . مسلماً اینگونه اثرات آنی بزودی بر طرف شده و در نتیجه موجب فقدان مقدار زیادی کالری انسانی میگردد .

من باب مثال میتوان خاطرات سفر پل امیل وینگتون و همراهانش را به قطب شمال ذکر نمود

پل و دوستانش در این سفر پس از شرب شراب چنین یادداشت کرده اند، و پس از گرمای موقتی کمی بعد حال بسیار بدتر از گذشته بمادست داد.

مسمومیت های الکلی: بررسی شماتیک کلی نظریات علمای پزشکی در مورد مسمومیت اعضاء مختلف بدن ثابت ساخت که الکل بعد از شرب (و در تمام مدت Oxydation با سوخت آن) وارد نسوج مختلف بدن، بالاخص سلولهای عصبی و دستگاه گوارش شده و آنان را شدیداً متأثر می سازد.

بر طبق نظریه Gorges و Maolignat ... الکل مانند یک سم خطرناک بر روی سیستم اعصاب عمل مینماید که با اصطلاح طبی اثر اولیه آن بر روی سلولهای عصبی Anesthésiant و Euphosiast است، علاوه بر دستگاهها و سلولهای مذکور الکل بر هورمونهای جنسی شخص معتاد اثر گذاشته که بصورت توارث این اثرات مخرب بفرزندانش بارت میرسد، در مورد مسمومیت کبد حسب نظریه اطباء هر گاه در مصرف غذایی، عناصری مانند مواد لبنی و گوشت موجود نباشد الکل حتی برای این عضو (که وظیفه دارد اثرات سمی الکل و غیره را خنثی نماید) نیز مسموم کننده است.

شوک های ناشی از الکل: بیماریهای دیگر، ظهور تشنجات مختلف در بدن مصرف کننده است که گاهی موجب فلج ناقص و حتی خونریزی مغزی میگردد.

بیماریهای دیگر ناشی از الکل: در گروه مجرمین معتاد بتحقیق اطباء بیماریهای مختلفی از قبیل:

delirium ternens Delire - Toxi - alcoolique
 psychose de Krosakoff encéphalite - aigue
 نéphrites pneumonies قلب

و غیره دیده اند که در جای خود و در مبحث عامل پاتولوژی و بیماریهای مغزی (یا یکی از علل مجرمیت) خواهند آمد.

بیماریهای سل و قلب ناشی از الکل:

در مورد بیماری سل حسب تحقیقات M. solly. le dermann و نیز بر طبق آمار ثابت شده که تعداد قابل توجهی از افراد معتاد بعلت سوخت مواد ذخیره بدن و ضعف جسمانی مبتلی به بیماری سل شده و نیز تعدادی از ایشان به علل مذکور وفات یافته اند.

اثرات مضر الکل بر زن:

قبلا اشاره گردید که الکل اثرات سوئی بر روی اسپرم و اول معتادین داشته و بوسیله آنها

و با بوسیله خون مادر معتاد ، بفرزندان بارش میرسد .

حسب آخرین تحقیقات علمی اطفال حتی قبل از تولد و در شکم مادر از اثرات از ناشیه از الکل متالم شده و نیز تعدادی از آنان مرده بدنیا می آیند

پروفسور Nicolou در این مورد ثابت نمود ، که در مدت کمتر از یک ساعت بعد از استعمال ۱۲ لیتر شراب سفید ، اسپرم مرد محتوی الکل می گردد ، این اثرات مضر نه تنها در نطفه انسان بلکه حسب آزمایشهای علمی بر روی تخم مرغان و ماهیان نیز ملاحظه گردیده (که چنانچه قبلاً اشاره گردید موجب بطی تحولات طبیعی تشکل جنین می گردد) ، آنچه مسلم است این است که اثرات مخرب الکل بر روی اطفال زنده و ضعیف قوی تر است که گاه با تعویق تحولات طبیعی بدن طفل ضعیف ، همراه بوده و نیز گاهی موجب ایجاد انواع تشنجات پسیکو پاتیکی می گردد

آزمایشهای انجام شده بر روی اطفال مجرم در سرویسهای - neuropsychiatric infantile در پاریس ثابت کرد که ۵۰ درصد بیمارانی که دچار تشنجات پسیکوپاتیکی هستند دارای اولیاء الکلیک و معتاد بوده اند .

تحقیقات انجام شده بر روی اطفال معتادین نمایان ساخت که از نظر عامل ارثی ، الکل از راه شیر مادر معتاد وارد دهان طفل شده و شدیداً وی را متأثر می سازد

اثر الکل در جرائم رانندگی :

اثر الکل در رانندگان موجب می گردد که راننده نتواند کاملاً کنترل ماشین ورل آنرا بدست گیرد بهمین جهت موجب عدم حفظ تعادل ماشین بتوسط راننده و بالتسبیب موجب تصادفات در رانندگی و نیز قتل و جرح عابریین و دیگران می گردد .

آزمایشهای انجام شده بر روی راننده گان در غرب نمایان ساخت ، هر گاه مقدار *alcoolemie* رانندگان (بالاخص رانندگان جوان) به ۸٪ تا ۱۰٪ برسد تعداد اشتباهات و خطاهای رانندگان به ۸۰٪ خواهد رسید . و نیز هنگامی که راننده مست دچار حالت تخیلی شد ، این میزان بعد اعلی خود میرسد .

عکس العملهای متفاوت افراد در مقابل الکل :

در بین مصرف کنندگان و معتادین الکل عکس العملهای متفاوتی بچشم می خورد .

- ۱- گاهی افراد کنترل خود را از دست داده و با اصطلاح تلوتلو میخورند .
- ۲- در مواردی دیگر شدت تنفس افراد شدت یافته و دستها و چهره هایشان گلگون می گردد .

۳- در پاره ای مواقع علاوه بر اثرات مذکور گفتار و کردارشان غیر عادی و تند شده :
الف - گروهی از ایشان بزنان مجاور خود حمله ور شده و نیز آنان را در آغوش

میگیرند .

ب- دسته‌ای از ایشان بخواب فرورفته و در حالت اخیر از گوشه لبان خویش تنفس نموده (که اصطلاحاً پنب کشیدن معتاد گفته می‌شود).

دزر صورت هر گاه مقدار ذالککل به $1/5\%$ در خون رسید مستقی‌های شدید که گاه سبب مسمومیت مغزی و ایجاد فکر خود کشی می‌گردد نمایان می‌گردد ،

اثر الککل بر روی شخصیت مجرمین معتاد :

تحقیقات مختلفه توسط دانشمندان غربی F. Lemming ، Wall ، Milea ، در فرانسه باین نتیجه رسید که یک نوع ضعف اخلاقی اتازونی DuChène De shaies ، در فرانس باین نتیجه رسید که یک نوع ضعف اخلاقی تو نزل شخصیتی در بین افراد معتاد به الککل ملاحظه می‌گردد ، بر حسب این تحقیقات یک حالت عدم تعادل اخلاقی و یک حالت غیر عادی از نظر اجتماعی و نیز یک سلسله هیجانات جنسی (که گاه موجب ایجاد حالت psych asthenique در معتاد می‌گردد) پدید می‌آورد .

اثرات مخرب الککل بر روی روان :

حسب اینگونه مطالعات ، یک حالت سقوط روانی مرحله بمرحله در مصرف کننده الککل ایجاد شده و زمانی طول نمی‌کشد که فرد در اثر ایجاد پدیده‌های منفی روانی (حسادت ، عداوت ...) یک وضع پر خاش آمیز و قابل انفجاری را بخود گرفته و گاهی نیز برعکس حالت تمسخر آمیزی را بخود می‌گیرد

تجلیات دیگر روانی این سم ، بصورت شدت اعمال و کردار و نیز قضاوت های شخصی و غیر صحیح بوده که گاهی اولیا معتاد ، اطفال خویش را بیبها نه‌های جزئی مضروب و یا خانواده خود را بدون نفقه و خرجی ترك و در پی میخوارگی می‌روند ، در صورت اخیر است که حوادثی مکرره و دور از انسانیت در خانواده معتاد ایجاد میشود که گاهی هم موجب سقوط زن جوان و یا دختران بی سرپرست معتاد (بعلت فروش اناث البیت خانواده و یا عدم پرداخت خرجی به زن و فرزندان و بالتبینه سوه استفاده دوستان ناباب از این موقعیت خانواده پدر الککلیک) می‌گردد علاوه بر این ، عدم انجام کار منظم ، عدم ثبات شغلی ، خیانت به همسر ، تجاوز به اخلاق ، پائین بودن راندمان کار در شغل تجلیات منفی دیگر این سم است .

در زنان معتاد نیز متقابلاً عصیان علیه اخلاق و تشنجات کار اکثر و بیماری عیدیه‌ای (که قسمتی از آن مذکور گشته و قسمتی دیگر در مبحث عامل زن و وراثت آمده) پدید می‌آید .

مجله « حقوق امروز شماره دهم دوره دوم » ، ناتمام