

# تریت نو باوگان

— ۱ —

## یاد داشتهای چند در باره شیر دادن به نوزادها

۱ — یکی از وظایف مهم مادر، که طبیعت برایش معین کرده تغذیه طفل خودش است از پستان خود یعنی دادن شیر مادری. در اینصورت یعنی با دادن غذای طبیعی، بهجه شیر خواره از ناخوشی‌ها و بدبختیها که طبیعت بواسطه آنها مخالفین خودش را مجازات می‌نماید محافظه می‌شود زیرا هعدد کوچک بهجه بستخی تحمل غذاهای دیگر را می‌کند. ولی اگر زندگانی مادر بواسطه غذا دادن بهجه از پستان خود در خطر باشد باید با صلاح‌حدید طبیب از راه دیگر او را تغذیه بکند.

۲ — اگر چنان‌چه بعد از تولد بهجه شیر کافی به پستان مادر نیامده، باید بدین سبب از تغذیه طفل خودداری کند؛ بلکه باید متحمل زحمت شده و بطور منظم بهجه را بمکیدن پستان خود وا دارد تا باعث ازدیاد شیر گردد چه اغلب اوقات این زحمت بی‌سیجه نمی‌ماند. و همچنین باید مادر بمالحظه اینکه بهجه در روز و یا هفته‌های نخستین شیر کافی از پستان نصیش نمی‌شود و سیر نمی‌گردد از تغذیه طفل خودداری کند.

۳ — در موقعیکه دادن غذای طبیعی (شیر مادری) به نوزاد امکان پذیر نیست، باید بجای آن شیر تیز گاو بمصرف رساند. و این باید از جانب طبیب برای تغذیه شیر خواره تصدیق شده باشد.

۴--- مادر یا پرستار بچه باید ملتفت باشد ، شیر گاو که برای بچه خریده میشود ممکن است بواسطه نا تمیزی ظرف و گرمی هوا خراب شده باعث ناخوشی بچه گردد.

۵--- برای شیر ، نا تمیزی و هوای گرم بی اندازه مضرند . ظرفی که در آن شیر نگاه داشته میشود ، باید قبلاً با اختیاط کامل شسته شود . و همچین خوبست قبل از آنکه شیر در ظرف مزبور ریخته شود دوباره در آب گرم آن ظرف را شست و شو داد . بعد از تمیز کردن ظرف اگر هنوز شیر در آن ریخته نشده باید در این میانه سر ظرف بسروش بماند . همین معامله را که ذکر شد باید با شیشه‌ای که در آن شیر به بچه داده میشود نمود . آنرا باید بعد از هر استعمال بخوبی پاک و تمیز کرد . و در موقع امکان هم قبل از آنکه شیر در آنها ریخته بشود در آب گرم شست و شو داد . پستانک ها را باید همیشه در آب تمیز و صاف نگاه داشت و برای مراعات تمیزی و امکان معاوضه همواره دو پستانک استعمال نمود .

۶--- شیر را باید بمحضر خرید در ظرف تمیز پخت ، بعد از پختن بزودی و با اختیاط زیاد سر همان ظرف را بایک سروش تها پوشیده در جای خنکی برای تغذیه بچه نگاه داشت . و باید شیر را از ظرفی بضرف دیگر ریخت که خالی از خطر نیست . اگر سردا به وغیره برای نگاهداری شیر وجود نداشته باشد باید لامحاله ظرف هزبور را در داخل ظرفی که با آب سرد پر است نگاه داشت .

شیر هر روزی طفل را باید همان روز تازه خریده و حاضر نمود و شیری را که از دیروز مانده باید امروز بمصرف رساند بلکه آنرا میتوان به اطفال بزرگتر داد .

چگونگی ترکیب شیر را با آب و قند که نسبت به بزرگی

طفل تقاویت میکند و چند مرتبه دادن آنرا در شبانه روز و مقدار شیری را که در هر دفعه باید داد باید طبیب معین کند.

۷— در موقع دادن شیر به بچه باید بقدرتی که در یکدفعه بتواند بخورد به شبشه تغذیه ریخته و بعد سرشارا محکم بسته در توی ظرفی که بر از آب گرم است، گذاشته گرم نمود.  
اگر بچه تمامی شیری را که باید بخورد تمام نکند، باید باقیمانده را دو باره داد.

۸— اگر چنانچه نوزاد دچار اسهال و قی گردد باید بزودی به طبیب رجوع نمود و از علاج نمودن از طرف خود و گوش دادن به حرف پیره زنان خود داری نمود، زیرا ناخوشی معده و جهاز هاضمه بچه خیلی خطر ناک بوده و غالباً در صورت اهمال منجر به مرگ وی میگردد.

۹— هیچ باید بجای شیر غذای دیگر استعمال نمود، چه ممکن است باعث تاخوشیهای خطرناک گردد در هر صورت در موقع لزوم باید از طرف طبیب اجازه داده شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

— ۲ —

## شرایط پرستاری نوزاد و حفظ صحت وی

### در روزهای نخستین زندگانی

هر سالی عده زیادی از نوزادان بواسطه موافق و سالم نبودن اغذیه ناخوش شده می‌برند. اگر چنانچه دادن غذای طبیعی و سالم یعنی شیر مادری غیر ممکن است، در این موقع باید بغير از شیر گاو چیز دیگری داد. و نسبت بزرگی بچه باید بقرار ذیل با آب مخلوط کرد: