


کمترین نسبت هزینه - سود برای داده‌های بازه‌ای

دکتر سهند دانشور^۱
مزگان منصوری کلیر^۲

چکیده

در این مقاله مسائل محاسبه حداکثر و حداقل سهم افراد یا سازمان‌ها جهت محاسبه سود و هزینه‌ی تخصیص یافته به بازیکنان با معیارهای متعدد بررسی و مورد بحث قرار می‌گیرد. با این فرض که بازیکنان خودخواه باشند و نمره‌ی هر معیار برای هر بازیکن یک بازه فرض شده است. هر بازیکن سعی می‌کند بهترین وضعیت را برای خود فراهم کند. در این مقاله طرحی جدید برای محاسبه‌ی کمترین نسبت هزینه - سود برای داده‌های بازه‌ای پیشنهاد شده است. هر بازیکنی که کمترین نسبت هزینه - سود را به خود اختصاص دهد موفق‌ترین بازیکن در کسب سود و هزینه مطلوب می‌باشد. همچنین طرح توسعه یافته در این مقاله روشی برای شناسایی موفق‌ترین بازیکنان و ائتلاف‌ها ارائه می‌نماید.

واژه‌های کلیدی: تحلیل پوششی داده‌ها، روش ناحیه اطمینان، نظریه بازی



^۱- استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (sahanddaneshvar1@yahoo.com)
^۲- عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (mozhganmansouri953@gmail.com)

۱. مقدمه

فرض کنید n بازیکن و هر کدام از بازیکنان دارای m معیار برای ارزیابی قابلیت یا توانایی می‌باشند، که با یک عدد مثبت برای هر معیار نمایش داده می‌شود. همان طور که در امتحانات کلاسی رایج است هر اندازه نمره یک معیار بالاتر باشد به همان اندازه این بازیکن برای اجرا در آن معیار مورد قضاوت بهتری قرار می‌گیرد.

برای مثال، فرض کنید بازیکنان ۳ دانش آموز باشند A، B و C با ۳ معیار ریاضیات، ادبیات و ژیمناستیک، که نمره‌های هر ۳ موضوع به صورت بازه فرض شده است. حال می‌خواهیم مقدار خاصی بورسیه به این ۳ دانش آموز با توجه به نمراتشان در این ۳ موضوع تخصیص دهیم. فرض کنید همه بازیکنان خودخواه باشند. بدان معنی که آنها در برتری خودشان در نمره‌هایشان اصرار می‌کنند. به هر حال بازیکنان باید در مورد تخصیص بورسیه به توافق برسند. شرایط مشابهی در اکثر مسائل اجتماعی وجود دارد. این مقاله با استفاده از تخصیص سود و هزینه (Nakabayashi & Tone, 2006) و (Jahanshahloo & et al, 2006) روشنی جدید برای محاسبه‌ی کمترین نسبت هزینه – سود برای داده‌های بازه‌ای برای بازیکنان تحت چهار چوب نظریه بازی و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) پیشنهاد می‌کند.

۲. مدل پایه بازی

در این بخش مدل‌های پایه و ساختارهای بازی را معرفی کرده و ویژگی‌های ریاضی بازی را بیان می‌کنیم.

۲-۱- رفتار خودخواهانه و تردید در عمل منتبه به اعتقاد خود

فرض کنید $[x_{ij}^l, x_{ij}^u]$ ماتریس نمره باشد، نمره بازیکن j در معیار i ، برای $i = 1, \dots, n$ و $j = 1, \dots, m$ با این فرض که هر اندازه نمره یک معیار بیشتر باشد

به همان اندازه بازیکن با توجه به آن معیار به عنوان کسی که عملکرد بهتری داشته مورد قضاوت قرار می‌گیرد. هر بازیکن، k امکان برای انتخاب دو مجموعه از وزن‌های نامنفی $w^k = (w_1^k, \dots, w_m^k)$ در ارتباط با آن معیارهایی دارد که برای آن بازیکن از بالاترین ارجحیت برخوردار است. با استفاده از وزن w^k ، نمره نسبی بازیکن k ام به کل نمره به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\frac{\sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^l}{\sum_{i=1}^m w_i^k (\sum_{j=1}^n (x_{ij}^l + x_{ij}^u))}, \quad \frac{\sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^u}{\sum_{i=1}^m w_i^k (\sum_{j=1}^n (x_{ij}^l + x_{ij}^u))} \quad \sum =$$

کسرهای فوق نشان‌گر این می‌باشد که نمره کل همه بازیکنان با گزینه وزنی بازیکن k سنجیده می‌شود. بنابراین عبارت (۱) اهمیت نسبی پایین و بالای سهم بازیکن k را تحت گزینه وزنی w^k نشان می‌دهد. بازیکن k ام می‌خواهد این نسبت را با انتخاب ارجح ترین وزن بیشینه کند، لذا این امر منجر به برنامه‌ریزی‌های کسری زیر خواهد شد:

$$\begin{aligned} \text{Max } & \frac{\sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^l}{\sum_{i=1}^m w_i^k (\sum_{j=1}^n (x_{ij}^l + x_{ij}^u))}, \quad \text{Max } \frac{\sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^u}{\sum_{i=1}^m w_i^k (\sum_{j=1}^n (x_{ij}^l + x_{ij}^u))} \quad \sum = \\ \text{s.t. } & w_i^k \geq 0 \quad \forall i \quad \text{s.t. } w_i^k \geq 0 \quad \forall i \end{aligned}$$

مساله را به شکل زیر بدون از دست دادن کلیت فرمول بندی می‌کنیم.

مجموعه داده‌های X نرمال‌سازی می‌شود (به طور سطحی نرمال می‌شود).

$$\sum_{j=1}^n (x_{ij}^l + x_{ij}^u) = 1, \quad (\forall i)$$

برای این کار، سطر $x_{ij}^l + x_{ij}^u$ به مجموع سطر $\sum_{j=1}^n (x_{ij}^l + x_{ij}^u)$ برای $i = 1, \dots, m$ تقسیم می‌شود. برنامه (۲) از این عملیات متأثر نمی‌شود. بنابراین با استفاده از طرح تبدیل چارنز-کوپر^۱ برنامه‌های کسری (۲) می‌تواند با استفاده از برنامه‌ریزی‌های خطی زیر بیان شود:

$$\begin{aligned} c^l(k) &= \text{Max} \sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^l \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^m w_i^k &= 1, w_i^k \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m) \quad = (3) \\ c^u(k) &= \text{Max} \sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^u \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^m w_i^k &= 1, w_i^k \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m) \quad = (4) \end{aligned}$$

حال مسئله، ماکریم‌سازی تابع هدف (۳) و (۴) روی سیمپلکس می‌باشد. آشکار است که جواب بهینه با اختصاص ۱ به وزن $\sum_{i=1}^m w_i^k = 1$ را داشته باشد. w_i^k را رای معیار $i(k')$ و $w_{i(k')}^k$ را رای معیار $i(k)$ می‌نامیم. بنابراین $x_{i(k')}^u = \text{Max}\{x_{i(k')}^u \mid i = 1, \dots, m\}$ و $x_{i(k)}^l = \text{Max}\{x_{i(k)}^l \mid i = 1, \dots, m\}$ و با تخصیص صفر به وزن معیارهای باقی مانده بدست می‌آید. بنابراین جواب بهینه به صورت زیر خواهد بود:

$$c^u(k) = x_{i(k)}^u \text{ و } c^l(k) = x_{i(k)}^l \quad k = 1, \dots, n$$

^۱. Charnes-Cooper

بیشترین نمره‌ی نسبی بازیکن k را نشان می‌دهد که از طریق رفتار انتخاب وزن بهینه بدست می‌آید. وزن بهینه $w_{i(k')}^k$ ممکن است از یک بازیکن به دیگری متفاوت باشد.

$$\sum_{k=1}^n (c^l(k) + c^u(k)) \geq 1 \quad \text{قضیه ۱:}$$

برهان: فرض کنید وزن بهینه بازیکن k $w_k^{l*} = (w_{1k}^{l*}, \dots, w_{mk}^{l*})$ و $w_{i(k)}^{l*} = \circ$, ($\forall i \neq i(k)$) $\#v_{i(k)k}^{l*} = 1$ باشد و $w_k^{u*} = (w_{1k}^{u*}, \dots, w_{mk}^{u*})$ و $w_{i(k)}^{u*} = \circ$, ($\forall i \neq i(k')$) $\#v_{i(k)k}^{u*} = 1$ در این صورت

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n c^l(k) + c^u(k) &= \sum_{k=1}^n c^l(k) + \sum_{k=1}^n c^u(k) + \sum_{k=1}^m w_{ik}^{l*} x_{ik}^l + \sum_{k=1}^m w_{ik}^{u*} x_{ik}^u \\ &= \sum_{k=1}^n x_{i(k)k}^l + \sum_{k=1}^n x_{i(k)k}^u + \sum_{k=1}^n x_{1k}^l + \sum_{k=1}^n x_{1k}^u = 1 \end{aligned} \quad \sum =$$

نامساوی $x_{i(k)k}^u \geq x_{1k}^u$ و $x_{i(k)k}^l \geq x_{1k}^l$ و تساوی آخر از نرمال‌سازی سطحی حاصل شدند.

این قضیه ثابت می‌کند، که اگر هر بازیکنی در تقسیم منتب به اعتقاد خود اصرار کند و در بدست آوردن بخشی از سود تخصیص داده شده از طریق پافشاری کند، مجموع سهم‌ها معمولاً از ۱ تجاوز می‌کند بنابراین $c^l(k), c^u(k)$ نمی‌تواند نقش تقسیم سود را تمام کند. در نهایت اگر مجموع $c^l(k) + c^u(k)$ باشد در این صورت همه بازیکنان با پذیرفتن تقسیم $c^l(k), c^u(k)$ موافق خواهند بود، چون از طریق ارجح‌ترین گزینه وزنی

بازیکنان بدست می‌آید. مورد اخیر در صورتی اتفاق خواهد افتاد که همه بازیکنان وزن انتخابی بهینه عادی و یکسان داشته باشند.

قضیه ۲: تساوی $c^l(k) + c^u(k) = 1$ برقرار است اگر و فقط اگر ماتریس

نمود در شرایط زیر صدق کند.

$$\begin{aligned} x_{1k}^l &= x_{2k}^l = \dots = x_{mk}^l &= & k = 1, \dots, n \\ x_{1k}^u &= x_{2k}^u = \dots = x_{mk}^u &= & \end{aligned}$$

یعنی، هر بازیکن دارای همان امتیاز با توجه به معیار m خواهد بود.

$$\text{برهان:} \quad \sum_{k=1}^n c^l(k) + c^u(k) = \sum_{k=1}^n x_{1k}^l + x_{1k}^u = \sum_{k=1}^n x_{2k}^l + x_{2k}^u = \dots = \sum_{k=1}^n x_{mk}^l + x_{mk}^u = \sum_{k=1}^n 1 = n$$

برعکس: فرض کنید $x_{11}^u > x_{21}^u$ و $x_{11}^l > x_{21}^l$ پس باید ستون ۱ $\neq 1$ و $h' \neq h$ وجود داشته باشد که $x_{1h'}^u < x_{2h'}^u$ و $x_{1h'}^l < x_{2h'}^l$ و گرنم مجموع سطر دوم نمی‌تواند به ۱ برسد. پس:

$$\begin{aligned} c^l(1) &\geq x_{11}^l \quad \text{و} \quad c^u(1) \geq x_{11}^u \\ c^l(h) &\geq x_{2h}^l \geq x_{1h}^l \quad \text{و} \quad c^u(h) \geq x_{2h}^u \geq x_{1h}^u \\ c^l(j) &\geq x_{1j}^l \quad (\forall j \neq 1, h) \quad \text{و} \quad c^u(j) \geq x_{1j}^u \quad (\forall j \neq 1, h') \quad \neq \end{aligned}$$

پس:

پرتاب جامع علوم انسانی
دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

$$\sum_{k=1}^n c^l(k) + c^u(k) = \sum_{k=1}^n c^l(k) + \sum_{k=1}^n c^u(k) \geq \sum_{j=1}^n x_{1j}^l + x_{2h}^l + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq h}}^n x_{2j}^u - x_{2h'}^u + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq h'}}^n x_{1j}^l - x_{1h'}^u = \sum_{j=1}^n x_{1j}^l - x_{1h'}^u =$$

که منجر به تناقض می‌شود. لذا بازیکن باید در همه معیارها نمره یکسان داشته باشد. همچنین رابطه یکسانی برای بازیکنان دیگر نیز برقرار باشد.

در مورد فوق، فقط یک معیار برای توصیف بازی و تقسیم مناسب به این نمره که یک تقسیم عادلانه می‌باشد لازم است. به هر حال ممکن است این شرایط

$$\cdot \sum_{k=1}^n c^l(k) + c^u(k) > 1$$

۲-۲-۱- ائتلاف با ویژگی جمعی

فرض کنید ائتلاف S یک زیرمجموعه از بازیکنان $(1, \dots, n) = N$ باشد.

سابقه هر ائتلاف S به صورت عبارت زیر تعریف می‌شود.

$$x_i^l(S) = \sum_{j \in S} x_{ij}^l, \quad x_i^u(S) = \sum_{j \in S} x_{ij}^u, \quad i = 1, \dots, m \quad (5)$$

هدف این ائتلاف رسیدن به حاصل ماکریم (S) می‌باشد.

$$c^l(S) = \text{Max} \sum_{i=1}^m w_i x_i^l(S), \\ s.t. \quad \sum_{i=1}^m w_i = 1, \quad w_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m) \quad (6)$$

$$c^u(S) = \text{Max} \sum_{i=1}^m w_i x_i^u(S), \\ s.t. \quad \sum_{i=1}^m w_i = 1, \quad w_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m) \quad (7)$$

می‌شود. بنابراین، بازی‌ای خواهیم داشت به شکل اثلافی با سود قابل انتقال که با (N, c) نمایش داده می‌شود.

تعریف ۱: تابع f زیر- جمعی است، اگر به ازای $S \subset N$ و $T \subset N$ با $S \cap T = \emptyset$ عبارت $f(S \cup T) \leq f(S) + f(T)$ برقرار باشد.

تعریف ۲: تابع f زیر- جمعی است، اگر به ازای $S \subset N$ و $T \subset N$ با $S \cap T = \emptyset$ عبارت $f(S \cup T) \geq f(S) + f(T)$ برقرار باشد.

قضیه ۳: تابع مشخصه c ، زیر- جمعی است، یعنی به ازای $S \subset N$ و $T \subset N$ با $S \cap T = \emptyset$ داریم:

$$c^l(S \cup T) + c^u(S \cup T) \leq c^l(S) + c^l(T) + c^u(S) + c^u(T) \quad +$$

برهان: با تجدید شماره گذاری اندیس‌ها می‌توان فرض کرد که $S = \{1, \dots, h\}$ و $T = \{h+1, \dots, k\}$ برای این مجموعه‌ها:

$$\begin{aligned} c^l(S \cup T) + c^u(S \cup T) &= \max_i \sum_{j=1}^k x_{ij}^l + \max_i \sum_{j=1}^k x_{ij}^u \quad + \\ &\leq \max_i \sum_{j=1}^h x_{ij}^l + \max_i \sum_{j=h+1}^k x_{ij}^l + \max_i \sum_{j=1}^h x_{ij}^u + \max_i \sum_{j=h+1}^k x_{ij}^u \quad . \\ &= c^l(S) + c^l(T) + c^u(S) + c^u(T) \quad + \end{aligned}$$

همچنین قضیه زیر را داریم:

قضیه ۴: بالاترین نمره نسبی همه بازیکنان برابر یک است،

$$\begin{aligned} c^l(N) + c^u(N) &= 1 \\ c^l(N) + c^u(N) &= \sum_{i=1}^m w_i \sum_{j=1}^n x_{ij}^l + \sum_{i=1}^m w_i \sum_{j=1}^n x_{ij}^u = \sum_{i=1}^m w_i \left(\sum_{j=1}^n (x_{ij}^l \sum_{i=1}^m x_{ij}^u) \right) = \sum_{i=1}^m w_i = 1 \quad = \end{aligned}$$

۳-۲- بازی مینیمم DEA

در این بخش طرف مقابل بازی خودخواهانه (N, c) مشاهده می‌شود که با جایگزینی Max در (۱) با Min به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned} d^l(k) &= \text{Min} \sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^l \\ s.t. \quad \sum_{i=1}^m w_i^k &= 1, \quad w_i^k \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m) \end{aligned} \quad = \quad (8)$$

$$\begin{aligned} d^u(k) &= \text{Min} \sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^u \\ s.t. \quad \sum_{i=1}^m w_i^k &= 1, \quad w_i^k \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m) \end{aligned} \quad = \quad (9)$$

مقدار بهینه $d^l(k) + d^u(k)$ کمترین نمره نسبی بازیکن k را نشان

می‌دهد، در این مورد، به عنوان نقطه مقابل قضیه (۱) داریم:

$$\sum_{k=1}^n (d^l(k) + d^u(k)) \leq 1 \quad \text{قضیه ۵:}$$

برهان: فرض کنید وزن بهینه بازیکن $w_k^{l*} = (w_{1k}^{l*}, \dots, w_{mk}^{l*})$ و $w_{i(k)}^{l*} = 0$ ، $(\forall i \neq i(k))$ باشد و $w_k^{u*} = (w_{1k}^{u*}, \dots, w_{mk}^{u*})$ و $w_{i(k)}^{u*} = 0$ در این صورت

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n d^l(k) + d^u(k) &= \sum_{k=1}^n d^l(k) + \sum_{k=1}^n d^u(k) + \sum_{k=1}^n w_{ik}^{l*} x_{ik}^l + \sum_{k=1}^n w_{ik}^{u*} x_{ik}^u \\ &= \sum_{k=1}^n x_{i(k)k}^l + \sum_{k=1}^n x_{i(k)k}^u = 1 \sum = \end{aligned}$$

نامساوی فوق از $x_{i(k)k}^u \leq x_{1k}^u$ و $x_{i(k)k}^l \leq x_{1k}^l$ نرمال سازی سطربال از آخر از نظیر مورد بازی Max، برای ائتلاف $S \subset N$

$$\begin{aligned} d^l(S) &= \text{Min} \sum_{i=1}^m w_i x_i^l(S), \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^m w_i &= 1, w_i \geq 0 (i = 1, \dots, m) \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} d^u(S) &= \text{Min} \sum_{i=1}^m w_i x_i^u(S), \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^m w_i &= 1, w_i \geq 0 (i = 1, \dots, m) \end{aligned} \quad (11)$$

بدیهی است $d^l(N) + d^u(N) = 1$. بازی مینیمم DEA با (N, d) نمایش داده می‌شود $d^l(k) > 0$ زیر- جمعی می‌باشد. لذا این بازی با $d^u(k) > 0$ شروع شده و از طریق ائتلاف مادامی که بیشترین ائتلاف ۱ بددست آید به بیشترین سود می‌رسد.

میان بازی‌های (N, c) و (N, d) قضیه زیر را داریم:

$$d^l(S) + d^u(S) + c^l(N/S) - c^u(N/S) = 1 \quad S \neq N \quad \forall \subset$$

برهان: با تجدید شماره گذاری اندیس‌ها می‌توان فرض کرد $S = \{1, \dots, h\}$ و $N = \{1, \dots, n\}$ و $N/S = \{h+1, \dots, n\}$. برای این مجموعه‌ها داریم:

پریال جامع علوم انسانی

$$\begin{aligned}
& d^l(S) + d^u(S) + c^l(N/S) - c^u(N/S) + \\
& = \min_i \sum_{j=1}^h x_{ij}^l + \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u - \max_i \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^l + \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u + \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u + \\
& = \min_i \left(\left(\sum_{j=1}^h x_{ij}^l + \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u \right) \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^l - \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u \right) - \max_i \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^l + \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u + \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u + \\
& = \min_i \left(1 - \left(\sum_{j=h+1}^n x_{ij}^l + \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u \right) \right) + \max_i \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^l + \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u + \\
& = 1 - \max_i \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^l - \max_i \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u - \max_i \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^l + \max_i \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u - 1 \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u = \sum_{j=h+1}^n x_{ij}^u
\end{aligned}$$

پس نتیجه زیر بدست می‌آید.

نتیجه ۱: (N, c) و (N, d) بازی‌های دوگان می‌باشند.

۳- توسعه مدل پایه

در این بخش مدل پایه را به بازی کمترین نسبت هزینه-سود برای داده‌های بازه‌ای گسترش می‌دهیم.

۳-۱- کمترین نسبت هزینه-سود

فرض کنید s معیار برای نمایش سودها و m معیار برای نمایش هزینه‌ها وجود دارد و $[x_{ij}^l, x_{ij}^u]$ ($i = 1, \dots, s$) و $[y_{ij}^l, y_{ij}^u]$ ($i = 1, \dots, m$) به ترتیب سودها و هزینه‌های بازیکن j ($j = 1, \dots, n$) و $u = (u_1, \dots, u_s)$ و $v = (v_1, \dots, v_m)$ وزن‌های مجازی سودها و هزینه‌ها برای بازیکن زام باشند. مانند عبارت (۱) نسبت هزینه-سود به صورت عبارت زیر تعریف می‌شود:

$$\frac{\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^l}{\sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^l}, \frac{\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^u}{\sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^u} \quad (12)$$

هر بازیکنی می‌خواهد نسبت هزینه-سود متناظر خود را کاهش دهد یعنی می‌خواهد بهترین شرایط را برای خود فراهم کند. با این شرط که وزن متناظر سودها و هزینه‌ها نامنفی است. این شرایط را با برنامه‌ریزی خطی زیر می‌توان بیان کرد:

$$\begin{aligned}
 d^l(j) &= \text{Min} \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^l \\
 s.t. \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^l &= 1, \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^l \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n) \\
 \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^l &\geq 0 \quad (j = 1, \dots, n), \quad u_i, v_i \geq 0 \quad i \quad (23) \quad \forall
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d^u(j) &= \text{Min} \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^u \\
 s.t. \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^u &= 1, \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^u \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n) \\
 \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^u &\geq 0 \quad (j = 1, \dots, n), \quad u_i, v_i \geq 0 \quad i \quad (24) \quad \forall
 \end{aligned}$$

قضیه ۷:

$$\sum_{k=1}^n (d^l(j) + d^u(j)) \leq 1$$

برهان: فرض کنید وزن بهینه بازیکن j ، $w_{1j}^{l*}, \dots, w_{mj}^{l*}$ و $w_{i(j)}^{l*} = \circ$ ، ($\forall i \neq i(j)$) $\nexists w_{i(j)j}^{l*} = 1$ باشد و $w_{1j}^{u*}, \dots, w_{mj}^{u*}$

و $w_{i(j)}^{u*} = \circ$ ، ($\forall i \neq i(j)$) $\nexists w_{i(j)j}^{u*} = 1$ در این صورت

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^n d^l(j) + d^u(j) &= \sum_{j=1}^n d^l(j) + \sum_{j=1}^n d^u(j) + w_{ij}^{l*} x_{ij}^l + w_{ij}^{u*} x_{ij}^u = w_{ij} \sum_{j=1}^n x_{ij}^u \\
 &= \sum_{j=1}^n x_{i(j)j}^l + \sum_{j=1}^n x_{i(j)j}^u + \sum_{j=1}^n x_{1j}^l + \sum_{j=1}^n x_{1j}^u + \sum_{j=1}^n x_{ij}^u = 1
 \end{aligned}$$

نامساوی فوق از $x_{i(j)j}^u \leq x_{1j}^u$ و $x_{i(j)j}^l \leq x_{1j}^l$ و تساوی آخر از نرمال‌سازی سط्रی حاصل شدند. فرض کنید ائتلاف S یک زیرمجموعه از بازیکنان $N = \{1, \dots, n\}$ باشد.

تابع مشخصه ائتلاف S با برنامه ریزی خطی زیر تعریف می‌شود:

$$d^l(S) = \text{Min} \sum_{i=1}^m v_i \sum_{j \in S} x_{ij}^l$$

$$s.t \quad \sum_{i=1}^s u_i \sum_{j \in S} y_{ij}^l = 1, \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^l \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n) \quad =$$

$$\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^l \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n), \quad u_i, v_i \geq 0 \quad i \quad (25) \quad \forall$$

$$d^u(S) = \text{Min} \sum_{i=1}^m v_i \sum_{j \in S} x_{ij}^u$$

$$s.t \quad \sum_{i=1}^s u_i \sum_{j \in S} y_{ij}^u = 1, \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^u \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n) \quad =$$

$$\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^u \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n), \quad u_i, v_i \geq 0 \quad i \quad (26) \quad \forall$$

در برنامه‌ریزی‌های خطی فوق سودها و هزینه‌های متناظر همه بازیکنان نامنفی است.

قضیه ۸: تابع مشخصه d زیر- جمعی است.

برهان: با تجدید شماره گذاری اندیس‌ها می‌توان فرض کرد $S = \{1, \dots, h\}$ و $T = \{1, \dots, k\}$ برای این مجموعه‌ها

پال جامع علوم انسانی


$$\begin{aligned}
 d^l(S \cup T) + d^u(S \cup T) &= \min_i \sum_{j=1}^k x_{ij}^l - \min_i \sum_{j=1}^k x_{ij}^u \\
 &\geq \left(\min_i \sum_{j=1}^h x_{ij}^l + \min_i \sum_{j=h+1}^k x_{ij}^u \right) - \min_i \sum_{j=h+1}^k x_{ij}^l + \sum_{j=h+1}^k x_{ij}^u + \\
 &= d^l(S) + d^l(T) - d^u(S) - d^u(T).
 \end{aligned}$$

۲-۳: اجتناب از وقوع وزن صفر و قرار دادن تقدم در وزن‌ها

در جریان محاسبه وزن‌ها یک وزن خاص ممکن است برای تمامی جواب‌های بهینه صفر باشد این بدان معنی است که معیار متناظر آن در جواب بازی به هیچ‌وجه مورد محاسبه قرار نگیرد، حتی با وجود اینکه این معیار به عنوان یک عامل مهم در اوایل بازی به نظر آید. به طور کلی‌تر، فرض کنید همه بازیکنان با قرار دادن برتری در معیار خاصی موافق‌اند. مثلاً معیار اول مهم‌تر از معیار دوم باشد. در این صورت باید محدودیت‌های زیر را به برنامه‌ریزی خطی اولیه‌ی (۴) و (۳) اضافه کنیم.

$\frac{w_1}{w_2} \geq 1$ یا $w_1 \geq w_2$ همین محدودیت را باید در ائتلاف اولیه‌ی برنامه‌ریزی خطی (۶) و (۷) نیز اعمال کرد.

همچنین، موضوع وزن صفر می‌تواند در این روش حل شود. اگر همه بازیکنان با رجحان تلفیقی در خصوص این معیار موافق باشند، در این صورت می‌توان "روش ناحیه اطمینان"^۱ را که در ادبیات DEA برای اولین بار مطرح شد، به کار برد (Cooper & et al, 2000, 175).



^۱ Assurance Region Method

برای مثال فرض کنید معیار برتر w_1 باشد، محدودیت‌ها را در نسبت w_1 قرار دهید:

$$L_i \leq \frac{w_i}{w_1} \leq U_i \quad , \quad i = 2, \dots, m$$

که L_i و U_i به ترتیب کران‌های پایین و بالای نسبت $\frac{w_i}{w_1}$ را نشان

می‌دهند. این کران‌ها باید با توافق میان همه بازیکنان قرار داده شود. پس برنامه‌ریزی‌های (۸) و (۹) به ترتیب به صورت زیر اصلاح می‌شوند:

$$\begin{aligned} d^l(k) &= \text{Min} \sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^l \\ s.t. \quad \sum_{i=1}^m w_i^k &= 1, \quad w_i^k \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m) \\ L_i \leq \frac{w_i}{w_1} &\leq U_i \quad i = 2, \dots, m \quad (17) \\ d^u(k) &= \text{Min} \sum_{i=1}^m w_i^k x_{ik}^u \\ s.t. \quad \sum_{i=1}^m w_i^k &= 1, \quad w_i^k \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m) \quad = \quad L_i \leq \frac{w_i}{w_1} \leq U_i \\ i &= 2, \dots, m \quad (18) \end{aligned}$$

به روش مشابه، برنامه‌ریزی‌های خطی (۱۳) و (۱۴) با فرض برتری معیار w_1 به ترتیب به صورت زیر اصلاح می‌شوند:

$$\begin{aligned} d^l(j) &= \text{Min} \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^l \\ s.t. \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^l &= 1, \\ \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^l &\geq 0 \quad (j = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^l \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n)$$

$$L_i \leq \frac{u_i}{u_1} \leq U_i \quad i = 2, \dots, s, L_i \leq \frac{v_i}{u_1} \leq U_i \quad i \leq 1, \dots, m \quad (19) \quad =$$

$$u_i, v_i \geq 0 \quad \forall i$$

$$d^u(j) = \min \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^u$$

$$s.t \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^u = 1$$

$$\sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^u \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n)$$

$$\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^u \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n)$$

$$L_i \leq \frac{u_i}{u_1} \leq U_i \quad i = 2, \dots, s, L_i \leq \frac{v_i}{u_1} \leq U_i \quad i \leq 1, \dots, m \quad (20) \quad =$$

$$u_i, v_i \geq 0 \quad \forall i$$

به روش مشابه، برنامه ریزی های خطی (15) و (16) با فرض برتری معیار u_1

به ترتیب به صورت زیر اصلاح می شوند:

$$d^l(S) = \min \sum_{i=1}^m v_i \sum_{j \in S} x_{ij}^l$$

$$s.t \quad \sum_{i=1}^s u_i \sum_{j \in S} y_{ij}^l = 1, \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^l \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n), \quad \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^l \geq 0 \quad (\neq 1, \dots, n) \quad (21)$$

$$L_i \leq \frac{u_i}{u_1} \leq U_i \quad i = 2, \dots, s, L_i \leq \frac{v_i}{u_1} \leq U_i \quad i \leq 1, \dots, m, u_i, v_i \geq 0 \quad i \leq 1, \dots, m \quad \geq \quad \forall$$

$$d^u(S) = \min \sum_{i=1}^m v_i \sum_{j \in S} x_{ij}^u$$

$$s.t \quad \sum_{i=1}^s u_i \sum_{j \in S} y_{ij}^u = 1, \quad \sum_{i=1}^s u_i y_{ij}^u \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n), \quad \sum_{i=1}^m v_i x_{ij}^u \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n) \quad \geq \quad =$$

$$\begin{aligned} L_i \leq \frac{u_i}{u_1} \leq U_i & \quad i = 2, \dots, s, L_i = \frac{v_i}{u_1}, U_i = 0 \Rightarrow \\ (22) \end{aligned} \quad \geq \quad \forall$$

بدیهی است بازیکنی که کمترین نسبت هزینه - سود را به خود اختصاص دهد، موفق‌ترین بازیکن در کسب سود و هزینه مطلوب خواهد بود. یعنی بازیکنی که بیشترین سود و کمترین هزینه را که مطلوب‌ترین شرایط و بهترین وضعیت بازی می‌باشد به خود اختصاص داده است.

-۴- مثال عددی

مثال زیر را با ۱۰ بازیکن و دو معیار هزینه و ۴ معیار سود در نظر بگیرید.

جدول ۱: معیارهای هزینه و سود برای هر کدام از بازیکنان

بازیکن j	x_{1j}^l	x_{1j}^u	x_{2j}^l	x_{2j}^u	y_{1j}^l	y_{1j}^u	y_{2j}^l	y_{2j}^u	y_{3j}^l	y_{3j}^u	y_{4j}^l	y_{4j}^u
۱	۵۰	۷۰	۲۰	۳۰	۸۰	۸۵	۲۰	۳۰	۳۵	۴۵	۳۴	۴۴
۲	۷۰	۹۰	۱۸	۲۸	۹۰	۹۵	۱۶	۲۶	۳۲	۴۲	۴۷	۵۷
۳	۸۰	۱۰۰	۲۲	۳۲	۱۰۰	۱۰۵	۱۷۵	۲۷۵	۳۹۵	۴۹۵	۴۰	۵۰
۴	۱۱۰	۱۳۰	۳۰	۴۰	۹۰	۱۰۰	۱۸۵	۲۸۵	۲۹۰	۳۹۰	۵۱۰	۶۱۰
۵	۹۰	۱۱۰	۱۷	۲۷	۹۶۰	۱۰۱۰	۱۸۶	۲۸۶	۲۸۰	۳۸۰	۴۸۰	۵۸۰
۶	۵۵	۷۵	۲۴	۳۴	۸۷۰	۹۲۰	۲۱	۳۱	۳۶	۴۶	۳۷	۴۷
۷	۶۵	۸۵	۲۶	۳۶	۷۸۰	۸۳۰	۱۶۵	۲۶۵	۳۰	۴۰	۴۴۰	۵۴۰
۸	۷۵	۳۲	۴۲	۶۷۰	۶۷۰	۷۲۰	۱۵۰	۲۵۰	۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۶۰۰
۹	۵۰	۲۹	۳۹	۸۱۰	۸۶۰	۸۶۰	۱۷۰	۲۷۰	۴۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۶۱۰
۱۰	۱۰۰	۱۶	۲۶	۹۱۰	۹۶۰	۹۶۰	۱۹۰	۲۹۰	۴۲۰	۵۲۰	۳۹۰	۴۹۰

با اجرای مدل‌های (۱۹) و (۲۰) برای مثال فوق کمترین نسبت هزینه - سود را برای ابتدا و انتهای بازه‌های مورد نظر برای بازیکنان محاسبه می‌کنیم.

جدول ۲: کمترین نسبت هزینه- سود (محدودیتها در نسبت ۱۱ قرار داده شده‌اند)

بازیکن ز	کمترین نسبت هزینه- سود برای ابتدای بازه	کمترین نسبت هزینه- سود برای انتهای بازه
۱	۰/۰۰۲۶	۰/۰۰۴۰
۲	۰/۰۰۳۱	۰/۰۰۴۵
۳	۰/۰۰۳۴	۰/۰۰۴۷
۴	۰/۰۰۴۷	۰/۰۰۶۲
۵	۰/۰۰۳۸	۰/۰۰۵۲
۶	۰/۰۰۲۷	۰/۰۰۴۰
۷	۰/۰۰۳۴	۰/۰۰۴۸
۸	۰/۰۰۴۰	۰/۰۰۵۳
۹	۰/۰۰۲۴	۰/۰۰۳۷
۱۰	۰/۰۰۴۳	۰/۰۰۵۷

در جدول ۲ بازیکن نهم کمترین نسبت هزینه- سود را به خود اختصاص داده است پس بازیکن نهم موفق ترین بازیکن می‌باشد. بعد از بازیکن نهم، به ترتیب بازیکنان ۱، ۲، ۶، ۷، ۳، ۵، ۸، ۱۰ و ۴ قراردادن بازیکن چهارم در آخر لیست قرار دارد پس ناموفق‌ترین بازیکن این بازی محسوب می‌شود.

ائتلاف موفق ترین بازیکنان S_1 ، ائتلاف ناموفق ترین بازیکنان S_2 ، ائتلاف ناموفق ترین بازیکن با بازیکنان موفق ، S_3 ، ائتلاف موفق ترین بازیکن با بازیکنان ناموفق S_4 و ائتلاف‌های تصادفی S_5 ، را تشکیل داده و شرایط آنها را با اجرای مدل‌های (۲۱) و (۲۲) از لحاظ کسب سود و هزینه مطلوب در جداول زیر بررسی می‌نماییم.

جدول ۳: کمترین نسبت هزینه - سود (ابتدای بازه)

کمترین نسبت هزینه - سود اعضا	اعضای اختلاف	کمترین نسبت هزینه - سود ابتدا برای ابتدای بازه	اختلاف
S_1	$0/0026$	۹	$0/0028$
		۱	$0/0028$
		۶	$0/0029$
S_2	$0/0045$	۴	$0/0053$
		۱۰	$0/0046$
		۸	$0/0046$
S_3	$0/0034$	۴	$0/0053$
		۹	$0/0028$
		۱	$0/0028$
S_4	$0/0039$	۹	$0/0028$
		۴	$0/0053$
		۱۰	$0/0046$
S_5	$0/0034$	۸	$0/0046$
		۷	$0/0038$
		۱	$0/0028$

جدول ۴: کمترین نسبت هزینه - سود (انتهای بازه)

کمترین نسبت هزینه - سود اعضا	اعضای اختلاف	کمترین نسبت هزینه - سود ابتدا برای انتهای بازه	اختلاف
S_1	$0/0039$	۹	$0/0037$
		۱	$0/0040$
		۶	$0/0040$
S_2	$0/0058$	۴	$0/0062$
		۱۰	$0/0057$
		۸	$0/0053$
S_3	$0/0047$	۴	$0/0037$
		۹	$0/0040$
		۱	$0/0040$
S_4	$0/0052$	۹	$0/0062$
		۴	$0/0037$
		۱۰	$0/0040$
S_5	$0/0046$	۸	$0/0037$
		۷	$0/0062$
		۱	$0/0057$

S_1 ، موفق‌ترین ائتلاف می‌باشد که با ائتلاف موفق‌ترین بازیکنان پدید آمده و S_2 ، ناموفق‌ترین ائتلاف می‌باشد که از ائتلاف ناموفق‌ترین بازیکنان پدید آمده است.

نتیجه

این مقاله به بحث درباره‌ی یکی از مهمترین مسائل اجتماعی یعنی تقسیم منافع میان واحدهای تصمیم‌گیری (افراد یا سازمان‌ها) با بهره‌گیری از تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی (رفتار انتخاب وزن دلخواه و جواب برنامه‌ریزی خطی بازی‌ها) پرداخته است. بازی DEA و ویژگی‌هایش را در دو بخش بازی مینیمم DEA و بازی ماکزیمم برای داده‌های بازه‌ای تعریف کرده و به بحث درباره ویژگی‌هایش پرداخته‌ایم. با استفاده از بازی مینیمم DEA داده‌های بازه‌ای مدلی برای محاسبه کمترین نسبت هزینه-سود هر واحد (به صورت بازه) ارائه شده است. مدل‌های جدیدی برای محاسبه کمترین نسبت هزینه-سود در واحدهای با تعداد بازیکن بیشتر (ائتلاف) معرفی شده است. سپس کاربرد نسبت هزینه-سود جهت تعیین میزان موفقیت واحدها (بازیکنان) بیان شده است. در مدل‌های ارائه شده برای برطرف کردن مشکل صفر شدن وزن‌های متناظر سودها و هزینه‌ها از روش ناحیه اطمینان استفاده شده است. برای این منظور تغییراتی در مدل‌های مطروحه، اعمال شده و مدل‌های جدیدی به دست آمده است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع:

- Barron, E.N., (2007), Game Theory an Introduction, Wiley-Interscience.
- Charnes, A., & Cooper, W.W., (1962), Programming with Fractional Function, Naval Res. Logist.Quart., Vol. 9, pp. 181-185.
- Charnes, A., Cooper, W.W., & Rhodes, E., (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research. Vol. 2, pp. 429-444.
- Cooper, W.W., Seiford, L.M., & Tone, K., (2000), Data Envelopment Analysis- a Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Boston., Kluwer Academic Publishers.
- Jahanshahloo, G.R., Hosseinzadeh Lotfi, F., & Sohraiee, S., (2006), Egoist's Dilemma with Interval Data, Applied Mathematics and Computation. Vol. 183, pp. 94-105.
- Nakabayashi, K., & Tone, K., (2006), Egoist's dilemma: a DEA game, The International Journal of Management Science., Vol. 34, pp. 135-148.
- Owen, G., (1975), On the Linear Production Games, Mathematical Programming., Vol. 9, pp. 358-70.

پژوهشکاران علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی