

بررسی مؤلفه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری انگزدن به افراد مبتلا به بیماری‌های روانی

دکتر سامان توکلی^۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین کاویانی

گروه روانپردازی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر ونداد شریفی

گروه روانپردازی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مجید صادقی

گروه روانپردازی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر اکبر فتوحی

گروه ایدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

هدف: در این مطالعه، رابطه بین اجزای شناختی، هیجانی و رفتاری انگزدن به بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا، بررسی و از این طریق اعتبار دو مدل استنادی و ارزیابی خطر در این نمونه

بررسی شد. **روش:** این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بود و روی ۲۲۴ نفر از کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سطح آشنازی با بیماری روانی و استناد - ۲۷ استفاده شد.

یافته‌ها: داشتن اطلاعات در مورد کنترل پذیری بیماری و خطرناک بودن بر اجزای هیجانی انگ بیماری روانی تأثیر داشت. یافته‌ها نشان داد که داشتن اطلاعات درباره خطرناک بودن، بدون واسطه باور به مسؤولیت شخصی، و به طور مرتبط با اجزای هیجانی انگ بیماری روانی رابطه دارد. با افزایش میزان آشنازی با بیماری روانی تمایل آزمودنی‌ها به رفتارهای وادارسازی کاهش می‌یابند؛ و آزمودنی‌هایی که به آنان اطلاعاتی مبنی بر خطرناک بودن بیمار داده شده بود، تمایل بیشتری برای وادارسازی بیماران نشان می‌دادند. آشنازی بیشتر با بیماری روانی با تمایل کمتر به جداسازی بیماران و داشتن اطلاعات مبنی بر خطرناک بودن بیمار با تمایل بیشتر به جداسازی بیماران همراه بود. خطرناک بودن بیمار و مسؤولیت شخصی، با واسطه اجرای هیجانی بر وادارسازی بیماران تأثیر می‌گذاشت. اجزای هیجانی در تأثیر خطرناک بودن، و مسؤولیت شخصی، در رفتار انگزدن نقش واسطه‌ای دارد و در برخی موارد مستقلأً عمل می‌کند. **نتیجه‌گیری:** هر دو مدل استنادی و ارزیابی خطر در شکل‌گیری بخشی از انگ بیماری روانی نقش دارند؛ و بهویژه به نظر می‌رسد که مدل ارزیابی خطر در نشان دادن واکنش‌های هیجانی و رفتارهای تبعیض‌آمیز به بیماران روانی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها: انگ، بیماری روانی، شناخت، میزان

سیاست، تاریخ، روانشناسی، پزشکی و انسان‌شناسی مرتبط است (حقیقت^۱، ۲۰۰۲؛ اسمیت^۲، ۲۰۰۲). تجربه رفتارهای تبعیض‌آمیز در بیماران روانی فراوان است و مطالعه‌ای نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد مبتلا به بیماری‌های شدید روانی، برخی تجارب تبعیض‌آمیز را گزارش می‌کنند (کوریگان^۳ و همکاران، ۲۰۰۳b).

مقدمه

بیماران روانی، نه تنها از بیماری خود، بلکه از انگ^۴ و تبعیض^۵ همراه آن نیز رنج می‌برند (فلان^۶، ۲۰۰۲). در مورد انگ و انگزدن نظریه‌ای واحد و مورد پذیرش عموم وجود ندارد. این موضوع عجیب نیست، چرا که انگ با تعاملات پیچیده علوم اجتماعی،

۲- stigma
4-Phelan
6- Smith


3-discrimination
5- Haghhighat
7- Corrigan

۱- نشانی ناس: تهران، خیابان کارگر جنوبی، بیمارستان روزیه.

Email: samantavakoli@gmail.com

شباهت‌های بین فرهنگی در این زمینه پژوهش‌های فراوانی شده است. یکی از موضوعات ویژه در پژوهش‌های این حیطه بازآزمودن نظریه‌ها و مدل‌هایی است که در جوامعی با زمینه‌ها و ویژگی‌های فرهنگی متفاوت مطرح شده‌اند.

مدل استنادی و مدل ارزیابی خطر در انگکازنی
بر اساس مدل استنادی^{۱۹}، اجزای هیجانی مختلف باعث بروز تمایل رفتاری متفاوتی نسبت به اشخاص بیمار یا ناتوان می‌گردند. خشم باعث برانگیختن دشمنی و طرد بیماران می‌شود، در حالی که دلسوزی، رفتار جانب‌دارانه را بر می‌انگیزد و بنابراین از طرد اجتماعی می‌کاهد. علاوه بر این، فرض شده است که هر دوی این اجزای هیجانی مؤلفه شناختی واحدی دارند. بر این اساس، دلسوزی و خشم، هر دو، در اثر باور به مسؤولیت فرد در بروز وضعیت نابهنجار خود ایجاد می‌شود. هرچه افراد در ایجاد وضعیت خود بیشتر مسؤول در نظر گرفته شوند، خشم بیشتر و دلسوزی کمتری برانگیخته خواهد شد. این روابط از نظر تجربی تأیید شده‌اند (Dijker^{۲۰} و Koomen^{۲۱}، ۲۰۰۳).



شکل ۱- مدل استنادی برای انگک بیماری روانی؛ برگرفته از کوریگان و همکاران (۲۰۰۲)

1- Link	2- Struening
3- Neese-Todd	4- Aasmussen
5- Gachel	6- Baumann
7- Markowitz	8- Wahl
9- Perlick	10- Dickerson
11- Sommerville	12- Origoni
13- Ringel	14- Parente
15- Ostman	16- Kjellin
17- McSween	18- de Mendonca Lima
19- Levav	20- Jacobsson
21- Rutz	22- Ucok
23- Polat	24- Sartorius
25- Erkoc	26- Atakli
27- World Psychiatric Association	28- treatment adherence
29- attribution model	30- Dijker
31- Koomen	

انگک بیماری روانی، در کل، و انگک همراه با اسکیزوفرنیا، به طور خاص، بر جنبه‌های مختلف بیماری تأثیر می‌گذارد و مانعی جدی در برابر موفقیت درمان می‌شود. افراد دچار اختلالات روانی برای دوری از تعیض و طرد ممکن است روابط اجتماعی خود را به افرادی محدود کنند که همچون خود آنان انگ خوردگانند، یا کسانی که از انگ آنان آگاه و آن را پذیرفته‌اند (Linck^۱، استرونینگ^۲، نیز-تاد^۳، آسموسن^۴ و فلان، ۲۰۰۱). انگک بیماری روانی شدید، بار بیماری را افزایش می‌دهد و این مسئله، به ویژه در اسکیزوفرنیا، به ناتوانی در از مدلت اجتماعی می‌انجامد (Giel و باومن^۵، ۲۰۰۳). انگک بیماری روانی سدی در برابر بهبود شناخته شده، و تأثیر بالقوه آن بر رفتارهای درمان‌جویانه (Linck و همکاران، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۷)، کاهش اثربخشی اقدامات بازتوانی و تیز نشی بازدارنده‌اش در بازگشت عزت‌نفس و بهبود کیفیت زندگی بیماران روانی بررسی شده است (مارکوویتس^۶، ۱۹۹۸ و ال^۷، ۱۹۹۹؛ پرلیک^۸، ۲۰۰۱؛ دیکرسون^۹، سامرولی^{۱۰}، اریگونی^{۱۱}، رینگل^{۱۲} و پارنته^{۱۳}، ۲۰۰۲). انگک بیماری روانی، علاوه بر بیمار روانی، خانواده و دوستان و نیز اعضای حرفه‌های مرتبط با ارایه خدمات به آنان را دربرمی‌گیرد (استمن^{۱۵} و کیلین^{۱۶}، ۲۰۰۲).
تعیض‌ها و محرومیت‌های اعمال شده بر بیماران روانی در قالب قوانین اجتماعی، پوشش بیمه‌های پزشکی و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بیماران روانی (مثل تخصیص بودجه برای سلامت روان) نیز مشاهده می‌شود (مکسوین^{۱۷}، ۲۰۰۲). به نظر می‌رسد که انگک و تعیض برای بیماران روانی هم در بخش سلامت و هم در جمعیت عمومی وجود دارد (دومندونکالیما^{۱۸}، لیواو^{۱۹}، یاکوبسن^{۲۰} و راتز^{۲۱}، ۲۰۰۳). مطالعات نشان می‌دهند که کارکنان پزشکی، شامل روانپزشکان، اغلب منبع مهمی برای انگک‌زنی هستند (Giel و باومن، ۲۰۰۳؛ اوکاک^{۲۲}، پولات^{۲۳}، سارتوریوس^{۲۴}، ارکوک^{۲۵} و اتاکلی^{۲۶}، ۲۰۰۴).

در دو دهه اخیر، و به ویژه با آغاز برنامه ضد انگک انجمن جهانی روانپزشکی^{۲۷}، به مسئله انگک بیماری روانی و بی‌آمدهای آن توجه خاصی شده است. برای شناخت عوامل و مؤلفه‌های ایجاد انگک، تأثیرات انگک بیماری روانی بر رفتارهای درمان‌جویانه، ادامه درمان^{۲۸}، بازگشت به جامعه و بازتوانی، و نیز تفاوت‌ها و


(صادقی، کاویانی و رضایی، ۱۳۸۳). مطالعه‌ای دیگر، نشان داد که آزمودنی‌ها (افرادی از جمعیت عمومی) درباره بیماری روانی مفهومی منفی و قابلی نداشتند و در مجموع بخشی قابل توجه از آنان دارای نگرش مثبت بودند (پژشکی و بوالهری، ۱۳۷۳). بر اساس جستجو در مقالات منتشر شده، مطالعه‌ای که اعتبار و نقش مدل‌های انگزنه را در ایران بررسی کند، یافت نشد.

با توجه به کمبود پژوهش در زمینه انگ بیماری روانی در کشور و فرهنگ ما، نیاز به پژوهش در این زمینه به خوبی حس می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگزنه به افراد مبتلا به بیماری روانی در زیرگروه‌هی ویژه از جمعیت ایران انجام شده است. هدف پژوهش آن بود که با بررسی انگزنه به بیماران روانی، ارتباط بین مؤلفه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری، و نیز تأثیر آشنازی قبلی با بیماری روانی و عوامل جمعیت‌نگاشتی بر این پدیده در کارآموزان و کارورزان رشته پژوهشی دانشگاه علوم پژوهشی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران ارزیابی شود. در این مطالعه دو نظریه و مدل اصلی پیشنهادی (یعنی مدل استادی و مدل ارزیابی خطر) برای پدیده انگزنه بررسی شده است. علاوه بر آن، با مقایسه نتایج این مطالعه در ایران با سایر کشورهایی که این مدل در آنها آزموده شده است تأثیر عوامل فرهنگی بر پدیده انگزنه و راههای کاهش آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

روش

تمام کارآموزان و کارورزانی که دوره روانپژوهی خود را در سال ۱۳۸۳ در بیمارستان روزبه می‌گذرانند، بدون هیچ گونه محدودیت (از نظر سن، جنس، وضعیت اقتصادی، تأهل، و سابقه بیماری جسمی یا روانپژوهی) در طرح پذیرفته شدند. نمونه به صورت پیاپی^۷ انتخاب شد و در مجموع ۳۲۴ نفر به عنوان آزمودنی در طرح مشارکت داده شدند؛ در انجام این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:

مدل ارزیابی خطر^۱، مدل فرضی دیگری برای انگ بیماری روانی است. بر اساس این مدل، اگر رفتار فردی خطرناک تلقی شود، باعث بروز احساس ترس می‌شود؛ و احساس ترس از خطرناک بودن فرد، خود، باعث رفتارهای اجتنابی می‌شود. بر اساس این مدل، یک پاسخ هیجانی (مانند ترس)، بدون آن که عاملی استادی در آن نقش واسطه داشته باشد، منجر به پامدهای رفتاری (مانند اجتناب) می‌شود (کوریگان و همکاران، ۲۰۰۲).



شکل ۲- مدل ارزیابی خطر برای انگ بیماری روانی؛ برگرفته از کوریگان و همکاران (۲۰۰۲)

تأثیر عوامل فرهنگی بر انگ

ویژگی‌های فرهنگی در رفتارهای تعیض آمیز مرتبط با انگ بیماری روانی، یکی دیگر از جنبه‌های قابل بررسی در این زمینه است. ویژگی‌های فرهنگی ارتباط بارزی با مسائل مرتبط با بیماری روانی، درمان‌جویی، بروز و نوع نشانه‌ها، و انگ همراه آن دارد (نگ، ۱۹۹۷). در اروپای شمالی و در فرهنگ پروستان (که از نظر تاریخی بیشترین تأثیر فرهنگی را بر ایالات متحده داشته است)، شخص^۲ یا خود^۳ موضوعی ثابت و البته تغییرپذیر (با کوشش فردی) تلقی می‌شود. در این بافت فرهنگی، فرد منشأ کنش و فعل است، ثبات در تعامل با دیگران ارزشمند تلقی می‌گردد و شخص جدا از بافت جامعه در نظر گرفته می‌شود. به دلیل همین تأکیدی که بر انسان به عنوان موضوعی فردی و منطقی می‌شود، بیماری روانی، که مستقیماً به این جنبه منطبقی و در اختیار فرد لطمہ می‌زند، می‌تواند بسیار تهدیدکننده تلقی شود (کوکر، ۲۰۰۵). برخلاف اروپای شمالی که در آن مفهومی «خودمحور»^۴ از انسان وجود دارد، در کشورهای مدیترانه «خود» در ارتباط با دیگران تعریف می‌شود، تحت تأثیر دیگران و محیط تعدیل می‌گردد و تغییراتی می‌پذیرد (کوکر، ۲۰۰۵).

اما مطالعات انجام شده در زمینه انگ بیماری روانی در ایران اندک است. در یک مطالعه، تجربه انگ بیماری روانی در بخش قابل توجهی از خانواده‌های بیماران روانی نشان داده شده است

۱- danger appraisal model

۳- the person

۵- Coker

۷- sequential

2- Ng

4- self

6- Ego-centric

سامان توکلی و همکاران

بعد از این داستان، ۲۷ جمله درباره سازه‌های مختلف شناختی، هیجانی، و رفتاری وجود دارد که این سازه‌ها عبارت اند از:

- ۱- باور به مسئولیت شخصی بیمار
- ۲- احساس دل‌سوزی
- ۳- احساس خشم
- ۴- احساس ترس
- ۵- احساس خطر

۶- خودداری از یاری‌رساندن به فرد مبتلا به بیماری روانی
۷- اجتناب از فرد مبتلا به بیماری روانی

۸- پشتیبانی از وادارسازی به درمان فرد مبتلا به بیماری روانی
۹- پشتیبانی از جداسازی فرد مبتلا به بیماری روانی

آزمودنی بر حسب میزان موافقت با آن جمله، در مقیاس لیکرت^{۱۵} نُمْرَه‌ای مربوط به آن، نمره‌ای بین ۱ تا ۹ را انتخاب می‌کند. برای مقایسه پذیرکردن این نمره‌ها، نمره جمله‌های مربوط به هر سازه باهم جمع و بر تعداد جمله‌های همان سازه تقسیم می‌شود؛ به این ترتیب، هر آزمودنی برای هر یک از سازه‌ها نمره‌ای بین ۱ تا ۹ می‌گیرد.

این پرسشنامه‌ها نخست به وسیله مجریان طرح به زبان فارسی برگردانده شدند و برای بررسی روایی صورت و محتوا، ترجمه فارسی اولیه در اختیار پنج نفر از اعضای هیأت علمی روانپژوهی قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا پیشنهاد خود را برای اصلاح هر کدام از جملات اعلام کنند. متن بر اساس دیدگاه آنان، بازنگری و تغییرات لازم اعمال گردید. سپس، ترجمه وارون این متن (فارسی به انگلیسی) به وسیله فردی دوزبانه و مسلط به هر دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شد. برای بررسی صحت ترجمه، متن ترجمه شده به انگلیسی همراه با متن اصلی در اختیار فردی انگلیسی زبان که با موضوع طرح نیز آشنایی داشت، قرار داده شد تا از نظر هم خوانی متن بازترجمه شده با متن اصلی بررسی شود. در پرسشنامه سطح آشنایی با بیماری روانی، بین متن انگلیسی ترجمه شده و متن اصلی

۱- پرسشنامه سطح آشنایی با بیماری روانی^۱

این پرسشنامه بهوسیله پاتریک و کوریگان تهیه و در چند مطالعه به کار گرفته شده است (هولمز^۲، کوریگان، ویلیامز^۳، کانار^۴ و کوبیاک^۵، ۱۹۹۹؛ کوریگان، ادواردز، گرین^۶، دیوان^۷ و پن^۸، ۲۰۰۱؛ کوریگان، گرین، لوندین^۹، کوبیاک و پن، ۲۰۰۱). این پرسشنامه ۱۱ جمله دارد که آزمودنی هر جمله‌ای را که درباره او صدق کند، علامت می‌زند. جمله‌ها درباره سطوح مختلف آشنایی و تماس با افراد مبتلا به بیماری روانی است و هر آزمودنی بر حسب میزان آشنایی و تماس با این نوع افراد نمره‌ای بین ۱ (کمترین میزان آشنایی و تماس) تا ۱۱ (بیشترین میزان آشنایی و تماس) می‌گیرد. اطلاعات جمعیت‌نگاشتی لازم در ابتدای این پرسشنامه گنجانده شده بود که بهوسیله آزمودنی تکمیل می‌شد.

۲- پرسشنامه استاد-۲۷^{۱۰}

این پرسشنامه نیز بهوسیله پاتریک و کوریگان تهیه و در چند مطالعه به کار گرفته شده است (کوریگان، مارکوویتس، واتسون^{۱۱}، رووان^{۱۲} و کوبیاک، ۲۰۰۳؛ کوریگان و همکاران، ۲۰۰۳^{۱۳}؛ کوریگان، واتسون، وارپنسکی^{۱۴}، و گارسیا^{۱۵}، ۲۰۰۳). این پرسشنامه با یک داستان کوتاه درباره یک بیمار روانی (دچار اسکیزوفرنیا) آغاز می‌شود. داستان چهار شکل دارد:

شکل الف - در این شکل به ایجاد خطر بهوسیله فرد مبتلا به بیماری روانی اشاره‌ای نشده است.

شکل ب - در این شکل به ایجاد خطر بهوسیله فرد مبتلا به بیماری روانی اشاره شده است، اما درباره کنترل پذیربودن علت بیماری روانی اطلاعاتی در آن وجود ندارد.

شکل پ - در این شکل علاوه بر اشاره به ایجاد خطر بهوسیله فرد دچار بیماری روانی، اطلاعاتی افزوده شده است که نشان می‌دهد او بر ایجاد بیماری کنترل نداشته و علت بیماری روانی اش او کنترل ناپذیر بوده است.

شکل ت - در این شکل، علاوه بر اشاره به ایجاد خطر بهوسیله فرد دچار بیماری روانی، اطلاعاتی افزوده شده است که نشان می‌دهد بیمار بر ایجاد بیماری کنترل داشته و علت بیماری اش کنترل پذیر بوده است.

1- Level of Familiarity Questionnaire	2- Holmes
3- Williams	4- Canar
5- Kubiak	6- Green
7- Diwan	8- Penn
9- Lundin	10- Attribution Questionnaire-27
11- Watson	12- Rowan
13- Warpinski	14- Garcia
15- Likert scale	16- Vignette

نکرده بودند. این نسبت با نسبت جنسی افراد واحد شرایط مشارکت در طرح تفاوت معنادار نداشت. تعداد کارآموزان شرکت کننده در طرح ۱۶۰ نفر (۴۹/۷ درصد) و کارورزان ۱۶۲ نفر (۵۰/۳ درصد) بود، و دو نفر وضعیت تحصیلی خود را مشخص نکرده بودند. ۲۳۰ نفر از شرکت کنندگان مجرد (۷۱/۴ درصد) و ۹۲ نفر متاهل (۲۸/۶ درصد) بودند و دو نفر وضعیت تأهل خود را اعلام نکرده بودند. شرکت کنندگان در طرح، تقریباً به طور مساوی شکل‌های الف، ب، پ و ت پرسش‌نامه استناد را دریافت کردند. به این ترتیب، ۸۲ نفر (۲۵/۳ درصد) شکل الف، ۸۳ نفر (۲۵/۶ درصد) شکل ب، ۸۰ نفر (۲۴/۷ درصد) شکل پ، و ۷۹ نفر (۲۴/۴ درصد) شکل ت پرسش‌نامه را تکمیل نمودند. سن شرکت کنندگان در مطالعه بین ۲۱ تا ۴۸ سال، با میانگین ۲۵/۷۰ و انحراف معیار ۲/۲۶ بود.

عوامل انگکزنی و متغیرهای جمعیت‌نگاشتی

تفاوت عوامل انگکزنی بر حسب متغیرهای جمعیت‌نگاشتی (جنس، مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل)، با استفاده از آزمون ^۱ برای نمونه‌های مستقل بررسی شد. از بین عوامل انگکزنی، فقط سه عامل در گروه مردان و زنان تفاوت معنادار داشت که هر سه عامل در زنان بیش از مردان بود: دلسوی (میانگین ۶/۴۱ دربرابر ۵/۶۶ $p < 0/01$)؛ احساس خطرناک بودن (میانگین ۵/۷۷ دربرابر ۴/۷۴ $p < 0/01$)؛ و احساس ترس (میانگین ۵/۳۴ دربرابر ۳/۷۷ $p < 0/01$). اجتناب تنها عاملی بود که در مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت بود به شکلی که کارورزان در مقایسه با کارآموزان اجتناب بیشتری را گزارش می‌کردند (میانگین ۷/۲۶ دربرابر ۶/۹۴ $p < 0/01$). هیچ یک از عوامل انگکزنی تفاوت معناداری در دو گروه افراد مجرد و متأهل نشان نداد.

رابطه عوامل انگکزنی با متغیرهای جمعیت‌نگاشتی، میزان آشنازی با بیماری روانی، کنترل پذیری علت و خطرناک بودن بیمار

برای بررسی رابطه بین عوامل انگکزنی با متغیرهای جمعیت‌نگاشتی، میزان آشنازی با بیماری روانی، وجود اطلاعات

موردی از ناهم خوانی گراوشن نشد و در پرسش‌نامه استناد-۲۷ نیز فقط درباره یکی از پرسش‌ها بین متن بازترجمه شده و متن اصلی ناخوانی گزارش شد که این پرسش اصلاح و پس از بازترجمه مجدد این پرسش نیز مورد تأیید قرار گرفت.

داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای SPSS تحلیل شد. تفاوت بین عوامل انگکزنی و متغیرهای جمعیت‌نگاشتی (جنس، مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل) با استفاده از آزمون ^۲ برای نمونه‌های مستقل ^۱ بررسی شد. سپس، برای بررسی رابطه پیش‌بینی کننده متغیرهای مورد نظر در این پژوهش، با توجه به مدل‌های استنادی و ارزیابی خطر در انگک بیماری روانی، مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون چندگانه ^۳ انجام و تحلیل شد. متغیرهای اطلاعات درباره خطرناک بودن بیمار، و کنترل پذیر بودن یا کنترل ناپذیر بودن علت بیماری برای ورود به تحلیل رگرسیون چندگانه به روشن کدگذاری ساختگی ^۴ تعریف گردید.

یافته‌ها

ویژگی‌های پرسش‌نامه استناد-۲۷

برای ارزیابی پایایی درونی پرسش‌های مرتبط با هر سازه در پرسش‌نامه استناد-۲۷، آلفای کرونباخ ^۴ اندازه‌گیری شد. آلفای کرونباخ برای وادرسازی ۰/۴۲۷ و برای سایر سازه‌ها بین ۰/۷۵ و ۰/۹۱۷ بود. نتایج این بررسی نشان‌دهنده همسانی (پایایی) درونی این پرسش‌نامه است، لذا می‌تواند برای اهداف این مطالعه مورد استفاده قرار گیرد.

درباره وادرسازی، یکی از پرسش‌ها همبستگی پایایی با دو پرسش دیگر داشت که می‌توانست باعث کاهش مقدار آلفای کرونباخ این سازه شده باشد. حذف این پرسش، آلفای کرونباخ برای وادرسازی را به ۰/۶۲۷ افزایش داد. تحلیل‌های مرتبط با آن سازه، یک یار هم با حذف آن پرسش انجام شد و با توجه به این که نتایج تفاوت قابل توجهی نکرد، از متن کامل پرسش‌نامه برای تحلیل نهایی استفاده شد.

ویژگی‌های نمونه

از مجموع ۳۲۴ آزمودنی، ۱۵۹ نفر مرد (۴۹/۴ درصد) و ۱۶۳ نفر زن (۵۰/۶ درصد)، بودند و دو نفر جنسیت خود را مشخص

۱- independent samples t test
۲- multiple regression
۳- dummy coding
۴- Cronbach's alpha

مبینی بر کنترل پذیری بیماری داشتند، در مقایسه با افرادی که در این باره اطلاعاتی نداشتند، دلسوزی کمتر و خشم بیشتری از خود نشان می‌دادند. خشم و ترس در آزمودنی‌هایی که اطلاعاتی مبنی بر خطرناک بودن بیمار به آنان داده شده بود، بیشتر از آزمودنی‌هایی بود که در این زمینه اطلاعاتی نگرفته بودند.

ت- نقش واسطه‌ای مسؤولیت شخصی بیمار در عوامل هیجانی

انگ:

در معادلات ۴، ۶ و ۸، باور آزمودنی به مسؤولیت شخصی بیمار به معادلات بالا افزوده شد تا نقش واسطه‌ای این باور در تأثیر اطلاعات مربوط به کنترل پذیری بیماری و خطرناک بودن بیمار، بر عوامل هیجانی انگ (دلسوزی، خشم و ترس) بررسی شود. بر اساس تحلیل این معادلات، باور به مسؤولیت شخصی باید بر میزان خشم و ترس می‌افزود. اضافه شدن باور به مسؤولیت شخصی، از اثر اطلاعات مربوط به کنترل پذیری بیماری بر دلسوزی و خشم می‌کاست و آنها را از معناداری می‌انداخت و باعث می‌شد بین کنترل پذیری و ترس رابطه‌ای معنادار ایجاد شود که بر اساس آن، داشتن اطلاعات مربوط به کنترل پذیری علت بیماری با احساس ترس از بیمار رابطه منفی دارد. افزودن باور به مسؤولیت شخصی بیمار، بر میزان تأثیر داشتن اطلاعات درباره کنترل پذیری بیماری بر دلسوزی و ترس اثر قابل توجه نداشت؛ اما رابطه بین اطلاعات درباره کنترل پذیری بیماری و خشم را از حالت منفی به مثبت درآورد. افزودن باور به مسؤولیت شخصی بیمار به معادلات رگرسیون، تغییر قابل توجهی در تأثیر اطلاعات مبنی بر خطرناک بودن بیمار بر احساس دلسوزی، خشم و ترس ایجاد نکرد. تحلیل این معادلات نشان می‌دهد که در نظر گرفتن سهم مسؤولیت شخصی در واکنش‌های هیجانی مرتبط با انگ بیماری روانی، فقط تغییر اندکی در خرایب مربوط به اثر خطرناک بودن ایجاد کرده است؛ یعنی داشتن اطلاعات درباره خطرناک بودن بیمار، بدون واسطه باور به مسؤولیت شخصی، و به طور بلافصل با اجزای هیجانی انگ بیماری روانی رابطه داشت.

ث- تأثیر متغیرهای جمعیت‌نگاشتی، میزان آشنازی، کنترل پذیری و خطرناک بودن بیمار بر اجزای رفتاری انگ:

معادلات ۹ تا ۲۰ مربوط به اجزای رفتاری انگ بیماری روانی

درباره کنترل پذیر بودن علت بیماری و خطرناک بودن بیمار، بر اساس مدل‌های استنادی و ارزیابی خطر، مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون چند گانه در نظر گرفته و سپس تحلیل شد. نتایج این معادلات رگرسیون چند گانه در جدول ۱ نشان داده شده است.

الف- تأثیر متغیرهای جمعیت‌نگاشتی بر میزان آشنازی با بیماری روانی:

اولین معادله رگرسیون، برای بررسی تأثیر تفاوت‌های جمعیت‌نگاشتی (جنس، مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل) بر میزان آشنازی با بیماری روانی انجام شد. این معادله از نظر آماری معنادار نبود و اثری از عوامل جمعیت‌نگاشتی بر میزان آشنازی با بیماری روانی نشان نداد.

ب- تأثیر کنترل پذیری علت و خطرناک بودن بیمار بر مسؤولیت شخصی بیمار:

در معادله دوم اثر دادن اطلاعات درباره کنترل پذیر بودن علت و خطرناک بودن بیمار بر باور آزمودنی‌ها درباره مسؤولیت شخصی بیمار (با کنترل کردن نقش عوامل جمعیت‌نگاشتی و میزان آشنازی با بیماری روانی) سنجیده شد. بر اساس این معادله، آزمودنی‌هایی که علت بیماری روانی به آنان کنترل پذیر معرفی شده بود، در مقایسه با آنان که اطلاعی از علت بیماری نداشتند، با احتمال بیشتری فرد را مسؤول شخصی بیماری اش می‌دانستند. در مقابل، افرادی که در پرسش‌نامه آنها عامل بیماری علتی کنترل پذیر معرفی شده بود، در مقایسه با کسانی که اطلاعی از علت بیماری نداشتند، کمتر احتمال داشت فرد را مسؤول بیماری اش بدانند.

پ- تأثیر متغیرهای جمعیت‌نگاشتی، کنترل پذیری علت و خطرناک بودن بیمار بر عوامل هیجانی انگ:

در معادله‌های ۳، ۵ و ۷، اثرات متغیرهای جمعیت‌نگاشتی (جنس، مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل)، میزان آشنازی با بیماری روانی و شرایط تجربی مطالعه (دادن اطلاعات درباره کنترل پذیری علت بیماری و خطرناک بودن بیمار) بر عوامل هیجانی انگ (دلسوزی، خشم و ترس) بررسی شد. تحلیل این معادلات حاکی از آن بود که آزمودنی‌های زن، نسبت به مردان، دلسوزی و ترس بیشتری نشان می‌دهند. علاوه بر آن، آزمودنی‌هایی که اطلاعاتی

بدون تغییر قابل ملاحظه باقی ماند. در معادله ۱۶، مسؤولیت شخصی به معادله ۱۵ افزوده شد، تا اثر واسطه‌ای این متغیر بر تأثیر داشتن اطلاعات درباره کترولپذیری علت و خطرناک بودن بیمار بر تمایل به وادارسازی سنجیده شود. باور آزمودنی‌ها به مسؤولیت شخصی بیماران با تمایل آنان به وادارسازی بیماران رابطه داشت و آنان که بیمار را بیشتر مسؤول وضع خود می‌دانستند، بیشتر تمایل داشتند تا او را به درمان وادارند. اما افزودن این متغیر، تغییر قابل ملاحظه‌ای در میزان تأثیر آشنایی با بیماری و داشتن اطلاعات درباره خطرناک بودن بیمار بر وادارسازی بیماران ایجاد نکرد. بر اساس معادله ۱۹، باور به مسؤولیت شخصی بیماران با افزایش تمایل به جداسازی آنان همراه بود، ولی در نظر گرفتن مسؤولیت شخصی تغییر قابل توجهی در میزان تأثیر سایر متغیرها ایجاد نمی‌کرد.

چنانچه مشاهده می‌شود، افزودن مسؤولیت شخصی به معادلات رگرسیون، در میزان تأثیر خطرناک بودن بیمار بر اجزای رفتاری انگک بیماری روانی کاهش قابل توجهی ایجاد نمی‌کرد.

ج- نقش واسطه‌ای اجزای هیجانی در اجزای رفتاری انگک:

در معادلات ۱۱، ۱۴، ۱۷ و ۲۰ متغیرهای مربوط به مؤلفه هیجانی انگک بیماری روانی (دلسوزی، خشم و ترس) به معادلات قبلی افزوده شد تا نقش واسطه‌ای این عوامل در تأثیرگذاری مسؤولیت شخصی بر اجزای رفتاری انگکردنی بررسی شود.

بر اساس معادله ۱۱، احساس دلسوزی بیشتر به بیماران و ترس کمتر از آنان، با تمایل بیشتر افراد برای یاری رساندن به این بیماران همراه بود. تحلیل معادله ۱۴ نشان می‌دهد افرادی که احساس دلسوزی بیشتر و ترس کمتری داشتند، رفتار اجتنابی، کمتری از خود نشان می‌دادند و با در نظر گرفتن مؤلفه هیجانی، رابطه بین متغیرهای مقطع تحصیلی، میزان آشنایی با بیماری روانی و خطرناک بودن بیمار، همچنان بدون تغییر قابل ملاحظه باقی مانده بود. بر اساس تحلیل معادله ۱۷، آنان که از فرد دچار بیماری روانی بیشتر می‌ترسیدند، تمایل بیشتری به وادارسازی بیماران از خود نشان می‌دادند. از سوی دیگر، افزودن اجزای هیجانی باعث شده بود که دیگر رابطه بین خطرناک بودن بیمار و مسؤولیت شخصی با وادارسازی معنادار نباشد. اما افرادی که آشنایی آنها با

است. در معادلات ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ اثرات عوامل جمعیت‌نگاشتی، میزان آشنایی، و اطلاعات مربوط به کترولپذیری و خطرناک بودن بیمار بر رفتار گزارش شده آزمودنی‌ها سنجیده شد.

تحلیل معادله ۹ بین عوامل جمعیت‌نگاشتی، آشنایی با بیماری روانی، و داشتن اطلاعات درباره کترولپذیری علت بیماری و خطرناک بودن بیمار رابطه‌ای نشان نداد. بر اساس معادله ۱۲، بالاتر بودن مقطع تحصیلی و داشتن اطلاعات درباره خطرناک بودن بیمار با افزایش رفتار اجتنابی، و افزایش آشنایی با بیماری روانی با کاهش رفتار اجتنابی هسراه بود. بر اساس معادله ۱۵، با بالا رفتن میزان آشنایی با بیماری روانی تمایل آزمودنی‌ها به رفتارهای وادارسازی کاهش می‌یافتد؛ و آزمودنی‌هایی که به آنان اطلاعاتی مبنی بر خطرناک بودن بیمار داده شده بود، در مقایسه با افرادی که این اطلاعات را نداشتند، تمایل بیشتری به وادارسازی بیماران نشان می‌دادند. تمایل به وادارسازی بیماران با داشتن اطلاعات درباره کترولپذیر بودن بیماری رابطه معناداری نشان نداد. تحلیل معادله ۱۸ نشان داد که افرادی که آشنایی بیشتری با بیماری روانی داشتند، تمایل کمتری به جداسازی بیماران از خود نشان می‌دادند؛ و آنان که اطلاعاتی مبنی بر خطرناک بودن بیمار داشتند، در مقایسه با افراد فاقد این اطلاعات، تمایل بیشتری به جداسازی بیماران نشان می‌دادند.

ج- نقش واسطه‌ای مسؤولیت شخصی بیمار در اجزای رفتاری انگک:

در معادلات ۱۰، ۱۳، ۱۶ و ۱۹، با افزودن باور به مسؤولیت شخصی بیماران به معادلات قبلی، نقش واسطه‌ای این متغیر در تأثیر داشتن اطلاعات مربوط به کترولپذیری علت و خطرناک بودن بیمار بر اجزای رفتاری انگک بیماری روانی بررسی شد.

معادله ۱۰ که از افزودن مسؤولیت شخصی به معادله ۹ به دست آمده، تغییر قابل ملاحظه‌ای در سهم هر یک از متغیرها ایجاد نکرد و باعث معنی داری آن نیز نشد و در نتیجه همچنان بین متغیرهای ذکر شده و رفتار یاری رسانی رابطه‌ای به دست نیامد. بر اساس معادله ۱۳، که از افزودن مسؤولیت شخصی به معادله ۱۲ به دست آمده، مسؤولیت شخصی با رفتار اجتنابی رابطه‌ای معنادار نشان نداد؛ و روابط معنادار قبلی بین مقطع تحصیلی، میزان آشنایی با بیماری روانی، و داشتن اطلاعات درباره خطرناک بودن بیمار

سامان توکلی و همکاران

کولن^{۱۴}، ۱۹۸۶) و افراد دارای آشنازی بیشتر با بیماری روانی، کمتر احتمال دارد که افراد دچار بیماری روانی را خطرناک بدانند و اجتناب کمتری از آنان را گزارش می‌کنند (کوریگان و همکاران، ۲۰۰۱b). برخی مطالعات هم بین تماس قبلی با بیماران روانی و نگرش افراد به آنان رابطه‌ای نشان نداده‌اند (العداوی و همکاران، ۲۰۰۲).

در این مطالعه، تأثیر آشنازی با بیماری روانی بر باور به مسؤولیت شخصی و اجزای هیجانی انگک بیماری روانی (احساس دلسوزی، خشم و ترس) قابل ملاحظه نبود. علاوه بر آن، آشنازی با بیماری روانی بر رفتار یاری‌رسانی نیز تأثیر معنادار نداشت. در مطالعه کوریگان و همکارانش، میزان آشنازی بیشتر با افزایش یاری‌رسانی همراه بود و از این لحاظ مطالعه حاضر با مطالعه کوریگان و همکاران (۲۰۰۳a) همخوانی ندارد. ممکن است یکی از دلایل این امر نوع خاص نمونه مطالعه حاضر باشد. این نمونه از جمعیت کارآموزان و کارورزان بود که بر اساس آموزه‌های اخلاقی و پژوهشی، نقش حرفه‌ای که برای خود قائل‌اند. احتسال درمان بیماران و یاری‌رسانندن به آنان را جزو وظایف خود می‌دانند و شاید به این دلیل میزان کمتر آشنازی با بیماری روانی با یاری‌رسانی کمتر همراه نبوده است. از سوی دیگر، نمونه این مطالعه از نظر میزان آشنازی با بیماری روانی، نمونه‌ای همگون‌تر از مطالعه کوریگان و همکارانش است و پراکندگی داده‌های مربوط به آشنازی با بیماری روانی محدود‌تر بوده است (میزان آشنازی ۶۷/۴ درصد از شرکت‌کنندگان با بیماری روانی به شکل "شفل من در ارتباط با ارایه خدمات با درمان افراد دچار بیماری روانی شدید است" در نظر گرفته شده است). این مسئله هم می‌تواند باعث شده باشد که تأثیر میزان آشنازی بر اجزای هیجانی و رفتار یاری‌رسانی در مطالعه‌ما متناووت از مطالعه مذکور و سایر مطالعات مشابه باشد.

در این مطالعه، میزان آشنازی با بیماری روانی با اجتناب، وادارسازی و جداسازی کمتر همراه بوده است که این یافته با

بیماری روانی بیشتر بود، هم‌چنان تمايل کمتری به وادارسازی بیماران از خود نشان می‌دادند؛ یعنی بر اساس این معادله، خطرناک بودن بیمار و مسؤولیت شخصی با واسطه اجزای هیجانی تأثیر خود را برابر وادارسازی بیماران اعمال کرده بودند. بر اساس معادله ۲۰ آنان که احساس دلسوزی بیشتری داشتند، تمايل کمتری به جداسازی بیماران از خود نشان می‌دادند؛ و احساس ترس بیشتر با تمايل بیشتر به جداسازی این بیماران همراه بود. افزودن اجزای هیجانی به معادله رگرسیون، رابطه بین مسؤولیت شخصی و جداسازی را از معناداری خارج کرد؛ اما آنان که اطلاعاتی مبنی بر خطرناک بودن بیمار داشتند، همچنان تمايل بیشتری به جداسازی از خود نشان می‌دادند؛ و آنان که آشنازی بیشتری با بیماری روانی داشتند، تمايل کمتری به جداسازی داشتند.

مجموعاً معادلات ۱۱، ۱۴، ۱۷ و ۲۰ نشان می‌دهند که اجزای هیجانی در تأثیر خطرناک بودن و مسؤولیت شخصی بر رفتار انگکزنی در برخی موارد نقش واسطه‌ای دارد و در برخی موارد مستقل‌ا عمل می‌کند.

بحث

در این مطالعه زنان بیش از مردان احساس دلسوزی، ترس و خطر را گزارش کردند؛ و آنان که در مقطع تحصیلی بالاتر بودند (کارورزان)، اجتناب بیشتری را گزارش نمودند. مطالعات دیگر در زمینه نقش متغیرهای جمعیت‌نگاشتی و انگک بیماری روانی یافته‌های متفاوتی داشته‌اند. مطالعه‌ای در عمان، بین نگرش بیماران روانی و متغیرهای جمعیت‌نگاشتی رابطه‌ای نشان نداده است (العداوی^۱ و همکاران، ۲۰۰۲). مطالعه دیگری نشان داده است که به طور کلی زنان کمتر از مردان انگک می‌زنند (مان^۲ و هایملین^۳، ۲۰۰۴).

پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که آشنازی با بیماری روانی با باورها و پیش‌داوری‌های منفی فرد درباره بیماری روانی رابطه معکوس دارد (پسن^۴، گوینسان^۵، دیلی^۶ و اسپالدینگ^۷، ۱۹۹۴؛ آریکان^۸، اویسال^۹ و سنتین^{۱۰}، ۱۹۹۹؛ هولمز و همکاران، ۱۹۹۹؛ کوریگان و همکاران، ۲۰۰۱الف و ب؛ مس^{۱۱} و هاتیم^{۱۲}، ۲۰۰۲؛ پینفولد^{۱۳} و همکاران، ۲۰۰۳). پژوهش‌های دیگر نشان داده‌اند که تماس با بیماران روانی باعث کاهش ترس از آنان می‌شود (لينک و

۱- Al-adawi
۳- Himelein
۵- Guynan
۷- Spalding
۹- Uysal
۱۱- Mas
۱۳- Pinfold

2- Mann
4- Penn
6- Daily
8- Arıkan
10- Cetin
12- Hatim
14- Culen

مسئولیت شخصی همچنان پایدار می‌ماند (کوریگان و همکاران، ۲۰۰۳الف). اما در مطالعه‌ما، اطلاعات مبنی بر کنترل‌پذیری یا کنترل‌ناپذیری علت، تأثیر معناداری بر اجزای رفتاری انگک بیماری روانی (یاری‌رسانی، اجتناب، وادارسازی و جداسازی) نشان نداد، و به نظر می‌رسد مؤلفه رفتاری انگک بیماری روانی، بیشتر از میزان آشنازی فرد با بیماری روانی و نیز خطرناک بودن بیمار بوده است. مطالعات دیگری هم نشان داده‌اند افرادی که افراد مبتلا به اسکیزوفرینیا را در ایجاد بیماری خود مقصراً می‌دانستند، تمایل بیشتری به اجتناب از آنان داشتند (انگرمایر^۱، بک^۲ و متینگر^۳، ۲۰۰۳؛ انگرمایر و متینگر، ۲۰۰۳). این تفاوت هم ممکن است ناشی از تفاوت فرهنگی و بارزتر بودن نقش مدل ارزیابی خطر در ایجاد انگک بیماری روانی باشد؛ گرچه با توجه به این که نمونه‌ما معرف مناسبی از جامعه عمومی نبوده است، احتمال سویمندی‌های ناشی از گزینش نمونه را باید در نظر داشت. همان‌طور که گفته شد، به اهمیت بیشتر فردیت و مسئولیت شخصی در فرهنگ غرب، و اهمیت انسان در بافت اجتماعی‌اش در فرهنگ شرق، و تأثیر این تفاوت دیدگاه بر انگک‌زنی اشاره شده است (کوکر، ۲۰۰۵). این مطلب هم می‌تواند بر تفاوت نتایج مطالعه حاضر با مطالعه کوریگان و همکاران تأثیر گذاشته باشد. به این ترتیب که ممکن است در فرهنگ ما فردیت و مسئولیت شخصی بیمار برنگرش افراد به این بیماران و رفتار با آنها کمتر از میزان برخورد قبلی با بیماران روانی و به ویژه خطری که می‌تواند برای دیگران ایجاد کند، تأثیر داشته باشد.

اطلاعات مبنی بر خطرناک بودن بیمار در این مطالعه بر باور به مسئولیت شخصی‌وی، و احساس دلسوی نسبت به او تأثیر قابل ملاحظه‌ای نداشت. مطالعه کوریگان و همکاران (۲۰۰۳) نیز تأثیر قابل ملاحظه خطرناک بودن را بر مسئولیت شخصی نشان نمی‌داد؛ اما خطرناک بودن بیمار با احساس دلسوی بیشتر نسبت به اوی همراه بود که با در نظر گرفتن مسئولیت شخصی همچنان تأثیر آن ادامه می‌یافت. این یافته با مطالعه حاضر هم آهنگی ندارد. در سایر مطالعات هم کم خطر تلقی کردن افراد دچار بیماری روانی با احساس ترس و اجتناب کمتر همراه بود (کوریگان و

مطالعه کوریگان و همکاران (۲۰۰۳a) همخوانی دارد. در این مطالعه، افرادی که اطلاعاتی مبنی بر کنترل‌پذیری علت بیماری دریافت کرده بودند، بیمار را بیشتر مسؤول بیماری خود می‌دانستند؛ و بر عکس، افرادی که اطلاعاتی مبنی بر کنترل‌ناپذیری علت بیماری داشتند، قادر این نوع اطلاعات بودند، بیمار را کمتر مسؤول وضعیت خود می‌دانستند. این یافته با یافته‌های پژوهش مشابه هماهنگ است (کوریگان و همکاران، ۲۰۰۳a). داشتن اطلاعات مبنی بر کنترل‌پذیری علت بیماری، با احساس دلسوی کمتر، خشم بیشتر، و ترس کمتر نسبت به بیمار همراه بود. از این نظر مطالعه حاضر با مطالعه کوریگان و همکاران (۲۰۰۳a) بود. ارایه اطلاعات مبنی بر کنترل‌ناپذیری علت، بر اجزای هیجانی انگک بیماری روانی تأثیری نداشت؛ در حالی که در مطالعه کوریگان و همکاران (همان‌جسا) داشتن اطلاعات مبنی بر کنترل‌ناپذیری علت، احساس دلسوی بیشتر، خشم کمتر و ترس کمتر به دنبال داشت. گویا در مطالعه حاضر اجزای هیجانی و رفتاری انگک بیشتر متأثر از میزان خطرناک بودن بیمار بوده است، تا اسنادهای علی. یعنی نظریه ارزیابی خطر در نمونه‌ما بارزتر از نمونه کوریگان و همکاران بوده است. البته، با توجه به اینکه نمونه مطالعه حاضر معرف جامعه عمومی نبوده است، نمی‌توان درباره تفاوت بین فرهنگی این مدل‌ها ارزیابی قاطع کرد؛ اما احتمال آن را نیز باید در نظر داشت.

وقتی تأثیر مسئولیت شخصی در نظر گرفته می‌شود، اثر اطلاعات مبنی بر کنترل‌پذیری بر احساس دلسوی و خشم از معناداری می‌افتد؛ یعنی اطلاعات مربوط به کنترل‌پذیری علت با واسطه باور به مسئولیت شخصی فرد، بر اجزای هیجانی دلسوی و خشم تأثیر می‌گذارد و این یافته با نظریه استاد در انگک بیماری روانی هماهنگی دارد.

در مطالعه کوریگان و همکاران (۲۰۰۳a)، اطلاعات مبنی بر کنترل‌پذیری علت با تمایل به جداسازی- وادارسازی همراه بود که با درنظر گرفتن مسئولیت شخصی این اثر از بین می‌رفت (یعنی کنترل‌پذیری با واسطه مسئولیت شخصی اثر خود را اعمال می‌کرد). همچنین، اطلاعات مبنی بر کنترل‌ناپذیری علت با تمایل کمتر به جداسازی- وادارسازی همراه بود و تأثیر آن با درنظر گرفتن

(۲۰۰۳)،

بر اساس نظریه استاد، چنانچه فرد درباره رویدادی منفی مسؤول شناخته گردد، ممکن است نسبت به وی احساس خشم ایجاد شود، و با اجتناب و رفتارهای تنبیه‌ی (مانند جداسازی) با او برخورد شود. بر عکس اگر فرد مسؤول آن وضعیت تلقی نشود، ممکن است احساس دلسوزی یا رفتارهای یاری‌رسانی را نسبت به خود برانگیزد (کوریگان ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴؛ کوریگان و همکاران ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳؛ ۲۰۰۳). مطالعه‌ای دیگر هم نشان داده است که مسؤولیت شخصی عامل مهمی در بروز واکنش‌های عاطفی افراد نسبت به بیماران روانی است (دیجکر و کومن، ۲۰۰۳).

در مطالعه حاضر، باور به مسؤولیت شخصی تأثیر معناداری بر احساس دلسوزی نسبت به فرد نداشت؛ اما با خشم و ترس بیشتر همراه بود. در نظر گرفتن مسؤولیت شخصی باعث نمی‌شد تأثیر خطرناک بودن بر اجزای هیجانی معنادار نباشد. این یافته نشان می‌دهد که بخشی از انگک بیماری روانی به طور مستقیم از باور به خطرناک بودن فرد ناشی می‌شود (نظریه ارزیابی خطر) و بخشی با واسطه باور به مسؤولیت شخصی فرد (نظریه استاد). در مطالعه کوریگان و همکاران (۲۰۰۳)، باور به مسؤولیت شخصی، علاوه بر افروختن ترس و خشم، باعث کاهش دلسوزی شده بود که در مجموع با یافته مطالعه‌ما هم‌آهنگ است (جز در مورد دلسوزی)؛ و مانند این مطالعه، از تأثیر انگک بیماری روانی بر اساس هر دو نظریه استاد و ارزیابی خطر حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، در مطالعه حاضر، درنظر گرفتن مسؤولیت شخصی باعث شد که تأثیر کنترل پذیری علت بر دلسوزی و خشم از معناداری خارج شود؛ و بر عکس، کنترل پذیری علت را به طور معناداری با کاهش ترس از بیمار همراه نماید. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که تأثیر اصلی کنترل پذیری بر اجزای هیجانی انگک بیماری روانی با واسطه باور به مسؤولیت شخصی بیمار اعمال می‌شود و این امر با نظریه استاد در انگک بیماری روانی هم‌آهنگی دارد. این یافته نیز با مطالعه کوریگان و همکاران همخوانی دارد (۲۰۰۳).

در مطالعه حاضر، باور به مسؤولیت شخصی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر یاری‌رسانی و اجتناب نداشت؛ اما باعث افزایش تمایل به وادارسازی و جداسازی شد. یعنی شرکت کنندگانی که

همکاران، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱۵، ۲۰۰۱۶). این تفاوت ممکن است ناشی از سویمندی نمونه‌ما یا تفاوت‌های بین فرهنگی باشد که قطعی دانستن این تفاوت و بررسی علت آن نیازمند مطالعات بیشتر است.

در این مطالعه، خطرناک بودن بیمار با احساس خشم و ترس بیشتر نسبت به او همراه بود، که با در نظر گرفتن مسؤولیت شخصی این اثر هم‌چنان پایدار می‌ماند. به این ترتیب، خطرناک بودن، تأثیر خود را بدون واسطه باور به مسؤولیت شخصی بیمار بر اجزای هیجانی انگک بیماری روانی اعمال می‌کند و این یافته با نظریه ارزیابی خطر در انگک بیماری روانی همخوانی دارد.

خطرناک بودن در مطالعه‌ما، بر رفتار یاری‌رسانی گزارش شده به وسیله شرکت کنندگان تأثیر قابل ملاحظه نداشت؛ اما تأثیر آن بر سایر اجزای رفتاری انگک بیماری روانی قابل توجه بود و باعث افزایش تمایل به اجتناب، وادارسازی و جداسازی می‌شد. با درنظر گرفتن نقش مسؤولیت شخصی و اجزای هیجانی (دلسوزی، خشم و ترس) تأثیر خطرناک بودن بر اجزای رفتاری انگک بیماری روانی کماکان حفظ می‌شد؛ و این نشان می‌دهد که خطرناک بودن بیمار بدون واسطه مسؤولیت شخصی و اجزای هیجانی، به بروز رفتارهای تعیض آمیز اجتناب، وادارسازی و جداسازی نسبت به بیماران منجر می‌شود. این هم یافته‌ای است که با نظریه ارزیابی خطر در انگک بیماری روانی همخوانی دارد. در مطالعه کوریگان و همکاران (۲۰۰۳)، اطلاعات مبنی بر خطرناک بودن بیمار بر تمام اجزای رفتاری (یاری‌رسانی-اجتناب و وادارسازی-جداسازی) تأثیر داشته است. در آن مطالعه، یاری‌رسانی و اجتناب مجموعاً یک عامل در نظر گرفته شده است و یافته‌های آنان جز در مورد عامل یاری‌رسانی با مطالعه حاضر همخوانی دارد و در آن مورد هم به دلیل جدا نبودن عامل یاری‌رسانی در آن مطالعه، قابل داوری نیست. اما از سویی، ویژگی جامعه خاص مورد مطالعه ما (کارآموزان و کارورزان پرشکی) که یاری‌رساندن به افراد دچار بیماری روانی را جزو وظایف خود می‌دانند، ممکن است باعث شده باشد تا خطرناک بودن بر رفتار یاری‌رسانی تأثیر نداشته باشد. مطالعه آنان نیز نشان دهنده تأثیر خطرناک بودن، بدون واسطه مسؤولیت شخصی و اجزای هیجانی انگک بیماری روانی (یعنی هم‌آهنگ با نظریه ارزیابی خطر) است (کوریگان و همکاران،

شناختی، هیجانی و رفتاری تفاوت قابل توجهی گزارش نشده است. لذا احتمالاً می‌توان با این مطالعه تفاوت یا تشابه ارتباط این مؤلفه‌ها و مدل پیشنهادی در فرهنگ ما را با فرهنگ‌های دیگر سنجید. محدودیت دیگر پژوهش حاضر این است که پاسخ رفتاری در این مطالعه به‌وسیله گزارش خود آزمودنی‌ها تعیین شده است و نه با مشاهده رفتار واقعی آنان. البته فراهم آوردن نمونه‌ای با اندازه کافی از اشخاصی که در تعامل رفتاری واقعی با بیماران روانی باشند، بسیار مشکل است و طراحی آن ممکن نبوده است. این محدودیت در مطالعات مشابه سایر کشورها نیز وجود داشته است. همچنین این مطالعه فقط محدود به بررسی انگزنهای مرد جوان دچار اسکیزوفرنیا بود. برای بررسی جنبه‌های دیگر انگزنهای و تعمیم‌پذیری مدل استناد در بیماری‌ها و حالت‌های گوناگون روانپزشکی، مطالعات دیگر با بررسی انگزنهای همراه با بیماری‌های روانی دیگر (مانند افسردگی)، در سنین مختلف و در هر دو جنس لازم است.

افراد دچار بیماری روانی، علاوه بر عوارض بیماری و نشانه‌های ناتوان‌کننده آن، از انگی که جامعه به آنان می‌زنند و تأثیرات آن نیز رنج می‌برند. افراد دچار اسکیزوفرنیا، به عنوان یکی از بیماری‌های روانی که با انگی پیشتری همراه است، از وجود نگرش‌های منفی در جامعه متأثر هستند. مطالعات مختلف به ویژه در کشورهای غربی، حضور این نگرش‌ها و ییش‌داوری‌های منفی و تأثیر آن بر اقدام برای درمان و نتیجه درمان و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کرده‌اند. دو مدل نظریه اسنادی و نظریه ارزیابی خطر درباره انگی بیماری روانی و رابطه بین اجزای مختلف شناختی، هیجانی و رفتاری آن، پیشتر از سایر نظریه‌ها مطرح است.

این مدل‌ها و نظریه‌ها در جوامع و فرهنگ‌های اروپایی و آمریکایی آزموده شده‌اند. اما به نظر منطقی می‌رسد که انگی بیماری روانی متأثر از عوامل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خاصی هر جامعه باشد، و بنابراین در فرهنگ‌های مختلف، متأثر از عوامل خاص آن فرهنگ بوده و تأثیرات ویژه خود را نیز داشته باشد. از این‌رو، بررسی مدل‌های آزموده شده در فرهنگ‌های دیگر برای بررسی تعمیم‌پذیری این مدل‌ها به شکل‌بین و فرهنگی لازم به نظر می‌رسد.

فرد را مسؤول بیماری خود می‌دانستد، از خود تمایل پیشتری به اعمال زور و اجبار برای درمان یا نگهداری بیمار به صورت جدا از جامعه نشان می‌دادند. این تأثیر، با در نظر گرفتن اجزای هیجانی انگی بیماری روانی از معناداری خارج می‌شد؛ یعنی، باور به مسؤولیت شخصی، با واسطه اجزای هیجانی انگی بیماری روانی تأثیر خود را بر اجزای رفتاری انگی بیماری روانی می‌گذارد و این یافته نیز با نظریه اسناد همخوانی دارد.


در مطالعه کوریگان و همکاران (۲۰۰۳a)، باور به مسؤولیت شخصی با تمایل کمتر به یاری‌رسانی-اجتناب و تمایل پیشتر به وادارسازی- جداسازی همراه بود و تأثیر آن بر یاری‌رسانی-اجتناب با در نظر گرفتن اجزای هیجانی معنادار نمی‌شد و این هم در مجموع، با یافته‌های مطالعه ما هم‌هنگی دارد (جز آن که در مطالعه ما مسؤولیت شخصی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر یاری‌رسانی و اجتناب نداشته است).

در مطالعه حاضر از بین اجزای هیجانی انگی بیماری روانی، احساس خشم بر اجزای رفتاری انگی تأثیر معناداری نداشت. اما دلسوزی پیشتر با تمایل به یاری‌رساندن پیشتر، اجتناب کمتر و جداسازی کمتر همراه بود؛ و ترس پیشتر با یاری‌رسانی کمتر و اجتناب، وادارسازی و جداسازی پیشتر همراه بود. این یافته در مجموع با یافته‌های مطالعه کوریگان و همکاران (۲۰۰۳a) همخوانی دارد. همان‌طور که پیش از این هم ذکر شد، با در نظر گرفتن اجزای هیجانی انگی بیماری روانی، تأثیر باور به مسؤولیت شخصی بر اجزای رفتاری معنادار نبود؛ یعنی باور به مسؤولیت شخصی با واسطه اجزای هیجانی انگی بیماری روانی بر رفتار فرد تأثیر می‌گذارد. این یافته هم با نظریه اسناد در انگی بیماری روانی همخوانی دارد.

اصلی‌ترین محدودیت این مطالعه آن بود که نمونه آن معرف جمعیت عمومی نبود و به همین دلیل هم نمی‌توان یافته‌های آن را با قطعیت به جمعیت عمومی کشور تعمیم داد. با این حال، جمعیت انتخاب شده با توجه به جمعیت جوان ایران و نیز به خاطر این که در آینده عهده‌دار ارایه خدمات پزشکی خواهد بود، زیرگروهی پراهمیت از جمعیت است. از سوی دیگر، در مطالعات کشورهای دیگر نیز بین زیرگروه‌های مختلف جمعیت از نظر رابطه اجزای

روانی مؤثرتر باشد (شکل ۲). این امر ممکن است به دلیل تفاوت فرهنگی در زمینه اهمیت فردیت و مسئولیت شخصی، در مقایسه با اهمیت نقش فرد در بافت جامعه و تهدید کنندگی او برای اطرافیان باشد. البته پدیرش یا رد این احتمال نیازمند تکرار نتایج این مطالعه در نمونه‌ای معرف از جامعه عمومی، به طور ویژه همراه با مطالعه ابعاد فردگرایی و جمع‌گرایی در این جامعه و تأثیر آن بر انگیزه بیماری روانی است. تا جایی که اطلاعات ما نشان می‌دهد، این مطالعه تاکنون تنها مطالعه‌ای است که به بررسی رابطه بین اجزای شناختی، هیجانی و رفتاری انگکزدنی به افراد دچار بیماری روانی در فرهنگ‌های غیراروپایی-آمریکایی پرداخته است.

دریافت مقاله: ۱۳۸۵/۴/۱۳؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۵/۵/۲۶



شکل ۳- روابط بین مؤلفه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری انگکزدنی به بیماران روانی در این مطالعه

یافته‌های این مطالعه، به طور کلی نشان می‌دهند که هر دو مدل در شکل گیری بخشی از انگکزدنی روانی نقش دارند؛ و به ویژه در مقایسه با مطالعه مشابه، به نظر می‌رسد که مدل ارزیابی خطر در ایجاد واکنش‌های هیجانی و رفتاری تبعیض آمیز نسبت به بیماران

منابع

- پژشکی، ز.، و بالهری، ج. (۱۳۷۳). بررسی نگرش اهالی چند روستای شمال شهر تهران در زمینه بیماری روانی. *اندیشه و رفتار*, سال ۱، شماره ۲.
- صادقی، م. کاویانی، ح.، و رضایی، ر. (۱۳۸۲). بررسی مقایسه‌ای انگکزدنی روانی در خانواده بیماران مبتلا به اختلال افسردگی، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی. *تازه‌های علوم شناختی*, ۵(۲)، ۲۵-۳۶.
- Al-adawi, S., Dovlo, A. S. S., Al-Ismaily, S. S., Al-Ghafry, D. A., Al-Noobi, B. Z., Al-Salmi, A., Burke, D. T., Shah, M. K., Ghassany, H. & Chand, S. P. (2002). Perception of and attitude towards mental illness in Oman. *International Journal of Social Psychiatry*, 48, 305-317.
- Angermeyer, M. C., Beck, M., & Matschinger, H. (2003). Determinants of the public's preference for social distance from the people with schizophrenia. *Canadian Journal of Psychiatry*, 48, 663-668.
- Angermeyer, M. C., & Matschinger, H. (2003). The stigma of mental illness: Effects of labeling on public attitudes towards people with mental disorder. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 108, 304-309.
- Arikan, K., Uysal, O. & Cetin, G. (1999). Public awareness of the effectiveness of psychiatric treatment may reduce stigma [Abstract]. *Israel Journal Psychiatry and Related Sciences*, 36, 95-99.
- Coker, E. M. (2005). Selfhood and social distance: Toward a cultural understanding of psychiatric stigma in Egypt. *Social Science and Medicine*, 61, 920-930.
- Corrigan, P. W. (2000). Mental health stigma as social attribution: Implications for research methods and attitude change, 7, 48-67.
- Corrigan, P. W., Edwards, A. B., Green, A., Diwan, S. L., & Penn, D. L. (2001a). Prejudice, social distance, and familiarity with mental illness. *Schizophrenia Bulletin*, 27, 219-225.
- Corrigan, P. W., Green, A., Lundin, R., Kubak, M. A., & Penn, D. L. (2001b). Familiarity with and social distance from people who have serious mental illness. *Psychiatric Services*, 52, 953-958.
- Corrigan, P. W., Rowan, D., Green, A., Lundin, R., River, P., Uphoff-Wasowski, K., White, K., & Kubak, M. A. (2002). Challenging two mental illness stigmas: Personal responsibility and dangerousness. *Schizophrenia Bulletin*, 28, 293-309.
- Corrigan, P., Markowitz, F. E., Watson, A., Rowan, D., & Kubak, M. A. (2003a). An attribution model of public discrimination towards persons with mental illness. *Journal of Health and Social Behavior*, 44, 162-179.
- Corrigan, P., Thompson, V., Lambert, D., Sangster, Y., Noel, J. G., & Campbell, J. (2003a). Perceptions of Discrimination among persons with serious mental illness. *Psychiatric Services*, 54, 1105-1110.
- Corrigan, P. W. (2004). How stigma interferes with mental

- health care. *American Psychologist*, 59, 614-625.
- de Mendonca Lima, C. A., Levav, I., Jacobsson, L., & Rutz, W. (2003). Stigma and discrimination against older people with mental disorders in Europe. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 18, 679-682.
- Dickerson, F. B., Sommerville, J., Origoni A. E., Ringel N. B., & Parente, F. (2002). Experiences of stigma among outpatients with schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 28, 143-155.
- Dijker, A. J., & Koomen, W. (2003). Extending Weiner's attribution-emotion model of stigmatization of ill persons. *Basic and Applied Social Psychology*, 25, 51-68.
- Gaebel, W., & Baumann, A. E. (2003). Interventions to reduce the stigma associated with severe mental illness: Experiences from the open the doors program in Germany. *Canadian Journal of Psychiatry*, 48, 657-662.
- Haghighat, R. (2001). A unitary theory of stigmatization: Pursuit of self-interest and routes to destigmatisation. *British Journal of Psychiatry*, 178, 207-215.
- Holmes, E. P., Corrigan, P. W., Williams, P., Canar, J., & Kubiak, M. A. (1999). Changing attitudes about schizophrenia. *Schizophrenic Bulletin*, 25, 447-456.
- Link, B. G., & Cullen, F. T. (1986). Contact with the mentally ill and perceptions of how dangerous they are. *Journal of Health and Social Behavior*, 27, 189-302.
- Link, B. G., Cullen, F. T., Struening, E., Shrout, P. E., and Dohrenwend, B. P. (1989). A modified labeling theory approach to mental disorders: An empirical assessment. *Am Sociol Rev*, 54: 400-423.
- Link, B. G., Struening, E. L., Neese-Todd, S., Asmussen, S., & Phelan, J. C. (2001). Stigma as a barrier to recovery: The consequences of stigma for the self-esteem of people with mental illnesses. *Psychiatric Services*, 52, 1621-1626.
- Link, B. G., Struening, E. L., Rahav, M., Phelan, J. C., & Nuttbrock, L. (1997). On stigma and its consequences: Evidence from a longitudinal study of men with dual diagnoses of mental illness and substance abuse. *Journal of Health Social Behavior*, 38, 177-190.
- Mann, C. E., & Himelein, M. J. (2004). Factors associated with stigmatization of persons with mental illness. *Psychiatric Services*, 55, 185-187.
- Markowitz, F. E. (1998). The effects of stigma on the psychological well-being and life satisfaction of persons with mental illness. *Journal Health of Social Behavior*, 39, 335-347.
- Mas, A., & Hatim, A. (2002). Stigma in mental illness: Attitudes of medical students towards mental illness [Abstract]. *Medical Journal of Malaysia*, 57, 33-44.
- McSween, J. L. (2002). The role of group interest, identity, and stigma in determining mental health policy preferences [Abstract]. *Journal Health of Political Policy Law*, 27, 773-800.
- Ng, C. H. (1997). The stigma of mental illness in Asian cultures. *Australian and Newslans Jornal of Psychiatry*, 31, 82-90.
- Ostman, M., & Kjellin, L. (2002). Stigma by association: Psychological factors in relatives of people with mental illness. *British Journal of Psychiatry*, 181, 494-498.
- Penn, D. A., Guynan, K., Daily, T., & Spaulding, W. D. (1994). Dispelling the stigma of schizophrenia: What sort of information is best? *Schizophrenia Buletin*, 20, 567-578.
- Perlick, D. A., (2001). Special section on stigma as a barrier to recovery: Introduction. *Psychiatric Services*, 52, 1613-1614.
- Phelan, J. C. (2002). Genetic bases of mental illness - A cure for stigma? *Trends in Neuroscience*, 25, 430-431.
- Pinfold, V., Toumlin, H., Thornicroft, G., Huxley, P., Farmer, P., & Graham, T. (2003). Reducing psychiatric stigma and discrimination: Evaluation of educational interventions in UK secondary schools. *British Journal of Psychiatry*, 182, 342-346.
- Smith, M. (2002). Stigma. *Advances in Psychiatric Treatment*, 8, 317-325.
- Ucok, A., Polat, A., Sartorius, N., Erkoc, S., & Atakli, C. (2004). Attitudes of psychiatrists toward Patients with schizophrenia. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 58, 89-91.
- Wahl, O. F. (1999). Mental health consumers' experience of stigma. *Schizophrenia Buletin*, 25, 467-78.