

همدلی پزشکان هیأت علمی رشته‌های مختلف تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برخورد با بیمار

غلامرضا خیرآبادی^۱، مهدخت حاجی رحیمی^۲، بهزاد مهکی^۳، نسرین مسائلی^۴، مریم یا حی^۵، لعیا گلشنی^۶، درنا خیرآبادی^۷

مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: همدلی در کسب نتیجه درمانی بهتر، رضایت مراجعت، بهبود رابطه پزشک-بیمار، محافظت پزشک از فرسودگی شغلی و شکایت احتمالی بیمار از پزشک نقش بسزایی دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی میزان همدلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برخورد با بیمار بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۲، بر روی جمعیت پزشکان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تخصص‌های مختلف انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش سرشماری بود و پرسشنامه همدلی پزشکان Jefferson Scale of Patient Perceptions of Physician Empathy (JSPPPE) یا Jefferson Scale of Patient Perceptions of Physician Empathy (JSPPPE) به صورت حضوری و یا از طریق پست الکترونیک در اختیار ۲۷۸ پزشک قرار گرفت. ۷۳ پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد. داده‌های استخراج شده از پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون‌های F و ANOVA یک‌طرفه و Kruskal-Wallis در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری داده‌ها در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: بالاترین میانگین نمره همدلی در استادان رشته نفرولوژی و کمترین میانگین نمره همدلی در استادان رشته جراحی اعصاب و رادیولوژی مشاهده شد. پس از دستبندی رشته‌های مختلف به سه گروه جراحی، غیر جراحی و روان‌پزشکی، بیشترین میانگین نمره همدلی مربوط به استادان رشته روان‌پزشکی بود و بعد از آن، رشته‌های غیر جراحی و جراحی قرار داشتند ($P = 0.045$).

نتیجه‌گیری: همدلی با بیماران در پزشکان عضو هیأت علمی رشته‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متفاوت است. این افراد همدلی لازم را با دانشجویان خود در تکمیل پرسشنامه تحقیقاتی ارایه شده نداشتند.

واژه‌های کلیدی: همدلی، پزشکان هیأت علمی، بیماران

ارجاع: خیرآبادی غلامرضا، حاجی رحیمی مهدخت، مهکی بهزاد، مسائلی نسرین، یا حی مریم، گلشنی لعیا، خیرآبادی درنا. همدلی پزشکان هیأت علمی رشته‌های مختلف تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برخورد با بیمار. مجله تحقیقات علوم رفتاری ۱۳۹۵؛ ۱۴(۲): ۱۵۴-۱۶۰.

پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۲/۲۵

دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۹/۳۰

سالم بین پزشک و بیمار، زیربنای مراقبت‌های خوب پزشکی است؛ چرا که بیشتر تشخیص‌های پزشکی و تصمیمات درمانی، بر اساس اطلاعات به دست آمده از شرح حال بیمار صورت می‌گیرد که طی مصاحبه با بیمار به دست می‌آید و اساس این مصاحبه، برقراری ارتباط مناسب می‌باشد. ارتباط پزشک و بیمار بر دو بعد ابزاری (مهارت پزشک در استفاده از تکنیک‌های درمانی، تست‌های تشخیصی و معاینات) و بیانی (برقراری ارتباط صمیمی و احساس همدلی با بیمار) استوار است.^(۳).

همدلی مستلزم آن است که بیمار بفهمد پزشکش او را درک می‌کند و این حالت فراتر از آن است که فقط به بیمار بگوید «من اساس شما را درک می‌کنم» یا به علامت تصدیق سر تکان دهد، بلکه برای همدلی پزشک، ابتدا باید تجارب عاطفی بیمار را به دقت درک نماید و سپس آن را در قالب کلمات و اشارات به او منتقل کند؛ چرا که بیمار، طبیعی را برای دردش می‌جوید که درمان

مقدمه

همدلی یک توانایی ارتیاطی به معنای درک تجربیات و دغدغه‌های دیگران همراه با توانایی ابراز آن می‌باشد و توانایی مهمی است که فرد را با احساسات و افکار دیگران همراه‌گش می‌کند، به دنیای اجتماعی پیوند می‌زند، کمک به دیگران را برای وی ترسیم می‌نماید و از آسیب به دیگران جلوگیری می‌کند. در همدلی، هم حوزه شناختی و هم حوزه عاطفی درگیر هستند. حوزه شناختی به صورت توانایی درک تجربیات و احساسات درونی شخص دیگر و توانایی دیدن دنیای بیرون از دریچه چشم فرد دیگر و حوزه عاطفی به صورت پیوند یافتن و وارد شدن به احساسات شخص دیگر می‌باشد.^(۲)

تحقیقات نشان می‌دهد که همدلی نقشی اساسی در رابطه پزشک و بیمار ایفا می‌کند. پزشکی حرفه‌ای است که نمی‌توان آن را بدون بهره گرفتن از احساس همدلی و احساسات انسانی و اعتماد، به درستی انجام داد. ارتباط خوب و

- ۱- دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۲- دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۳- استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۴- کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روان‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

نویسنده مسؤول: غلامرضا خیرآبادی

Email: kheirabadi@bsrc.mui.ac.ir

برنامه‌ریزی‌های مداخله‌ای احتمالی در آینده انجام شد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش به صورت مقطعي و با هدف تعیین و مقایسه وضعیت همدلی پزشکان عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در تخصص‌های مختلف در برخورد با بیماران در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت. جامعه آماري مطالعه شامل کلیه اعضای هيأت علمي مشغول به کار در رشته‌های باليني در دانشگاه و مراکز درمانی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه در سطح شهر اصفهان بود. به منظور داشتن نمونه کافی برای مقایسه بين گروهی، نمونه‌گيری به روش سرشماری بر حسب تخصص‌های مختلف انجام شد و معیار ورود به مطالعه، تمایل افراد جهت شرکت در طرح و تکمیل پرسشنامه بیماری برآورد شد.

از کلیه اعضای هيأت علمي بالیني رشته‌های مختلف پزشکي شامل داخلی، جراحی، نورولوژي، طب اورژانس، قلب، عفونی، زنان، بیهوشی، اطفال، جراحی اعصاب، پوست، ارتودپدي، راديولوژي، طب فiziيکي، انکولوژي و نفرونولوژي به صورت حضوري و يا ارسال ايميل (افرادی که در دسترس نبودند)، برای همکاري در مطالعه دعوت گردید که در مجموع ۲۵۶ نمونه در اختیار محققان قرار گرفت. شرکت در مطالعه اختياري و بر اساس تمایل افراد بود.

جهت سنجش همدلی، از پرسشنامه Jefferson و پژوهش همدلی پزشکان Jefferson Scale of Patient Perceptions of Physician Empathy) (JSPPPE) استفاده شد. اين مقیاس نخستین بار در سال ۱۹۷۲ توسيط Peabody طراحی گردید و مشتمل بر ۹۰ آيتم بود که بر اساس بررسی متون و تجارب روان‌پژشكى تأثیر گردید (۱۹). در سال ۱۹۹۵، اين ابزار توسيط Hojat و همکاران مورد بازبیني قرار گرفت و مقیاس نهايی با ۲۰ آيتم طراحی شد (۲۰). پرسشنامه JSPPPE به صورت خودگزارشي و داراي مقیاس ليکرت پنج درجه‌اي مي‌باشد. تكميل کننده بر اساس ميزان موافقت خود، به هر آيتم نمره‌اي از ۱ تا ۵ مي‌دهد که نمره ۱ نشان دهنده عدم موافقت و نمره ۵ نشان دهنده خداکثر موافقت است. حداقل و خداکثر نمرات كسب شده به ترتيب ۲۰ و ۱۰۰ امتياز مي‌باشد. بالا رفتن نمرات بيانگ افزایش ميزان همدلی مي‌باشد (۲۱).

اعتبار و پایایي پرسشنامه JSPPPE در مطالعات مختلف تحت بررسی و تأييد قرار گرفته است (۲۲). همچين، روايي آن نيز توسيط Hojat و همکاران تأييد شد (۲۳)، روايي نسخه فارسي اين ابزار توسيط هاشمي‌پور و کرمي بررسی گردید که ضريب Cronbach's alpha آن را بالاي ۰/۷۰ و ضريب ICC (Intraclass correlation coefficient) را ۰/۸۲ گزارش نمودند (۲۴). در مطالعه شريعت و كياخوانی، پايابي و روايي نسخه فارسي اين ابزار با استفاده از ضريب Cronbach's alpha (۰/۰۸) مورد تأييد قرار گرفت (۲۵).

در مطالعه حاضر علاوه بر ۲۰ آيتم ذکر شده، اطلاعات دموگرافيك شامل سن، جنسیت، تأهل، سابقه کار، محل کار، رشته تحصیلي، علاقه به رشته تحصصي، تجربه بستری قبلی خود فرد، ابتلای فرد يا بستگان درجه يك به بیماري مزمن و ابتلای شخص به بیماري خاص نيز سوال گردید.

پرسشنامه‌های تهييه شده بعد از هماهنگي با دانشکده پزشكى، به صورت حضوري و با مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشكان عضو هیأت علمي دانشگاه و يا از طریق پست الکترونیک، در اختیار ۲۷۸ نفر از افرادی که تمایل به همکاری داشتند، قرار گرفت. برای رعایت نکات اخلاقی، قبل از تحویل پرسشنامه، راجع به محترمانه بودن اطلاعات و نحوه انجام مطالعه توضیحات لازم به افراد ارایه شد.

را با همدردي و محبت نسبت به بیمارش همراه کند (۴).

جدا از اهميت همدلی در برقراری ارتباط پزشك با بیمار، به کار بردن همدلی در علوم پزشكى، نتایج مثبت زیادي در بردارد که هم برای بیمار و هم برای پزشك مفید است و پزشك و بیمار هر دو از برقراری روابط همدلانه سود می‌برند. همدلی فرایند مداوای بیماری را تقویت می‌کند و هنگامی که بیمار احساس می‌کند پزشك او را درک کرده است، احتمال بیشتری دارد که از توصیه‌های درمانی وی پیروی نماید (۵). در نتیجه، همکاري و تمكين بیمار بهتر می‌شود و رنج و تحمل بیماری برای او آسان‌تر می‌گردد (۶).

همدلی اثر مستقیمي بر روی پیامدهای بالیني دارد. در مطالعه Hojat و همکاران، اثر میزان همدلی پزشك با بیماران مبتلا به دیابت از طریق اندازه‌گيري سطح هموگلوبین گلیکوزیله بررسی شد. نتایج نشان داد، کنترل دیابت در گروهی که پزشك معالج همدلی بیشتری با بیمارانش داشت، بهتر بود (۷). مطالعات دیگري نتیجه‌گيري کردنده که کنترل بیماری و تشخيص آن در بیماران پزشكاني که نمره همدلی بیشتری دارند، بهتر است (۸، ۹). همچنین، اثرات مثبت همدلی بر سیر و پيش‌آگهی بیماران دچار سكته قلبی (۱۰) و آسماتيک (۱۱) تأييد شده است.

همدلی با بیمار، موجب افزایش رضایتمندی هر دو طرف (پزشك- بیمار) می‌شود و روابط همدلانه با بیمار همچون مانع در برابر استرس‌های شغلی و فرسودگی (که پزشكان با آن روبرو هستند) عمل می‌کند و به عنوان عامل بالقوه‌ای برای بهزیستي پزشكان محسوب می‌شود. همدلی موجب کاهش درگيری‌های قانونی در زمينه پزشكی می‌گردد و هرگاه بیمار از مراقبت‌های عاطفي پزشك خود راضی باشد، حتی اگر از نتایج درمان رضایت نداشته باشد، کمتر علیه پزشك خود شکایت می‌کند (۱۲).

نتایج پژوهش Pollak و همکاران نشان داد که پزشكان به ندرت به احساسات منفي بیمارانشان پاسخ همدلانه نشان می‌دهند (۱۳). مطالعات مختلف نتایج متفاوت را در رابطه با نقش عوامل بر میزان همدلی پزشكان ارایه کرده‌اند. در مطالعه شريعت و همکاران، همدلی در پزشكان زن بیشتر از مردان بود و عنوان شد که همدلی با افزایش تجربه عملی پزشك افزایش می‌باشد (۱۴). نتایج تحقیق Hasan و همکاران که در کویت انجام گرفت، حاکي از آن بود که میزان همدلی رابطه مستقیمي با جنسیت، مقاطع تحصيلي پزشكى، سطح تحصيلات مادر، درامد خانواده و سطح استرس فرد داشت، اما بين همدلی با معدل دانشجو، رشته تحصصي مورد علاقه و سطح تحصيلات پدر رابطه‌اي مشاهده نشد (۱۵). مطالعه‌اي به منظور ارزیابی میزان همدلی در ابتدا و انتهای دوره کارورزی انجام گرفت و نتایج آن نشان داد که میزان همدلی در پایان دوره افزایش یافته است (۱۶). نتایج تحقیق West و همکاران گزارش کرد که کاهش همدلی با افزایش خطاهای فردی دستیاران همراه می‌باشد (۱۷).

همچنین، نتایج مطالعه‌اي که بر روی دستیاران مشغول به تحصيل در رشته‌های بیماردار (زنان و زایمان، اورژانس و روان‌پزشكى) انجام گردید، حاکي از آن بود که اين دستیاران نمره همدلی بالاتری نسبت به دستیاران مشغول به تحصيل در رشته‌های بر پایه تکنولوژي (رادیولوژي) كسب کردنده (۱۸).

با توجه به اهميت همدلی در كسب نتایج درمانی بهتر، رضایت مراجعيان، بهبود رابطه پزشك- بیمار، محافظت پزشك از فرسودگي شغلی و شکایت بیماران و همچنین، قابل آموزش بودن اين توانمندی، مطالعه حاضر با هدف ارزیابي وضع موجود در اعضای هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكى اصفهان و

جدول ۱. مقایسه میانگین نمرات همدلی در شرکت کنندگان بر حسب خصوصیات دموگرافیک و برخی دیگر از متغیرها

P	میانگین ± انحراف معیار	تعداد	متغیر مورد مطالعه
.۰/۷۰۰	۷۹/۸۶ ± ۹/۷۵۹	۵۱	مرد
	۷۹/۲۲ ± ۷/۹۳۴	۲۲	زن
.۰/۹۰۰	۷۹/۲۸ ± ۶/۸۷۳	۷	محدر
	۷۹/۷۱ ± ۹/۴۵۱	۶۶	متاهل
.۰/۳۰۰	۸۲/۲۵ ± ۱۰/۷۹۷	۱۲	بلی
	۷۹/۷۷ ± ۸/۹۰۰	۶۰	خیر
.۰/۸۰۰	۷۹/۹۲ ± ۹/۱۵۳	۴۲	بلی
	۷۹/۵۳ ± ۹/۴۸۲	۳۰	خیر
.۰/۹۰۰	۷۹/۶۰ ± ۹/۳۰۳	۱۵	بلی
	۷۹/۸۰ ± ۹/۲۹۰	۷۵	خیر
	۸۳/۵۰ ± ۳/۵۲۵	۲	مطب
.۰/۳۰۰	۷۸/۰۵ ± ۹/۲۱۸	۳۶	دانشگاه
	۸۱/۱۱ ± ۹/۱۹۷	۳۵	هر دو

علاقة زیاد، ۸۰/۱۵ و در گروه با علاقه متوسط، ۷۵/۱۴ به دست آمد. بین علاقه

به رشته تحصیلی و میزان همدلی ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد ($P = 0/172$). با توجه به شاخص‌های احتمالی دخیل، در پرسشنامه سؤالات دیگری برای سنجش همدلی مطرح شده بود. برای مثال، ساقه‌بستری قبلی به مدت بیش از سه روز در بیمارستان ($P = 0/900$), ابتلای بستگان درجه یک به بیماری مزمن ($P = 0/800$) یا ابتلای به بیماری خاص که موجب مراجعه مکرر به سایر متخصصان می‌شود ($P = 0/300$). با توجه به داده‌های جدول ۱، همدلی با هیچ کدام از شاخص‌های مذکور ارتباط معنی‌داری نداشت. همچنین، بر اساس محل کار افراد که مطب، دانشگاه و یا هر دو بود، میانگین نمره همدلی برای هر آیتم محاسبه و مقایسه شد که ارتباط معنی‌داری با نمره همدلی مشاهده نشد ($P = 0/318$).

در بررسی داده‌ها، رشته‌های مختلف در سه گروه رشته‌های جراحی، غیر جراحی و روان‌پژوهی قرار گرفتند. رشته‌های جراحی شامل جراحی اعصاب، جراحی عمومی، زنان و ارتوبیدی و رشته‌های غیر جراحی شامل داخلی، نوروولوژی، قلب، عفونی، کودکان، بیهوشی، طب اورژانس، رادیولوژی، طب فیزیکی و بوست بود. رشته‌های روان‌پژوهی زیرمجموعه‌ای نداشت.

از آن جایی که ابتدا با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smirnov مشخص شد داده‌ها بر اساس این طبقه‌بندی از توزیع نرمال پیروی می‌کنند ($P > 0/05$), برای تحلیل داده‌ها و مقایسه همدلی بین سه گروه از آزمون ANOVA استفاده گردید که نتایج آن در جدول ۲ ارایه شده است. بین نمره همدلی سه گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده شد ($P = 0/045$). بیشترین میانگین نمره همدلی در استادان رشته روان‌پژوهی و بعد از آن، در رشته‌های غیر جراحی و در نهایت رشته‌های جراحی وجود داشت.

با وجود این که نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام گرفت، اما متأسفانه به علت عدم همکاری تعداد زیادی از افراد (که از ابتدای تمايل به همکاری نداشتند و با پرسشنامه‌ها را به صورت کامل نکمل نکردند)، فقط ۷۳ پرسشنامه از مجموع ۲۵۶ پرسشنامه تکمیل و عودت گردید و به منظور افزایش تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده، از مدیریت دانشکده پژوهشکی درخواست کمک شد و پیشنهاد گردید که در صورت اجازه آن دانشکده، مکاتبه رسمی و اداری چهت تکمیل پرسشنامه‌ها صورت گیرد که مورد قبول دانشکده واقع نشد. بنابراین، با مراجعه مکرر و حضوری به مطب استادان، ۷۳ پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t ، ۲۰ ANOVA یک‌طرفه و Kruskal-Wallis (version 20, SPSS Inc., Chicago, IL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. $P < 0/05$ به عنوان سطح معنی‌داری داده‌ها در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در مطالعه حاضر، ۷۷ نفر از ۲۵۶ پژوهشک هیأت علمی دانشگاه علوم پژوهشکی اصفهان در تکمیل پرسشنامه‌ها همکاری نمودند که ۴ پرسشنامه به علت نقص بودن اطلاعات، از تجزیه و تحلیل خارج شد و ۷۳ پرسشنامه مورد بررسی نهایی قرار گرفت. میانگین نمره همدلی در کل نمونه‌ها، ۷۶/۶۷ به دست آمد. حداکثر و حداقل نمره نیز ۹۷ و ۶۰ بود.

جدول ۱ میانگین نمرات همدلی کسب شده را بر حسب خصوصیات دموگرافیک و برخی دیگر از متغیرهای مورد مطالعه نشان می‌دهد. ۶۶ نفر به رشته تحصیلی خود علاقه زیاد و ۷ نفر علاقه متوسط داشتند. میانگین نمره همدلی در گروه با

جدول ۲. مقایسه میانگین نمرات همدلی بر حسب تقسیم‌بندی افراد به رشته‌های جراحی، غیر جراحی و روان‌پژوهی

نوع رشته	میانگین ± انحراف معیار	F	درجه آزادی	P
رشته‌های جراحی	۷۳/۶۴ ± ۱۱/۰۸۳	۳/۲۵۸	۲	۰/۰۴۵
رشته‌های غیر جراحی	۷۹/۲۳ ± ۹/۲۳۰			
روان‌پژوهی	۸۴/۰۰ ± ۴/۸۹۹			

جدول ۳. مقایسه میانگین نمرات همدلی بر حسب تقسیم‌بندی رشته‌ها در چهار گروه

نوع رشته	میانگین ± انحراف معیار	درجه آزادی	F	p
رشته‌های مبتنی بر تکنولوژی	۷۲/۸۷ ± ۱۳/۰۵۴	۳	۱/۹۹۶	۰/۱۲۳
رشته‌های مبتنی بر ابزار	۷۵/۸۷ ± ۹/۹۷۸			
رشته‌های غیر مرتبط با مراقبت‌های اولیه	۸۰/۹۴ ± ۶/۸۳۸			
رشته‌های مرتبط با مراقبت‌های اولیه	۷۹/۱۸ ± ۱۱/۱۲۰			

کننده در این مطالعه دانست (۲۲ زن در مقابل ۵۱ مرد).

در مطالعه حاضر، بر اساس وضعیت تأهیل نیز تفاوت معنی‌داری مشاهده شد که با یافته‌های برعی مطالعات دیگر (۲۵) مشابه است. از جمله مسائل دیگری که در این پژوهش به آن پرداخته شد، ارتباط بین نمره همدلی استادان با میزان علاقه به رشته تخصصی خود (اصلاً کم، زیاد و متوسط) می‌باشد. بدین ترتیب، از مجموع ۷۳ نفر، ۷ نفر علاقه به رشته تخصصی خود را متوسط و ۶۶ نفر آن را زیاد بیان کردند. این امر نشان می‌دهد که ۹۰ درصد استادان علاقه زیادی به رشته تحصیلی خود دارند و بیانگر آن است که با این‌داده انتخاب رشته بر اساس علاقه صورت گرفته و یا این علاقه در طی دوران تحصیل دستیاری و اشتغال به کار درمانی ایجاد شده است. با توجه به این که علاقمندی به رشته یکی از موارد بسیار تأثیرگذار در عملکرد شغلی مناسب می‌باشد، این نتایج امیدوار کننده است. با این وجود، بین علاقه به رشته و میزان همدلی ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.

در مطالعه حاضر، بر اساس نوع رشته تخصصی، بالاترین میانگین نمره همدلی در استادان نفروژوئی و بعد از آن به ترتیب در استادان رشته‌های عفونی و روان‌پزشکی مشاهده شد و کمترین میانگین نمره همدلی به استادان رشته جراحی اعصاب و بعد از آن به رشته رادیولوژی اختصاص داشت. مطالعات مختلف (۲۵، ۲۸، ۳۲) نتایج متفاوتی را در این زمینه عنوان کرده‌اند.

در مطالعه شریعت و کیاخوانی بر روی دستیاران پزشکی، حداقل نمره همدلی در دستیاران رشته روان‌پزشکی مشاهده گردید که اختلاف معنی‌داری با رشته‌های پوست، ارتوپدی و چشم داشت و کمترین نمره مربوط به دستیاران پوست بود. نتایج اغلب پژوهش‌های انجام گرفته پیرامون این موضوعات نشان داده است که میزان همدلی در رشته‌های تخصصی مختلف، متفاوت می‌باشد و در بیشتر مطالعات، بیشترین میزان همدلی را دستیاران روان‌پزشکی و بعد از آن رشته‌های داخلی، اطفال و اورژانس داشتند. در مرحله بعد، رشته‌های جراحی مانند جراحی عمومی، جراحی قلب، ارتوپدی و زنان قرار گرفتند که بیشتر کار آن‌ها در اطاق عمل و با تکیه بر جراحی بود. در انتهای این فهرست، رشته‌های رادیولوژی و پاتولوژی بودند که تشخیص در این رشته‌ها بیشتر بر اساس تکنولوژی و پاراکلینیک صورت می‌گیرد و کمتر با خود بیماران سر و کار دارند (۲۵).

مطالعه دیگری که بر روی دانشجویان پزشکی صورت گرفت، گزارش کرد، دانشجویانی که تمایل به تحصیل در رشته‌های غیر جراحی دارند، سطح همدلی بالاتری را نسبت به دانشجویان عالقمند به رشته‌های جراحی نشان می‌دهند (۲۸). نتایج پژوهش Walocha و همکاران بیان نمود که همدلی در رشته‌های غیر جراحی بیشتر است و علت آن، ارتباط مستقیم بیشتر پزشک با بیمار در رشته‌های غیر جراحی می‌باشد (۲۲).

با انجام آزمون تعقیبی (Least significant difference) (LSD) برای مقایسه یک به یک گروه‌ها، مشخص شد که بین دو گروه روان‌پزشکی و جراحی تفاوت معنی‌داری وجود داشت ($P = ۰/۰۱۴$).

از یک نگاه دیگر، رشته‌های تخصصی پزشکی در چهار گروه مختلف قرار گرفتند (۲۵). این گروه‌ها شامل رشته‌های مبتنی بر تکنولوژی مانند ارتوپدی، جراحی عمومی و جراحی اعصاب؛ رشته‌های مبتنی بر ابزار مانند رادیولوژی و بیهوشی؛ رشته‌های غیر مرتبط با مراقبت‌های اولیه مانند عفونی، قلب، پوست، طب اورژانس، روان‌پزشکی، زنان، طب فیزیکی، نورولوژی و طب کار و رشته‌های مرتبط با مراقبت‌های اولیه (مردم‌دار) همچون داخلی و اطفال بود.

در مقایسه همدلی بین این چهار گروه، بیشترین میانگین نمره همدلی در رشته‌های غیر مرتبط با مراقبت‌های اولیه و کمترین میانگین نمره همدلی در رشته‌های مبتنی بر تکنولوژی مشاهده شد و تفاوت بین گروه‌ها معنی‌دار نبود ($P = ۰/۱۲۳$). (جدول ۳).

بحث و نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر با هدف اندازه‌گیری همدلی اعضای اعیان علمی دانشگاه اصفهان انجام گرفت. ارتباط آماری معنی‌داری بین نمره همدلی و ویژگی‌های دموگرافیک مانند جنسیت و وضعیت تأهیل مشاهده نشد.

مطالعات زیادی در کشورهای مختلف نقش جنسیت را در میزان همدلی بررسی کرده‌اند که بر اساس نتایج، در دو گروه قرار می‌گیرند. در بیشتر مطالعات، میزان همدلی در خانم‌ها بیشتر از آقایان عنوان شده، اما بیشتر آن‌ها بر روی دانشجویان و دستیاران پزشکی صورت گرفته است (۲۶-۲۹). خادم‌الحسینی و همکاران در تحقیق خود گزارش کردند که دانشجویان پزشکی دختر با میانگین ۵/۵ نمره همدلی بالاتری نسبت به دانشجویان پزشکی پسر با میانگین ۵/۰ داشتند و تفاوت بین این دو گروه معنی‌دار بود (۳۰). در پژوهش انجام شده بر روی دانشجویان دندان‌پزشکی نیز نتیجه مشابهی به دست آمد (۳۱).

در گروه دیگری از مطالعات، ارتباط معنی‌داری بین جنسیت و نمره همدلی مشاهده نشد (۲۵) که مطالعه حاضر نیز از این نظریه حمایت می‌کند. در تحقیقی که در لهستان بر روی متخصصان (و نه دانشجویان) صورت گرفت، مشخص گردید که ارتباط معنی‌داری بین زنان و مردان از نظر نمره همدلی وجود نداشت (۳۲) که با یافته‌های مطالعه حاضر همخوانی دارد. این تفاوت نتایج می‌تواند ناشی از جامعه آماری متفاوت بین دو گروه باشد که در اکثر مطالعات بر روی دانشجویان پزشکی و دستیاران انجام گرفته بود و در پژوهش حاضر و مطالعه انجام شده در لهستان (۳۲) بر روی متخصصان انجام شد. همچنین، می‌توان علت را ناشی از تعداد کم حجم نمونه و عدم تساوی تعداد زن و مرد شرکت

همدلی با بیماران در پژوهشکان عضو هیأت علمی رشته‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متفاوت است. این افراد همدلی و همکاری لازم را با دانشجویان خود در تکمیل پرسشنامه تحقیقاتی ارایه شده نداشتند. محدودیت اصلی مطالعه حاضر، عدم همکاری مناسب پژوهشکان هیأت علمی در تکمیل و عودت پرسشنامه‌های تحقیقاتی بود.

پیشنهادها

تکرار مطالعه در سایر دانشگاه‌های ایران و مقایسه نتایج و اقدام به پرسشگری در شرایط و همراه با تمهدیاتی که حداکثر مشارکت پژوهشکان هیأت علمی را به همراه داشته باشد، توصیه می‌گردد. همچنین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور ارتقای همدلی با بیماران و انتقال تجربه به دانشجویان توسط همکاران پژوهش هیأت علمی دانشگاه پیشنهاد می‌شود.

سیاست‌گذاری

مطالعه حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهش و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شماره ۲۹۲۰۹ می‌باشد. بدین وسیله از کلیه اعضای هیأت علمی جهت همکاری در تکمیل پرسشنامه‌ها و همچنین، از مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روان‌پژوهی که زمینه اجرای این پژوهش را فراهم نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

اگرچه در مطالعه حاضر برخلاف اغلب مطالعات حداکثر نمره مربوط به رشته روان‌پژوهی نبود، اما کمترین نمره همدلی در جراحان اعصاب مشاهده شد که در تبیین علت آن می‌توان گفت، جراحان با احتمال بیشتری با بیماران پرخاشگر یا بیماران غیر مطبوع و گاهی غیر هوشیار پرخورد دارند. در مطالعه وی، همدلی به تفکیک رشته تخصصی تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.

با وجود این که همدلی نقش بسیار مهمی در مراقبت‌های پژوهشکی و روند درمان بیمار ایفا می‌نماید، مطالعات بسیاری از کاهش همدلی طی دوران تحصیل پژوهشکی و دوره دستیاری خبر می‌دهد (۳۴، ۳۳، ۲۶)، اما شاخص‌های دخیل در کاهش احتمالی همدلی هنوز ناشناخته مانده است و به نظر می‌رسد این شاخص‌ها متعدد و چند جانبه باشند. یکی از عوامل احتمالی را ساعات کاری و تعداد زیاد مراجعه کنندگان به بیمارستان‌های دولتی عنوان کرده‌اند (۲۵). به منظور بررسی این عامل، محل کار از شرکت کنندگان این طرح سؤال شد که ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. تبیین دقیق این موضوع نیازمند مطالعات تکمیلی با حجم نمونه بالاتر می‌باشد؛ چرا که بیشتر حجم بیماران در نظام سلامت ایران و طی طرح تحول، به سمت بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی سوق داده می‌شوند و اگر سختی کار موجب کمتر شدن همدلی پژوهش با بیمار شود، به طور قطع بر روند درمانی اثر دارد و باید این مشکل به نحوی برطرف شود. با افزایش حجم بیماران، فرصت ویزیت هر بیمار کاهش می‌یابد و شاخص زمان یکی از مسائل بسیار تأثیرگذار در پیدایش همدلی بین هر دو انسان است.

References

- Jolliffe D, Farrington DP. Examining the relationship between low empathy and bullying. *Aggressive Behavior* 2006; 32(6): 540-50.
- Rieffe C, Ketelaar L, Wiefferink CH. Assessing empathy in young children: Construction and validation of an Empathy Questionnaire (EmQue). *Pers Individ Dif* 2010; 49(5): 362-7.
- Hemmerdinger JM, Stoddart SD, Lilford RJ. A systematic review of tests of empathy in medicine. *BMC Med Educ* 2007; 7: 24.
- Parvan K, Ebrahimi H, Zamanzadeh V, Seyedrasooly A, Dadkhah D, Jabarzadeh F. Empathy from the nurses' viewpoint in teaching hospitals of Tabriz university of medical sciences, Iran. *J Caring Sci* 2014; 3(1): 29-36.
- Squier RW. A model of empathic understanding and adherence to treatment regimens in practitioner-patient relationships. *Soc Sci Med* 1990; 30(3): 325-39.
- Kim SS, Kaplowitz S, Johnston MV. The effects of physician empathy on patient satisfaction and compliance. *Eval Health Prof* 2004; 27(3): 237-51.
- Hojat M, Louis DZ, Markham FW, Wender R, Rabinowitz C, Gonnella JS. Physicians' empathy and clinical outcomes for diabetic patients. *Acad Med* 2011; 86(3): 359-64.
- Tavakol S, Dennick R, Tavakol M. Medical students' understanding of empathy: a phenomenological study. *Med Educ* 2012; 46(3): 306-16.
- Rietveld S, Prins PJ. The relationship between negative emotions and acute subjective and objective symptoms of childhood asthma. *Psychol Med* 1998; 28(2): 407-15.
- Frasure-Smith N, Lesperance F, Talajic M. The impact of negative emotions on prognosis following myocardial infarction: is it more than depression? *Health Psychol* 1995; 14(5): 388-98.
- Zachariae R, Pedersen CG, Jensen A, Ehrnrooth E, Rossen P, von der Maase H. Association of perceived physician communication style with patient satisfaction, distress, cancer-related self-efficacy, and perceived control over the disease. *Br J Cancer* 2003; 88(5): 658-65.
- Levinson W, Roter DL, Mullooly JP, Dull VT, Frankel RM. Physician-patient communication. The relationship with malpractice claims among primary care physicians and surgeons. *JAMA* 1997; 277(7): 553-9.
- Pollak KI, Arnold R, Alexander S, Jeffreys AS, Olsen MK, Abernethy A, et al. Do patient attributes predict oncologist empathic responses and patient perceptions of empathy? *Support Care Cancer* 2010; 18(11): 1405-11.
- Shariat SV, Eshtad E, Ansari S. Empathy and its correlates in Iranian physicians: A preliminary psychometric study of the Jefferson Scale of Physician Empathy. *Med Teach* 2010; 32(10): e417-e421.

15. Hasan S, Al-Sharqawi N, Dashti F, AbdulAziz M, Abdullah A, Shukkur M, et al. Level of empathy among medical students in Kuwait University, Kuwait. *Med Princ Pract* 2013; 22(4): 385-9.
16. Rosen IM, Gimotty PA, Shea JA, Bellini LM. Evolution of sleep quantity, sleep deprivation, mood disturbances, empathy, and burnout among interns. *Acad Med* 2006; 81(1): 82-5.
17. West CP, Huschka MM, Novotny PJ, Sloan JA, Kolars JC, Habermann TM, et al. Association of perceived medical errors with resident distress and empathy: a prospective longitudinal study. *JAMA* 2006; 296(9): 1071-8.
18. Hojat M, Zuckerman M, Magee M, Mangione S, Nasca T, Vergare M, et al. Empathy in medical students as related to specialty interest, personality, and perceptions of mother and father. *Pers Individ Dif* 2005; 39(7): 1205-15.
19. Peabody FW. The care of the patient. *Holistic Medicine* 1990; 5(3-4): 129-40.
20. Hojat M, Gonnella JS, Nasca TJ, Mangione S, Veloski JJ, Magee M. The Jefferson Scale of Physician Empathy: further psychometric data and differences by gender and specialty at item level. *Acad Med* 2002; 77(10 Suppl): S58-S60.
21. Vallabh K. Psychometrics of the student version of the Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE-S) in final-year medical students in Johannesburg in 2008. *S Afr J Bioeth Law* 2011; 4(2): 63-8.
22. Hojat M, Gonnella JS, Nasca TJ, Mangione S, Vergare M, Magee M. Physician empathy: definition, components, measurement, and relationship to gender and specialty. *Am J Psychiatry* 2002; 159(9): 1563-9.
23. Hojat M, Mangione S, Kane GC, Gonnella JS. Relationships between scores of the Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) and the Interpersonal Reactivity Index (IRI). *Med Teach* 2005; 27(7): 625-8.
24. Hashemipour M, Karami MA. Validity and reliability of the Persian version of JSPE-HP questionnaire (Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Professionals Version). *J Kerman Univ Med Sci* 2012; 19(2): 201-11. [In Persian].
25. Shariat SV, Kaykhavoni A. Empathy in medical residents at Iran University of Medical Sciences. *Iran J Psychiatry Clin Psychol* 2010; 16(3): 248-56. [In Persian].
26. Chen D, Lew R, Hershman W, Orlander J. A cross-sectional measurement of medical student empathy. *J Gen Intern Med* 2007; 22(10): 1434-8.
27. Newton BW, Barber L, Clardy J, Cleveland E, O'Sullivan P. Is there hardening of the heart during medical school? *Acad Med* 2008; 83(3): 244-9.
28. Hojat M, Vergare MJ, Maxwell K, Brainard G, Herrine SK, Isenberg GA, et al. The devil is in the third year: a longitudinal study of erosion of empathy in medical school. *Acad Med* 2009; 84(9): 1182-91.
29. Austin EJ, Evans P, Magnus B, O'Hanlon K. A preliminary study of empathy, emotional intelligence and examination performance in MBChB students. *Med Educ* 2007; 41(7): 684-9.
30. Khademalhosseini M, Khademalhosseini Z, Mahmoodian F. Comparison of empathy score among medical students in both basic and clinical levels. *J Adv Med Educ Prof* 2014; 2(2): 88-91.
31. Sherman JJ, Cramer A. Measurement of changes in empathy during dental school. *J Dent Educ* 2005; 69(3): 338-45.
32. Walocha E, Tomaszecka IM, Mizia E. Empathy level differences between Polish surgeons and physicians. *Folia Med Cracov* 2013; 53(1): 47-54.
33. Bellini LM, Baime M, Shea JA. Variation of mood and empathy during internship. *JAMA* 2002; 287(23): 3143-6.
34. Bellini LM, Shea JA. Mood change and empathy decline persist during three years of internal medicine training. *Acad Med* 2005; 80(2): 164-7.

Empathy with Patients in Medical Sciences Faculty Physicians at Isfahan University of Medical Sciences, Iran

Gholamreza Kheirabadi¹, Mahdokht Haji-Rahimi², Behzad Mahki³, Nasrin Masaiey⁴, Maryam Yahaei², Laya Golshani², Dorna Kheirabadi²

Original Article

Abstract

Aim and Background: Empathy has an important role in better health results, customer satisfaction, improved physician-patient relationship, prevention of job burnout among physicians, and possible patient complaints from doctors. This study aims to evaluate the level of empathy with patients among the faculty members of Isfahan University of Medical Sciences, Iran.

Methods and Materials: This cross-sectional study was conducted on medical sciences faculty physicians with different specialties at Isfahan University of Medical Sciences in 2013. The participants were selected through census sampling method. The Jefferson Scale of Patient Perceptions of Physician Empathy (JSPPPE) was distributed among 278 physicians via e-mail or in person. Only 73 questionnaires were completed and returned. The collected data were analyzed using t-test, one-way ANOVA, and Kruskal-Wallis in SPSS software. All P values < 0.05 were considered as significant.

Findings: The highest and lowest average empathy scores were observed in nephrology professors and neurosurgery and radiology professors, respectively. After the categorization of the various disciplines into three groups of surgery, non-surgery, and psychiatry, the highest empathy score was observed in the group of psychiatry professors, followed by the non-surgical and surgical groups ($P = 0.045$).


Conclusions: Empathy with patients differed among physicians of different disciplines of Isfahan University of Medical Sciences. They did not show empathy and cooperation with their students in completing the questionnaire presented to them.

Keywords: Empathy, Medical sciences faculty physicians, Patients

Citation: Kheirabadi G, Haji-Rahimi M, Mahki B, Masaiey N, Yahaei M, Golshani L, et al. **Empathy with Patients in Medical Sciences Faculty Physicians at Isfahan University of Medical Sciences, Iran.** J Res Behav Sci 2016; 14(2): 154-60.

Received: 21.12.2015

Accepted: 14.05.2016



1- Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2- Student of Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3- Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4- Behavioral Sciences Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Corresponding Author: Gholamreza Kheirabadi, Email: kheirabadi@bsrc.mui.ac.ir