

تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و اضطراب و افسردگی کودکان دیابت نوع یک

مریم اکبری^{۱*}, بهناز دهقانی^۲, آمنه جعفری^۳, آمنه کاردر^۴

دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: بازی درمانی تأثیری مثبت بر تنظیم شناختی هیجان، کاهش اضطراب و افسردگی کودکان دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و اضطراب و افسردگی کودکان دیابت نوع یک انجام شده است.

مواد و روش کار: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایشی و گواه است. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه کودکان دیابتی نوع ۹ تا ۱۱ سال شهرستان ساری سال ۹۵-۹۶ می‌باشد. از بین جامعه آماری، ۱۸ در مرحله پیش آزمون به تعداد ۱۸ نفر پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرافیکی و پرسشنامه اضطراب بک (BID) و پرسشنامه افسردگی بک (BID) داده شد تا تکمیل نمایند، پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها از بین کسانی که در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان نمره بالا و اضطراب و افسردگی نمره پایین کسب کرده‌اند، به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه (هر کدام ۹ نفر) قرار گرفتند. سپس برای کودکان دیابتی گروه آزمایشی به مدت دو ماه، هشت جلسه آموزش بازی درمانی مبتنی بر شناختی رفتاری برگزار شد. اما به گروه گواه، آموزش خاصی داده نشد. سرانجام در پایان آموزش، دو گروه در یک جلسه به پس آزمون پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرافیکی و پرسشنامه اضطراب بک (BID) و پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش آماری کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج نشان دادند، بازی درمانی به شیوه شناختی - رفتاری موجب افزایش تنظیم شناختی هیجان و کاهش اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک شده است.

بحث و نتیجه‌گیری: مطابق با یافته‌های این پژوهش بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری تأثیر مثبت بر کاهش اضطراب و افسردگی در کودکان دارد. همچنین، بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری راهبرد مفیدی برای کاهش اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: اضطراب، افسردگی، بازی درمانی، تنظیم هیجانی، شناختی رفتاری

مجله ایده‌های نوین روانشناسی، دوره اول، شماره دوم، ص ۵۴-۴۵، بهار ۱۳۹۶

آدرس مکاتبه: ساری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دانشکده روانشناسی، تلفن: ۰۹۱۱۳۵۳۴۱۵۰

Email: Akbarishila1352@yahoo.com

می‌کند تا از نظر روانی و جسمی سالم بوده و نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کند. توجه به رشد جسمی، هیجانی، روانی و رفتاری آنان همواره از سوی اندیشمندان و پژوهشگران مورد تأکید بوده است، به گونه‌ای که در ۲۵ سال اخیر مسایل و مشکلات رفتاری، اجتماعی و هیجانی کودکان به عنوان یکی از موضوع‌های عمدی و اصلی روان‌پژوهی

مقدمه

کودکان قشر عمده‌ای از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، به‌طوری که در کشورهای در حال توسعه، سهم این قشر از کل جمعیت تقریباً به ۵۰ درصد می‌رسد (۱). در هر جامعه سلامت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه‌ای دارد و توجه به بهداشت روانی آنان کمک

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (نویسنده مسئول)

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مشاور آموزش و پرورش، دانشکده روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

^۳ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

^۴ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

راهبردهای تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی وجود دارد. نتایج پژوهش‌ها نشان داد که استفاده از برخی راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجان، روی تجربه هر فرد از حوادث منفی زندگی تأثیر می‌گذارد که یکی از این راهبردها بازی درمانی است (۶). کودکانی که افسرده هستند ممکن است به عنوان افسرده برچسب نخورند، زیرا افسرده‌گی آن‌ها ذهنی و یک واکنش شخصی است. در سبب‌شناسی اختلال افسرده‌گی کودکی، به سابقه خانوادگی، عوامل زیستی، عوامل اجتماعی و شیوه فرزندپروری اشاره گردیده است. در این جامعه، نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی دارای بیشترین تأثیر می‌باشد (۷). شیوه اختلال افسرده‌گی در دوره‌های تحول دو درصد کودکان ۴ تا ۱۶ سالگی تخمين زده شده است. مقدار شیوه افسرده‌گی در آمریکا در کودکان ۰/۴ تا ۲/۵ درصد و مقدار شیوه آن در طی عمر برای نوجوان سنین ۱۵ تا ۱۸ سال ۱۴ درصد تخمین زده شد. در مقدار افسرده‌گی بین پسران و دختران در سنین کودکی تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نگردیده است (۸). قابل ذکر این که هر چقدر سن افسرده‌گی پایین‌تر باشد، پیش آگهی ضعیفتر است (۹). بازی درمان‌گری یک روش کاملاً شناخته شده در محیط روانشناسی کودک است اما تا چندی پیش این شیوه از پشتونه تجربی اندکی برخوردار بود. تلاش برای اثبات، بازی درمان‌گری هفت دهه قدیم دارد. در دهه ۱۹۴۰، اکسلاین نخستین بار به طور جدی کوشید اعتبار این روش مداخله را از طریق بررسی دقیق سوابق مراجعت‌نشان دهد. اما تلاش‌های وی به دلیل عدم استفاده از روش‌های آماری متناسب، به نتیجه قابل قبولی منتهی نشد. پس از آن نیز پژوهش‌های متعددی در این عرصه انجام شدند. اما حجم پایین نمونه‌ها و عدم کنترل دقیق شرایط پژوهش، تعمیم‌پذیری نتایج را با محدودیت رویرو می‌ساخت. در سال‌های اخیر، در پرتو جنبش شناسایی درمان‌گری‌های مبتنی بر شواهد، پژوهش در زمینه درمان‌گری به طور چشمگیری افزایش یافته است و پژوهشگران کوشیده‌اند بازی درمان‌گری را به عنوان یک روش درمان‌گری مؤثر در درمان طیف وسیعی از مشکلات و اختلال‌های دوران کودکی، در فهرست مؤثرترین و پرکاربردترین روش‌های درمانی قرار دهند (۱۰). بازی درمان‌گری یکی از شاخص‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها است که روانشناسان و پژوهشگران متعددی طی چندین دهه از این روش برای درمان طیف وسیعی از اختلال‌ها و مشکلات بهره جسته‌اند و اثربخشی آن را به اثبات رسانیده‌اند (۶).

بازی درمانی روشی است که به وسیله آن، ابزارهای طبیعی بیان حالت کودک، یعنی بازی، به عنوان روش درمانی وی به کار گرفته می‌شوند تا به همچنین این روش در مورد کودکان سه تا هشت ساله به کار می‌رود که مشکلات خانوادگی (مانند طلاق والدین) دارند، ناخن می‌جونند، دچار شب ادراری‌اند، اختلال رفتاری دارند، بیش‌فعال‌اند، در روابط گروهی موفق نیستند، اضطراب دارند و دارای افسرده‌گی در دوران کودکی هستند. این

و روانشناسی مطرح بوده است (۲). اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشأ ناشناخته که فرد تجربه می‌کند و آن شامل عدم اطمینان، درمانندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی است. اضطراب دارای هیجان منفی است و یک احساس نگرانی در مورد خطری که احتمال بروز دارد، در بر می‌گیرد. نشانه‌های اضطراب در کودکان و بزرگسالان تقریباً مشابه است، اما ظاهرات آن در سنین گوناگون متفاوت می‌باشد. اختلالات اضطرابی جزء شایع‌ترین اختلالات رایج در کودکان می‌باشد که منجر به اختلال در عملکرد تحصیلی، سازگاری اجتماعی، زندگی خانوادگی و روابط با همسالان می‌گردد. از اختلال افسرده‌گی نیز یکی از رایج‌ترین مشکلات دوران کودکی است (۳). اختلال افسرده‌گی به عنوان یک مسئله روانی که در آن شخص به گونه پایدار ناراحتی عمیق و مداوم و علاقه کاسته شده‌ای را در تمام فعالیت‌ها برای دوره‌ای حداقل دو هفته‌ای تجربه می‌کند، تعریف شده است (۴). اختلال افسرده‌گی کودکی به گونه منفی عملکرد شخصی و خانوادگی به هنگار کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اغلب تا بزرگسالی به صورت متناوب ادامه می‌یابد. در سال‌های اخیر وجود افسرده‌گی و اضطراب در کودکان و نوجوانان نه تنها محزز دانسته شده است، بلکه نظر بر این است که افسرده‌گی و اضطراب در کودکی می‌تواند مشکلات جدی برای سلامت عمومی ایجاد کند. به گونه‌ای که پژوهش‌ها نشان داده است که شناسایی افسرده‌گی‌ها و اضطراب‌های کودکی و نوجوانی می‌تواند احتمال بیماری‌های روانی دیگر، ناراحتی‌های شدید، رفتارهای ناسازگارانه و حتی مرگ‌ومیر کودکان و نوجوانان را کاهش می‌دهد. برخی کودکان نشانه‌های کلاسیک اضطراب و افسرده‌گی شامل غمگینی، بی‌قراری را نشان می‌دهند. در حالی که در بعضی از کودکان مضطرب و افسرده مشکلات و دردهای جسمانی نشان داده می‌شود که به دردهای متداول پاسخ نمی‌دهند. تشخیص افسرده‌گی و اضطراب در کودکان به مصاحبه و نوع ابزارهای سنجش نیز بستگی دارد (۵). تنظیم شناختی-هیجانی راهبردهایی است که افراد در شرایط پریشانی به کار می‌برند تا هیجان‌های خود را کنترل کنند. هنگامی که فرد با یک موقعیت رویرو می‌شود احساس خوب و خوش‌بینی، به تهایی برای کنترل هیجان‌های وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد. نظریه‌های جدید در قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارد. طبق این نظریه‌ها هیجان می‌تواند نقش سازنده‌ای در حل مسئله و پردازش اطلاعات، هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آن‌ها را تنظیم و مدیریت کرد. تحقیقات نشان داده‌اند که توأم‌نمدی افراد در تنظیم شناختی-هیجانی می‌تواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با واقعی استرس‌زای زندگی بازی کند. رابطه روشی بین تجربه حوادث منفی،

پایین‌تر یا انتقال از یک مدرسه به مدرسه‌دیگر سودمند شناخته شده است (۲۰). با وجود این، اخیراً درمان‌های شناختی رفتاری، درمان انتخابی برای اختلال‌های عاطفی (افسردگی و اضطراب) کودکان و نوجوانان تلقی می‌شوند (۲۱). که از جمله روش‌های مؤثر بازی درمانی، روش شناختی-رفتاری است. بازی درمانگران شناختی-رفتاری همواره سعی می‌کند از طریق تسهیل کسب مهارت‌های رفتاری جدید و فراهم آوردن تجربی که تغییر شناختی را تسهیل کند، به کودک و نوجوان کمک کنند. بدین ترتیب، روند درمان با سنجش دقیق عواملی شروع می‌شود که مشکل ترس و عاطفی و رفتاری کودک را ایجاد می‌کند، سپس روش‌هایی ارایه می‌شود که به منظور افزایش توانایی رفتاری طراحی شده‌اند و نیز فنونی که برای تصحیح شناخته‌های اشتباہ یا ناسازگارانه به کارمی روند (۲۲).

بازی درمانی شناختی-رفتاری، در حین عبور کودک از مراحل متعدد درمانی (مرحله آغازین- مرحله ارزیابی، مرحله میانی و مرحله پایانی) انجام می‌گیرد. بعد از آمادگی، برای بازی درمانی شناختی رفتاری مرحله ارزیابی آغاز می‌شود؛ درمانگر، در مرحله میانی، نقشهٔ درمان را طراحی می‌کند و درمان، روی افزایش خودکنترلی کودک، حس پیشرفت و یادگیری پاسخ‌های سازگارانه‌تر برای رویارویی با موقعیت‌های خاص، متمرکز می‌شود. تعمیم و پیشگیری از عود و بازگشت در مرحله میانی، به کار گرفته می‌شود تا کودک مهارت‌های جدیدی در مورد زمینه‌های گوناگون بیاموزد؛ در مرحله پایانی، کودک و خانواده‌اش برای خاتمه درمان آماده می‌شوند (۲۳).

در بازی درمانی شناختی-رفتاری مداخله‌های متعدد رفتاری و شناختی به کار گرفته می‌شود. از جمله این مداخله‌های رفتاری می‌توان از حساسیت‌زادایی منظم، تصویرسازی ذهنی برانگیزش‌نده، مدیریت وابستگی تقویت مثبت، شکلدهی، خاموش‌سازی و الگوسازی نام برد. از طرفی روش‌های شناخت رفتاری که به‌طور معمول در بازی درمانی شناختی-رفتاری که به‌طور معمول در بازی درمانی شناختی-رفتاری استفاده می‌شوند با تغییر رفتار و روش‌های شناختی با تغییر افکار، سروکار دارند. چون این گونه تصور می‌شود که شناخته‌های ناسازگارانه، باعث رفتار همراه با ترس و اضطراب می‌شوند، فرض بر این است که تغییر در تفکر، تغییر در رفتار را به همراه دارد. درمانگر به کودک کمک می‌کند تا شناخته‌های خود را شناسایی و اصلاح کند و یا آن‌ها را بسازد، او علاوه بر کمک کردن به کودک در شناسایی تحریف‌های شناختی خود، به او یاد می‌دهد که این تفکر ناسازگارانه را با تفکر سازگارانه تعویض کند (۲۴).

بازی درمانی شناختی-رفتاری با کودکان به‌طور خاص، برای کودکان سن پیش از مدرسه و کودکان سینین آغاز مدرسه طراحی می‌شود و با تأکید بر مشارکت کودک در درمان و از طریق مورد توجه قرار دادن در قبال تغییر رفتار شخصی خویش، ایجاد می‌شود در این روش همچون درمان‌های شناختی-رفتاری با بزرگسالان، اعتقاد بر آن است که رفتار

نوع درمان درمورد تعلیم و تربیت کودکان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بازی درمانی نوعی تعامل کمکی بین کودک و بزرگسال آموزش دیده است که از طریق ارتباط نمادین در بازی، در جستجوی راههایی برای کاهش آشفتگی‌های هیجانی کودک است، به‌طوری که کودک در طی تعاملات بین فردی با درمانگر، پذیرش، تخلیه هیجانی، کاهش اثرهای رنج‌آور، جهت‌دهی مجدد تکانه‌ها و تجربه هیجانی تصحیح شده را تجربه می‌کند (۱۱). درمان‌های غیردارویی همچون روان درمانی و مشاوره کودکان، با استفاده از شیوه‌های بازی درمانی، برای درصد قابل ملاحظه‌ای از کودکان، نتیجه بخش بوده است. هرگاه زبان کلامی برای ابراز افکار و احساسات کودکان کفایت نکند، درمانگران از بازی درمانی برای کمک به کودکان، برای ابراز آن‌ها را نازاحت کرده است، استفاده می‌کنند (۱۲). بازی افکار درونی کودک با دنیای خارجی او را ارتباط می‌دهد و باعث می‌شود که کودک بتواند اشیای خارجی را تحت کنترل خود درآورد. بازی به کودک اجازه می‌دهد تا تجربیات، افکار، احساسات و تمایلاتی را که برای او تهدیدکننده هستند نشان دهد (۱۳). بازی یک روش صحیح و درست برای درمان کودک است، زیرا کودکان اغلب در بیان شفاهی احساساتشان با مشکل روپرور هستند. از طریق بازی کودکان می‌توانند مواون را کاهش دهند و احساساتشان را بهتر نشان دهند (۱۴). بازی درمانی به عنوان ارتباط بین فردی پویا بین کودک و درمانگر آموزش دیده در فرآیند بازی درمانی توصیف می‌شود که رشد یک ارتباط امن را برای کودک تسهیل می‌کند تا کودک به‌طور کامل خود را بیان کند (۱۵). از این طریق کودک می‌تواند مهارت‌های کنترل خود را بهتر فراگیرد و کسب کند (۱۶).

بازی درمانی پیوند طبیعی دو درمان مؤثر است. این رویکرد درمانی برای کودکان فرآیند روان اجتماعی برای رشد و یادگیری در مورد خودشان و دیگران فراهم می‌آورد. ترکیب بازی درمانی و گروه درمانی، یک فرآیند روان‌شناختی و اجتماعی است که در آن کودکان از طریق ارتباط با یکدیگر در اتاق بازی چیزهایی را در مورد خودشان یاد می‌گیرند. بازی درمانی گروهی برای درمانگر فرستی را فراهم می‌کند که به کودکان کمک کنند تا یاد بگیرند که تعارضات را حل نمایند (۱۷). اهداف کلی از مداخله بازی درمانی کودکان محور، کمک به مشارکت یادگیری، خودکنترلی، مسئولیت ابراز احساسات، احترام گذاشتن، پذیرفتن خود و دیگران و بهبود رفتارهایی چون مهارت‌های اجتماعی، عزت نفس و کاهش افسردگی است (۱۸). روان‌درمانی و دارو‌درمانی برای کودکان دارای اختلال‌های عاطفی مفید تشخیص داده شده است. هرچند شواهد نشان می‌دهند که روان‌درمانی برای اغلب کودکان اختلال عاطفی مقدم بر دارو‌درمانی است (۱۹). با این حال مجموعه‌ای از درمان‌های روان‌شناختی شامل درمان حمایتی، درمان‌های بینش‌مدار، بازی درمانی، رفتار درمانی، خانواده درمانی و حتی روان‌درمانی والدین و آموزش‌های بهداشتی مانند پیشگیری از فشار روانی زیاد به کودکان به دلیل ضعف عملکرد یادگیری یا تنزل به کلاس

فرد خواسته می‌شود تا واکنش خود را در مواجهه با تجربه تهدیدآمیز و رویدادهای استرس‌زا زندگی که به تازگی تجربه کرده‌اند را به وسیله پاسخ به ۵ تا پرسش که تا استراتژی برای کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی می‌کند مشخص نماید این پرسشنامه دارای فرم ویژه بزرگان و فرم ویژه کودکان می‌باشد.

مقیاس اضطراب کودکان اسپینس - نسخه کودک^۴: این مقیاس دارای ۴۵ سؤال می‌باشد این مقیاس توسط موسوی، مرادی، فرزاد، مهدوی و اسپینس (۲۹) به فارسی برگردان شده است. شیوه نمره‌گذاری به صورت خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد می‌باشد. این پرسشنامه از اعتبار روانی بالایی برخوردار است. ضریب همسانی درونی آن (ضریب آلفا) ۰/۹۲، اعتبار آن با روش بازارآزمایی به فاصله یک هفته ۰/۷۵ و همبستگی ماده‌های آن از ۰/۳۰ تا ۰/۷۶ متغیر است. ۵ پنج نوع روانی محتو، همزمان، سازه، تشخیصی و عاملی برای این آزمون سنجیده شده است که همگی نشان‌دهنده کارایی بالای این ابزار در اندازه‌گیری شدت اضطراب می‌باشد.

پرسشنامه افسردگی کودکان ماربا کواس^۵: CDI یک ابزار خود گزارشی ۲۷ آیتمی است که جهت ارزیابی نشانه‌های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می‌شود. آیتم‌های این پرسشنامه که از پرسشنامه افسردگی بک (۲۶) برگرفته شده است هر نشانه‌ای را که می‌تواند مختص افسردگی بک دوره کودکی باشد ارزیابی می‌کند: به عنوان مثال خلق پایین، خود ارزیابی ضعیف، و مشکلات بین فردی. CDI شامل ۵ خرده مقیاس می‌باشد که عبارت‌اند از: خلق منفی، مشکلات بین فردی، احساس بیهوشی، فقدان احساس لذت و عزت نفس پایین. CDI با سایر پرسشنامه‌های مرتبط با افسردگی دوره کودکی و نوجوانی از جمله مقیاس افسردگی نوجوانان رینولدرز همبستگی دارد. شماری از پژوهش‌ها نشان دادند که نمره کودکان افسرده به طور معناداری بالاتر از کودکان غیرافسرده در گروه کنترل می‌باشد. برخی شواهد نیز نشان دادند که این ابزار با وجود این که بیشترین کاربرد آن بررسی افسردگی در مطالعات همه گیرشناسی می‌باشد، به تغییرات نیز حساس است. نسخه ۱۰ آیتمی CDI نیز جهت بررسی وجود یا عدم وجود افسردگی در کودکان تهیه شده است. آیتم‌ها بر اساس طبقه‌بندی صفر (عدم وجود نشانه) تا ۲ (وجود نشانه‌های مشخص) نمره‌گذاری می‌کنند. نمره کلی (با دامنه صفر تا ۵۴ که هر چه نمره فرد بیشتر باشد شدت افسردگی فرد نیز بیشتر خواهد بود) با جمع نمرات همه آیتم‌ها به دست می‌آید (۳۱، ۳۰).

مشخصات روانسنجی: مطالعات نشان‌دهنده مشخصات روان‌سنجری خوب برای CDI است. همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ ۰/۸۶ است. اعتبار همزمان و افتراقی نیز مناسب گزارش شده است. داده‌هایی

انطباقی حاصل تعامل بین افکار، احساسات و رفتار فرد است (۲۵). در مطالعه مورد نظر با هدف بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و اضطراب و افسردگی کودکان دیابت نوع یک انجام خواهد شد. در سایه دستیابی به این هدف، مطالعه حاضر به سه فرضیه خواهد پرداخت: ۱- بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر تنظیم‌شناختی هیجان کودکان مبتلا به دیابت نوع یک مؤثر است، ۲- بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب کودکان مبتلا به دیابت نوع یک آزمون است، ۳- بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک مؤثر است.

مواد و روش کار

پژوهش موردنظر یک پژوهش آزمایشی از نوع پژوهش‌های مداخله‌ای و طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون است با دو گروه آزمودنی است. که هر دو گروه دوبار مورد ارزیابی قرار گرفتند. جامعه آماری مطالعه عبارت از کلیه کودکان دیابتی نوع یک ۹ تا ۱۱ سال شهرستان ساری سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ می‌باشد. برای تعیین نمونه آماری پس از هماهنگی با انجمن دیابت جهت انجام تحقیق و گرفتن معرفی نامه برای مراکز درمانی به صورت غیرتصادفی (هدفمند) از بین کودکان دیابتی نوع یک انتخاب می‌شوند. در مرحله پیش‌آزمون به تعداد ۱۸ نفر پرسشنامه تنظیم‌شناختی هیجان گرانفسکی و پرسشنامه اضطراب بک (BID) و پرسشنامه افسردگی بک^۱ (۲۶) داده شد تا تکمیل نمایند، پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها از بین کسانی که در پرسشنامه تنظیم‌شناختی هیجان نمره بالا و اضطراب و افسردگی نمره پایین کسب کرده‌اند، این تعداد ۱۸ نفر به صورت تصادفی به دو گروه برابر آزمایش و گواه (هر کدام ۹ نفر) تقسیم شدند، سپس برای کودکان دیابتی گروه آزمایش به مدت دو ماه، هشت جلسه آموزش بازی درمانی مبتنی بر CBT برگزار شد. اما به گروه گواه، آموزش خاصی داده نشد. سرانجام در پایان آموزش، دو گروه در یک جلسه به پس‌آزمون پرسشنامه تنظیم‌شناختی هیجان گرانفسکی و پرسشنامه اضطراب بک (BID) و پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند.

ابزارهای پژوهش

پرسشنامه تنظیم‌شناختی هیجان گرانفسکی^۲: پرسشنامه تنظیم‌شناختی هیجان توسط گرانفسکی، کرایج و اسپینه‌اون^۳ (۲۷) تدوین شده است، این پرسشنامه، پرسشنامه‌ای چندبعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای ۳۶ ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان و کودکان می‌باشد. این پرسشنامه شامل ۳۶ پرسش مدرج پنج نمره‌ای (از همیشه یا هرگز) می‌باشد فرم فارسی این مقیاس به وسیله سامانی و جوکار (۲۸) مورد اعتباریابی قرار گرفته است. در این پرسشنامه از

¹ Beck

² Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)

³ Garnefski, Kraaij, & Spinhoven

شماره (۱) هدف و محتوای جلسه‌های بازی درمانی مبتنی بر CBT را نشان می‌دهد.

یافته‌ها

مطالعه حاضر با بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. جدول شماره (۲) میانگین و انحراف معیار نمرات دو گروه در متغیرهای پژوهش در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون را نشان می‌دهد.

راجع به هنچارهای سن و جنس موجود است. برای مثال، فینچ و همکاران اجرای گروهی CDI را برای آزمودن تقریباً ۱۵۰۰ کودک دبستانی هفت تا شانزده ساله مورد استفاده قرار دادند. تفاوت‌های سنی و جنسی اندک، اما مهمی آشکار شد: کودکان بسیار خردسال نسبت به کودکان بزرگتر افسردگی کمتری نشان دادند و دختران، به خصوص در گروههای سنی پایین‌تر، افسردگی کمتری ابراز کردند (۳۲). هر سؤال در این پرسشنامه دارای سه جمله است که آزمودنی با توجه به احساسات و افکار خود در طول دو هفته گذشته یکی از جملات را انتخاب و ضربه‌ریزند. جدول

جدول (۱): هدف و محتوای جلسه‌های بازی درمانی مبتنی بر CBT

جلسات	هدف
جلسه اول	آشنایی اعضا گروه با یکدیگر و پژوهشگر
جلسه دوم نظرهای خود گروه	استفاده از حواس بساوایی و یکپارچه کردن حواس، تشویق اعضا به بیان احساسات خود در هنگام انجام فعالیتها حفظ شعرهای حروف الفبا
جلسه سوم	استفاده از حواس بساوایی و یکپارچه کردن حواس، تعامل اعضا با یکدیگر، کمک اعضا برای رسیدن به بیش و آگاهی از جانب دیگران قادر ساخت کودک برای فرافکنی احساساتش به اشکال ساخته شده
جلسه چهارم برای شرح داستان و مشارکت در آن با استفاده از اشکال ساخته شده	استفاده از حواس بساوایی و یکپارچه کردن حواس، کمک به کودک ساختن مجسمه هایی از گل رسان که نشان‌دهنده احساسات کودک است توضیح احساسات ها توسط اعضا گروه حفظ شعرهای کتاب خوانداری
جلسه پنجم	شناخت احساسات خود و نیز آگاهی از احساسات دیگران چیدن مجسمه هایی در کنار یکدیگر به تشخیص اعضا گروه بحث در مورد چگونگی وضیت قرار گرفتن هر مجسمه حفظ کردن متن نمایشنامه برای جلسه بعدی
جلسه ششم خيالی (حيوانی)	استفاده از بازی تخیلی به منظور ترغیب اعضا برای گفتگو با یکدیگر، ایجاد فرافکنی احساسات، افکار، آرزوها و توانمندی‌ها در قالب شخصیت‌ها
جلسه هفتم	هدف‌های جلسه ششم فرافکنی احساسات، نیازها و آرزوهای کودک در شکل شخصیت‌های نمایش (عروسوکهای دستی حیوانی)، آشنایی با قطب‌های منضاد شخصیت (ضعیف با سلطه‌پذیر، قوی یا سلطه‌گر)، ارزیابی پیامد رفتارهای شخصیت‌ها که سبب بیش کودک از کنش خود می‌شود، بهبود مهارت‌های حل مساله و تصمیم‌گیری، قوی شدن از طریق نمایش جسمانی. در این جا هیجان‌های غیرقابل‌پذیری می‌توانند بدون احساس ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن بیان شوند

جدول (۲): میانگین و انحراف معیار نمرات دو گروه در متغیرهای پژوهش در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون

متغیر	گروه	میانگین	انحراف معیار	پیش آزمون	میانگین	انحراف معیار	پس آزمون	انحراف معیار
تنظیم‌شناختی هیجان	گواه	۳/۱۲	۰/۳۵	۲/۱۴	۰/۳۴	۰/۳۴		
	آزمایش	۳/۱۶	۰/۳۱	۲/۵۱	۰/۲۷	۰/۲۷		
	گواه	۳/۶۷	۰/۱۵	۲/۶۷	۰/۱۶	۰/۱۶		
اضطراب	آزمایش	۳/۶۳	۰/۱۵	۲/۳۲	۰/۲۱	۰/۲۱		
	گواه	۲/۱۱	۰/۱۴	۲/۰۹	۰/۱۳	۰/۱۳		
افسردگی	آزمایش	۲/۱۸	۰/۱۱	۱/۷۵	۰/۲۸	۰/۲۸		

کوواریانس برای فرضیه‌های مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس رابطه خطی بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون نمرات تنظیم‌شناختی هیجان، اضطراب و افسردگی با استفاده از رسم نمودار پراکنش با خط رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت که موازی بودن شبیط‌ها حاکی از برقراری رابطه خطی نمرات در متغیرهای مذبور بوده است. در گام بعدی مفروضه یکسانی واریانس نمرات دو گروه با استفاده از آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از یکسانی واریانس نمرات دو گروه بوده است. همچنین مفروضه‌های عدم هم خطی چندگانه و همگنی شبیه‌های رگرسیون نیز برقرار بوده است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مبنی بر تعیین اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان و کاهش اضطراب و افسردگی از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شده است که نتایج در جدول‌های شماره (۳) و (۴) ارائه شده است.

جدول شماره (۲) میانگین و انحراف معیار نمرات شرکت‌کنندگان گروه آزمایش و گواه را در متغیرهای تنظیم‌شناختی هیجان، اضطراب و افسردگی به تفکیک پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان می‌دهد. همچنین، میانگین نمرات در مرحله پس‌آزمون نشان‌دهنده روند کاهشی نمرات اضطراب و افسردگی در گروه آزمایش است. به این صورت که میانگین گروه آزمایش در پس‌آزمون نسبت به گروه گواه کاهش داشته است این در حالی است که میانگین نمرات این دو متغیر در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری نداشته است. همچنین میانگین نمره تنظیم‌شناختی هیجان در مرحله پس‌آزمون نشان‌دهنده روند افزایشی نمره تنظیم‌شناختی هیجان در گروه آزمایش است. در ادامه برای مقایسه نمرات متغیرهای تحقیق در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

قبل از هرگونه استنباط آماری ابتدا مفروضه‌های استفاده از تحلیل

جدول (۳): نتایج آزمون تحلیل مانکوا بر روی میانگین نمره‌های پس‌آزمون تنظیم‌شناختی هیجان و کاهش اضطراب و افسردگی با کنترل پیش‌آزمون

نام آزمون	مقدار	f	df	df خطا	سطح معنی‌داری
اثر پیلای	۰/۹۶۹	۲۴۹	۲	۱۶	۰/۰۰۰
لامبدای ویلکز	۰/۰۳۱	۲۴۹	۲	۱۶	۰/۰۰۰
اثر هتلینگ	۳۱/۱۹	۲۴۹	۲	۱۶	۰/۰۰۰
بزرگترین ریشه روی	۳۱/۱۹	۲۴۹	۲	۱۶	۰/۰۰۰

وجود دارد. برای پی‌بردن به این تفاوت سه تحلیل کوواریانس تک متغیری در تحلیل مانکوا انجام گرفت نتایج حاصل از آن‌ها در جدول شماره (۴) ارائه شده است.

نتایج جدول شماره (۳) نشان می‌دهد بین نمره‌های تنظیم‌شناختی هیجان و کاهش اضطراب و افسردگی گروه‌های آزمایش و شاهد در سطح ۰/۰۰۰ تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بر این اساس می‌توان گفت حداقل در یکی از متغیرهای وابسته بین دو گروه تفاوت معنی‌داری

جدول (۴): نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکوا

متغیرهای وابسته	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	فیشر	معنی‌داری
تنظیم‌شناختی هیجان	۰/۵۲	۱	۰/۵۲۲	۱۰/۲۴	۰/۰۰۶
اضطراب	۰/۴۴۵	۱	۰/۱۲	۱۰/۲۴	۰/۰۰۰
افسردگی	۰/۵۷۸	۱	۰/۵۷۸	۱۲/۳۶	۰/۰۰۳

هیجان، بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان دیابت نوع یک بوده است. هم‌سو با فرضیه‌های این پژوهش، نتایج حاکی از تأثیر بازی درمانی مبتنی بر cbt بر تنظیم‌شناختی هیجان، بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان دیابت نوع یک است که بر این اساس می‌توان گفت بازی درمانی برای کودکان کاری را انجام می‌دهد که صحبت و مشاوره برای بزرگسالان فراهم می‌کند. بازی یکی از مهم‌ترین ابزارهای جایگزین هم صحبتی است. بازی زبان کودکان است و به او اجازه می‌دهد که با ما بدون کلام صحبت کند. بازی درمانی برای کودکان کاری را انجام می‌دهد که صحبت و مشاوره برای بزرگسالان فراهم می‌کند. بازی یکی از ابزارهای جایگزین هم صحبتی است. بازی زبان کودک است و به او

نتایج جدول شماره (۴) نشان می‌دهد که پس از کنترل نمرات پیش‌آزمون، بین میانگین‌های تعدیل شده پس‌آزمون تنظیم‌شناختی هیجان، اضطراب و افسردگی در دو گروه آزمایش و شاهد تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر همسو با فرضیه‌های این پژوهش می‌توان گفت بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری موجب افزایش تنظیم‌شناختی هیجان و کاهش اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک شده است.

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر هدف تأثیر بازی درمانی مبتنی بر cbt بر تنظیم‌شناختی

رفتاری در کاهش اختلال‌های هیجانی و رفتاری کودکان مؤثر است. در فرضیه دوم پژوهش بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان مبتلا به دیابت نوع یک پرداخته شد و نتایج فرضیه دوم نشان می‌دهد بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان مبتلا به دیابت نوع یک مؤثر است. در واقع بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری موجب کاهش اضطراب در آزمودنی‌ها می‌گردد که این نتیجه با نتایج تحقیقات محمودی و همکاران (۳۳)، نساجی و همکاران (۳۴)، جعفری و حاجی‌لو^۵ (۳۷)، جلالی و رفیعی^۶ (۳۸)، باگرلی و پارکر^۷ (۳۹)، پارکر و همکاران (۳۵) و ویرارگاران^۸ (۴۰) همسو می‌باشد.

در تبیین این فرضیه می‌توان گفت که: درمان شناختی-رفتاری برای توصیف مداخله‌های روان درمانگرانه که با تغییر فرآیندهای شناختی هدف آن کاهش ناراحتی‌های روان‌شناختی و رفتار ناسازگارانه است که نحوه تفکر ما بر احساس ما تأثیر می‌گذارد نقش مهمی در درمان اضطراب ایفا می‌کند. افزون بر این نحوه عمل ما در یک موقعیت به پیامدهایی که به دنبال رفتار می‌آیند بستگی دارد. به عبارت دیگر اگر پس از یک رفتار اتفاق ناخواستیدی بیافتد، آن رفتار به احتمال زیاد کاهش پیدا می‌کند یا حتی متوقف می‌شود. این روش در درمان اختلال‌های اضطراب تعمیم‌یافته، مؤثر و سودمند است. در درمان شناختی-رفتاری، درمانگر به کودک مهارت‌های مقابله‌ای و موقعیت‌هایی را برای او مهیا می‌کند تا این مهارت‌های مقابله‌ای را تمرین کند. این مهارت‌ها عواملی حمایت‌کننده در اختلال‌های اضطرابی کودکان هستند. در فرضیه سوم پژوهش نیز بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به دیابت نوع پرداخته شد و نتایج فرضیه سوم نشان می‌دهد که بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک مؤثر است. در واقع بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری موجب کاهش افسردگی در آزمودنی‌ها می‌گردد که این نتیجه با نتایج تحقیقات محمودی (۳۳)، نساجی زواره، طاهری و امینیان^۹ (۳۴)، پارکر، کریکوی، برانکار، هریس، مجیکسی، وود و هوگان^{۱۰} (۳۵) و اسپنس، اویدس و کاپوتی^{۱۱} (۳۶) همسو می‌باشد. در تبیین این فرضیه می‌توان گفت کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی، قادر به بیان هیجانات و احساس خود نیستند، سرکوب و عدم مهارت در بیان احساسات به ویژه از نوع منفی آن بهداشت روانی کودک را به مخاطره می‌اندازد. اختلال‌های رفتاری، مشکلات فردی و اجتماعی فراوانی را به وجود می‌آورد. کودکان مبتلا به این اختلال‌ها، خانواده، آموزشگاه و اجتماع را با مسائل و دشواری‌های گوناگونی مواجه می‌کنند و آن‌ها را نیز در برابر آشفتگی‌های روانی-اجتماعی دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی، آسیب‌پذیر می‌سازند.

در تبیین این فرضیه می‌توان گفت که افسردگی یک مشکل رایج است که کودکان آن را تجربه می‌کنند. بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری روشنی است که در آن استراتژی‌های رفتاری با استراتژی‌های شناختی ترکیب می‌شوند که فرصت ابراز حالات خود انگیخته را فراهم می‌آورد. بازی درمانی به باری کودکان می‌شتابد تا بتوانند مسایل خود را به دست خویش حل کنند. در این نوع درمان به کودک فرصت داده

جازه می‌دهد که با ما بدون کلام صحبت کند. بازی درمانی رویکرد شناختی-رفتاری پاسخ‌های عاطفی و رفتاری کودک به رویدادهای زندگی هستند. از این‌که چگونه این رویدادها ادراک و یادآوری می‌شوند در این روش چنین فرض می‌شود که آن‌ها فاقد باورها و محتویات شناخت، یا استعدادهای حل مسئله (فرآیندهای شناختی) از جهاتی آشفته و مختل می‌باشد. نارسایی‌های شناختی به عدم پردازن شناختی کارآمد اشاره دارد، بازی درمانگران شناختی-رفتاری همواره سعی می‌کنند از طریق تسهیل کسب مهارت‌های جدید و فراهم آوردن تجاربی که تغییر شناختی را تسهیل کند به کودک و نوجوان کمک می‌کنند. اثر بخشی بازی درمانی بر کاهش مشکلاتی چون تنظیمشناختی، اضطراب و افسردگی و ... نشان داده است. بازی درمانی بر مشکلات رفتاری، مشکلات درونی‌سازی و بیرونی‌سازی شده خودپنداره، خودکارآمدی افسردگی و اضطراب تأثیر مثبت دارد.

در فرضیه اول پژوهش به بررسی بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر تنظیمشناختی هیجان کودکان مبتلا به دیابت نوع یک پرداخته شد و نتایج نشان داد که بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر تنظیمشناختی هیجان کودکان مبتلا به دیابت نوع یک مؤثر است. در واقع بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری موجب بهبود تنظیم هیجان در آزمودنی‌ها می‌گردد که این نتیجه با نتایج تحقیق محمودی، برج‌علی، علیزاده، غباری بناب، اختیاری و اکبری زردخانه^۱ (۳۳)، نساجی زواره، طاهری و امینیان^۲ (۳۴)، پارکر، کریکوی، برانکار، هریس، مجیکسی، وود و هوگان^۳ (۳۵) و اسپنس، اویدس و کاپوتی^۴ (۳۶) همسو می‌باشد. در تبیین این فرضیه می‌توان گفت کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی، قادر به بیان هیجانات و احساس خود نیستند، سرکوب و عدم مهارت در بیان احساسات به ویژه از نوع منفی آن بهداشت روانی کودک را به مخاطره می‌اندازد. اختلال‌های رفتاری، مشکلات فردی و اجتماعی فراوانی را به وجود می‌آورد. کودکان مبتلا به این اختلال‌ها، خانواده، آموزشگاه و اجتماع را با مسائل و دشواری‌های گوناگونی مواجه می‌کنند و آن‌ها را نیز در برابر آشفتگی‌های روانی-اجتماعی دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی، آسیب‌پذیر می‌سازند. درمانگران از طریق بازی به کودکانی که مهارت‌های اجتماعی عاطفی‌شان ضعیف است رفتارهای سازگارانه‌تری را می‌آموزند. برنامه‌ای شناختی-رفتاری را برای کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری تدارک دیده شده که شامل به چالش کشیدن باورهای شناختی، آموزش مهارت‌های اجتماعی و مواجهه رفتاری است. پژوهش‌های مختلف و همچنین نتایج تحقیق نشان داد که روش‌ها و مداخله‌های شناختی

⁵ Jafari & hajilo

⁶ Jalali & Rafeie

⁷ Baggerly & Parker

⁸ Virargaran

¹ Mahmoudi1, Borjali, Alizadeh, Ghobari-Bonab, Ekhtiari, & Akbari-Zardkhanee

² Nassaji Zavvareh, Taheri, & Aminian

³ Parker, Creque, Barnhart, Harris, Majeski, Wood, & Hogan

⁴ Spence, Oades, & Caputi

7. Bayat M. Assessing the effectiveness of child-centered therapies on reducing the symptoms of children being over-stimulated. [dissertation]. Tehran: Shahid Beheshti University; 2008.
8. Nolen-Hoeksema S, Wisco BE, Lyubomirsky S. Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science 2008; 3(5): 400-424.
9. Moustaches C. Relationship play therapy. Northvale, NJ: Jason Aronson, Inc; 1997.
10. Sabatino DA, Webste BG, Booneyvance H. Children mood disorders: History, characteristics, dia gnosis and treatment. Clinical Assessment of Child and Adolescent Behavior; 2001. P. 413-449.
11. Park RJ, Goodyer IM. Clinical guidelines for depressive disorders in childhood and adolescence. Eur child Adolesc Psychiatry 2000; 9: 147-161.
12. Lamarine RJ. Child and adolescent depression. J Sch Health 1995; 65(9): 390-3.
13. Shen YJ. Short- term group play therapy with Chinese earth quake victims: Effects on anxiety, depression, and adjustment. International Journal Play Therapy 2002; 11(1): 43-63.
14. Angold A, Erkanli A. Comorbidity. Journal of Child Psychology and Psychiatry 1999; 40(1): 57-87.
15. Landreth GL, Ray DC, Bratton S. Play therapy in elementary school. Psychology in the School 2009; 46(3): 281-289.
16. Porter ML, Heruandez Reif M, Jessee P. Play therapy: A review- Early child developmental and care. Taylor & Francis. 2009; 179(8): 1029-1040.
17. Dayle Jones K. Group play therapy with sexually abused preschool children: Group behaviors and intervention. Journal for Special in Group Work 2002; 27(4): 377-389.
18. Ray DC, Armstrong SA, Balkin RS, Jayne, KM. Child centered play therapy in the schools: Review and Meta-Analysis. Psychology in the Schools 2015; 52(2): 107-123.
19. Amaury S. The effect of social skill instruction on sport and game setting: An open pilot study journal of clinical psychology mediation 16: 169-related behaviors of children anadolescents with emotional or behavioral

می شود تا احساسات آزاردهنده و مشکلات درون خود را از طریق بازی بروز داده و آن ها را به نمایش بگذارد. از طریق بازی درمانی به شیوه شناختی رفتاری می توان با کودک ارتباط برقرار کرد و در او اعتماد ایجاد نمود تا آماده پذیرش اقدامات درمانی شود.

پژوهش حاضر محدودیتهایی داشت به قرار زیر: ۱- محدوده اجرای پژوهش کودکان دیابت نوع یک بوده است؛ ۲- ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است؛ ۳- عدم تمایل برخی از آزمودنی ها به پاسخگویی سوالات مربوطه؛ ۴- تأثیر تفاوت ادراکی بین آزمودنی ها از مفاهیم پرسشنامه در پاسخ های آنان؛ ۵- دریافت مجوزهای لازم به منظور اجرای پرسشنامه؛ ۶- موضوع این پژوهش به تأثیر بازی درمانی مبتنی بر cbt بر تنظیم شناختی هیجان، بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان دیابت نوع یک محدود شده است.

پیشنهاد می شود که ۱- درمانگر به محدودیتهای کودک توجه نماید؛ ۲- به رفتارهای کودک جهت ندهند و به او احترام بگذارند؛ ۳- باید کودک احساس کند که قابل احترام بوده و افکارش مورد توجه درمانگر می باشد؛ ۴- رابطه ای که در حین بازی میان کودک و درمانگر به وجود می آید سبب اعتماد و یا عدم اعتماد کودک به درمانگر می شود؛ ۵- ضمن بازی می توان از گفتارهای کودک به وجود این حس اعتماد پی برد؛ ۶- در کلیه روش های بازی درمانی، قوانین و محدودیتهای بازی، باید در آغاز جلسه بیان شود؛ ۷- درمانگر باید از هر گونه انتقاد، سرزنش، تحقیر و تنبیه لفظی پرهیز کند.

References:

1. Narimani M, Soleymani E, Abolghasem A. A comparison of internal and external dimensions of thinking styles in blind and sighted students. Journal of School Psychology 2012; 1(1):108-118.
2. Mash EJ, Barkley RA (Eds). Child psychopathology. 3rd ed. New York: Guilford Press; 2014.
3. Watts S, Markham, RA. Etiology of depression in children. Journal of Instructional Psychology 2005; 32(3): 266-270.
4. American Psychiatric Association. Revised text of the diagnostic and statistical manual of mental disorders. In: Nikkhah MR, Avadis Yans H. Tehran: Sokhan Publishing; 2001.
5. Dhavale HS. Depression in childhood and adolescents. J Indian Med Assoc 2001; 99(1): 34-39.
6. Bratton SC, Ray D, Rain T, Jones L. The efficacy of therapy with children: A meta- analytic review of Treatment outcomes. Professional Psychology: Research and Practice 2005, 3(4): 370-390.

- of the life span. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 1996; 35(6): 705-715.
31. Smacker MR, Craighead E, Craighead LW, Green BJ. Normative and reliability data for the Children Depression Inventory. *Journal of Abnormal Child Psychology* 1996; 14(1), 25-39.
32. Harrington R. Depressive disorder in childhood and adolescence. *Arch Dis Child* 1995; 72(3): 193° 195.
33. Mahmoudi M, Borjali A, Alizadeh H, Ghobari-Bonab B, Ekhtiari H, Akbari-Zardkhaneh S. Emotion regulation in children with learning disorders and normal children. *Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning* 2016; 4(13): 69-84.
34. Nassaji Zavvareh M, Taheri R, Aminiyan M. Study of the relationship between schizoaffective disease and diabetes. *Scientific Research Feiyz Journal* 2007; 11(4): 36-39.
35. Parker JDA, Creque RE, Barnhart DL, Harris JI, Majeski SA, Wood LM, Hogan MJ. Academic achievement in high school: Does emotional intelligence matter. *Personality and Individual Differences* 2004; 37(7): 1321-1330.
36. Spence G, Oades L, Caputi P. Trait emotional intelligence and goalself-integration: important predictors of emotional well-being?. *Journal of Personality & Individual Differences* 2010; 37(7): 449-461.
37. Jafari A, Hajilo N. The role of perceived stress, social support in sensation seeking and addiction. *Health Psychology* 2016; 4(16): 19-30.
38. Jalali I, Rafeie H. The Relationship between cognitive emotion regulation and conflict resolution styles with the family process and content of high school students in Shiraz. *Journal of Modern Psychological Research* 2011; 2(25): 44-61.
39. Baggerly J, Parker M. Child-centered group play therapy with African American boys at the elementary school level. *Journal Counsel Develop* 2005; 83(4): 387-396.
40. Virarg R. Indication and early results of sildenafil. (Viagra) in erectile dysfunction. *Urology* 1999; 54(6): 1073-1077.
- disorders. [dissertation]. Ohio: University in Columbus; 2007.
20. Knell SM. Cognitive-behavioral play therapy. *J Clin Child Psychol*, 1998; 27(1): 28-33.
21. Bimaher B, Axelson DA, Monk K, Kalas C, Clark DB, Ehmann M, Bridge J, Heo J, Brent DA. Fluvoxamine for the treatment of childhood anxiety disorders. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2003; 42(4): 415-23.
22. Cartwright-Hatton S, McNicols K, Doubleday E. Anxiety in a neglected population: Prevalence of anxiety disorders in pre-adolescents children. *Clinical Psychology Review* 2006; 26(7): 817-833.
23. Raberts R, Attkinsson CC, Rosenblatt A. Prevalence of psychopathology among children and adolescents. *American Journal of Psychiatry* 1998; 155(6): 715-725.
24. Pedro-Carroll J, Reddy L. A preventive play intervention to foster children resilience in the after of divorce. In: Reddy, L, Files-Hall T, Schaefer C, editors. *Empirically based play interventions for children*. Washington: Dc American psychological association; 2005. P. 51-75.
25. Michaelene MO, Hedda M. *Helping Children Play and Learn Together*. *Young children* 2010; 65(1): 104-108.
26. Beck AT, Steer RA, Garbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. *Clinical Psychology Revie* 1988; 8(1): 77-100.
27. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. CERQ: Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire. Leiderdorp: The Netherlands; 2002.
28. Samani S, Jokar B. Check the credentials and reliability is a short form of psychological pressure and anxiety depression scale. *The Journal of Social Sciences and Humanities University of Shiraz* 2007; 26(3): 65-77.
29. Mousavi R Moradi AR Farzad V Mahdavi E Spence S. Psychometric properties of the spence children's anxiety Scale with an Iranian sample. *International Psychology Journal* 2007; 1(1): 1-16.
30. Kovacs M. Presentation and course of major depressive disorder during childhood and later years

THE EFFECT OF GAME THERAPY WITH A COGNITIVE BEHAVIORAL APPROACH ON THE REGULATION OF EXCITEMENT, ANXIETY AND DEPRESSION IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES

Maryam Akbari^{1}, Behnaz Dehghani², Ameneh Jafari³, Ameneh Kardar⁴*

Received: 12 March, 2017 Accepted: 14 May, 2017

Abstract

Background & Aims:

Game therapy has a positive effect on the cognitive regulation of excitement, reduction of stress and depression in children. The present study aimed to investigate the effect of game therapy with a cognitive-behavioral approach on the regulation of excitement, anxiety and depression in children with type-1 diabetes.

Materials & Methods:

This is a semi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. 18 diabetic children who received a high score after performing a test of excitement cognitive regulation and a low score after the implementation of cognitive regulation test of anxiety and depression were randomly divided into experimental and control groups (9 each).

Results:

Data was analyzed using statistical method of covariance analysis. The results of the study show that game-based therapy with a cognitive-behavioral approach is a useful strategy for reducing anxiety and depression in children and adolescents.

Conclusion:

According to the findings of this study, game-based cognitive-behavioral therapy is effective in reducing anxiety and depression in children.

Keywords: Anxiety, Depression, Game therapy, Emotional regulation, Cognitive- behavioral

Address: Sari, Islamic Azad University, Sari Branch, Faculty of Psychology

Tel: +989113534150

Email: akbarishila1352@yahoo.com

SOURCE: Journal of Psychology New Ideas, 2017: 1(2): 45-54 ISSN: 2588-3356

¹ MA Student of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari City, Iran (Corresponding Author)

² MA Student of Clinical Psychology and Education Advisor, Faculty of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari city, Iran

³ MA Student of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari City, Iran

⁴ MA Student of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari City, Iran