



نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نظری، محمد علی؛ زاهد، عادل (۱۳۹۱). بررسی اثربخشی

نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجّه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی.

پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، ۲(۱)، ۵-۲۴.

بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجّه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

دکتر محمد نریمانی^۱، سوران رجبی^۲، دکتر عباس ابوالقاسمی^۳، دکتر محمد علی نظری^۴، دکتر عادل زاهد^۵

تاریخ دریافت: ۹۰/۶/۲۷

چکیده

هدف این مطالعه تعیین اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجّه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی می‌باشد. نمونه این مطالعه ۳۱ نفر دانش آموز پسر نارساخوان مراجعت کننده به مرکز ویژه ناتوانی هاییادگیری اردبیل بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش مطالعه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بوده است. برای جمع آوری داده‌ها از دستگاه نوروفیدبک (NFT)، آزمون عملکرد پیوسته (CPT)، آزمون اختلال خواندن و مقیاس تجدید نظر شده هوش و کسلر کودکان استفاده شد. تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری‌های مکرر بهبودی معناداری را در آزمون عملکرد پیوسته یعنی (پاسخ‌های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه) و امواج مغزی مورد اندازه گیری (دامنه فرکانس دلتا و تتا) در طی جلسات آموزش نوروفیدبک و پیگیری بعد از دو ماه، نشان داد. همچنین معناداری تعامل بین زمان و گروه نیز برای هر سه مقیاس (پاسخ‌های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه) و برای دو دامنه امواج دلتا و تتا نشاند هنده بهبودی معنادار در گروه نوروفیدبک بود. یافته‌های این پژوهش حاکی از کارایی نوروفیدبک و پایداری آن به عنوان یک شیوه درمانی در درمان مشکلات توجّه و اصلاح امواج مغزی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی است.

کلید واژه‌ها: نوروفیدبک، نارساخوانی، امواج تتا و دلتا، توجّه

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رسال صالح علوم انسانی

^۱. استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی Narimani@uma.ac.ir

^۲. استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه خلیج فارس

^۳. دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

^۴. استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تبریز

^۵. استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

مقدمه

مشخصه اختلال خواندن یا نارسانخوانی^۱، ناتوانی برای بازشناسی واژه‌ها، خواندن کند و نادرست و فهم ضعیف است (садوک و سادوک^۲، ۲۰۰۷). ناتوانی در خواندن یکی از حوزه‌های مهم است که معمولاً مشکلات بیشتری برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری به وجود می‌آورد. در این فرایند پیچیده شناختی هم‌زمان مهارت‌های مختلفی از جمله حفظ توجه، بازداری تکانه‌ها^۳، حافظه و ... در گیر می‌شوند (تارویان، نیکلاس و فاوست^۴، ۲۰۰۷).

میزان توجه یادگیرندگان به موضوع درس از عوامل اصلی در امر آموزش و یادگیری است به طوری که بندورا تأکید می‌کند که مرحله ابتدایی هر یادگیری با توجه آغاز می‌شود و اگر توجه کافی نباشد، یادگیری فرد خدشه‌دار می‌گردد (هارتمن و هانفالوی^۵، ۲۰۰۲). توجه یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های عالی ذهن است و به تنها یکی از جنبه‌های اصلی ساختار شناختی است که در ساختار هوش، حافظه و ادراف نیز نقش مهمی دارد (گلاس و هالیاک^۶، ۱۹۸۶).

نارسایی توجه^۷ یکی از هسته‌های اصلی اختلال‌های یادگیری است (انجمن روان‌پژوهی آمریکا^۸، ۲۰۰۰؛ دوپال^۹ و همکاران، ۲۰۰۱؛ بوم^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۴؛ سیدمن^{۱۱}؛ سوانسون^{۱۲} و همکاران، ۲۰۰۶؛ سوانسون و ژرمن^{۱۳}، ۲۰۰۷). پژوهش‌ها نشان داده‌اند کودکان دارای اختلال یادگیری نسبت به کودکان بهنجار در جستجوی دیداری^{۱۴} عملکرد ضعیف‌تری دارند. حتی بعضی از یافته‌ها نشان می‌دهد نارسایی توجه در این افراد تا سنین بزرگ‌سالی نیز ادامه دارد (فارون^{۱۵} و همکاران، ۲۰۰۱؛ ماسون^{۱۶} و همکاران، ۲۰۰۳).

پژوهش‌های ارزشمندی در ارتباط با شناسایی منشاء عصبی و زیستی اختلال نارسانخوانی نیز به انجام

-
- ^۱. dyslexia
 - ^۲. Sadock & Sadock
 - ^۳. impulses control
 - ^۴. Taroyan, Nicolson and Fawcett
 - ^۵. Hartman & Hunfalvay
 - ^۶. Glass & Holyoak
 - ^۷. Attention deficit
 - ^۸. American Psychiatric Association
 - ^۹. Dupal
 - ^{۱۰}. Bohm
 - ^{۱۱}. Seidman
 - ^{۱۲}. Swanson
 - ^{۱۳}. Jerman
 - ^{۱۴}. visual scanning
 - ^{۱۵}. Faraone
 - ^{۱۶}. Mason

رسیده و به نتایج قابل توجهی منتهی شده است (فرناندز^۱ و همکاران، ۲۰۰۷). شیویتز^۲ و شیویتز (۲۰۰۶) معتقدند که علم عصب شناختی^۳ و آموزش خواندن ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. شواهد عصب شناختی نشان می‌دهند که خواندن در مغز انجام می‌گردد و به سیستم‌های مغزی ای که در زبان گفتاری استفاده می‌شوند، واپسی است (راموس^۴ و همکاران، ۲۰۰۳). اگرچه پژوهش در این زمینه نسبتاً جدید است، با وجود این محققان در تشخیص سیستم‌های عصبی خواندن (برای مثال استولینگ^۵، ۲۰۰۰ به نقل از راموس و همکاران، ۲۰۰۳)، تشخیص نقص این سیستم‌ها در نارساخوان‌ها (پینولاژی^۶ و همکاران، ۲۰۰۸) و در ک سازوکارهای مرتبط با رشد روان خوانی (پرایس^۷، ۱۹۹۸)، پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. مطالعات نشان داده است که بیشترین فراوانی نابهنجاری^۸ EEG در کودکان دارای اختلال یادگیری، افزایش فعالیت تنا در مقایسه با همسالان بهنجار بوده است (جان^۹ و همکاران، ۱۹۸۳؛ هارمونی^{۱۰} و همکاران، ۱۹۹۰؛ آلوارز^{۱۱} و همکاران، ۱۹۹۲ به نقل از فرناندز و همکاران، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸؛ چابوت^{۱۲} و همکاران، ۲۰۰۱؛ فرناندز و همکاران، ۲۰۰۳؛ گاسر^{۱۳} و همکاران، ۲۰۰۳) و کاهش فعالیت آلفا در حالت استراحت نیز در کودکان دارای اختلال یادگیری مشاهده شده است. این یافته‌ها مشخص می‌کند که تقویت کاهش کمیت تنا/آلفا برای کودکان دارای اختلال یادگیری و نابهنجاری EEG ممکن است منجر به بهنجاری EEG در آنان گردد و در نهایت منجر به بهبود توانایی‌های شناختی و رفتاری در آن‌ها گردد (استرمن و اگر^{۱۴}، ۲۰۰۶).

شیوه‌ای که به تازگی برای بهبود نابهنجاری‌های EEG بکار گرفته می‌شود، نوروفیدبک^{۱۵} است. نوروفیدبک یک فرایند شرطی سازی عامل^{۱۶} است به طوری که فرد می‌تواند یاد بگیرد تا فعالیت الکتریکی مغزش را تغییر دهد (تاتچر^{۱۷}، ۱۹۹۸). این شیوه روش غیرتهاجمی و بدون دردی است که طی

^۱. Fernandez^۲. Shaywitz^۳. neuroscience^۴. Ramus^۵. Snowling^۶. Penolazzi^۷. Price^۸. Electro Encephalo Graphy^۹. John^{۱۰}. Harmony^{۱۱}. Alvarez^{۱۲}. Chabot^{۱۳}. Gasser^{۱۴}. Sterman & Egner^{۱۵}. neurofeedback^{۱۶}. operant conditioning^{۱۷}. Thatcher

آن حسگرهایی (الکترود) به سر بیمار متصل می‌گردد (کایزر و اتمر^۱، ۲۰۰۰) و از طریق آن، ریتم‌ها و فرکانس‌های نابهنجار (بر اساس تشخیص‌های مبتنی بر موج نگار کمی مغزی^۲) به ریتم‌ها و فرکانس‌های بنهنجار (یا نسبتاً بنهنجار)، و به دنبال آن فرایندهای روان شناختی نابهنجار به فرایندهای روان شناختی بنهنجار تغییر می‌کند (گانکلمن و جانسون^۳، ۲۰۰۵).

نتایج اولیه مبنی بر تأثیرات درمانی نوروفیدبک توسط ویوریکا^۴ و استرمن (۱۹۶۸ و ۱۹۶۹) ارائه شد. در طول سه دهه گذشته، مطالعات بسیاری در زمینه درمان نوروفیدبک نشان داده است که این راهبرد در گستره وسیعی از موقعیت‌های آسیب شناسی روانی از قبیل اختلال سلوک^۵ و نارسایی توجه با و بدون فزون کنشی^۶ (روزیتر^۷، ۲۰۰۴)، توانمندی‌های شناختی (مارینوس^۸ و همکاران، ۲۰۰۹، زوفل^۹، هاستر^{۱۰} و هرمان، ۲۰۱۱)، و اختلال‌های یادگیری (فرناندز و همکاران، ۲۰۰۳؛ بکرا^{۱۱} و همکاران، ۲۰۰۶؛ فرناندز و همکاران، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸؛ مارینوس و همکاران، ۲۰۰۹) کاربرد دارد.

منطق نوروفیدبک ریشه در پژوهش‌های نوروفیزیولوژیکی دارد که نشان داده‌اند بین EEG و مکانیسم‌های تalamo-کورتیکال زیرین که مسئول ریتم‌ها و فرکانس‌های EEG هستند، رابطه وجود دارد. به اعتقاد استرمن (۱۹۹۶) آسیب عصبی^{۱۲} می‌تواند ریتم‌ها و فرکانس‌های EEG را تغییر دهد و آموزش نوروفیدبک با هدف بنهنجارسازی این ریتم‌ها می‌تواند موجب اثرات بالینی پایدار گردد. همسو با این فرضیه چندین مطالعه نشان داده‌اند که داشش آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری و به ویژه نارساخوانی، دارای EEG نابهنجاری هستند به طوری که دارای فعالیت امواج کند به ویژه در دامنه تا^{۱۳} و کاهش آلفا^{۱۴} نسبت به گروه همسالان بنهنجار خود هستند (بکرا و همکاران، ۲۰۰۶).

از طرف دیگر، به اعتقاد ورنون^{۱۵} و همکاران (۲۰۰۳) نوروفیدبک مکانیسمی به کودک ارائه می‌دهد تا از طریق کاهش فعالیت موج آهسته و افزایش فعالیت موج سریع وضعیت قشری خود را بنهنجار سازد.

^۱. Kaiser & Othmer

^۲. Quantitative Electro Encephalo Graphy (QEEG)

^۳. Gunkelman & Johnstone

^۴. Wywircka

^۵. conduct disorder

^۶. Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)

^۷. Rossiter

^۸. Marinus

^۹. Zoefel

^{۱۰}. Huster

^{۱۱}. Becerra

^{۱۲}. neuropaθiology

^{۱۳}. theta range

^{۱۴}. alpha

^{۱۵}. Vemon

بنابراین انتظار می‌رود کودک بتواند از طریق اصلاح نابهنجاری EEG، توجه و تمرکز بیشتری نشان داده و از میزان برانگیختگی بیشتری برخوردار شود.

گادس و ایگل^۱ (۱۹۹۴) گزارش دادند که ۸۰ درصد کودکان درمان شده، در آزمون هوشیار، آزمون آزمون استاندارد شده پیشرفت تحصیلی و درجه بندی‌های والدین و معلمان پیشرفت معنی داری نشان دادند. فرناندز و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعه‌ای نشان دادند که نوروفیدبک موجب کاهش نسبت تتا/آلfa در کودکان دچار اختلال یادگیری شد و بهبود رفتاری بعد از اتمام درمان در آنان مشاهده شد و این بهبودی تا ۲ ماه بعد از درمان نیز مشاهده شد. بکرا و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه‌ای اثربخشی نوروفیدبک را در یک پیگیری^۲ ۲ ساله بررسی کردند و مشاهده کردند که کودکان دارای اختلال یادگیری که با نوروفیدبک درمان شده بودند در مقایسه با گروه کنترل، تغییرات رفتاری مثبت را که منعکس کننده بهبود نشانه‌های اختلال یادگیری بود، نشان دادند. همچنین فرناندز و همکاران (۲۰۰۷، ۲۰۰۸) نشان دادند که آموزش نوروفیدبک موجب بهبود فعالیت‌های شناختی و رفتاری و اصلاح EEG در کودکان مبتلا به اختلال‌های یادگیری شده است. همچنین پیگیری‌های دو ماهه نیز نشان دهنده ثبات تغییرات بود به طوری که فراوانی باند تتا عمدتاً در ناحیه فرونتال چپ^۳ و سینگولیت^۴ کاهش یافت و باند آلفا در ناحیه تمپورال راست^۵ و فرونتال راست و باند بتا در تمپورال چپ، فرونتال راست و ناحیه قشری سینگولیت افزایش نشان داد. مارینوس و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقی بر روی کودکان نارساخوان نشان دادند که نوروفیدبک موجب بهبود معنادار هجی کردن^۶ در گروه آزمایش شده است اما این تغییر در خواندن بدست نیامد. همچنین افزایش معناداری در به هم پیوستگی^۷ آلفا بدست آمد که ممکن است نشان دهنده تأثیر بهبود توجه بر تغییر معنادار هجی کردن باشد.

با وجود تمام پیشرفت‌ها و تلاش‌های علمی در مورد مطالعه شیوه‌های نوین در مباحث بالینی، مطالعه فرنسیس^۸ و همکاران (۱۹۹۷؛ به نقل از لرنر^۹، ۲۰۰۳) نشان داده است کودکانی که افت تحصیلی دارند، به رغم تلاش‌هایی که برای جبران عقب افتادگی آن‌ها انجام می‌شود، باز هم عقب افتادگی تحصیلی در

^۱. Gaddes and Edgell

^۲. follow-up

^۳. left frontal

^۴. cingulate

^۵. right temporal

^۶. spelling

^۷. coherence

^۸. Francis

^۹. Lerner

آن‌ها همچنان باقی می‌مانند. جوئل^۱ (به نقل از لرنر، ۲۰۰۳) معتقد است کودکانی که در کلاس اول کنده‌خوان بودند، به احتمال ۸۸ درصد در کلاس چهارم نیز ضعیف خوان خواهند بود. آلبرت شانکر^۲ (به نقل از لرنر، ۲۰۰۳) معتقد است کودکانی که نمی‌توانند خواندن، نوشتن و شمردن را تا کلاس چهارم و پنجم کاملاً یاد ننمودند، در کلاس‌های بالاتر هم نمی‌توانند این تکالیف را یاد بگیرند، فرقی نمی‌کند که چه نوع برنامه درمانی برای آن‌ها فراهم شود.

با علم به ناکافی بودن روش‌های رایج در درمان نارساخوانی، این سؤال مطرح است که آیا آموزش نوروفیدبک به عنوان یک شیوه جدید در بهبود فرایندهای روان‌شناختی و عصب‌شناختی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی مؤثر است؟

روش

الف- گروه نمونه

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر نارساخوان مراجعه کننده به مرکز ویژه ناتوانی‌های یادگیری در شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۹ تشکیل می‌داد که تعداد آن‌ها برابر با ۱۵۰ نفر بود و در پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.

روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونه موردنیاز از بین کلیه دانش آموزان ارجاع داده شده به مرکز که اختلال نارساخوانی بر اساس ملاک‌های DSM-IV-TR در آن محروم شده، نمونه‌ای به حجم ۴۰ نفر انتخاب شد، سپس آزمون‌های خواندن، CPT و الکتروآنسفالوگرافی بر روی نمونه انتخاب شده اجرا شد.

در مرحله بعدی دانش آموزان نارساخوان در گروه‌های آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شد. ضمناً انتخاب حجم نمونه ($n=40$) با توجه به روش مطالعه که آزمایشی است صورت گرفته است به طوری که حجم نمونه در تحقیقات آزمایشی برای هر زیر گروه حداقل ۱۵ نفر کفایت می‌کند (کوهن^۳ و همکاران، ۲۰۰۱). اما با توجه به عواملی از جمله ریزش گروه و ... تعداد ۲۰ نفر برای هر زیر گروه در نظر گرفته شد. در ادامه ۵ نفر از گروه کنترل و ۴ نفر از گروه آزمایشی از ادامه جلسات خودداری نمودند که در مجموع داده‌های بدست آمده از ۳۱ نفر تحلیل شد. دامنه سنی این افراد ۸-۱۱ سال با میانگین ۹/۲۵ و انحراف معیار ۱/۱۲ بود.

¹. Joel

². Albert Shanker

³. Cohen

ج- ابزارهای جمع آوردی اطلاعات و روش اجرا

آزمون عملکرد پیوسته^(CPT): این آزمون برای اولین بار در سال ۱۹۶۵ توسط رازولد^۲ و همکاران تهیه شد و به سرعت مقبولیت عام یافت. ابتدا این آزمون برای سنجش ضایعه مغزی بکار گرفته شد اما در دهه ۱۹۹۰ به عنوان متدائل‌ترین شیوه آزمایشگاهی در ارزیابی کودکان فزون کنش همراه با نارسایی توجه به کار رفت. هدف این آزمون سنجش نگهداری توجه و زود انجیختگی در این کودکان است (هادیان فرد و همکاران، ۱۳۸۷). در حقیقت آزمون عملکرد پیوسته یک آزمون واحد نیست. تاکنون گونه‌های مختلفی از آن جهت اهداف درمانی یا پژوهشی تهیه شده است. فرم فارسی آزمون که از طریق رایانه اجرا می‌شود؛ دارای اعداد فارسی به عنوان محرک است. از این تعداد ۳۰ محرک (۲۰ درصد) به عنوان محرک هدف می‌باشد. فاصله بین ارائه دو محرک ۵۰۰ میلی ثانیه و زمان ارائه هر محرک ۱۵۰ میلی ثانیه است (کارکام و سیگل، ۱۹۹۳). ضرایب اعتبار (بازآزمایی) قسمت‌های مختلف آزمون در مطالعه هادیان فرد و همکاران (۱۳۷۹)، با فاصله ۲۰ روز روی ۴۳ دانش آموز پسر دبستانی انجام شد؛ در دامنه‌ای بین ۰/۵۹ تا ۰/۹۳ قرار دارد. روابط آزمون با شیوه روانی سازی ملاکی از طریق مقایسه گروه بهنچار (۳۰ دانش آموز پسر دبستانی) و فزون کنشی همراه با نارسایی توجه (۲۵ دانش آموز پسر دبستانی) انجام گرفت. مقایسه آماری میانگین دو گروه در قسمت‌های مختلف آزمون، تفاوت معناداری را بین عملکرد این دو گروه نشان داد ($P < 0/001$).

آزمون اختلال در خواندن: این آزمون توسط شفیعی و همکاران (۱۳۸۷) در مطالعه‌ای با عنوان طراحی و ساخت آزمون غریالگری تشخیص اختلال درخواندن درپایه‌های اول تا پنجم دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر اصفهان ساخته شده است. بدنه‌اصلی آزمون در هر پایه مرکب از یک متن صد کلمه‌ای و چهار سؤال در ک مطلب است. این آزمون بر روی ۲۰۰ دانش آموز دختر و پسر در تمام پایه‌های اول تا پنجم مقطع ابتدایی و مجموعاً ۱۰۰۰ دانش آموز که به صورت تصادفی از کلیه نواحی پنج گانه شهر اصفهان انتخاب شده بودند، معیار شده است. به علاوه آزمون روی دو گروه نارساخوان و عادی اجرا گردیده است. یافته‌های این مطالعه نشان داد که همبستگی نمرات دقت و سرعت خواندن با نمره کل آزمون بالا بوده است. پایایی آزمون با معیار آلفای کرونباخ $\alpha = 0.77$ گزارش شده است و تفاوت میانگین دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به اختلال خواندن معنی دار بوده است ($p < 0.01$).

1. Continuous Performance Test

2. Rosvold

3. Corkum, and Siegel

مقیاس تجدیدنظر شده هوش و کسلر کودکان: این مقیاس توسط و کسلر (۱۹۶۹)، به منظور سنجش هوش کودکان تهیه شده است. این آزمون دارای ۱۲ خرده مقیاس می‌باشد (۶ خرده مقیاس کلامی و ۶ خرده مقیاس غیرکلامی). اعتبار این آزمون از طریق دونیمه کردن برای هوش‌شهر کلی ۰/۹۷، برای هوش‌شهر کلامی ۰/۹۷ و برای هوش‌شهر عملی ۰/۹۳ گزارش شده است (مارنات، ۱۹۹۰ ترجمه پاشا شریفی و همکاران، ۱۳۷۵). در این پژوهش از فرم فارسی این مقیاس که توسط شهیم (۱۳۷۳) جهت سنجش هوش کودکان ۱۳ تا ۶ ساله هنجریابی شده، استفاده گردیده است. اعتبار این آزمون با روش دونیمه کردن برای هوش کلی، هوش کلامی و هوش غیرکلامی به ترتیب ۰/۹۰ و ۰/۹۴ و ۰/۹۶ گزارش شده است. همچنین همبستگی آزمون با پیشرفت تحصیلی ۸/۸ و با میزان بازآزمایی ۸۵/۰ گزارش شده است. از این آزمون در مطالعه حاضر جهت بررسی بهنجار بودن بهره‌هوشی دانش آموزان نارساخوان استفاده شده است.

دستگاه نوروویدبک (NFT)^۱: ابزاری است مجهز به سیستم رایانه‌ای، که جهت اجرای نوروویدبک به کاربرده می‌شود. این ابزار از تجهیزات مشاهده گری که به بدن وصل هستند (الکترودها) استفاده می‌کنند تا به افراد اطلاعاتی درباره برخی از کارکردهای زیست شناختی بدنشان ارائه کند (لورنس^۲، ۲۰۰۲) و طرز کار آن به این ترتیب است که یک جفت الکترود روی پوست فرق سر و یک یا دو الکترود هم روی لوبهای گوش قرار داده می‌شود. سپس با کمک تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای و براساس وضعیت امواج مغزی فرد، یک پسخوراند دیداری و شوابی (معمول‌آر قالب یکبازی، تصویر، ویاصوت کامپیوتری) به فرد ارائه می‌شود. فرد طی مرافق بالاتر درمی‌یابد که می‌تواند با استفاده از امواج مغزی اش، این فیدبک‌ها را کنترل و تنظیم کند. تداوم این فرایند باعث بروز تغییراتی در وضعیت امواج مغزی و بهبود نابهنجاری‌های آن می‌شود (هموند^۳، ۲۰۰۶). این وسیله جهت سنجش خط پایه امواج مغزی و اجرای جلسات درمانی به کار گرفته شد.

۵- روش اجرای جلسات درمانی

پس از محرز شدن اختلال نارساخوانی بر اساس ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR در کلیه دانش آموزان پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی ارجاع داده شده به مرکز ناتوانی‌های ویژه یادگیری شهرستان اردبیل، آزمون‌های تعریف شده در مطالعه حاضر اجرا شد و سپس با استفاده از روش جایگزینی تصادفی، دانش آموزان نارساخوان به دو گروه (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. لازم به ذکر است که نمونه انتخاب شده، در زمان اجرای نوروویدبک درمان دیگری دریافت نمی‌کرد.

¹. neurofeedback training

². Lawrence

³. Hammond

گروه آزمایش تحت درمان نوروفیدبک به مدت ۱۰-۷ دقیقه‌ای به عنوان موقعیت آزمایشی قرار گرفت. لازم به ذکر است که در کارهای بالینی عمدتاً درمان نوروفیدبک شامل ۳۰ جلسه می‌باشد اما مطالعات فرناندز و همکاران (۲۰۰۳) نشان داده است که اجرای نوروفیدبک در ۲۰ جلسه موجب بهبودی علایم می‌گردد لذا تعداد جلسات این مطالعه نیز به طور مشابه انجام شد. هر جلسه در ۹۰ ثانية اول، خط پایه^۱ برای بیمار مشخص می‌شد و در طی جلسه، براساس این خط پایه تمرين صورت می‌گرفت. در هر جلسه ۶ تمرين وجود داشت که هر یک ۵ دقیقه به طول می‌انجامید و بین تمرين‌ها یک استراحت ۳۰ ثانية‌ای در نظر گرفته شده بود. دانش آموزان، هم‌فیدبک دیداری و هم شنیداری دریافت می‌کردند.

در جلسه اول ارتباط بین دستگاه نوروفیدبک (FlexComp Infiniti™)، بدنه دانش آموزان، کامپیوتر، وصفحه‌نمایش، تشریع می‌شد. دانش آموزان راهنمایی می‌شدند تا بكمک آرمیدگی و تمرين‌کزبرصفحه‌نمایش، بازی‌های مورد نظر را باموفقیت انجام دهند. کوشش‌های موفق دانش آموزان با تشویق‌های کلامی درمانگرهمراء می‌شدند و در پایان جلسه در صورت موفقیت وی در دو سوم موارد، یک کارت به وی داده می‌شد. دانش آموزنی توانست با جمع کردن پنج کارت، آن‌هارا با سباب بازی دلخواه خود عرض کند. محل نصب الکترودها و امواج مورد هدف بر اساس مطالعات پیشین (Demos^۳، ۲۰۰۴؛ والکر و نورمن^۴، ۲۰۰۶؛ آرنز^۵ و همکاران، ۲۰۰۷؛ پیونلازی^۶، اسپیرونل و آنگریلی^۷، ۲۰۰۸؛ مارینوس و همکاران، ۲۰۰۹) تعیین گردید به طوری که پروتکل درمانی به این شکل تعریف شد: سرکوب^۸ دلتا (۱-۴ هرتز) در T6 به مدت ۱۰ دقیقه و سرکوب تنا و دلتا (۷-۲ هرتز) در C7 به مدت ۲۰ دقیقه.

همچنین آستانه‌ها بر اساس الگوی (اسکوت^۹ و همکاران، ۲۰۰۵) تعریف شد به طوری که در ابتدا آستانه‌ها به نحوی تنظیم شد که چنانچه دانش آموز در ۲۰ درصد موقع باندهای سرکوب شده را به مدت حداقل ۰/۲۵ ثانية پایین‌تر از آستانه حفظ می‌کرد، تقویت (فیدبک دیداری و شنیداری) دریافت می‌کرد. در صورتی مراجع می‌توانست ۹۰ درصد موقع و در دو کوشش پیاپی باند سرکوب شده را پایین‌تر از آستانه قرار دهد، آستانه بر اساس برنامه تغییر می‌کرد تا به آستانه بھینه نزدیک‌تر شود.

¹. baseline

^۲. مدلی از دستگاه نوروفیدبک است که ۱۰ کاناله می‌باشد و جدیدترین نوع دستگاه است.

³. Demos

⁴. Walker and Norman

⁵. Arns

⁶. inhibit

⁷. Scott

گروه کنترل نیز مشابه گروه آزمایش به روش نورو فیدبک کاذب^۱ به مدت ۷-۱۰ هفته و ۲۰ جلسه درمانی ۳۰ دقیقه‌ای در مرکز ناتوانی‌های ویژه یادگیری شهرستان اردبیل به عنوان موقعیت کنترل قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات، مجدداً از دو گروه پس آزمون گرفته شد. در ادامه، پیگیری ۲ ماهه برای گروه آزمایش و گروه کنترل انجام گرفت.

۵- روش آماری: داده‌های این مطالعه با استفاده از تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌های تحقیق:

یافته‌های توصیفی نشان می‌دهد گروه آزمایش با تعداد ۱۶ نفر در یک دامنه سنی ۱۱-۸ سال با میانگین ۹/۲۵ و انحراف معیار ۱/۱۲ قرار دارند و گروه کنترل با تعداد ۱۵ نفر در یک دامنه سنی ۱۱-۸ سال با میانگین ۹/۱۳ و انحراف معیار ۱/۰۶ می‌باشند. از نظر پایه تحصیلی، ۵ نفر (۱۶/۱ درصد) در پایه دوم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند، ۵ نفر (۱۶/۱ درصد) در پایه سوم ابتدایی، ۳ نفر (۹/۷ درصد) در پایه چهارم ابتدایی، و ۳ نفر (۹/۷ درصد) در پایه پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند. یافته‌های مربوط به سوالات تحقیق در جدول‌های شماره ۱ و ۲ گزارش شده است.

جدول شماره ۱: نتایج تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری مکرر برای مقایسه گروه نورو فیدبک (n=۱۶) و گروه کنترل (n=۱۵) در آزمون CPT

ES		F(۱۹,۲۹)			پیگیری (SD) M	پس آزمون (SD) M	پیش آزمون (SD) M	گروه	متغیر
نیزه	نورو فیدبک	عامل	زمان	گروه					
۰/۰۵	۰/۶۲	** ۷/۷	** ۴/۵	*	(۴/۷۳) ^b ۱۳۵/۹۴	(۴/۷۸) ^b ۱۳۶/۵۶	(۳/۱۵) ^a ۱۳۲/۰۶	نورو فیدبک	پاسخ‌های صحیح
					(۴/۳۲) ^a ۱۳۱/۸۰	(۳/۹۹) ^a ۱۳۱/۵۳	(۳/۶۲) ^a ۱۳۱/۵۳	کنترل	
۰/۱۰	۰/۶۱	** ۷/۷	** ۵/۵	** ۵/۵	(۱/۹۶) ^b ۵/۱۲	(۲/۲۷) ^b ۴/۸۷	(۰/۸۷) ^a ۷/۶۸	نورو فیدبک	خطای حذف
					(۱/۱۸) ^a	(۱/۲۴) ^a	(۱/۰۸) ^a	کنترل	

Mock neurofeedback در این شیوه همانند نورو فیدبک واقعی الکتروودها روی سر کودک نصب می‌گردد و بازیهای ضبط شده را از مانیتور می‌بیند اما با این تفاوت که تغییر در این تصاویر ضبط شده ناشی از فیدبک دامنه امواج مغزی نیست و کاملاً تصادفی است.

					۷/۴۶	۷/۶۰	۷/۸۰		
۰/۰۷	۰/۵۰	* ۱/۵۴	* ۲/۰۶	۲/۲۷	(۲/۴۱) ^b ۸/۳۷	(۲/۵۷) ^b ۸/۳۱	(۲/۵۰) ^a ۱۰/۴۳	نورو فیدبک	خطای ارائه
					(۲/۸۹) ^a ۱۰/۶۶	(۲/۸۹) ^a ۱۰/۶۶	(۲/۵۹) ^a ۱۰/۸۰	کنترل	

توضیح: در هر گروه میانگین‌هایی که $\mu_{\text{subscript}}$ مشترکی ندارند از یکدیگر تفاوت معنادار براساس آزمون بنفرونی دارند

* $P < 0.05$ ** $P < 0.01$ *** $P < 0.001$

آزمون عملکرد پیوسته: جدول شماره ۱، میانگین‌ها، انحراف معیارها، اندازه‌های تأثیر، نتایج حاصل از آنوای دو عاملی بالاندازه گیری‌های مکرر را دربردارد. قبل از بررسی نتیجه آزمون، پیش فرض‌های این آزمون یعنی آزمون باکس (به ترتیب $0/69$ ، $0/65$ ، $0/99$)، کرویت موچلی (به ترتیب $0/42$ ، $0/45$ ، $1/38$) و آماره لوین (به ترتیب $0/73$ ، $0/12$ ، $0/28$) در مورد هر سه متغیر نشان دهنده آن بوده است که به ترتیب شرط همگنی ماتریس‌های واریانس کواریانس، برابری واریانس‌های درون آزمودنی و برابری واریانس‌های بین گروهی رعایت شده است.

نتیجه حاصل، بهبود معناداری رابطه مقیاس‌های مورد اندازه گیری (پاسخ‌های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه) در طی جلسات درمانی و پیگیری دو ماهه، نشان می‌دهند. تعامل بین زمان و گروه نیز برای هر سه مقیاس (پاسخ‌های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه) معنادار است. این مسئله نشان دهنده بهبودی معنادار در گروه نوروفیدبک است. عامل گروه در دو مقیاس (پاسخ‌های صحیح و خطای حذف) معنادار است و در مقیاس خطای ارائه گرایش به معناداری دارد ($F_{(1,29)} = 0.08$; $P = .27$).

جدول ۲: نتایج تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری مکرر برای مقایسه دامنه فرکانس دلتا (۴-۱ هرتز) و تتا (۸-۴ هرتز) در دو گروه نوروفیدیک (n=۱۶) و گروه کنترل (n=۱۵)

ES		F _(١٩٢٩)			پیشگیری	جلسہ پیشتم (پس آزمون)	جلسہ دهم	جلسہ اول (پیش آزمون)	گروہ	متغیر
کنٹرول	بوز و فیدبک	تعامل	زمان	گروہ						
					(SD) M	(SD) M	M(SD)	(SD) M		

۰/۱۰	۰/۸۲	** ۱۱/۷۹	** ۰/۹۹	** ۰/۲۰	** ۰/۲۸	(۱/۱۹) ^{ab} ۱۳/۱۳	(۱/۱۶) ^{ab} ۱۳/۱۹	(۰/۸۹) ^b ۱۳/۷۰	(۰/۶۸) ^a ۱۴/۱۰	نوروفیدبک پیک	نوروفیدبک پیک	Delta _{μV}	نوروفیدبک پیک
						(۰/۸۸) ^a ۱۴/۴۴	(۰/۹۴) ^a ۱۴/۴۹	۵۵(۰/۹۵) ^a ۱۴/	(۰/۹۱) ^a ۱۴/۵۲	نوروفیدبک پیک	نوروفیدبک پیک		
۰/۰۷	۰/۵۴	** ۰/۵۵	** ۰/۵۲	** ۰/۵۹	** ۰/۶۹	(۰/۴۴) ^{ab} ۱۰/۴۳	(۰/۴۴) ^{ab} ۱۰/۴۴	(۰/۴۹) ^b ۱۰/۵۸	(۰/۴۶) ^a ۱۰/۶۵	نوروفیدبک پیک	نوروفیدبک پیک	Theta _{μV}	نوروفیدبک پیک
						(۰/۴۰) ^a ۱۰/۹۳	(۰/۴۶) ^a ۱۰/۹۷	(۰/۴۹) ^a ۱۰/۹۹	(۰/۵۳) ^a ۱۰/۸۹	نوروفیدبک پیک	نوروفیدبک پیک		

توضیح: در هر گروه میانگین‌هایی که subscript ندارند از یکدیگر تفاوت معنادار براساس آزمون بنفرونی


*P<0/05 **P<0/01 ***P<0/001 .(P<۰/۰۵)

دامنه^۱ فرکانس دلتا (۱-۴ هرتز) و تتا (۴-۸ هرتز): جدول شماره ۲، میانگین دامنه امواج مغزی دلتا و تتا به میکروولت (μV)، انحراف معیارها، اندازه‌های تأثیر، ونتایج حاصل از آن‌ووای دو عاملی بالاندازه گیری‌های مکرر را در برابر دارد. قبل از بررسی نتیجه آزمون، پیش فرض های این آزمون یعنی آزمون باکس (به ترتیب ۱/۲۷ و ۱/۰۹)، کرویت موچلی (به ترتیب ۲/۸۱ و ۲/۰۱) و آماره لوین (به ترتیب ۲/۰۳ و ۰/۰۴) در مورد هر سه متغیر نشان دهنده آن بوده است که به ترتیب شرط همگنی ماتریس‌های واریانس کواریانس، برابری واریانس‌های درون آزمودنی و برابری واریانس‌های بین گروهی رعایت شده است.


یافته‌ها بهبودی معناداری را برای امواج مغزی مورداندازه گیری (دامنه فرکانس دلتا و تتا) در طی جلسات درمانی و پیگیری دو ماهه، نشان می‌دهد. تعامل بین زمان و گروه نیز برای هر دو دامنه امواج مغزی معنادار است. این مسئله نشان‌دهنده بهبودی معنادار در گروه نوروفیدبک است. عامل گروه نیز در دو دامنه دلتا و تتا معنادار است.

این یافته‌ها در نمودارهای صفحه بعد نمایش داده شده است:

¹. amplitude



نمودار شماره ۲: میانگین پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری دامنه فرکانس دلتا (۴-۸ هرتز) در دو گروه نوروفیدبک و گروه بلاسیو



نمودار شماره ۱: میانگین پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری دامنه فرکانس دلتا (۱-۴ هرتز) در دو گروه نوروفیدبک و ...

بحث و نتیجه گیری

سؤال اول این پرسش را مطرح می کرد که آیا آموزش نوروفیدبک در افزایش نگهداری توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی مؤثر است؟

نتایج حاصل از آنوازی دو عاملی بالاندازه گیری های مکرر بهبودی معناداری را برای مقیاس های مورداندازه گیری در آزمون عملکرد پیوسته یعنی (پاسخ های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه) در طی جلسات درمانی و پیگیری بعد از دو ماه نشان داد. همچنین تعامل معنادار بین زمان و گروه نیز برای هر سه مقیاس (پاسخ های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه) نشان دهنده بهبودی در گروه نوروفیدبک بود.

این یافته با نتایج پژوهش های زیر هم خوانی دارد. بخشایش، اسر و ویشکن (۱۳۸۹) در مطالعه ای نشان دادند که آموزش نوروفیدبک در بهبود نارسایی توجه اثربخش بوده است و این بهبودی در ۵۵/۶ درصد از دانش آموزان دارای اختلال فزون کنشی همراه با نارسایی توجه گزارش شده است. راسیتر^۱ (۲۰۰۴) با مرور نتایج مطالعات نشان داد که آموزش نوروفیدبک موجب بهبود عملکرد افراد در آزمون عملکرد پیوسته (CPT) شده است. همچنین این بهبودی در مقیاس اختلال نقص توجه برآون^۲ (۱۹۹۶) معنادار بوده است. بکرا و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه ای پیگیرانه نشان دادند که در گروه کودکان دارای اختلال یادگیری که با نوروفیدبک درمان شده بودند بهبود معناداری در آزمون عملکرد پیوسته نشان داده اند.

در تبیین این یافته باید به اهمیت کاهش یا افزایش دامنه امواج مغزی به ویژه امواج تنا (۴-۸ هرتز) و دلتا (۱-۴ هرتز) در عملکردهای عالی ذهنی اشاره کرد. مطالعات نشان داده است که افزایش امواج کند مغزی

¹. Rossiter

². Brown

(کمتر از ۱۰ هرتز) در نواحی مختلف مغزی با تفکر مه آلود^۱، کندی زمان واکنش^۲، نارسایی حساب^۳، ضعف قضاوت^۴، عدم کنترل تکانه و کاهش توجه و انگیختگی در افراد همراه است (دموس، ۲۰۰۴)؛ لذا انتظار می‌رود با سرکوب یا کاهش دامنه امواج تتا و دلتا در منطقه F7، شاهد تغییر رفتار به ویژه افزایش انگیختگی و توجه در افراد بود. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که نوروفیدبک می‌تواند کوکان مبتلا به نارساخوانی را در تنظیم فعالیت امواج مغزی آن‌ها یاری دهد و از این طریق، مشکلات توجه آنان را بهبود بخشد.

سؤال دوم این بود که آیا آموزش نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی مؤثر است؟

یافته‌ها بیانگر بهبودی معنادار در دامنه امواج مغزی دلتا و تتا در طی جلسات آموزش نوروفیدبک و پیگیری بعد از دو ماه بود. این یافته با یافته‌های محققان زیر هم‌خوانی دارد. فرناندز و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعه‌ای نشان دادند که نوروفیدبک موجب کاهش نسبت تتا/آلfa در کوکان دچار اختلال یادگیری شد و تغییرات EEG تا ۲ ماه بعد از درمان نیز مشاهده شد.

بکرا و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه‌ای پیگیرانه به مدت ۲ سال نشان دادند که آموزش نوروفیدبک موجب تغییرات مثبت رفتاری و الکتروآنسفالوگرافی که منعکس کننده بهبود نشانه‌های اختلال یادگیری بود نشان دادند. در حالی که در گروه کنترل نابهنجاری موج تتا در غیاب تغییرات مثبت رفتاری تداوم داشت.

فرناندز و همکاران (۲۰۰۷) نیز در مطالعه‌ای مشابه نشان دادند که برخلاف گروه کنترل که تغییری در عملکرد شناختی و رفتاری آنان مشاهده نشد. در گروه آزمایش، آموزش نوروفیدبک سریعاً موجب بهبودی فعالیت‌های شناختی و رفتاری و EEG در کوکان مبتلا به اختلال‌های یادگیری شد. همچنین پیگیری‌های دو ماهه نیز نشان دهنده ثبات تغییرات بود. همچنین مارینوس و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقی افزایش معناداری را در تقارن^۵ آلفا گزارش کردند.

در تبیین این موضوع باید گفت مغز انسان قادر به شفابخشی خود است یعنی توانایی یادگیری و یا یادگیری مجدد مکانیسم‌های خود تنظیمی^۶ امواج مغزی را که برای کارکرد طبیعی مغز دارای نقش اساسی می‌باشد، دارد (دموس، ۲۰۰۴). بنابراین آموزش نوروفیدبک در واقع تقویت مکانیسم‌های زیرینایی

^۱. foggy thinking

^۲. slow reaction time

^۳. poor calculation

^۴. poor judgment

^۵. coherence

^۶. self- regulation

خود تنظیمی برای کار کرد مؤثر است. این سیستم آموزشی با باز خورد دادن به مغز در مورد اینکه فرد در چند ثانیه گذشته چه کارهایی انجام داده است و ریتم های بیوالکتریکی طبیعی مغز در چه وضعیتی بودند، مغز را برای اصلاح، تعديل و حفظ فعالیت مناسب تشویق می کند. در نتیجه از مغز خواسته می شود تا امواج مغزی متفاوت را با تولید بیشتر برخی از امواج و تولید کمتر برخی دیگر از امواج دست کاری نماید (اشتاين برگ و سیگفرید، ۲۰۰۴ ترجمه رسمی و نیلوفری، ۱۳۸۷).

mekanisim زیربنایی این تغییر را شاید بتوان بر اساس نظریه شرطی سازی عامل^۱ تبیین کرد به طوری که اگر تغییر محرك (دامنه امواج مغزی) بر مبنای قرارداد از پیش تعیین شده با پیامد مطلوب (حرکت تصاویر ویدیوئی و یا تولید صدا) همراه گردد و تقویت شود منجر به یادگیری خواهد شد و این یادگیری زمانی مؤثرتر خواهد بود که از محركهای ساده‌تر (مانند آموزش نوروفیدبک) که منجر به دریافت تقویت می شود استفاده کرد. بنابراین نوروفیدبک به عنوان یک شیوه، ناظر است بر ارائه اطلاعات به فرد پس از ابراز رفتار مورد نظر تا آنکه در آینده این اطلاعات به رخداد مجدد آن رفتار منجر شود. در نتیجه این اطلاعات، دانش آموز می آموزد تا رفتار مزبور را در جهت مطلوب تر تغییر دهد.

البته نباید فراموش کرد که این کودکان در کنار مشکلات عملکردی مغز، مشکلات دیگری نیز دارند. برخی از آن همشکلات خانوادگی بسیاری دارند (مثل اطلاق، درگیری های خانوادگی، وغیره)، برخی از آن ها به جلسه های تقویتی و کمک در برخی دروس نیاز دارند، بسیاری از آن ها از اختلال های همراه رنج می برند؛ بنابراین بهتر است با توجه به مشکلات خاص هر یک از این کودکان، در کنار به کار گیری نوروفیدبک از شیوه های مناسب رفتار درمانی، خانواده درمانی، کمک های درسی برای مشکلات تحصیلی و سایر شیوه های لازم، به صورتی که درمان چندوجهی کمک گرفته شود.

انتظار می رود این شیوه درمانی بتواند جای خود را در کنار شیوه های دیگر درمانی در کشور بگشاید. بدینهی است اصل سرعت اثربخشی این تکنیک در کنار نظم یافتنگی فرآیند درمان و پروتکل های ویژه تدوین شده باید در چارچوب عملی - تجربی کار بالینی در جامعه ما محک بخورد تا بتواند در کارآمدی خود به مجموعه فعالیت های درمانی متخصصان بالینی افزوده شود.

در پایان باید گفت تحقیقات آزمایشگاهی همواره با ریزش فراوان افراد نمونه مواجه هستند که این مطالعه نیز با آن رویرو بود، بنابراین از عملده ترین محدودیت های پژوهش حاضر می توان به مشکل حضور آزمودنی ها برای دو تاسه بار در هفته وافت آزمودنی ها، که به طور معمول در پژوهش های آزمایشی

^۱. operant conditioning

دیده می‌شود، اشاره کرد. همچنین این مطالعه صرفاً بر روی دانش آموzan پسر انجام شده است. بنابراین امکان مقایسه دو جنس درباره میزان تأثیرپذیری از این روش وجود ندارد. بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک در دانش آموzan دختر نارساخوان و همچنین در دیگر اختلال‌های یادگیری و در مقایسه با روش‌های معمول درمان نارساخوانی مانند روش چند حسی فرنالد و کپهارت و ... پیشنهاد می‌گردد.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

- بخشایش، علیرضا؛ اسر، گونتر؛ ویشکن، آنه (۱۳۸۹). میزان تأثیر نوروفیدبک EEG در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه. *پژوهش‌های روان‌شناسی*. ۱۳ (۱): ۲۹-۷.
- شفیعی، بیژن؛ توکل، سمیرا؛ علی‌نیا، لیلا؛ مراثی، محمد رضا؛ صداقتی، لیلا و فروغی، رقیه (۱۳۸۷). طراحی و ساخت آزمون غربالگری تشخیص اختلال درخواندن در پایه‌های اول تا پنجم دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر اصفهان. *شناختی‌سنگی*، دوره ۱۷، شماره ۲، ص ۵۳-۶۰.
- شهیم، سیما (۱۳۷۳). کاربرد مقیاس هوش و کسلر کودکان در ایران. *مجله پژوهش‌های روان‌شناسی*، دوره ۱ شماره ۳ و ۴.
- گرات-مارنات، گ (۱۹۹۲). راهنمای سنجش روانی. ترجمه: حسین پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو (۱۳۸۲). تهران: انتشارات رشد.
- هادیان فرد، حبیب؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز (۱۳۷۹). تهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. *مجله روان‌شناسی*. ۴ (پیاپی ۱۶): ۳۸۸-۴۰۴.
- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; 4th ed.; Text Revision, (DSM-IV-TR). Washington DC: American Psychiatric Association.
- Arns, M., Peters, S., Bretler, R., Verhoeven, L. (2007). Different brain activation patterns in dyslexic children: evidence from EEG power and coherence patterns for the double-deficit theory of dyslexia. *Journal of integrative neuroscience*, vol. 6, no. 1: 175-190
- Becerra, J., Fernández, T., Harmony, T., Caballero, M. I., García, F., Fernández-Bouzas, E. Santiago-Rodríguez and R. A. Prado-Alcalá (2006). Follow-Up Study of Learning-Disabled Children Treated with Neurofeedback or Placebo. *Journal of Clinical EEG & Neuroscience*, 37(3):198-203.
- Bohm, B., Smedler, A. C., & Forssberg, H. (2004). (pp. 263-278). Baltimore, MD: Brookes.
- Impulse control, working memory and other executive functions in preterm children when starting school, *Acta paediatrica*, 93, 1363-1371.
- Chabot RJ, Michele F, John ER. (2001). the clinical role of computerizedEEG in the evaluation and treatment of learningand attention disorders in children and adolescents.Neuropsychiatry Clin Neurosci; 13: 171-186.
- Cohen, L, Manion, L. & Morrison (2001) Research Method in education, Rutledge Flamer.ISBN: 0415368782, 9780415368780.

- Corkum, P. V. & Siegel, L. S. (1993). Is the Continuous Performance are task a valuable research tool for use with children with AD/HD. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 34, 1217-1238.
- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. Norton & company, New York, London.
- DuPaul, G. J., McGoey, K. E., Eckert, T. L., & VanBrakle, J. (2001). Preschool children with attention-deficit/hyperactivity disorder: Impairments in behavioral, social, and school functioning. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 40(5), 508-515.
- Faraone, S. V., Biederman, J. L., Monuteaux, M. C. and Seidman, L. J. (2001). A Psychometric Measure of Learning Disability Predicts Educational Failure Four Years Later in Boy with ADHD. *Journal of Attention Disorder*. 4, 220-230.
- Fernández T, Herrera W, Harmony T, Díaz-Comas L, Santiago E, Sánchez, et al. (2003). EEG and behavioral changes following neurofeedback treatment in learning disabled children. *Clin Electroencephalogr*; 34: 145-152.
- Fernández, T., Garcí'a, F., Prado Alcalá, R.A., Santiago, E., Fernández Bouzas, E., Harmony, T., Díaz Comas, L., Belmont, H (2008). Positive vs. Negative reinforcement in neurofeedback applied to learning disabled children. *Clinical Neurophysiology*, Volume 119, Issue 9, Page e163
- Fernandez, T; Harmony, T; Fernandez-Bouzas, A; Diaz-Comas, L; Prado-Alcala, R.A; Valdes-Sosa, P; Otero, G; Bosch, J; Galan, L; Santiago-Rodriguez, Aubert, E; Garcia-Martinez, F (2007). Changes in EEG Current Sources Induced by Neurofeedback in Learning Disabled Children. An Exploratory Study. *Appl Psychophysiol Biofeedback*, 32: 169–183.
- Gaddes WH, Edgell D.(1994). Learning disabilities and brain function. New York: Springer-Verlag.
- Gasser T, Rousson V, Scheiter Gasser U. (2003). EEG power and coherence in children with educational problems. *ClinNeurophysiol*; 20: 273-282.
- Glass, A. L. and Holyoak, K. J. (1989). Cognition. New York: MC Graw-Hill.
- Gunkelman, J. D; Johnstone, J. (2005). Neurofeedback and the Brain. *Journal of AdultDevelopment*, 12, 2/3.
- Hammond, D. C. (2006). What is Neurofeedback?. University of Utah school of medicine.
- Harmony, T., Hinojosa, G., Marosi, E., Becker, J., Rodríguez, M., Fernández, T., et al. (1990). Correlation between EEG spectral parameters and an educational evaluation. *International Journal of Neuroscience*, 54, 147 – 155.
- Harmony, T., Marosi, E., Díaz de Leon, A. E., Becker, J., & Fernández, T. (1990). Effect of sex, psychosocial disadvantages and biological risk factors on EEG maturation. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 75, 482 – 491.
- Hartman, J. & Hunfalvay, T. (2002) . Effect of attentional focus of learning the basic cast for fly fishing . *Journal of Motor Behavior*. 200 : 95-123.
- John, E. R., Prichep, L., Ahn, H., Easton, P., Friedman, J., & Kaye, H. (1983). Neurometric evaluation of cognitive dysfunctions and neurological disorders in children. *Progress in Neurobiology*, 21, 239 – 290.
- Kaiser DA, Othmer S. (2000). Effects of neurofeedback on variables of attention in a large multi-center trial. *J Neurotherapy*; 4: 5-15
- Lawrence, J. T. (2002). Neurofeedback and yourbrain: A beginners manual. Faculty, NYU medicalcenter & brain research lab, New York.
- Lerner, J. W. (2003). Learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies (9th ed.). Boston: MA: Houghton Mifflin.
- Marinus, H.M; Breteler, M. A; Sylvia, P; Ine, G; Ludo, V (2009). Improvements in Spelling after QEEG-based Neurofeedback in Dyslexia: A Randomized Controlled Treatment Study. *Appl*

- Psychophysiol Biofeedback, DOI10.1007/s10484-009-9105-2
- Mason, D. J., Humphreys, G. W. and Kent, L. S. (2003). Exploring Selective Attention in ADHD: Visual Search Through Space and Time. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 4 (2), 1-20.
- Penolazzi, B., Spironelli, CH and Angrilli, A (2008). Delta EEG activity as a marker of dysfunctional linguistic processing in developmental dyslexia. *Psychophysiology*, 45, 1025–1033. Wiley Periodicals, Inc. Printed in the USA.
- Price, C. J. (1998). The functional anatomy of word comprehension and production. *Trends in Cognitive Sciences*, 2, 281 – 288.
- Ramus, F., Rosen, S., Dakin, S. C., Day, B. L., Castellote, J. M., White, S., et al. (2003). Theories of developmental dyslexia: Insights from a multiple case study of dyslexic adults. *Brain*, 126, 841–865.
- Rossiter, T. (2004). The Effectiveness of neurofeedback and stimulant drugs in treating AD/HD. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 29 (2).
- Rosvold, H. E., Mirsky, A. F., Sarason, I. Bransome, E. D. & Beck, L. H. (1956). A continuous performance test of brain damage. *Journal of Consulting Psychology*, 20, 343-350.
- Sadock, B.J., Sadock, V.A (2007). *Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry behavioral sciences*. 10th. Ed.
- Scott, W. C; Kaiser, D; Othmer, S; & Sideroff, S. I.(2005). Effects of an EEG biofeedback protocol on amixed substance abusing population. *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 31:455-469.
- Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functioningArchive of SID in people with ADHD across the lifespan. *Clinical Psychology Review*, 26, 466–485
- Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2006). Dyslexia (specific reading disability). *Biological Psychiatry*, 57, 1301–1309.
- Sterman, M. B. (1996). Physiological origins and functional correlates of EEG rhythmic activities. *Biofeedback and Self-Regulation*, 21 (1), 3-49.
- Sterman, MB, and T. Egner. (2006). Foundation and practice of neurofeedback for the treatment of epilepsy. *Appl. Psychophysiol. Biofeedback* 31(1):21–35.
- Swanson, L. H., & Jerman, O. (2007). The influence of working memory on reading growth in subgroups of children with reading disabilities. *Journal of Experimental Child Psychology*, 96(4), 249-283.
- Swanson, L. H., Saez, L., & Gerber, M. (2006). Growth in Literacy and cognition in Bilingual children at Risk or Not at Risk for Reading Disabilities. *Journal of Educational Psychology*, 98(2), 247-250 .
- Taroyan, N.A., Nicolson, R.I. and Fawcett, A.J. (2007). "Behavioral and neurophysiological correlates of dyslexia in the continuous performance task." *Clinical Neurophysiology*, 118,(4), 845-855.
- Thatcher RW.(1998). Normative EEG databases and EEG biofeedback. *J Neurother*; 2: 8-39.
- Vernon D, Egner T, Cooper N, et al. (2003). The effect of training distinct neurofeedback protocols on aspects of cognitive performance. *International Journal of Psychophysiology* . 47: 75-85
- Vernon, D. J. (2005). Can neurofeedback training enhance performance? An evaluation of the evidence with implications for future research. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 30, 347-364.
- Walker, J. E., & Norman, C. A. (2006). The neurophysiology of dyslexia: A selective review with implications for neurofeedback remediation and results of treatment in twelve consecutive

- patients. Journal of Neurotherapy, 10, 45–55.
- Wywricka, W; & Sterman, M. B. (1968). Instrumental conditioning of sensorimotor cortex EEG spindles in the waking cat. Physiology and Behavior, 3, 703-707.
- Zoefel, B., Huster, R.J., Herrmann, CH.S (2011). Neurofeedback training of the upper alpha frequency band in EEG improves cognitive performance . NeuroImage, Volume 54, Issue 2, Pages 1427-1431



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی