

## پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس وسواسی - اجباری بیل - براون

سپیده راجزی اصفهانی<sup>۱</sup>، دکتر یاسمین متقی پور<sup>۲</sup>، دکتر کامبیز کامکاری<sup>۳</sup>، دکتر علی رضا ظهیر الدین<sup>۴</sup>، دکتر مسعود جان بزرگی<sup>۵</sup>

### Reliability and Validity of the Persian Version of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS)

Sepideh Rajezi Esfahani <sup>\*</sup>, Yasaman Motaghipour <sup>a</sup>, Kambiz Kamkari <sup>b</sup>,  
Alireza Zahiredin <sup>c</sup>, Masuod Janbozorgi <sup>d</sup>

#### Abstract

**Objectives:** The aim was to evaluate the validity and reliability of the persian version of Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS). **Method:** The sum of 140 patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) and 30 individual participants without OCD were selected via convenient sampling as experimental and control groups respectively. Data gathering was done using Y-BOCS, Structured Clinical Interview for DSM-IV axis-I disorders (SCID-I) and Symptom Checklist-90-Revised Obsessive-Compulsive Symptoms (SCL-90-R-OCS). Reliability coefficients were calculated by Cronbach's alpha, split-half, and test-retest reliability. For validity assessment, concurrent criterion-related validity in correlation with SCID-I and SCL-90-R-OCS, and construct validity (exploratory factor analysis) were executed. In order to normalize the Y-BOCS after insuring that the distribution is normal and does not have kurtosis and skewness, mean and standard deviation were used as the most appropriate central tendencies and deviation. **Results:** Optimal levels of internal consistency scores (symptom checklist 0.97, severity scale 0.95) split-half reliability (symptom checklist 0.93, severity scale 0.89), and test-retest reliability (0.99) were calculated. Concurrent reliability were examined and established by correlating the Y-BOCS with the SCL-90-R-OCS and SCID-I. Exploratory factor analysis was also examined, which indicated three factors for symptom checklist scale and two factors for symptom severity scale. Cutoff point value (9) was also determined. **Conclusion:** The results supported satisfactory validity and reliability of translated form of Yale-brown Obsessive-Compulsive Scale for research and clinical diagnostic applications.

**Key words:** obsessive-compulsive disorder; Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale; validity; reliability; normalization

[Received: 18 May 2010; Accepted: 20 September 2010]

#### چکیده

**هدف:** هدف پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس وسواسی - اجباری بیل - براون (Y-BOCS) بود. **روش:** 140 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری (OCD)، به عنوان گروه آزمایش و 30 فرد سالم، به عنوان گروه گواه، به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، افزون بر Y-BOCS، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال‌های محور I در DSM-IV (SCID-I) (DSM-IV) و خرده‌مقیاس وسواسی - اجباری سیاهه 90 گویه‌ای نشانه‌ها (SCL-90-R-OCS) به کار رفت. پایایی به سه روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دونیمه‌سازی و SCL-90-R-OCS (90-R-OCS) و سازه (تحلیل عامل اکتشافی) بررسی شد. در مورد هنگاریابی Y-BOCS نیز، پس از تعیین نرم‌البودن توزیع و تأیید ندادشتمن کجی و کشیدگی، از میانگین و انحراف معیار به عنوان مناسب‌ترین شاخص گرایش مرکزی و پراکنش، استفاده شد. **یافته‌ها:** ثبات درونی دو بخش سیاهه نشانه (SC) و مقیاس شدت (SS)، به ترتیب 0/97 و 0/95، اعتبار دونیمه‌سازی برای SC و SS به ترتیب 0/93 و 0/89 و اعتبار بازآزمایی 0/99 به دست آمد. میان SC با SCL-90-R-OCS و SS با SC همبستگی مثبت (0/001< $p$ <0) وجود داشت. تحلیل عامل اکتشافی برای SC و SS به ترتیب سه و دو عامل نشان داد. نقطه برش نه برای تمایز بیمار/ سالم پیشنهاد شد. **نتیجه گیری:** نسخه فارسی Y-BOCS برای بررسی محتوا و شدت نشانه‌های وسواسی - اجباری، پایایی و روایی مناسبی دارد.

**کلیدواژه:** اختلال وسواسی - اجباری؛ مقیاس وسواسی - اجباری بیل - براون؛ روایی؛ پایایی؛ هنگاریابی

[دریافت مقاله: 1389/2/28؛ پذیرش مقاله: 1389/6/29]

<sup>1</sup> دانشجوی دکترا روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، خیابان شهید مدنی، بیمارستان امام حسین (ع). دورنگار:  
<sup>2</sup> دکترا روانشناسی مشاوره، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی؛ <sup>3</sup> دکترا تخصصی روانشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر؛ <sup>4</sup> دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ <sup>5</sup> دکترا تخصصی روانشناسی بالینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

**Corresponding author:** PhD. Student in Clinical Psychology, Behavioral Sciences Research Center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Madani St, Emam Hosein Hospital, Tehran, Iran, IR. Fax: +9821-77553074. E-mail: sepideh.rajezi@gmail.com; <sup>a</sup> PhD. in Counseling Psychology, Associate Prof. of Shahid Beheshti University of Medical Sciences; <sup>b</sup> PhD. in Exceptional Children Education, Islamic Azad University of Islamshahr; <sup>c</sup> Psychiatrist, Associate prof. of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Behavioral Sciences Research Center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences; <sup>d</sup> PhD. in Clinical Psychology, Research Institute of Hawzeh & University.

## مقدمه

آبرامویتز<sup>40</sup>، 2005). امروزه Y-BOCS تبدیل به ابزاری جهت غربالگری بیماران مبتلا به OCD شده و در پژوهش‌های بسیاری به کار رفته است. پایایی بین ارزیاب‌ها<sup>41</sup> و بازآزمایی<sup>42</sup> Y-BOCS برای بررسی تغییر نشانه‌ها در OCD، و نه در سایر اختلال‌های اضطرابی و همچنین اختلال افسردگی، مناسب گزارش شده است (وودی<sup>43</sup>، استکتی و چامبلس<sup>44</sup>، 1994؛ تک<sup>45</sup>، اولو<sup>46</sup> و گورسری رزاکی<sup>47</sup>، 1995). Y-BOCS به 13 زبان برگردان شده و پایایی و روایی<sup>48</sup> آن در پژوهش‌ها (کالماری<sup>49</sup>، ویگارت<sup>50</sup> و جانک<sup>51</sup>، 1999؛ موریتز<sup>52</sup>، میه<sup>53</sup> و کلاس<sup>54</sup>، 2002؛ اریندل<sup>55</sup>، والمنیگ<sup>56</sup>، آینهارت<sup>57</sup> و برکام<sup>58</sup>، 2002؛ فینستین<sup>59</sup>، فالون<sup>60</sup>، پتکوا<sup>61</sup> و لیبوویتز<sup>62</sup>، 2003؛ دیاکون و آبرامسویتز، 2005؛ استورچ و همکاران، 2005؛ روساریو-کامپوز<sup>63</sup> و همکاران، 2006؛ استین<sup>64</sup>، اندرسون<sup>65</sup> و اورو<sup>66</sup>، 2007؛ کولن<sup>67</sup> و براؤن<sup>68</sup>، 2007؛ پستو<sup>69</sup>، 2008) و فرهنگ‌های

اختلال سوسائی اجباری<sup>1</sup> (OCD) مشکل روان‌شناختی شدید و پایداری است که تأثیرات منفی بسیار گسترده‌ای بر موقعیت اجتماعی، کاری و خانوادگی فرد بر جای می‌گذارد (پارکین<sup>2</sup>، کوران<sup>3</sup>، 2000؛ بایز<sup>4</sup> و همکاران، 2001). میزان شیوع این اختلال نزدیک به دو درصد گزارش شده است (انجمن روانپزشکی امریکا<sup>5</sup>، 2000؛ مولدینگ<sup>6</sup>، دوران<sup>7</sup>، کیوریوس<sup>8</sup> و ندلچکویک<sup>9</sup>، 2008).

مقیاس سوسائی - اجباری بیل - براؤن<sup>10</sup> (Y-BOCS) (گودمن<sup>11</sup>، پرایس<sup>12</sup> و راسموسن<sup>13</sup>، 1989)؛ یک مصاحبه نیمه‌ساختاریافته<sup>14</sup> برای ارزیابی شدت سوسائی‌ها و اجراء‌ها، بدون توجه به شمار و محتوای سوسائی‌ها و اجراء‌های کنونی است. برخلاف سایر پرسشنامه‌های موجود در این حوزه، Y-BOCS حساسیت<sup>15</sup> بالایی نسبت به تغییرات درمانی دارد و به طور گسترده برای ارزیابی اثربخشی درمان‌های دارویی و روان‌شناختی OCD به کار می‌رود، به طوری که با عنوان «معیار طلایی» ارزیابی شدت نشانه‌های OCD در پایان درمان شهرت یافته است (استکتی<sup>16</sup> و فراست<sup>17</sup>، 1994).

Y-BOCS دو بخش دارد: یکی سیاهه نشانه (SC) و دیگری مقیاس شدت<sup>19</sup> (SS). 16 گویه SC در مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای و به صورت خودگزارشی پاسخ داده می‌شود. در SS هر یک از سوسائی‌ها و اجراء‌ها در پنج بعد میزان آشتفتگی<sup>20</sup>، فراوانی<sup>21</sup>، تداخل<sup>22</sup>، مقاومت<sup>23</sup> و کنترل نشانه‌ها<sup>24</sup> برآورد می‌شود. Y-BOCS سه نمره به دست می‌دهد: شدت سوسائی‌ها، شدت اجراء‌ها و یک نمره کل که در برگیرنده تمامی گویه‌ها است (گودمن و همکاران، 1989).

از دیگر آزمون‌هایی که برای ارزیابی OCD به کار می‌رود، می‌توان به پرسشنامه وسوس فکری لیتون<sup>25</sup> (LOI) (کوپر<sup>26</sup>، 1970)، پرسشنامه ملی سلامت روان<sup>27</sup> (NIMHOCS) (هوگسون<sup>28</sup> و راچمن<sup>29</sup>، 1977)، مقیاس سوسائی (MOCI) (ساناویو<sup>30</sup>، 1983)، پرسشنامه وسوسی - اجباری مادرزی<sup>31</sup> (PI) (ساناویو<sup>33</sup>، 1988)، سیاهه فعالیتی وسوس عملی (CAC) (فیلپوت<sup>35</sup>، 1975) و مقیاس سوسائی - اجباری فلوریدا (FOCI)<sup>36</sup> (استورچ<sup>37</sup> و همکاران، 2007) اشاره نمود. ولی هیچ‌یک از این ابزارها مانند Y-BOCS برای ارزیابی پیامد درمان‌های دارویی و شناختی - رفتاری مناسب نیستند (گودمن و همکاران، 1989؛ ناکاجیما<sup>38</sup>، 1999؛ دیاکون<sup>39</sup> و

- |  |   |
|--|---|
| 1- Obsessive-Compulsive Disorder                                   | 3- Koran                                  |
| 2- Parkin  | 4- Bobes                                  |
| 5- American Psychiatry Association                                 | 6- Moulding                               |
| 7- Doron   | 8- Kyrios                                 |
| 9- Nedeljkovic   | 10- Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale |
| 11- Goodman  | 12- Price                                 |
| 13- Rasmussen  | 14- semi-structured                       |
| 15- sensitivity  | 16- Steketee                              |
| 17- Frost  | 18- Symptom Checklist                     |
| 19- Severity Scale   | 20- distress                              |
| 21- frequency  | 22- intervention                          |
| 23- resistance   | 24- symptoms control                      |
| 25- Leyton Obsessional Inventor                                    |   |
| 26- Cooper   |   |
| 27- Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory                        |   |
| 28- Hodgson  | 29- Rachman                               |
| 30- National Institute of Mental Health Obsessive-Compulsive Scale |   |
| 31- Insel  | 32- Padua Inventory                       |
| 33- Sanavio  | 34- Compulsive Activity Checklist         |
| 35- Philpott   |   |
| 36- Florida Obsessive-Compulsive Inventory                         |   |
| 37- Storch   | 38- Nakajima                              |
| 39- Diakon   | 40- Abramowitz                            |
| 41- interrator reliability   | 42- test-retest                           |
| 43- Woody  | 44- Chambliss                             |
| 45- Tek  | 46- Ulu                                   |
| 47- Gürsoy Rezaki  | 48- validity                              |
| 49- Calamari   | 50- Wiegartz                              |
| 51- Janeck   | 52- Moritz                                |
| 53- Meie   | 54- Kloss                                 |
| 55- Arrindell  | 56- Vlaming                               |
| 57- Eisenhardt   | 58- Berkum                                |
| 59- Feinstein  | 60- Fallon                                |
| 61- Petkova  | 62- Liebowitz                             |
| 63- Rosario-Campos   | 64- Stein                                 |
| 65- Andersen   | 66- Overo                                 |
| 67- Cullen   | 68- Brown                                 |
| 69- Pinto  |   |

گزارش شده است (زانارینی<sup>22</sup> و فرانکبرگ<sup>23</sup>، 2001؛ زانارینی، اسکودل<sup>24</sup>، بندر<sup>25</sup> و دولان<sup>26</sup>، 2000؛ ساجاتوویک<sup>27</sup> SCID-I و رامیز<sup>28</sup>، 2001). توافق تشخیصی نسخه فارسی SCID-I بالای 0/6، توافق کلی برای کل تشخیص‌های فعلی 0/52 و کل تشخیص‌های طول عمر 0/55 گزارش شده است (شریفی و همکاران، 2009). این ابزار برای بررسی روایی ملاک Y-BOCS به کار رفت؛ دو متخصص (یک روانشناس بالینی و یک روانپژوه) با کاربرد SCID-I، با 30 آزمودنی که بر پایه نقطه برش 16 (گودمن و همکاران، 1989) در Y-BOCS تشخیص OCD گرفته بودند، مصاحبہ کردند.

خرده‌مقیاس وسوسی - اجباری سیاهه تجدیدنظر شده 90گویه‌ای نشانه‌ها (SCL-90-R-OCS) (دراگوتیس، 1994): پایابی درونی SCL-90-R برای نه محور رضایت‌بخش گزارش شده است. بالاترین ضریب همبستگی مربوط به افسردگی (0/90) و پایین‌ترین ضریب همبستگی مربوط به روان‌پریشی (0/77) بوده است. پایابی بازآزمایی نیز 0/90-0/78 گزارش شده است (همانجا). دامنه آلفای کرونباخ نسخه فارسی SCL-90-R از 0/61 (خرده‌مقیاس اضطراب ترس گونه<sup>29</sup>) تا 0/87 (خرده‌مقیاس افسردگی) گزارش شده و 31پایابی تمام خرده‌مقیاس‌ها، جز پرخاشگری<sup>30</sup>، ترس مرضی و افکار پارانوئیدی<sup>32</sup>، بیشتر از 0/8 بوده است. ضرایب همبستگی خرده‌مقیاس‌های SCL-90-R با شاخص‌های مقیاس اضطراب آشکار تیلور<sup>33</sup> (تیلور، 1953) نیز مثبت و معنادار گزارش شده است (یوسفی و حسینی، 2002). در بررسی حاضر نیز به پیروی از گودمن (گودمن و همکاران، 1989؛ گودمن و راسموسن<sup>34</sup>، 1989)، برای تعیین اعتبار همگرایی SCL-90-R-OCS، Y-BOCS به کار برده شد.

بسیاری (مولارد<sup>1</sup>، کاتراکس<sup>2</sup> و بسوارد<sup>3</sup>، 1989؛ ناکاجیما، 1999؛ وودی و همکاران، 1994؛ روزاس<sup>4</sup> و همکاران، 2002؛ جاکوبسون<sup>5</sup>، کلاس، فریک<sup>6</sup>، هند<sup>7</sup> و موریتز، 2003) مورد بررسی قرار گرفته است. تا آنجا که بررسی انجام شد، در ایران تنها دو پژوهش (محمدخانی، 1991؛ بیغم، 2000) روایی محتوایی<sup>8</sup> Y-BOCS را مورد بررسی قرار داده‌اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی پایابی آلفای کرونباخ<sup>9</sup> بازآزمایی و دونیمه‌سازی<sup>10</sup> و روایی [ملاک هم‌زمان<sup>11</sup> با دو ابزار مصاحبہ بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در<sup>12</sup> DSM-IV (شریفی و همکاران، 2009) و خرده‌مقیاس وسوسی - اجباری سیاهه تجدیدنظر شده 90گویه‌ای نشانه‌ها<sup>13</sup> (SCL-90-R-OCS) (دراگوتیس، 14) و سازه<sup>15</sup>] نسخه برگردان شده Y-BOCS بود.

## روش

پژوهش توصیفی - پیمایشی حاضر، به روش مقطعی انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از تمامی بیماران مبتلا به OCD استان تهران، که برای درمان به بیمارستان امام حسین (ع) و چند مطب خصوصی مراجعه کرده یا ارجاع شده بودند. از این افراد 140 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابتلای این افراد به OCD پس از مصاحبہ توسط روانپژوه یا روانشناس بالینی، بر پایه ملاک‌های تشخیصی<sup>16</sup> (انجمن روانپژوهی آمریکا، 2000) برای OCD تأیید شد. 30 فرد سالم (نمودار از 16 در Y-BOCS؛ گودمن و همکاران، 1989) نیز برای گروه گواه در نظر گرفته شدند. معیارهای خروج عبارت بودند از: ابتلای به اختلال‌های نورو‌لوژیک<sup>17</sup> و عفونی (که نشانه‌های OCD را در فرد ایجاد می‌کند)، سندروم تورت<sup>18</sup>، اختلال دوقطبی<sup>19</sup> و اختلال‌های روان‌پریشی<sup>20</sup> و وابستگی به مواد<sup>21</sup>، که بر پایه گزارش خود فرد، اعضای خانواده یا پزشک معالج مشخص می‌شد.

برای گردآوری داده‌ها، ابزارهای زیر به کار رفت:

**مصاحبہ بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در SCID-I DSM-IV (شریفی و همکاران، 2009)**، یک مصاحبہ نیمه‌ساختاریافته است، که امکان تشخیص بر پایه DSM-IV (انجمن روانپژوهی آمریکا، 1994) را فراهم می‌آورد. نیمه‌ساختاری بودن آن به این علت است که اجرای آن، به قضاوت بالینی مصاحبہ کننده نیاز دارد. SCID-I بیش از هر مصاحبہ تشخیصی معتبر شده دیگری در بررسی‌های روانپژوهی به کار رفته است، زیرا روایی و پایابی آن خوب

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1- Mollard  | 2- Cottraux              |
| 3- Bouvard  | 4- Rosas                 |
| 5- Jacobsen   | 6- Fricke                |
| 7- Hand   | 8- content               |
| 9- Cronbach $\alpha$  | 10- split-half           |
| 11- concurrent  |                          |
| 12- Structured Clinical Interview for DSM Disorders- I axis                                   |                          |
| 13- Symptom CheckList-90- Revised, Obsessive-Compulsive Scale                                 |                          |
| 14- Derogatis   | 15- construct            |
| 16- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4 <sup>th</sup> ed. Text Revision) | 17- neurologic           |
| 18- Tourette syndrome   | 19- bipolar              |
| 20- psychotic   | 21- substance dependency |
| 22- Zanarini  | 23- Frankenburg          |
| 24- Skodol  | 25- Bender               |
| 26- Dolan   | 27- Sajatovic            |
| 28- Ramirez   | 29- feared               |
| 30- aggression  | 31- pathological fear    |
| 32- paranoid thoughts   |                          |
| 33- Taylor Manifest Anxiety Scale   |                          |
| 34- Rasmussen   |                          |

بر پایه I-SCID، ابتدا در مود 13 آزمودنی، مصاحبه به وسیله یک روانشناس بالینی و یک روانپژوه انجام شد. از آنجا که ضریب همبستگی کنдал میان دو ارزیاب،  $p \leq 0.01$  (0/67) به دست آمد، از آن پس در مورد 17 آزمودنی دیگر، مصاحبه تنها به وسیله روانشناس بالینی انجام شد؛ ضریب همبستگی کنдал میان ارزیابی روانشناس بالینی و Y-BOCS 30 آزمودنی،  $p \leq 0.001$  (0/69) به دست آمد.

برای تعیین روایی سازه، پس از مقابله با داده‌های مفقود<sup>5</sup> (رقم 0/02)، بررسی شاخص KMO<sup>6</sup> بیشتر از رقم 0/80 (شاخص KMO برای SC و SS به ترتیب 0/82 و 0/86 بود)، بررسی نرمال‌بودن توزیع چندمتغیری با آزمون کرویت بارتلت<sup>7</sup> با تأکید بر مجذور خی (میزان کرویت برای SC و SS در سطح 0/001 معنادار بود) و شناسایی مقادیر اشتراک‌ها، یعنی همبستگی هر گویه با نمره کل آزمون، که معرف تجانس درونی است، میزان اشتراک یا بار عاملی بیشتر از 0/3 و واریانس مشترک تبیین شده (مجموع بارهای عاملی تبیین شده) بیشتر از 0/6، به شناسایی عوامل اصلی مقیاس پرداخته شد؛ با رجوع به نمودار سنگریزه<sup>8</sup>، جدول ماتریس مؤلفه و با کمک روش استخراج<sup>9</sup>، همرا با چرخش<sup>10</sup>، سه عامل برای SS و دو عامل برای SC استخراج شد. در مورد SC عامل‌های نخست، دوم و سوم به ترتیب در حالت بدون SC عامل‌های نخست و دوم به ترتیب در مورد چرخش، 5 و 6 گویه و پس از چرخش، به همان ترتیب، 19 و 17 گویه داشتند. در حالت بدون چرخش، 22 عامل‌های نخست و دوم SS به ترتیب در ماتریس مؤلفه<sup>11</sup>، 10 و صفر، در ماتریس الگو<sup>12</sup>، پنج و پنج و در ماتریس ساختار<sup>13</sup>، پنج و پنج گویه داشتند. عامل‌های نخست و دوم SS پس از چرخش، در ماتریس مؤلفه 10 و صفر و در ماتریس چرخش یافته، پنج و پنج گویه داشتند.

هنچار کمی و کیفی Y-BOCS در جدول‌های 1 و 2 آمده است.

تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS-16<sup>1</sup> و به روش آمار توصیفی، ضریب همبستگی<sup>2</sup> و تحلیل عامل اکتشافی<sup>3</sup> انجام شد.

## یافته‌ها

به ترتیب 27 (و 73) و 24 (و 76) درصد گروه بیمار و سالم مورد (و زن) بودند. 9/52 (73/3)، 25 (10)، 9 (12/9) و 9/3 (6/7) درصد گروه بیمار (و سالم) به ترتیب در گروه‌های سنی 27-18، 37-28، 38-47 و 48-57 سال قرار داشتند. آلفای کرونباخ (و تعداد گویه‌های SC و SS به ترتیب 0/95 و 0/95) بود. بنابراین گویه‌ها از تجانس درونی برخوردار بودند.

ضریب همبستگی میان دونیمه آزمون (گویه‌های فرد و زوج) در مورد 140 آزمودنی، برای SC و SS به ترتیب 0/93 و 0/89 ( $p \leq 0/001$ ) بود.

پایایی بازآزمایی برای بررسی ثبات Y-BOCS به کار رفت؛ 30 آزمودنی با فاصله زمانی یک ماه، دو بار SC را اجرا کردند. میانگین (و انحراف معیار) عامل وسوس اعماق اجراء SC و SS به ترتیب در اجرای نخست 27/85 (12/02)، 21/65 (28/02) و در اجرای دوم 28/75 (12/18)، 22/50 (27/24) 28/55 (11/93) و 30/85 (12/05) به دست آمد. ضریب همبستگی میان دو اجراء در هر سه مورد 0/99 ( $p \leq 0/001$ ) بود.

در بررسی روایی هم‌گرایی، 31 آزمودنی افزون بر Y-BOCS، به نیز پاسخ دادند. ضریب هم‌سانی درونی کنдал<sup>4</sup> عامل اجراء SC، عامل وسوس اعماق اجراء SC و SS با نمره SCL-90-R-OCS به ترتیب 0/47 و 0/22 ( $p=0/006$ ) و 0/48 ( $p=0/008$ ) و 0/46 ( $p=0/008$ ) بود. در اجرای هم‌گرایی هم‌گرایی در مورد 2 هم‌گرایی داشتند.

در بررسی روایی هم‌گرایی Y-BOCS با تشخیص OCD

جدول 1- هنچار کمی مقیاس وسوسی - اجباری بیل - برآون

شاخص‌های توزیع			شاخص‌های پراکندگی			شاخص‌های گرایش مرکزی			خرده مقیاس‌ها
کشیدگی	کجی	واریانس	انحراف معیار	مد	میانه	میانگین	میانگین	SC*	
0/75	1/07	290/35	17/04	18	18	22/78	(1)	عامل	
0/34	0/91	242/66	15/58	30	17/50	21/06	(2)	عامل	
0/34	0/94	122/88	11/09	9	11	14/29	(3)	عامل	
0/23	1/13	1462/01	38/24	17	47/50	58/13	(1)	نمراه کل	
-0/44	0/037	16/12	4/01	13	12	11/77	(1)	عامل	
-0/47	-0/46	17/99	4/24	9	11	10/58	(2)	عامل	
-0/49	/425	46/17	6/79	18	22	22/35	کل	نمراه کل	

\*Symptom Checklist, \*\*Severity Scale

1- Statistical Package for the Social Science-version 16

2- correlation

3- exploratory factor analysis

4- Kendal internal consistency

5- missing

6- Kaiser-Meyer-Olkin

7- Bartlett's test of sphericity

8- screen plot

9- extraction

10- rotation

11- component matrix

12- pattern matrix

13- structure matrix

جدول 2- هنجار کیفی مقیاس وسواسی- اجباری بیل- براون

بسیار بالا	بالا	متوسط	پایین	بسیار پایین	خود مقیاس‌ها
15/99 تا 8/2	21/99 تا 16	34/99 تا 22	35 به بالا	زیر 8/2	عامل (1) SC*
14/39 تا 7	22/5 تا 14/40	31/99 تا 22/6	32 به بالا	زیر 7	عامل (2)
8/99 تا 5	13/99 تا 9	23/7 تا 14	23/8 به بالا	زیر 5	عامل (3)
41/3 تا 26/2	57/99 تا 41/4	83/99 تا 58	83 به بالا	زیر 26/2	نموده کل
16 به بالا	15/99 تا 13	12/99 تا 11	10/99 تا	زیر 8	عامل (1) SS**
14 به بالا	13/99 تا 12	11/99 تا 9	8/99 تا 7	زیر 7	عامل (2)
28 به بالا	27/99 تا 23	22/99 تا 20	19/99 تا 16	زیر 16	نموده کل

\*Symptom Checklist, \*\*Severity Scale

ضریب آلفای کرونباخ Y-BOCS در پژوهش حاضر بالا بود. این ضریب در دیگر پژوهش‌ها نیز بالا به دست آمده است؛ برای مثال: 0/89 (گودمن و همکاران، 1989؛ ناکاجیما، 1999)، 0/80 (جاکوبسن و همکاران، 2003)، 0/90 (روزان و همکاران، 2002) و 0/83 (موریتز و همکاران، 2002).

از محدودیت‌های پژوهش حاضر، روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب آزمودنی‌های سالم بر پایه نقطه برش نسخه اصلی، به دست نیاوردن روایی تفکیکی و تعیین نکردن نقطه برش به روش منحنی راک<sup>4</sup> بود، که امید است این نکات در پژوهش‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

برای تعیین نقطه برش ابتدا میانگین و انحراف معیار Y-BOCS و سپس فاصله اطمینان<sup>1</sup> (CI) دو انحراف معیار بالا و پایین میانگین، در دو گروه بیمار (مثبت<sup>2</sup>) و سالم (منفی<sup>3</sup>) تعیین شد. محدوده پایین تر از CI گروه بیمار و محدوده بالاتر از CI گروه سالم به عنوان نقطه برش در نظر گرفته شد. بنابراین نقطه برش یکبار با تأکید بر آزمودنی‌های سالم (8/7) و بار دیگر با تأکید بر آزمودنی‌های بیمار (8/8) محاسبه شد و در نهایت نقطه برش نه معرفی شد (نموده بیشتر از نه، معرف بیماری). گفتنی است میانگین (و انحراف معیار) آزمودنی‌های بیمار و سالم، به ترتیب عبارت بود از: 22/35 (6/2) و 2/6 (6/8).

## سپاسگزاری

بدین وسیله از مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی، که بودجه پژوهش حاضر را تأمین نمودند، قدردانی می‌شود.

[بنابراین اظهار نویسنده مسئول مقاله، تعارض منافع وجود نداشته است].

## منابع

- American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4<sup>th</sup>ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4<sup>th</sup>ed. Text Revision). Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Arrindell, W.A., Vlaming, I., Eisenhardt, B., & Berkum, D. (2002). Cross-cultural validity of the Yale-Brown obsessive

## بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی Y-BOCS بود. یافته‌ها نشان داد Y-BOCS در جامعه ایران نیز از پایایی و روایی بالایی برخوردار است. نقطه برش نسخه فارسی Y-BOCS، نه به دست آمد، که در مقایسه با نقطه برش 16 در نسخه اصلی (گودمن و همکاران، 1989)، می‌توان چنین گفت که شدت OCD در جامعه ایران نسبت به جامعه آمریکا بالاتر است. البته تعمیم یافته‌ها به سراسر ایران، باید با احتیاط صورت پذیرد و این امر نیازمند پژوهش بیشتر در این زمینه است.

از پژوهش‌هایی که یافته‌های مشابه با پژوهش حاضر داشتند، می‌توان به نسخه‌های ژاپنی (JY-BOCS) (ناکاجیما، 1999)، آلمانی (جاکوبسن و همکاران، 2003)، اسپانیایی (روزان و همکاران، 2002)، هلندی (IY-BOCS) (اریندل و همکاران، 2002) و فرانسوی (مورالد و همکاران، 1989) اشاره کرد.

1- confidence interval  
3- negative

2- positive  
4- Roc curve

- compulsive scale. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 33, 159-176.
- Bighm, A. (2000). *Epidemiology of obsessive-compulsive disorder in secondary-School students in Kashan 1999-2000 and its relationship with parenting style*. MA thesis, clinical psychology, Tehran psychiatric institute, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran. (Persian)
- Bobes, J., Gonzalez, M. P., Bascaran, M. T., Arango, C., Saiz, P. A., & Bousono, M. (2000). Quality of life and disability in patient's obsessive-compulsive disorder. *Journal of European Psychiatry*, 16(4), 239-245.
- Calamari, J. E., Wiegartz, P. S., & Janeck, A. S. (1999). Obsessive-compulsive disorder subgroups: A symptom-based clustering approach. *Journal of Behaviour Research and Therapy*, 37, 113-125.
- Cooper, J. (1970). The Leyton obsessional inventory. *Psychology Medicine*, 1(1), 48-64.
- Cullen, B., & Brown, C. H. (2007). Factor analysis of Yale-brown obsessive-compulsive scale in a family study of obsessive compulsive disorder. *Journal of Depression and Anxiety*, 24(2), 130-138.
- Deacon, B., & Abramowitz, J. (2005). The Yale-Brown obsessive-compulsive scale: Factor analysis, construct validity, and suggestions for refinement. *Journal of Anxiety Disorders*, 19, 573-585.
- Derogatis, L. R. (1994). Symptom checklist-90-revised: Administration, scoring and procedures manual (3<sup>rd</sup>ed.). Minneapolis: National Computer Systems, Inc.
- Feinstein, S., Fallon, B., Petkova, E., & Liebowitz, M. (2003). Item by item factor analysis of Yale-Brown obsessive-compulsive scale checklist. *Neuropsychiatry Clinical Neuroscience*, 15(2), 187-193.
- Goodman, W. K., & Rasmussen, S. A. (1989). The Yale-Brown obsessive-compulsive scale (Y-BOCS), Part II: Validity. *Journal of Archives of General Psychiatry*, 46, 1006-1016.
- Goodman, W. K., Price, L. H., & Rasmussen, S. A. (1989). The Yale-Brown obsessive-compulsive scale (Y-BOCS), Part I: Development, use, and reliability. *Journal of Archives of General Psychiatry*, 46, 1006-1011.
- Hodgson, R. J., & Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. *Behaviour Research and Therapy*, 15, 389-395.
- Insel, T., Murphy, D., Cohen, R., Alterman, I., Kilts, C., & Linnoila, M. (1983). Obsessive-compulsive disorder in five U.S. communities. *Archives of General Psychiatry*, 40, 605-612.
- Jacobsen, D., Kloss, M., Fricke, S., Hand, I., & Moritz, S. (2003). Reliability of the German version of the Yale-Brown obsessive-compulsive scale. *Verhaltenstherapie*, 13(2), 111-113.
- Koran, L. M. (2000). Quality of life in obsessive-compulsive disorder. *Psychiatric Clinics of North America*, 23(3), 509-517.
- Mohammad-Khani, P. (1991). Coping strategies for handling the stress and symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder. MA thesis, clinical psychology, Tehran psychiatric institute, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran. (Persian)
- Mollard, E., Cottraux, J., & Bouvard, M. (1989). French version of obsessive-compulsive scale. *American College Health*, 15(3), 335-341.
- Moritz, S., Meie, B., & Kloss, M. (2002). Dimensional structure of Yale-brown obsessive-compulsive scale. *Journal of Psychiatry Research*, 22, 118-124.
- Moulding, R., Doron, G., Kyrios, M., & Nedeljkovic, M. (2008). Desire for control, sense of control and obsessive-compulsive checking: An extension to clinical samples. *Journal of Anxiety Disorders*, 22, 1472-1479.
- Nakajima, T. (1999). Reliability and validity of the Japanese version of the Yale-Brown obsessive-compulsive scale. *Journal of Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 49, 121-126.
- Parkin, R. (1997). Obsessive-compulsive disorder in adults. *Journal of International Review of Psychiatry*, 9(1), 61-72.
- Philpott, R. (1975). Recent advances in the behavioral of obsessional illness; Difficulties common to these and other measures. *Scottish Medical Journal*, 20, 33-40.
- Pinto, A. (2008). Further development of YBOCS dimensions in the OCD collaborative genetics study: Symptoms vs. category. *Journal of Psychiatry Research*, 160, 83-93.

- Rosario-Campos, M. C., Miguel, E. C., Quatrano, S., Chacon, P., Ferrao, Y., Findley, D., Katsovich, L., Scahill, L., King, R. A., Woody, S. R., Tolin, D., Hollander, E., Kano, Y., & Leckman, J. F. (2006). The dimensional Yale-Brown obsessive-compulsive scale (DY-BOCS): An instrument for assessing obsessive-compulsive symptom dimensions. *Journal of Molecular Psychiatry*, 11(5), 495-504.
- Rosas. H.J., Vega-Dienstmaier, J. M., Suarez, G. M., Vidal, H., Guimas, B., Adrianzen, C., & Vivar, R. (2002). Validation of a version in Spanish of the Yale-Brown obsessive-compulsive scale. *Journal of Actas Espanolas De Psiquiatria*, 30(1), 30-35.
- Sajatovic, M., & Ramirez, L. F. (2001). Rating scales in mental health. Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc.
- Sanavio, E. (1988). Obsessions and compulsions: The Padua inventory. *Behavior Research Therapy*, 26, 169-177.
- Sharifi, V., Asaadi, M., Mohammadi., M. R., Amini, H., Kaviani, H., Semnani, Y., Shabani, A., Shahrivar, Z., Davari-Ashtiani, R., Hakim Shushtari, M., Sadiq, A., & Jalali Roodsari, M. (2009). Reliability and functionality of the Persian version of the structured diagnostic interview for DSM-IV. *New Journal of Cognitive Science*, 4, 1-2. (Persian)
- Stein, D., Andersen, E., & Overo, K. (2007). Response of symptom dimensions in obsessive-compulsive disorder to treatment with Citalopram or placebo. *Journal of Revista Brasileira de Psiquiatria*, 29 (4), 303-307.
- Steketee, G., & Frost, R. (1994). Measurement of risk-taking obsessive-compulsive disorder. *Journal of Behavioral and Cognitive Psychotherapy*, 28, 793-802.
- Storch, E. A., Bagner, D., Merlo, L. J., Shapira, N. A., Geffken, G. R., Murphy, T. K., & Goodman, W. K. (2007). Florida obsessive-compulsive inventory: Development, reliability, and validity. *Journal of Clinical Psychology*, 63(9), 851-859.
- Storch, E. A., Shapira, N. A., Dimoulas, E., Geffken, G. R., Murphy, T. K. & Goodman, W. K. (2005). Yale-Brown obsessive-compulsive scale: The dimensional structure. *Journal of Depression and Anxiety*, 22(1), 28-35.
- Taylor, J. A. (1953). A personality scale of manifest anxiety. *Journal of Abnormal Social Psychology*, 48, 285-290.
- Tek, C., Ulu, B., & Gürsoy Rezaki, N. (1995). Yale-Brown obsessive-compulsive scale and US national institute of mental health global obsessive-compulsive scale in Turkish: Reliability and validity. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 91(6), 410-413.
- Woody, S. R., Steketee, G., & Chambless, D. L. (1994). Reliability and validity of the Yale-Brown obsessive-compulsive scale. *Journal of Behavior Research Therapy*, 33, 597-605.
- Yosefi, F., & Hosseincbari, M. (2002). SCL-90-R symptom patterns for the first year medical students in Shiraz. *Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University*, 36, 100-110. (Persian)
- Zanarini, M. C., & Frankenburg, F. R. (2001). Attention and maintenance of reliability of axis I and II disorder; A longitudinal study. *Journal of Comprehensive Psychiatry*, 42, 416-425.
- Zanarini, M. C., Skodol, A. E., Bender, D., & Dolan, R. (2000). The collaborative longitudinal personality disorder study: Reliability of axis I and II diagnoses. *Journal of Personality Disorder*, 14, 291-299.