

بررسی اثر تحریک دلستگی ایمن در سطح زیر هشیاری در کاهش خاطرات مزاحم در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نسرین حسین‌پور^۱، حسن میرزا‌حسینی^۲، مجید ضرغام حاجبی^۳، نادر منیرپور^۴

Investigating the effect of safe attachment stimulation in the level of subconscious in reducing the disturbing memories in students with generalized anxiety disorder

Nasrin Hosseinpour¹, Hasan Mizahossein², Majid Zarghami Hajebi³, Nader Monirpour⁴

چکیده

زمینه: اختلال اضطراب فراگیر یکی از اختلالات شایع روان‌پژوهشی می‌باشد که باعث ناراحتی فرد و نقص در عملکرد رفتاری و شناختی او می‌گردد. خاطرات مزاحم مجموعه‌ای از خاطراتی هستند که بی‌اختیار بوده و با اختلال اضطراب فراگیر در ارتباط است. **هدف:** هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریک دلستگی ایمن در سطح زیر هشیاری در کاهش خاطرات مزاحم در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. **روش:** پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی مبتلا به GAD شهر قم در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ بودند. ۴۰ دانشجو با اختلال اضطراب فراگیر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوش ای چند مرحله‌ای، انتخاب و با روش تصادفی در گروه‌های ۱۰ نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه سبک دلستگی کولینزورید (۱۹۹۰)، مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد واپس و مارمر (۱۹۹۷)، پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر تاچینگ و فیدل (۱۹۹۶) بود. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس دوراهه، تحلیل کواریانس و تی مستقل در سطح ۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. **یافته‌ها:** یافته‌ها نشان دادند که تحریک دلستگی ایمن در سطح زیر هشیاری، خاطرات مزاحم دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر را کاهش داد ($F=32/283$, $p=\leq 0.001$). **نتیجه‌گیری:** بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که تحریک دلستگی ایمن در سطح زیر هشیاری، بر کاهش خاطرات مزاحم دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مؤثر بود.

واژه کلیدی‌ها: دلستگی ایمن، خاطرات مزاحم، اختلال اضطراب فراگیر

Background: General anxiety disorder is one of the common psychiatric disorders that causes an individual's discomfort and abnormality in his behavioral and cognitive behavior. Predatory memories are a collection of memories that are inaccurate and associated with anxiety disorders. **Aims:** The present study was aimed at exploring the impact of stimulating secure attachment in the subconscious level in reducing intrusive memories in students with generalized anxiety disorder (GAD). **Method:** A pretest-posttest design with control group was used. The statistical population included undergraduate students with GAD in the school year 2017-2018 in Qom, Iran. A total of 40 students were selected using a random cluster sampling method, and randomly divided into experimental and control groups (each group comprised of 10 participants). The Revised Adult Attachment Scale (1990), the Impact of Event Scale - Revised (1997), and the Generalized Anxiety Disorder Scale (1996) were used to collect data. The data were analyzed using two-way analysis of variance (ANOVA), analysis of covariance (ANCOVA), and independent-samples t-test at 5% level. **Results:** According to the study results, stimulation of secure attachment in the subconscious level significantly reduced intrusive memories in the students with GAD ($F=32/283$, $p=\leq 0.001$). **Conclusions:** Based on this, it can be concluded that stimulation of safe attachment was effective on the reducing disturbing memories of students with general anxiety disorder. **Key words:** Secure attachment, Intrusive memories, General anxiety disorder

Corresponding Author: mirzahoseini.hasan@yahoo.com

۱. دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

۲. Ph.D. Student Department of General Psychology, the unitQom, Islamic Azad university, Qom, Iran

۳. استادیار، گروه روان‌شناسی بالینی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسئول)

۴. Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, the unitQom, Islamic Azad university, Qom, Iran (Corresponding Author)

۵. استادیار، گروه روان‌شناسی عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

۶. Assistant Professor, Department of General Psychology, the unitQom, Islamic Azad university, Qom, Iran

۷. استادیار، گروه روان‌شناسی سلامت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

۸. Assistant Professor, Department of health Psychology, the unitQom, Islamic Azad university, Qom, Iran

میزانی که دلستگی می‌تواند برای افراد مفید باشد به نظر می‌رسد که به تفاوت‌های فردی در امنیت دلستگی وابسته باشد. نظریه‌های دلستگی بر این اعتقاد هستند که تجربه روابط غیر قابل اعتماد قبلی می‌تواند منجر به نقصان در ظرفیت فرد برای سود جستن از فعال‌سازی روابط دلستگی شود زیرا این کار موجب ارتقای حس امنیت نمی‌شود (میکولینسر، شاور، پراگک^۵، ۲۰۰۵). دلستگی‌های نامن می‌تواند موجب شود که فرد گرایشات دلستگی اجتنابی یا اضطرابی را تجربه کند. افراد دارای دلستگی‌های اضطرابی تمایل دارند به طور افراطی سیستم دلستگی خود را در طی استرس فعال سازند زیرا نیاز بسیار حیاتی به آرامش پیدا کردن از طریق دیگران دارند (خالقی و همکاران، ۱۳۹۵).

بر عکس، افراد دارای دلستگی اجتنابی سیستم دلستگی خود را کمتر فعال می‌سازند و خود را از دیگران با استفاده از راهبرد مقابله‌ای اجتناب کنار می‌کشند. حمایت از این پیش‌فرض زمانی بیشتر مشهود است که در طی تهدید، افراد دارای سبک دلستگی اجتنابی از رفتارهای مجاورت و نزدیکی جویی پرهیز می‌کنند (میکولینسر، گیلاس، و شاور^۶، ۲۰۰۲) و با احتمال کمتری بازنمایی‌های دلستگی خود را فعال می‌سازند (میکولینسر و همکاران، ۲۰۰۰).

از طرف دیگر تحقیقات نشان می‌دهند که یکی از دلایل تجربه منفی هیجانات با راهبردهای ناسازگار مقابله با استرس است، و بر عکس مشخص شده است که استفاده از راهبردهای سازگارانه در برابر استرس مقابله می‌کند و به طور مثبت موجب سلامت روان فرد می‌شود. اندیشه مربوط به بکارگیری راهبردهای هوشیارانه و ناهمشیار برای محافظت فرد از خود در برابر اضطراب به فروید بر می‌گردد (۱۹۶۲) و همان‌طور که کرامر (۲۰۰۰) تأکید دارد هنوز در تحقیقات مدرن با عنوان توجه انتخابی، کاهش ناهمانگی، سبک دلستگی اجتنابی، و خطاهای شناختی مثبت شناخته می‌شود.

نظر به اینکه تاکنون تحقیقات ویژه‌ای در زمینه نقش سبک‌های دلستگی بر خاطرات استرس‌زا با در نظر گرفتن نقش تعديل کننده سبک‌های مقابله با استرس صورت نگرفته است، این تحقیق گامی جدید برای روشن شدن این ارتباطات خواهد بود. بنابراین، مسئله

مقدمه

مطابق با نشر سازمان بهداشت جهانی، اختلال‌های روان‌پزشکی، مخصوصاً اختلال‌های هیجانی مانند اضطراب، در اکثر بیماری‌ها و ناتوانی‌های حاصل از آنها نقش دارند. این سازمان شیوع طول عمر اختلال‌های اضطرابی را ۲۸ درصد عنوان کرده است (بشارت، حافظی، رنج‌شیرازی و رنج‌بری، ۱۳۹۷). اضطراب یک احساس ناخوشایند و نافذ از تنش و ترس است که موجب آشفتگی فرد می‌شود (یعقوبی راد، پورحسین و غلامعلی لوسانی، ۱۳۹۵). مطابق با مطالعات انجام شده، اختلال اضطراب فراگیر می‌تواند با خاطرات مزاحم ارتباط داشته باشد (بروین و ساندرز^۷، ۲۰۰۱).

خاطرات مزاحم مجموعه‌ای از خاطراتی هستند که بی اختیار بوده و با رخدادهایی ارتباط دارند که به طور خودکار در خود آگاه فرد ظاهر می‌شوند (برای مثال داویس و کلارک^۸، ۱۹۹۸؛ اسلام‌مکان، واویلاشویلی، و شولتز^۹، ۲۰۰۷). خاطرات مزاحم و استرس‌زا می‌توانند با بازآرایی رخدادها یا نشخوار کلامی مکرر مشخص شوند. در حالی که خاطرات مزاحم می‌توانند هم به شکل تصاویر ذهنی حسی یا افکار کلامی ظاهر شوند. خاطرات آزار دهنده اغلب در زندگی روزمره نیز موجب آزار و اذیت فرد حتی در موقعیت‌های غیر بالینی می‌شوند (برنستین^{۱۰}، ۱۹۹۶).

تجربه مجدد افکار مزاحم به صورت ذهنی از یک رخداد آسیب‌زا می‌تواند به طور افراطی موجب آشفتگی شود و یکی از سه نشانگان اصلی برای تشخیص اختلال استرس پس از سانحه را تشکیل می‌دهد. نتایج تحقیقات مشخص می‌سازند که مجاورت با اشکال دلستگی موجب کاهش پاسخ‌های استرس‌زا می‌شود (کوهن و همکاران، ۲۰۰۶؛ دیتن و همکاران^{۱۱}، ۲۰۰۸) این شواهد منعکس کننده غایت اساسی نظریه دلستگی است که در طی استرس ما به دنبال حمایت اجتماعی هستیم. این نظریه بر این اعتقاد است که به هنگام رشد فردی، او همزمان بازنمایی ذهنی از اشکال دلستگی را درونی می‌سازد، و این مشابهت می‌تواند احساس امنیت را در طی استرس به فرد بدهد (برجلی و همکاران، ۱۳۹۵).

^۵. Ditzen, Schmidt, Strauss, Nater, Ehlert ,Heinrichs

^۶. Mikulincer, Shaver, Pereg

^۷. Mikulincer, Gillath, Shaver

^۱. Brewin & Saunders

^۲. Davies & Clark

^۳. Schlagman, Kvavilashvili, Schulz

^۴. Berntsen, D

دارد.

سبک وابستگی: (D) که تقریباً عکس دلستگی اجتنابی است. ضرایب پایایی هر سه مقیاس پرسشنامه توسط طراحان این مقیاس بالای ۸۰٪ گزارش شده است.

مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رخدادها: این پرسشنامه از ۱۵ سؤال خودسنجی تشکیل می شود که پاسخ های مزاحم، اجتنابی و تحریکی به رخدادهای آسیب زا را نشان می دهد. سؤالات این پرسشنامه بر اساس یک مقیاس ۰ تا ۴ نمره ای نمره گذاری می شوند. به منظور شاخص بندی خاطرات مزاحم از تحریکی که در آزمایش ارائه می شود، خرده مقیاس مزاحمت که بطور مستقیم به رخداد خاطرات ناخواسته از هدف مدنظر ارتباط دارد استفاده شد (برای مثال تصاویر ارائه شده ذهن را مخدوش کرد).

پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر: این پرسشنامه خود گزارشی نه گویی ای، ملاک های GAD را ارزیابی می کند. دامنه نمرات بین صفر تا ۳۳ می باشد افرادی که نمره بالای ۵/۷ کسب می کنند، به عنوان افرادی که از لحاظ بالینی دارای نشانه های معنadar GAD هستند در نظر گرفته می شوند. پرسشنامه GADQ-IV همسانی درونی خوب ($\alpha=0.84$) و پایایی آزمون - باز آزمون دو هفتاهی بالای ($r=0.84$) را در نمونه دانشگاهی نشان داده است (نیومن و همکاران، ۲۰۰۲).

داده ها و یافته ها

در این پژوهش ۴۰ دانشجوی دختر در ۴ گروه شرکت کرده بودند که میانگین سنی آنها ۲۱/۱۶ با انحراف معیار ۲/۱۲ بود. در این قسمت به تحلیل یافته های پژوهش پرداخته می شود. کمپل و استانلی (۱۹۶۳) خاطر نشان می سازند که نخستین مرحله تحلیل طرح چهار گروهی سالمون، بررسی این مطلب است که آیا پیش آزمون باعث حساسیت آزمودنی ها به مداخله ای آزمایشی شده است یا خیر؟ برای این منظور، باید در یک طرح تحلیل واریانس دو راهه، به منظور تکمیل تحلیل قرار گیرند. بعد از تحلیل واریانس دو راهه، به منظور تکمیل تحلیل پژوهش از آزمون آماری تحلیل کوواریانس و تی مستقل استفاده کردید. قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و تی مستقل باید برخی از پیشفرض های مهم این آزمون آماری مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که عدم رعایت این مفروضه ها ممکن است نتایج تحقیق را با سوگیری همراه سازد. پیشفرض های استفاده از تحلیل کوواریانس و تی مستقل عبارتند از: نرمال بودن توزیع پراکنده

اصلی این پژوهش این است که: آیا اثر فعال سازی دلستگی ایمن در کاهش خاطرات استرس آور تأثیر دارد؟ آیا سبک های مقابله با استرس نقشی تعديل کننده در ارتباط بین اثر فعال سازی دلستگی ایمن در کاهش خاطرات استرس آور دارد؟

روش

روش پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه گیری: روش این پژوهش از نوع آزمایشی است که با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه های شهر قم تشکیل داده بودند؛ بدین صورت که از دانشگاه های شهر قم به تصادف یک دانشگاه انتخاب و سپس از دانشگاه انتخاب شده یک دانشکده انتخاب شد از این دانشکده ۸ کلاس انتخاب گردید و سپس از هر یک از کلاس های انتخاب شده تعداد ۱۰ نفر دانشجو (در مجموع ۴۰ دانشجو) انتخاب شد. شیوه اجرا: روش اجرا بدین ترتیب بود که بعد از اجرای پیش آزمون برای هر دو گروه (آزمایش و کنترل)، مداخله تحریک دلستگی ایمن در سطح زیر هشیاری برای دانشجویان گروه آزمایش اجرا شد اما برای گروه کنترل هیچ مداخله ای اجرا نشد، سپس پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد؛ بدین ترتیب داده های لازم برای تحلیل و نتیجه گیری مورد جمع آوری قرار گرفت.

ابزار

پرسشنامه سبک دلستگی کولینزو و رید: نظریه سبک دلستگی توسط جان بالبی مطرح شد. این نظریه بیان می دارد که روابط اولیه مادر با کودک سبک دلستگی را شکل می دهد و این سبک دلستگی در تمام طول زندگی اثرات خود را نشان می دهد. چهار نوع سبک دلستگی وجود دارد که عبارتند از: سبک دلستگی ایمن، سبک دلستگی آشفته، سبک دلستگی اجتنابی و سبک دلستگی دوسوگرا. کولینزو و رید (۱۹۹۰) بر اساس نظریه هازان و شاور پرسشنامه سبک دلستگی کولینزو و رید (RAAS) را تهیه کردند. این پرسشنامه در ابتدا دارای ۲۱ ماده بود که بعدها به ۱۸ آیتم کاهش یافت. این پرسشنامه سه زیر مقیاس دارد که عبارتند از: سبک اضطرابی: (A) که با سبک دلستگی دوسوگرا مطابقت دارد. سبک نزدیک بودن: (C) که با سبک دلستگی ایمن مطابقت

آزمون هیچ اثر کاهشی یا افزایشی بر مداخله‌ی آزمایشی برجا نگذاشته است.

در جدول ۲ نتیجه آزمون تحلیل کواریانس به وضوح نشان داده شده است. همان‌طور که در این جدول مبهم است مجموع مجدورات متغیر مستقل برابر $254/65$ می‌باشد که منجر به اندازه آزمون $F^{33}/283$ می‌شود که اندازه این آزمون F در سطح یک درصد معنی دار است. به عبارتی دیگر، بین دو گروه کنترل و آزمایش در میزان خاطرات مزاحم، بعد از تعديل اثر پیش‌آزمون تفاوت معنی دار می‌باشد؛ بنابراین به این نتیجه می‌توان رسید که تحریک دلبستگی ایمن در کاهش خاطرات مزاحم دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

داده‌ها - برابری واریانس‌های خطای همگن بودن خطوط رگرسیون، این سه مفروضه قبل از تحلیل کوواریانس برای این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. هر سه مفروضه آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برقرار بود. یعنی استفاده از تحلیل کوواریانس برای تحلیل داده‌های این پژوهش مناسب بود.

همان‌گونه که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود، F مربوط به عامل گروه برابر با $50/12$ و در سطح ۱ درصد از لحظه آماری معنی دار است. بنابراین، فرضیه‌ی کلی مؤثر بودن مداخله‌ی آزمایش تأیید می‌شود. معنی دار نبودن F های تعامل میان (گروه و وضعیت) و اثر اصلی وضعیت، نشان دهنده‌ی آن است که حساس‌سازی پیش

جدول ۱. نتایج تحلیل واریانس دوراهه در طرح چهار گروهی سالومون

منع تغییرات	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	F	سطح معناداری
مدل تصحیح شده	505/90	۳	168/63	2/34	2/34
عرض از مبدا	76562/50	۱	76562/50	1063/53	...
گروه	505/00	۱	505/00	۱۲/۵۰	.۰۰۱
وضعیت	۱۱۲/۴۲	۱	۱۱۲/۴۲	۲/۴۱	.۰۲۱
گروه*وضعیت	۱۱۲/۴۲	۱	۱۱۲/۴۲	۲/۴۱	.۰۲۱
خطا	152/83	۳۰	152/83	152/83	-
کل	623/00	۴۰	-	-	-
کل تصحیح شده	385/36	۳۹	-	-	-

جدول ۲. نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات خاطرات مزاحم پس از تعديل پیش‌آزمون

منع تغییرات	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	F	سطح معناداری
مدل تصحیح شده	۱۵۲۷/۷۳۰	۲	۷۶۳/۸۶۵	99/836	0/000
عرض از مبدا	3/402	۱	3/402	.۰/۴۴۵	.۰/۵۱۴
گروه	1253/930	۱	1253/930	163/887	0/000
وضعیت	254/651	۱	254/651	33/283	0/000
گروه*وضعیت	130/070	۱۷	7/651	-	-
خطا	40202/000	۲۰	-	-	-
کل	1657/800	۱۹	-	-	-
کل تصحیح شده	۱۵۲۷/۷۳۰	۲	۷۶۳/۸۶۵	99/836	0/000

جدول ۳. نتایج T مستقل بررسی پس آزمون خاطرات مزاحم در گروه‌های بدون پیش‌آزمون

t	درجه آزادی	سطح معنی داری	اختلاف میانگین	۹۵٪ فاصله اطمینان اختلاف	بایین ترین بالاترین
۴/۳۲۲	۱۸	۰/۰۰۱	۱۲/۵۰	۱۸/۵۷	۶/۴۱

بشارت، محمدعلی؛ حافظی، الهه، رنجبرشیرازی، فرزانه؛ رنجبری، توحید (۱۳۹۷). مقایسه ناگویی هیجانی و مکانیسم‌های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر، و سوساس فکری-عملی و جمعیت عمومی. *مجله علوم روانشناسی*, ۱۷(۶۶)، ۱۷۶-۱۹۹.

خالقی، محمد؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر (۱۳۹۵). اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی در کاهش نگرانی و علائم و نشانه‌های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. *مطالعه تک‌آموزدنی روان‌شناسی بالینی*, ۸(۲)، ۴۳-۵۵.

یعقوبی راد، مهسا؛ پورحسین، رضا؛ غلامعلی لوسانی، مسعود (۱۳۹۵). بررسی اثربخشی فن مرور خویشتن در کاهش افسردگی، اضطراب و تندیگی در بیماران مبتلا به ام اس. *مجله علوم روانشناسی*, ۱۵(۶۰)، ۴۳۳-۴۴۴.

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®)*. American Psychiatric Pub.

Borkovec, T. D., Alcaine, O. M., & Behar, E. (2004). Avoidance Theory of Worry and Generalized Anxiety Disorder. In R. G. Heimberg, C. L. Turk, & D. S. Mennin (Eds.), *Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice* (pp. 77-108). New York, NY, US: Guilford Press.

Brewin, C. R., Andrews B, Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68(5), 748-66.

Brewin, C. R., Gregory, J. D., Lipton, M., & Burgess, N. (2010). Intrusive images in psychological disorders: characteristics, neural mechanisms, and treatment implications. *Psychological review*, 117(1), 210-232.

Bryant, R. A., McGrath, C., & Felmingham, K. L. (2013). The roles of noradrenergic and glucocorticoid activation in the development of intrusive memories. *PloS one*, 8(4), e62675.

Bryant, R. A., O'Donnell, M. L., Creamer, M., McFarlane, A. C., & Silove, D. (2011). Posttraumatic intrusive symptoms across psychiatric disorders. *Journal of Psychiatric Research*, 45(6), 842-847.

Coan, J. A., Schaefer, H. S., & Davidson, R. J. (2006). Lending a hand: Social regulation of the neural response to threat. *Psychological science*, 17(12), 1032-1039.

Ditzen, B., Schmidt, S., Strauss, B., Nater, U. M., Ehlert, U., & Heinrichs, M. (2008). Adult attachment and social support interact to reduce psychological but not cortisol responses to stress. *Journal of psychosomatic research*, 64(5), 479-486.

Dugas, M. J. (2000). Generalized anxiety disorder publications: so where do we stand?. *Journal of anxiety disorders*, 14(1), 31-40.

نتایج جدول T مستقل به منظور مقایسه میزان افکار مزاحم در دو گروه از دانشجویانی که مورد پیش‌آزمون قرار نگرفته بودند، نشان داد که مقدار T اختلاف بین دو گروه ۴/۳۲ بدست آمده است. این مقدار T در درجه آزادی ۱۸ منجر به سطح معنی داری ۰/۰۰۱ شده است. می‌توان گفت که با توجه به جدول بالا میزان خاطرات مزاحم دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تفاوت وجود دارد، این تفاوت به نفع دانشجویانی است که مورد درمان تحریک دلبستگی اینم قرار گرفته بودند. به عبارتی میزان خاطرات مزاحم دانشجویانی که مورد درمان قرار گرفته بودند، کمتر از دانشجویان گروه کنترل است.

بحث و نتیجه‌گیری

چنانچه که ملاحظه شد اثر تحریک دلبستگی اینم در سطح زیر هشیاری در کاهش خاطرات مزاحم در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تأیید شد. تصاویر مرتبط با تحریک دلبستگی منجر به یادآوری خاطرات کمتر شده و همچنین شرکت کنندگان اگر سطوح پایینی از گرایش دلبستگی نایمین را نشان دهند، خاطرات مزاحم کمتری را گزارش می‌دهند. همچنین ما اثرات متفاوتی از تحریک دلبستگی را توسط تصاویر منفی و خنثی نیافریم چرا که این احتمال وجود دارد که اثر تحریک از یک تصویر به تصویر بعدی تعیین یافته و این تأثیر برای هر دو تصاویر منفی و خنثی یافت شد.

تئوری دلبستگی پیشنهاد می‌کند که سبک دلبستگی اینم به واسطه‌ی راهاندازی احساس امنیت در شخص توسط دیگران می‌تواند مفید باشد و شخص به واسطه‌ی محافظت دیگران در زمان‌های نیاز احساس امنیت می‌کند. در این تحقیق ما فرض کردیم که اثر حمایتی دلبستگی باید بر پاسخ‌های استرس اثر گذاشته و باعث کاهش آنها گردد و به این نتیجه رسیدیم که فعالیت‌های دلبستگی می‌توانند به عنوان یک نقش کاهنده‌ی احتمالی استحکام خاطرات مزاحم عمل کنند. یکی از یافته‌های اصلی این بود که شرکت کنندگان با دلبستگی نایمین بالا خاطرات مزاحم کمتری را گزارش دادند.

منابع

بر جعلی، محمود؛ مدیگی، زهرا؛ گلشنی، فاطمه (۱۳۹۵). رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی مادران با اختلالات اضطرابی دانش آموزان پسر شهر تهران . خانواده و پژوهش، ۳۵، ۴۷-۳۱

- generalized anxiety disorder: preliminary evidence for independent and overlapping contributions. *Behavior therapy*, 40(2), 142-154.
- Roozendaal, B., Hahn, E. L., Nathan, S. V., Dominique, J. F., & McGaugh, J. L. (2004). Glucocorticoid effects on memory retrieval require concurrent noradrenergic activity in the hippocampus and basolateral amygdala. *Journal of neuroscience*, 24(37), 8161-8169.
- Roozendaal, B., Quirarte, G. L., & McGaugh, J. L. (2002). Glucocorticoids interact with the basolateral amygdala β -adrenoceptor-cAMP/cAMP/PKA system in influencing memory consolidation. *European Journal of Neuroscience*, 15(3), 553-560.
- West, G. C. (2001). The Adult Attachment Projective. *Attachment & Human Development*; 3(30-61).
- Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. *Behaviour research and therapy*, 38(4), 319-345.
- George C, Kaplan N, Main M. (1985). *Adult Attachment Interview*. Unpublished manuscript, University of California, Berkeley.
- Gillath, O., Mikulincer, M., Birnbaum, G. E., & Shaver, P. R. (2008). When sex primes love: Subliminal sexual priming motivates relationship goal pursuit. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 34(8), 1057-1069.
- Holmes, E. A., & Bourne, C. (2008). Inducing and modulating intrusive emotional memories: A review of the trauma film paradigm. *Acta Psychologica*, 127(3), 553-566.
- Leahy RL. (2002). A model of emotional schemas. *Cognitive and Behavioral Practice*, 9(3), 177-90.
- Liu, B., Tarigan, L. H., Bromet, E. J., & Kim, H. (2014). World Trade Center disaster exposure-related probable posttraumatic stress disorder among responders and civilians: a meta-analysis. *PLoS One*, 9(7), e101491.
- McGaugh, J. L. (2000). Memory--a century of consolidation. *Science*, 287(5451), 248-251.
- McGaugh, J. L., & Roozendaal, B. (2002). Role of adrenal stress hormones in forming lasting memories in the brain. *Current opinion in neurobiology*, 12(2), 205-210.
- Mennin, D. S., Heimberg, R. G., Turk, C. L., & Fresco, D. M. (2005). Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. *Behaviour research and therapy*, 43(10), 1281-1310.
- Mennin, D. S., McLaughlin, K. A., & Flanagan, T. J. (2009). Emotion regulation deficits in generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, and their co-occurrence. *Journal of anxiety disorders*, 23(7), 866-871.
- Mikulincer, Mario, Omri Gillath, and Phillip R. Shaver. "Activation of the attachment system in adulthood: threat-related primes increase the accessibility of mental representations of attachment figures." *Journal of personality and social psychology*, 83(4), 881-895
- Pierce, T., & Lydon, J. (1998). Priming relational schemas: Effects of contextually activated and chronically accessible interpersonal expectations on responses to a stressful event. *Journal of personality and social psychology*, 75(6), 1441.
- Robichaud, M. (2013). Cognitive behavior therapy targeting intolerance of uncertainty: Application to a clinical case of generalized anxiety disorder. *Cognitive and Behavioral Practice*, 20(3), 251-263.
- Roemer, L., & Orsillo, S. M. (2005). An acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder. In Acceptance and mindfulness-based approaches to anxiety (pp. 213-240). Springer, Boston, MA.
- Roemer, L., Lee, J. K., Salters-Pedneault, K., Erisman, S. M., Orsillo, S. M., & Mennin, D. S. (2009). Mindfulness and emotion regulation difficulties in