

ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان آذربایجان شرقی به روش پرالونگ

ابوالفضل قنبری^۱

استادیار گروه پژوهش های جغرافیای دانشگاه تبریز.

شهرام روستایی

دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز.

محمد قنبری

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۰۸/۰۲

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۰۸/۱۰

چکیده

صنعت سفید (گردشگری) درصد از کشورها جزو ۵ منبع اول درآمدزایی می باشد. ولی با این وجود سهم گردشگری کشور ایران از تولید ناخالص ملی فقط ۰/۱ درصد است. با این که به لحاظ پتانسیل گردشگری در میان ۱۰ کشور جهان قرار دارد. لذا ضرورت پرداختن به این مسئله امری بدیهی و با توجه به این مهم، شناسایی، معرفی نواحی و پژوهش در این راستا می تواند به عنوان مهم ترین هدف از این پژوهش مطرح باشد. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان آذربایجان شرقی به تفکیک هر پدیده پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است. داده های مورد بررسی از مطالعات میدانی و اسنادی جمع آوری شده است و با بهره گیری از روش پرالونگ (Pralong) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش پرالونگ بر اساس چهار معیار (اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی-تاریخی، علمی و زیبایی ظاهری) تحت معادله ذیل محاسبه می شود: معیار گردشگری=(معیار اجتماعی-اقتصادی+معیار فرهنگی-تاریخی+معیار علمی+معیار زیبایی ظاهری)/۴؛ در این فرمول وزن هیچ کدام از جنبه های عیار گردشگری نسبت به دیگری کم یا زیاد نیست. در مقاله حاضر جهت برآورد ارزش ژئوتوریستی پدیده های موجود در محدوده مورد مطالعه، پارامتر های زیبا شناختی، علمی، فرهنگی-تاریخی و اجتماعی-اقتصادی به تفکیک هر پدیده در ارتباط با ژئومورفولوژی و جنبه های کاربردی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی حاضر، نشان دهنده قابلیت های ژئوتوریستی محدوده مورد مطالعه، علی الرغم وجود موانع (فقدان شبکه ای ارتباطی مناسب، کمبود نیروهای انسانی متخصص در راهنمایی توریست، نامناسب بودن تجهیزات اقامتی و رفاهی، نارسانی امکانات و تجهیزات بهداشتی) می باشد. مهم ترین دستاوردهای این پژوهش ایجاد نگرشی مردمی در راستای گردشگری علمی در موزه های زمین شناسی به صورت علمی است. تا به موازات ایجاد علاقه در بین مردم و جذب گردشگر به نواحی ژئوتوریستی، گامی در راستای توسعه پایدار ناحیه ای باشد.

واژگان کلیدی: توانمندی، ژئوتوریستی، پرالونگ، آذربایجان شرقی.

مقدمه

مطالعات در زمینه‌ی گردشگری برای چندین دهه در علوم محیطی، کشاورزی، انسانی، اقتصاد و سایر رشته‌ها با اهداف و روش‌های متفاوتی مورد مطالعه قرار گرفته است. مهم‌ترین موضوعاتی که در زمینه‌ی مطالعاتی گردشگری مطرح می‌باشد. و بر اساس ملاک‌های اندازه، مقیاس، ظرفیت پذیرش و ماهیت جذبیت‌های گردشگری طبقه‌بندی می‌شوند (حیدری، ۱۳۸۷، صص ۳۸-۴۳) عبارتند از: گردشگری تفریحی، شهری، ماجراجویانه، گردشگری بر مبنای منابع طبیعی و دیگر اقسام گردشگری می‌باشند.

ولی آنچه در دهه‌ی اخیر مطرح شده و به سرعت نیز درحال توسعه است مبحث ژئوتوریسم می‌باشد. ژئوتوریسم در قالب تعاریفی همچون: ارایه‌ی امکانات تفسیری و خدمت به گردشگران، همچنین درک زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی از سایت مورد نظر، فراتر از یک درک زیباشتختی آن (Hose, 1995)، ژئوتوریسم متراffد با گردشگری جغرافیایی با هدف کشف یک منطقه، با تمام عناصر طبیعی و انسانی مرتبط با آن (Reynard, 2008)، حفاظت از منابع طبیعی سایت‌های زمین‌شناستختی (Wimbledon, 1988)، فری و همکارانش، انتقال دانش و نظریات علوم زمین به عموم مردم (Frey & et al, 2002)، و در نهایت انجمن زمین‌شناسی لندن نیز گردشگری در چشم اندازهای زمین‌شناستختی را به عنوان ژئوتوریسم تعریف می‌نمایند (داولینگ و نیوسام، ۱۳۸۸، ص ۴۸۱). در واقع ژئوتوریسم به معنای گردشگری جغرافیایی است که به طور ضمنی بر ویژگی‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژیکی به عنوان بستر کلیه‌ی فعالیت‌های انسانی و خصیصه‌های جغرافیایی تأکید دارد. ژئوتوریسم فرصتی را برای مطالعه‌ی اشکال زمین‌شناستختی فراهم ساخته، مکان‌هایی را برای درک موضوعات علمی زمین‌شناستختی و همگانی سازی آنها فراهم می‌آورد. اقتصاد محلی را از طریق گردش علمی، پژوهشی و گردشگری، محافظت زیست محیطی توسعه می‌دهد. با توجه به آنچه گذشت تضاد واقعی و قابل بحث زیادی بین حفاظت از طبیعت بی‌جان و تبلیغ گردشگری وجود ندارد و در نتیجه می‌توان ژئوتوریسم را جزیی از طرح‌های پایدار گردشگری به حساب آورد. و این راه است که بسیاری از مناسبات کشف شده، می‌توان به درک بهتری از کره‌ی خاکی فایق آمد (همان منبع، ۱۳۸۸).

در زمینه‌ی ژئوتوریسم کارهایی هرچند کم ولی بسیار با ارزش به صورت کیفی (Coratza & et al, 2008; Rybar, 2010; Pralong, 2005; Comanescu & et al, 2010; Illies & Josan, 2009) و کمی (Ghasemi & et al, 2009; Ghiraldi & et al, 2010; Boley, 2009) صورت گرفته است. ولی در محدوده‌ی مورد مطالعه کاری که ارزش ژئوتوریستی منطقه را برجسته نماید به صورت علمی انجام نشده است. لذا در مطالعه‌ی حاضر با توجه به پتانسیل بالای ژئوتوریستی منطقه‌ی آذرشهر سعی شده است، با روش پرالونگ به شناسایی و بررسی چند نمونه از ژئوسایت‌های محدوده‌ی مورد مطالعه پرداخته شود تا گامی در راستای توسعه‌ی پایدار منطقه باشد.

جایگاه ژئوتوریسم در گردشگری پایدار

تعاریفی که از ژئوتوریسم ارایه شده است از مفاهیم قبلی توسعه‌ی پایدار، گردشگری پایدار و اکوتوریسم اتخاذ شده و چیزی که به صورت کاملاً ابداعی باشد نیست. تمایزات ژئوتوریسم از اکوتوریسم در تمرکز آن بر روی خصوصیات جغرافیایی یک ناحیه است در حالی که تعاریف اکوتوریسم، اکوتوریسم را به تنها یکی به رخدادهایی که

در طبیعت فراهم شده است محدود می‌کند. توجه به این نقطه مهم است که ابهام در تعریف اکوتوریسم وقتی به وجود می‌آید که این اختلافات بین اکوتوریسم و ژئوتوریسم بررسی می‌شود. تنوع تعاریف در اکوتوریسم بعضاً بالاتکلیفی در بیشتر تعاریف اکوتوریسم ایجاد کرده است که اکثراً در ادبیات پذیرفته شده است (Fennell, 2001; Juric, Bettina, & Mather, 2002; Neely, 1988; Saleh & Karwacki, 2002). برای مثال تعاریفی چون «بازدیدکنندگانی که به مناطق حفاظت شده می‌روند» و «کسی که در جستجوی تجربه‌ای در مناطق طبیعی بکر تخرب شده است» (Rose & Westem, 1993; Eepler, 2002) ارایه شده است، عمدتاً اصول زیر را دنبال می‌کند. نخست: توافق کاملی در این که اکوتوریسم چه چیزی را شامل می‌شود وجود دارد. دوم: بیشتر تعاریف اکوتوریسم را به مناطق حفاظت شده و طبیعی محدود می‌کند. و سوم: تعریف اکوتوریسم به پایداری در درجه‌ی اول بر روی اختلاف محیطی از ژئوتوریسم تأکید و تمرکز دارد. که سعی بر ترکیب پایداری برای چشم‌اندازهای ایجاد شده، جایی که محیط با انسان در تماس است، دارد. تمام این اختلافات بین اکوتوریسم و ژئوتوریسم در کار فنل^۱ به چشم می‌خورد که شامل تحلیل‌هایی از تعاریف اکوتوریسم می‌باشد (Fennell, 2001). فنل در پژوهش خود ۸۵ تعریف منحصر از اکوتوریسم را مورد تحلیل قرار داد تا شباهت‌ها و اختلافات آنها را مشخص سازد. یافته‌های تحقیق نشان داد که ۴۵ درصد از تعاریف اکوتوریسم بیان کننده‌ی این است که اکوتوریسم می‌بایستی در مناطق طبیعی رخ دهد و در ۵۰ درصد از تعاریف هیچ استنباطی از فرهنگ ایجاد نمی‌کند (Fennell, 2001). این امر به وضوح توافق کمی که در تعریف اکوتوریسم وجود دارد را به تصویر کشیده است. و با توجه به حداقل ۵۰ درصد از تعاریف، اختلافات اساسی بین اکوتوریسم و ژئوتوریسم وجود دارد. ژئوتوریسم به طور کلی شامل محیط، فرهنگ، زیباشت‌ناختی، میراث زمین، و رفاه ساکنان می‌شود در حالی که اکوتوریسم مطابق با ذکر بلامی^۲ در سال ۲۰۰۱ در درجه‌ی اول بر روی طبیعت، و در درجه‌ی دوم بر روی آموزش، و در نهایت بر روی پایداری تأکید دارد (Blamey, 2001).

به جای بحث تفاوت بین اکوتوریسم و ژئوتوریسم، بهتر است به ژئوتوریسم به عنوان شکلی جامع از گردشگری پایدار پرداخته شود که شامل موضوعاتی در زمینه‌های متنوع گردشگری پایدار مانند گردشگری رستای (Clare & Chabrel, 2007; Ilbery, & Kneafsey, 2007; Oliver & Jenkins, 2003; Saxena, Clark, Oliver, & Ilbery, 2007), گردشگری میراث فرهنگی (Boyd, 2002; Kang & Moscardo, 2006; Moscardo & Pearce, 1999)، گردشگری جهانگردی (Ashley & Rose, 1996; Blackstock, 2005; Joppe, 1996)، گردشگری حامی فقرا (Ceballos, 1996; Scheyvens, 1999)، و اکوتوریسم (Miel به تجربه‌ی مناطق بکر طبیعی بدون تأثیر منفی بر آنها با اقتباس از اکوتوریسم می‌باشد. اشتیاق به تجربه‌ی میراث فرهنگی منحصر به فرد از گردشگری فرهنگی اتخاذ شده است. اهمیت برای رفاه ساکنان محلی از اکوتوریسم، مجتمع گردشگری رستایی (IRT)، گردشگری حامی

¹- Fennell²- Blamey

فکر و مبتنی بر جامعه‌ی فرهنگی اتخاذ شده است. ژئوتراولرها^۳ طبق تعریف همان اکوتوریست‌ها هستند. به خاطر این که آنها در مورد محیط زیست مراقب محتاط و مراقب می‌باشند. اما اکوتوریست‌ها را نمی‌توان با این عنوان ژئوتراولر نامید مگر این که آنها با تمام الزامات مندرج در تعاریف مواجه شوند. یکی این که ممکن است تمام محافظت‌ها درباره‌ی محیط زیست انجام بگیرد، اما درباره‌ی اینکه تجربه‌ی فرهنگ و میراث فرهنگی برایش مهم باشد، مراقب و محتاط نباشد. چهارچوب کاری که ژئوتوریسم بر روی آن تأکید دارد در شکل شماره‌ی یک به صورت شماتیک نشان داده شده است (Boley, 2009).

اهداف

- ایجاد کارت شناسایی برای هر یک از مکان‌های ژئومورفولوژیکی تحت بررسی در شهرستان آذرشهر؛
- ارزیابی پتانسیل ژئوتوریستی مکان‌های ژئومورفولوژیکی در شهرستان آذرشهر.

فرضیات

- مکان‌های ژئومورفولوژیکی تحت بررسی در شهرستان آذرشهر از قابلیت‌های بالای ژئوتوریستی برخوردار می‌باشند؛
- عدمه‌ترین موانع در جذب گردشگری در ژئوسایت‌های موجود در شهرستان آذرشهر عدم وجود امکانات رفاهی و زیرساخت‌ها می‌باشد.


معوفی منطقه‌ی مورد مطالعه

منطقه‌ی مورد مطالعه در این بررسی در جنوب غرب توده‌ی کوهستانی سهند و در محدوده‌ی طول جغرافیایی "۲۵° ۴۸' تا "۱۰° ۴۹' و مابین عرض شمالی "۳۷° ۵۳' تا "۴۰° ۳۳' واقع شده است. وسعت این منطقه در حدود ۱۰۶۷ کیلومتر مربع بوده که در ۵۴ کیلومتری جنوب غربی تبریز و ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی دریاچه‌ی ارومیه، به همسایگی مراغه و عجب‌شیر در جنوب، اسکو و ایلخچی از شمال و شرق قرار دارد. این شهرستان (آذرشهر) به لحاظ وجود چشمه‌های معدنی متعدد، همچنین آثار باستانی و روستاهای تاریخی با طبیعتی بکر حائز پتانسیل بالای ژئوتوریستی در استان می‌باشد (نقشه‌ی شماره‌ی ۱).

روش کار


در پژوهش حاضر شناسایی ژئوسایت‌های موجود در شهرستان به صورت بازدیدهای میدانی و برداشت زمینی بوده و توصیف هر یک از این ژئوسایت‌ها در قالب کارت‌های شناسایی با نظر کارشناسی و به صورت علمی تنظیم شده است (جدول شماره‌ی ۱). و در راستای ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریستی محدوده‌ی مورد مطالعه به تفکیک هر یک از مکان‌های ژئومورفولوژیکی (با ژئوسایت‌های موجود در آن) از روش پرالونگ (Pralong, 2005) استفاده شده است که ذیلاً تشریح شده است.

ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی ... ۳۷




شکل شماره‌ی(۱): توصیفی شماتیک از چهار چوب کاری ژئوتوریسم

(Boley, 2009)



نقشه‌ی شماره‌ی(۱): موقعیت جغرافیایی شهرستان آذرشهر



نقشه‌ی شماره‌ی (۲): توان‌های زئوتوریستی شهرستان آذرشهر

جدول شماره‌ی (۱): کارت شناسایی مکان زئومورفولوژیکی، به عنوان سند ارزیابی و مدیریت این نوع از مکان‌ها

کارت شناسایی مکان زئومورفولوژیکی	
شاخص‌ها	شناسه
نام محلی:	پدیده‌ها
موقعیت نسبی:	نحوه پیدایش
مختصات جغرافیایی:	تصویف شکل، ساختار مورفولوژیکی، فراسایش
ارتفاع:	دینامیک
	سن
	وابستگی اصلی به
	وابستگی فرعی به
	حیطه‌ی مطالعاتی
	کشاورزی
	دسترسی
	سطح جذایت
	جهنه‌های کاربردی
	وضعیت حفاظت
	کاربری فعلی
	ارتباطات
	زیرساخت‌ها
	برخوردها
	وضعیت قانونی

Cf: Serrano & Trueba, 2005

روش پرالونگ

ارزیابی عیار گردشگری مکان های ژئومورفولوژیکی

عیار گردشگری مکان های ژئومورفولوژیکی با توجه به روش پرالونگ و بر اساس چهار عیار (اجتماعی - اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، علمی و زیبایی ظاهری) تحت معادله ذیل محاسبه می شود:

عیار گردشگری = (عیار اجتماعی + عیار اقتصادی + عیار فرهنگی - تاریخی + عیار علمی + عیار زیبایی ظاهری)/۴
در این فرمول وزن هیچ کدام از جنبه های عیار گردشگری نسبت به دیگری کم یا زیاد نیست.

۱- معادله محاسبه ارزش زیبایی ظاهری

$$\text{امتیاز کل} = (\text{امتیاز بند ۵} + \text{امتیاز بند ۴} + \text{امتیاز بند ۳} + \text{امتیاز بند ۲} + \text{امتیاز بند ۱}) / 5$$

این امتیازها براساس جدول شماره‌ی (۲) محاسبه می شوند. در این فرمول وزن هیچ کدام از جنبه های عیار گردشگری نسبت به دیگری کم یا زیاد نیست.

جدول شماره‌ی (۲): معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار زیبایی ظاهری یک مکان ژئومورفولوژیکی

امتیاز معیار	۱	۰/۷۵	۰/۵	۰/۲۵	صفرا	
تعداد نقاط دیدنی	بیش از ۶	۶ یا ۵،۴	۳ یا ۲	یک	-----	
بند ۱: در این بند تعداد نقاط دیدنی قابل دسترس با پای پیاده، هر کدام از این نقاط باید دارای جنبه خاصی از زیبایی یاشند و فاصله آنها از مکان ژئومورفولوژیکی مورد نظر بیش از ۱ کیلومتر نباشد.						
۲- متوسط فاصله تا نقاط دیدنی بر حسب متر	بیش از ۵۰۰	۵۰۰-۲۰۰	بین ۵۰-۲۰۰	کمتر از ۵۰ متر	-	
بند ۲: عبارت است از مجموع کوتاه ترین فواصل بین هر یک از نقاط دیدنی و مکان ژئومورفیک تقسیم بر تعداد نقاط دیدنی مورد نظر در بند ۱						
۳- مساحت	بسیار بزرگ	بزرگ	متوسط	کوچک	-	
بند ۳: مساحت کل مکان مدنظر است. برای هر یک از انواع مکان ها یک مقیاس کمی بر حسب کیلومتر در نظر گرفته می شود که به بزرگی و کوچکی آن در رابطه با دیگر مکان های شناسایی شده در محدوده مورد مطالعه تعیین می شود.						
۴- ارتفاع	بسیار بلند	بلند	متوسط	کم	صفرا	
بند ۴: ارتفاع کل مورد نظر است. برای هر یک از انواع مکان ها یک مقیاس کمی از ارتفاع در رابطه با دیگر مکان های شناسایی شده در محدوده مورد مطالعه تعیین می شود.						
۵- تابیز رنگ ها با محیط اطراف	رنگ های متضاد	-	رنگ های گوناگون	رنگ های مشابه		
بند ۵: تابیز رنگی بین مکان و محیط مستقیم آن را مورد توجه قرار می دهد. یک رنگ بخصوص شامل همه سایه رنگ های بی شمار آن نیز هست. تیره، خاکستری و خاکستری روش را به عنوان رنگ مشخص می شناسیم.						

۲- معادله محاسبه ارزش علمی

$$\text{امتیاز کل} = (\text{امتیاز بند ۶} + \text{امتیاز بند ۵} + \text{امتیاز بند ۴} + \text{امتیاز بند ۳} + \text{امتیاز بند ۲} + \text{امتیاز بند ۱}) / 5$$

این امتیازها بر اساس جدول شماره‌ی (۳) محاسبه می شوند. در این فرمول وزن بندهای ۳ و ۴ کاهش یافته است. زیرا هر دوی آنها شاخص کمیابی در ارتباط با بند ۳ ورد ارزیابی قرار می گیرند.

۴۰ فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی - سال چهارم، شماره چهارم، پائیز ۱۳۹۱

جدول شماره‌ی (۳): معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار علمی یک مکان ژئومورفولوژیکی

معیار	امتیاز	صفرا	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد	معیار
جدایت از نظر جغرافیای دیرینه	-----	-----	-----	-----	زیاد	خیلی زیاد	۱
بند ۱: این شاخص با قابلیت‌های مکان ژئومورفولوژیکی در بازسازی مورفوکلیمایی مکان سنجیده می‌شود. جدایت مکان‌های ژئومورفولوژیکی که ارزش تاریخی نیز دارند، بیشتر است.	-----	-----	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد	۲ ویژگی‌های تجسمی
بند ۲: عبارت است از ویژگی‌های آموزشی مکان ژئومورفولوژیکی در آشنا نمودن عموم مردم با داشتن ژئومورفولوژی	-----	-----	صفرا	متوسط	زیاد	خیلی زیاد	۳ مساحت (%)
بند ۳: همان بند ۳ جدول ۱، این امتیاز به صورت نسبی از مساحت مکان ژئومورفولوژیکی مورد نظر بر مساحت کل ناحیه دارای مکان‌های مشابه منطقه‌ی مطالعه و به درصد بیان می‌شود.	-	-	کمتر	بین ۲۵-۵۰	بین ۵۰-۹۰	بیش از ۹۰	۴- کمیابی
بند ۴: این شاخص به صورت تعداد مکان‌های مشابه موجود در منطقه‌ی مطالعه تعریف می‌شود. یک مکان ژئومورفولوژیکی بی‌نظیر می‌تواند نمونه‌ای منحصر به فرد از یک محیط مورفوکلیمایی مربوط به گذشته باشد که امروزه دیگر از آن محیط خبری نیست.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	۵- وضعیت مکان
بند ۵: این شاخص به وجود مخاطرات طبیعی، چگونگی تکامل مکان و عوامل انسانی موثر در مکان ژئومورفولوژیکی و درجه‌ای از اقدامات حفاظتی اعمال شده بستگی دارد.	بدون هر گونه دستکاری	اندکی تخریب شده	در حد متوسط	تخریب شد	به شدت تخریب شده	تخریب شده	بی‌نظر
بند ۶: این شاخص با نادر بودن گونه‌ها، تنوع (تعداد گونه‌ها)، و دینامیک طبیعی (توانایی محیط در توسعه‌ی طبیعی) پوشش گیاهی و جانوری مکان ژئومورفولوژیکی بیان می‌شود.	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	بین ۵ تا ۷	بین ۳-۴	بیش از ۲-۱

۳- معادله‌ی محاسبه‌ی ارزش فرهنگی

$$\text{امتیاز کل} = (\text{امتیاز بند ۵} + \text{امتیاز بند ۴} + \text{امتیاز بند ۳} + 2 \times \text{امتیاز بند ۲} + \text{امتیاز بند ۱}) / 6$$

این امتیازها بر اساس جدول شماره‌ی (۴) محاسبه می‌شوند. در این فرمول وزن بند ۲ دوبار محاسبه شده است. زیرا، این بند ممکن است شامل تذکره‌های ادبی نیز باشد که عموماً همراه با عناصر پیکرنگاری دیده می‌شوند.

۴- معادله‌ی محاسبه‌ی ارزش اقتصادی

$$\text{امتیاز کل} = (\text{امتیاز بند ۵} + \text{امتیاز بند ۴} + \text{امتیاز بند ۳} + \text{امتیاز بند ۲} + \text{امتیاز بند ۱}) / 5$$

این امتیازها بر اساس جدول ۵ محاسبه می‌شوند. در این فرمول نیز وزن هیچ کدام از جنبه‌های عیار گردشگری نسبت به دیگری کم یا زیاد نیست زیرا همه‌ی آن‌ها به یک اندازه در تعیین ارزش اقتصادی مکان ژئومورفولوژیکی سهیم هستند.

۴۱ ارزیابی توانمندی های ژئو توپوگرافیستی ...

جدول شماره‌ی (۴): معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار فرهنگی یک مکان ژئومورفولوژیکی

معیار	امتیاز
۱- قابلیت دسترسی	۰/۷۵
با فاصله‌ی بیش از ۱ کیلومتر مسیر قابل دسترس	۰/۵
قابل دسترس از طریق جاده‌ای با اهمیت ملی منطقه‌ای محلی	۰/۲۵
صفرا	
۲- مخاطرات طبیعی	
بدن: ۱) این بند بستگی به فاصله‌ی مکان ژئومورفولوژیکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل و ارتباط آنها، در صورتی که دسترسی از طریق تله کاپین یا ترن باشد، مقیاس باید براساس آنها تنظیم شود.	
۳- تعداد بازدیدکنندگان در هر سال	بند: ۲) این شاخص با سطح خطر مکان ژئومورفولوژیکی و سیاست‌های کنترلی اعمال شده (سطح آگاهی، زیرساخت‌های حفاظتی و ...) تعریف می‌شود. در این معیار مخاطرات حاصل از عملکرد انسان لحظه‌نمي شود.
بند: ۳) توانمندی مکان ژئومورفولوژیکی در جذب بازدیدکنندگان به صورت تعداد افراد بازدید کننده از مهمترین نقطه‌ی دیدنی مورد مطالعه تعریف می‌شود. بنابراین، امتیاز در نظر گرفته شده برای تمام مکان‌های ژئومورفولوژیکی منطقه‌ی یکسان خواهد بود.	کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر
۴- سطح تمهدیدات حفاظتی	
بدن سطح حفاظت مکان ژئومورفولوژیکی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. برای این شاخص، بهره‌دهی اقتصادی با کاهش سطح حفاظت نسبت عکس دارد.	
۵- جذابیت	
بند: ۴) این بند با بند ۴ در تعادل است زیرا، نبود حفاظت می‌تواند از نظر جذب گردشگر از مبادی مختلف، مانع در راه گسترش گردشگری و بهره‌وری اقتصادی مکان ژئومورفولوژیکی باشد.	بین المللی

جدول شماره‌ی (۵): معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عیار اقتصادی یک مکان ژئومورفولوژیکی

معیار	امتیاز
۱- قابلیت دسترسی	۰/۷۵
با فاصله‌ی بیش از ۱ کیلومتر مسیر قابل دسترس	۰/۵
قابل دسترس از طریق جاده‌ای با اهمیت ملی منطقه‌ای محلی	۰/۲۵
صفرا	
۲- مخاطرات طبیعی	
بدن: ۱) این بند بستگی به فاصله‌ی مکان ژئومورفولوژیکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل و ارتباط آنها، در صورتی که دسترسی از طریق تله کاپین یا ترن باشد، مقیاس باید براساس آنها تنظیم شود.	
۳- تعداد بازدیدکنندگان در هر سال	بند: ۲) این شاخص با سطح خطر مکان ژئومورفولوژیکی و سیاست‌های کنترلی اعمال شده (سطح آگاهی، زیرساخت‌های حفاظتی و ...) تعریف می‌شود. در این معیار مخاطرات حاصل از عملکرد انسان لحظه‌نمي شود.
بند: ۳) توانمندی مکان ژئومورفولوژیکی در جذب بازدیدکنندگان به صورت تعداد افراد بازدید کننده از مهمترین نقطه‌ی دیدنی مورد مطالعه تعریف می‌شود. بنابراین، امتیاز در نظر گرفته شده برای تمام مکان‌های ژئومورفولوژیکی منطقه‌ی یکسان خواهد بود.	کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر
۴- سطح تمهدیدات حفاظتی	
بدن سطح حفاظت مکان ژئومورفولوژیکی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. برای این شاخص، بهره‌دهی اقتصادی با کاهش سطح حفاظت نسبت عکس دارد.	
۵- جذابیت	
بند: ۴) این بند با بند ۴ در تعادل است زیرا، نبود حفاظت می‌تواند از نظر جذب گردشگر از مبادی مختلف، مانع در راه گسترش گردشگری و بهره‌وری اقتصادی مکان ژئومورفولوژیکی باشد.	بین المللی

ارزیابی عیار بهره‌وری مکان ژئومورفولوژیکی

ارزیابی عیار بهررهوری مکان ژئومورفولوژیکی شامل دو جزء به صورت زیر میباشد:

(عيار کیفیت؛ عیار میزان بھرہوری) = عیار بھرہوری

روابط بین این دو عیار، شدت بهره‌ری (کم، متوسط، زیاد) را در مکان ژئومورفولوژیکی تعیین می‌کند. میزان بهره‌وری بیان‌گر میزان استفاده‌ی فضایی و زمانی از مکان ژئومورفولوژیکی است. در حالی که، کیفیت بهره‌وری بر اساس چگونگی استفاده از معیار گردشگری مکان ژئومورفولوژیکی محاسبه می‌شود. در چنین وضعیتی، معیارهای مختلفی با مقیاس‌های امتیازده متفاوت با ارزیابی این دو جزو اصلی عبارت هستند: مقدار مگذ

عبار میزان بھوک = (امتیاز بند ۳ + امتیاز بند ۲ + امتیاز بند ۱)/۴

که از ۱۹۹۴ جدید شما، ۵۰ (۶) تعبیه شود.

عما، كفشت بـ ٩٩٥، (امتياز بند ٤ + امتياز بند ٣ + امتياز بند ٢ + امتياز بند ١) / ٤

امتنا؛ بندھائے، فہق ننزاں، وی، جدوار، شمارہ، (۷) تعین م شہد۔

جدول شماره ۶(۶): معار و مقیاس امتیازدهی، در ارزیابی، عبار میزان بهره‌داری، یک مکان ژئوموژولوژیک

۱	۰/۷۵	۰/۵	۰/۲۵	صفرا	امتیاز	معیار
بند ۱: این بند به مساحتی از مکان ژئومورفولوژیکی که به منظور گردشگری و بهره‌بردای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بستگی دارد. این مساحت ممکن است شامل مکان ژئومورفولوژیکی و یا قسمتی از آن باشد.	بیش از ۱۰	بین ۵ - ۱۰	کمتر از ۱	صفرا	۱ - مساحت مورد استفاده (هکتار)	۱
بند ۲: عبارت است از مجموع زیرساخت‌های حمل و نقل، اطلاعاتی، اسکان، بازدیدها و سوغاتی‌های موجود در مکان ژئومورفولوژیکی مسیرهای پیاده‌رو در این شاخص محاسبه نمی‌شوند.	بیش از ۱۰	بین ۵ - ۶	۱	صفرا	۲ - تعداد زیرساخت‌ها	۱
بند ۳: این بند با تعداد روزها یا فصلی که مکان ژئومورفولوژیکی در طول سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، در صورتی که بهره‌برداری از مکان ژئومورفولوژیکی در طول سال مداوم نباشد، امتیاز براساس میانگین سالانه محاسبه می‌شود.	از ۲۷۱ تا ۳۶۰ روز	از ۱۸۱ تا ۲۷۰ روز	از ۹۱ تا ۱۸۰ روز	از ۹۰ تا ۹۱ روز	-	۳ - اسکان فصلی (روز)
بند ۴: عبارت است از تعداد ساعت‌های استفاده از مکان ژئومورفولوژیکی، در صورتی که بهره‌برداری روزانه در طول سال متغیر می‌باشد، امتیاز بر اساس میانگین سالانه محاسبه می‌شود.	ساعت	ساعت	ساعت	ساعت	۴ - اسکان روزانه (ساعت)	۴

ارزیابی توانمندی های ژئو توپوگرافیستی ... ۴۳

جدول شماره‌ی(۷): معیار و مقیاس امتیازدهی در ارزیابی عبار کیفیت بهره‌برداری از یک مکان ژئومورفولوژیکی

معیار	امتیاز	صفر	بدون هرگونه تبلیغات	یک اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	یک اقدام حمایتی و معرفی چند محصول	یک اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	۰/۷۵	۰/۵	۰/۲۵	۱
۱- استفاده از زیبایی ظاهری	بدون هرگونه تبلیغات	یک اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	یک اقدام حمایتی و معرفی چند محصول	یک اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول				
بند ۱: در این بنده استفاده از پدیده‌های دیدنی مکان ژئومورفولوژیکی با توجه به تبلیغات از طریق انواع حمایت‌ها (نهیه‌ی بروشور، تابلوهای تبلیغاتی، سایت‌های کامپیوتربی و ...) و محصولات مدنظر است.											
۲- استفاده از ارزش علمی	بدون هرگونه امکان آموزشی	آموزشی	بدون هرگونه امکان آموزشی	آموزشی	یک اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	یک اقدام حمایتی و معرفی چند محصول	یک اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	
بند ۲: در این بند استفاده از جذابیت‌های علمی مکان ژئومورفولوژیکی با توجه به بهره‌برداری آموزشی از طریق ازارهای مختلف حمایتی (برپایی نمایشگاه، تورهای آموزشی، و اعلان‌های آموزشی و ...) و محصولات مدنظر است.											
۳- استفاده از ارزش فرهنگی	بدون هرگونه امکان آموزشی	آموزشی	بدون هرگونه امکان آموزشی	آموزشی	یک اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	یک اقدام حمایتی و معرفی چند محصول	یک اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	چندین اقدام حمایتی و معرفی یک محصول	
بند ۳: در این بند استفاده از جذابیت‌های فرهنگی مکان ژئومورفولوژیکی با توجه به بهره‌برداری آموزشی از طریق ازارهای مختلف حمایتی (برپایی نمایشگاه، تورهای آموزشی، و اعلان‌های آموزشی و ...) و محصولات مدنظر است.											
بند ۴: استفاده از ارزش اقتصادی (نفر)	بدون بازدید کننده	کمتر از ۵۰۰۰	بین ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰	بین ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰	بیش از ۱۰۰۰۰						
بند ۴: در این بند استفاده از امکانات بالوهی اقتصادی مکان ژئومورفولوژیکی بر اساس تعداد بازدیدکننده در طی سال مدنظر است. امتیاز این بند بیان گر میزان سوددهی مکان ژئومورفولوژیکی نیست.											

معرفی مکان‌های ژئومورفولوژیکی منطقه

شهرستان آذرشهر به لحاظ وسعت و هم‌جواری با توده‌ی آتشفسانی سهند دارای مجموعه‌ای جذاب از اشکال ژئومورفولوژیک است. که در سرتاسر شهرستان گستردگ است. ولی به لحاظ محدودیت امکانات و زمان به چند نمونه که به صورت انتخابی مطلوب پژوهشگر و اهداف پژوهش بوده بسنده شده و ویژگی‌های هر یک از آنها در قالب یک کارت شناسایی به عنوان سند ارزیابی و مدیریت این نوع از مکان‌ها در جداول ۸ تا ۱۰ نشان داده شده‌اند.

این ۳ مکان عبارتند از:

- ۱- ائل میدانی (واقع در ارتفاعات شهر گوگان از توابع آذرشهر)؛
- ۲- قرمزی گول (روستایی واقع در غرب توده‌ی آتشفسانی سهند، از توابع شهرستان آذرشهر)؛
- ۳- هفت چشممه (روستایی واقع در جنوب غرب شهرستان آذرشهر، در امتداد رشته کوه سهند)؛

جدول شماره‌ی (۸): کارت شناسایی مکان ژئومورفولوژیکی ائل میدانی

کارت شناسایی مکان ژئومورفیکی		شناخته
نام محلی: اتل میدانی موقعیت نسبی: در روی فلات آهکی در جنوب شرقی گوگان، حدوداً ۱,۵ کیلومتری شهر گوگان واقع شده است. مختصات چهارگانی: بین ۳۷ درجه و ۴۶ دقیقه و ۴۲ ثانیه تا ۳۷ درجه و ۴۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه عرض شمالی، و ۴۵ درجه و ۵۴ دقیقه و ۲ ثانیه تا ۴۵ درجه و ۵۶ دقیقه و ۴۲ ثانیه طول شرقی واقع می باشد. ارتفاع: ۱۳۰۰ تا ۱۴۳۰ متر از سطح دریا		موقعیت
پژوهش‌های تراورتن ساز، اوپالا، درز و شکاف‌های وسیع، غار (ساری کوهیل، بدی کوهیل، دریابار، تافولی)	پدیده‌ها	
نحوه پیدایش این نوشههای عظیم تراورتنی این است که آب‌ای زیرزمینی اسیدی (آب‌های ژوئنل و وادوز) که از سوی ارتفاعات مجموعه آتششانی سهند به سوی دریاچه ارومیه در حرکت مستند. ضمن حرکت در سیر خود با مجموعه نوشههای کرتانه کرتانی، ژواراسیک و سایر واحدهای کربناتی قدیمی (در خاور جاده آذرشهر- چیتبشیر) برخورد کرده و با آنها واکنش می کنند. به علت اسیدی بودن این آبهای کربنات نامحلول بهصورت بی کربنات محلول در می آید و به همراه جریان آب به سوی دریاچه ارومیه حمل می شوند. هنگامی که این آبها در درازای شکستگی‌های گسلی به سطح زمین می رستند عامل اسیدی آب (گاز CO_2 و ...) پیرون می‌روند و بی کربنات محلول به صورت کربنات تامحلول (یعنی تراورتن) در پیرامون چشممهای نوشهه شده و این فلات را به وجود آورده‌اند؛ علت ایجاد اوپالا روى فلات آهکی: آبهای حاصل از ریزش باران‌ها و یا ذوب ندریجی پرفراز در دوره‌های سرد دوران چهارم، در نقاط ضعیف و فروزنده فلات آهکی ایشانه شده و فروزنگی بزرگی را تشکیل داده است؛ دریابار: نقش دریاچه ارومیه را در موفرگذرنده منطقه بر جسته می‌نماید. که در دوره‌های سرد دوران چهارم به وجود آمدته‌اند. غار: در نتیجه اتحال سازند آهکی در دوره‌های مختلف زمین شناسی پدیدار شده است. درز و شکاف‌ها مریبوط به زمان آتششانی سهند در پی گلشی که متوجه به برون ریزی مواد آتششانی سهند شده به وجود آمدته‌اند و در نهایت تأثیرگذاشتار یا در نتیجه ذوب و پختندان در شبانه روز اثر شنیدن صیغ گاهی بر روی کنگاورما، ماسه سنگ و غیره به وجود آمدته‌اند.	نحوه پیدایش	
مجموعه اشکال ژئومورفولوژیکی در محدوده اتل میدانی بر روی فلات آهکی مشکل از سنگهای تراورتن همراه با توده‌های نفوذی تشکیل یافته‌اند. که هنوز هم شکل‌رایی با وجود چشممهای تراورتن ساز ادامه دارد. که سالانه ایهای بر آن می‌افزاید. فراسایش در این محدوده در عصر حاضر بیشتر تشیدیدی بوده که در نتیجه برهه‌برداری انسانی از منابع معدنی آن و ساخت و سازها است که چهارهای منطقه را مخدوش کرده است.	تصویف شکل، ساختار مورفولوژیکی، فراسایش	ژئومورفولوژی
فرایندیهای هوازدگی (گلکنیک و شبیهای)، تشکیل فراسایش در نتیجه‌ی تخریب توسط انسان، ایجاد لایه‌های جدید از رسوب در نتیجه‌ی وجود چشممهای تراورتن ساز	دینامیک	
شکل گیری این مجموعه تماماً مریبوط به دوران کواترنری می‌باشد که در طول این دوره بر جای گذاشته شده است.	سن	
چشممهای تراورتن ساز، حاکمیت اقلیم پلیستوسن، رسوبات مریبوط به فرایندهای جنب پیچجالی	وابستگی اصلی به	
رسوبات دریاچه‌ای در دوران چهارم، نوسانات دریاچه‌ای که در حقیقت باعث ایجاد اشکال مختلفی در سطح خودش شده است.	وابستگی فرعی به	
اشکال کارست، فلاحت‌های آهکی	حیطه مطالعاتی	
معدن کاری، کشاورزی، دامداری	بار فرهنگی	
تا فاصله‌ی ۱ کیلومتری از طریق جاده آسفالت، و تمام محدوده جاده شوسه	دسترسی	
بسیار زیاد، به برای عموم مردم و برای معحقان، برای عموم به لحاظ وجود طبیعت زیبا و چشممهای درمانی و برای محققان از لحاظ مطالعه‌ی زمین ساخت و نحوی تکونین	سطح جذابیت	
بی توجهی از جانب مسئولان و از طرفی تعصب اهالی بومی نسبت به حفاظت از محدوده	وضعیت حفاظت	جنبهای کاربردی
عمدها معدن	کاربری فعلی	
مسافرکش‌های محلی	ارتباطات	
پیست موتور سواری، اسب دوانی (ایجاد شده توسط اهالی بومی)	زیرساخت‌ها	
تخریب محیط از سوی معدن کارها، سواستفاده اهالی در افزودن به باخ‌های خود	برخورددها	
حفاظت نشده	وضعیت قانونی	

۴۵ ... یو اتومندی های ژئوتوریستی ... ارزیابی توانمندی

جدول شماره‌ی (۹): کارت شناسایی مکان ژئومورفولوژیکی روستای قرمزی گول

کارت شناسایی مکان ژئومورفولوژیکی		شناسه
شناخت	نام محلی: قرمزی گول	موقعیت
	<p>موقعیت نسبی: در حدود ۱۰ کیلومتری جنوب شهرستان آذرشهر در مجاورت رودخانه‌ی گیرفت قرار گرفته است.</p> <p>مختصات جغرافیایی: بین عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۴۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه تا ۳۷ درجه و ۴۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۵ دقیقه و ۴ ثانیه تا ۴۶ درجه و ۶ دقیقه و ۵۴ ثانیه‌ی طول شرقی واقع شده است.</p> <p>ارتفاع: در ارتفاع بین ۱۸۱۱ تا ۱۷۲۲ متر از سطح دریا واقع شده است.</p>	
پدیده‌ها	رودخانه‌ی پرآب، صخره‌های سربه فلک کشیده، طبیعتی زیبا، استخرهای طبیعی	
نحوه پیدايش	شامل ریدیفی ضخیم از سنگ‌های آذرآوری، کنگلومرا، برش‌های افگخاری آندزیت، لاهار، توف و عدسی‌هایی از گدازه‌های جریانی پیروکسین آندزیت می‌باشد که در اطراف رودخانه بروزند دارند. پیدايش این اشکال مربوط به فرآیندهای آتششانی (در زمان غایلت سهند) و رودخانه‌ای (در عصر حاضر) قرار دارد.	
ژئومورفولوژی	توده‌های آندزیتی بریده شده توسط رودخانه، تراس‌های رودخانه‌ای پوشیده از گیاهان، صخره‌های کنگلوماری و آندزیتی برچای مانده از فرسایش؛ فرسایش در حال حاضر نیز از طرف رودخانه بر منطقه اعمال می‌شود و در مناطق خارج از دسترس رودخانه، فرسایش عمده‌ای تشدیدی و در مکان‌های دور از دسترس دام و انسان هوازدگی عمده‌ای فیزیکی به صورت خوردشده است.	تصویف شکل، ساختارمورفولوژیکی، فرسایش
دینامیک	حاکمیت فرآیندهای رودخانه‌ای و فرآیندهای فرسایش	
سن	می‌توان سن این تاچیه را به میوسن نسبت داد (P. Bordet 1971) نیز در گزارش خود سن این مجموعه را میوسن نسبت داده است.	
وابستگی اصلی به	فرآیندهای آتششانی	
وابستگی فرعی به	فرآیندهای رودخانه‌ای و بیوژئومورفولوژی	
حیطه مطالعاتی	اشکال رودخانه‌ای و کوهستانی آتششانی	
کشاورزی	باغداری، دامپروری و کشت گیاهان زراعی	
دسترسی	راه آسفالته تا روستا و راههای خاکی و مال رو تا مناطق بکر	
سطح جذایت	سیار جذاب برای عموم، و به لحاظ اشکال منحصر به فرد ژئومورفولوژی آزمایشگاهی است که در اختیار محققان قرار می‌دهد.	
وضعیت حفاظت	برنامه‌ریزی‌های انجام شده از جانب مسولان ولی در عمل بدون هیچ کونه توجهی، مورد توجه مردم و بهره‌برداری از منطقه به لحاظ زیبایی منحصر آن در منطقه، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در گسترش توریسم منطقه (ایجاد هتل، اقداماتی در ایجاد زیر ساخت‌ها)	
کاربری فعلی	اکوتوریسمی، زراعت دیم، باغداری و چرای دام	
ارتباطات	مسافرکش‌های محلی	
زیرساخت‌ها	هتل (در حال احداث از جانب شرکت‌های خصوصی)، سرویس خدمات عمومی، باخهای تحت حفاظت افراد حقیقی و ارایه خدمات از جانب این افراد، رستوران	
برخوردها	محافظت در کناره‌های رودخانه به لحاظ وجود باغهای زیبا، از بین رفتن پوشش گیاهی در کمی دورتر از روستا به لحاظ دامپروری سنتی	
وضعیت قانونی	حفظ نشده	

جنبهای
کاربردی

۴۶ فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی - سال چهارم، شماره چهارم، پائیز ۱۳۹۱

جدول شماره‌ی (۱۰): کارت شناسایی مکان ژئومورفولوژیکی هفت چشممه

شناسه	شاخص‌ها	کارت شناسایی مکان ژئومورفولوژیکی
موقعیت	<p>نام محلی: هفت چشممه</p> <p>موقعیت نسبی: در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب غرب آذربایجان در مجاورت کوه کرکس قرار گرفته است.</p> <p>مختصات جغرافیایی: بین عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۲ دقیقه و ۲ ثانیه تا ۳۷ درجه و ۴ دقیقه و ۶ ثانیه شمالی و ۴۵ درجه و ۵۵ دقیقه و ۲۲ ثانیه تا ۴۵ درجه و ۵۸ دقیقه و ۳۹ ثانیه قرار دارد.</p> <p>ارتفاع: در ارتفاع بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است.</p>	
ژئومورفولوژی	<p>پدیده‌ها</p> <p>چشممه‌ای بر آب، دره‌های سرسیز، صخره‌های سنگی سر به فلک کشیده، تپه‌های کنگلومراتی باشکوه، استخر طبیعی بسیار زیبا، فلاتی بسیار تیپیک</p> <p>نحوه‌ی پیدایش</p> <p>نحوه‌ی پیدایش هر یک از نهشته‌های تعبیری در تتجهی پسروی دریاچه‌ی ارومیه متفاوت بوده است به طوری که از نهشته‌های تعبیری در تتجهی پسروی دریاچه‌ی ارومیه گرفته تا مراحل آتششانی سهند که مواد اصلی از کنگلومراها را تأمین نموده است. و اشکال حاضر در بعد از پدیده‌ی کوهزایی سنوزوئیک بدین شکل تکونین یافته‌اند.</p> <p>توصیف شکل، ساختارمورفولوژیکی، فراسایش</p> <p>دینامیک</p> <p>حاجکیست فرآیندهای پریگلامسیری و اثر ذوب و یخبندان، فرآیندهای رودخانه‌ای</p> <p>سن</p> <p>به لحاظ پیچیدگی در ساختار، سن در نقاط مختلف بسیار متفاوت است به طوری که از قدم ترین لايهای نهشته‌گذاری در کامبرین تا رسوبات کوائنزی در این محدوده قابل مشاهده است.</p> <p>وابستگی اصلی به فرآیندهای پیشروی و پسروی دریاچه‌ی ارومیه، تغییرات اقلیمی</p> <p>وابستگی فرعی به فرآیندهای آتششانی سهند، لیتولوژی</p> <p>چیزه</p> <p>رسوب شناسی و اشکال کوهستانی</p> <p>زراعت، دامپروری، باغداری</p> <p>کشاورزی</p> <p>دسترسی</p> <p>متسط، اما در حال رشد از طرف اهالی شهرستان و در مواقعی استان، ولی برای محققان به لحاظ موزه‌ی زمین‌شناسخی در منطقه بسیار جذاب</p> <p>سطح جاذیت</p> <p>وضعیت حفاظت</p> <p>جهنمه‌ای آسفالته تا خود روستا و جاده خاکی و مال رو تا پدیده‌های ژئوتوربیستی محدوده‌ی مورد نظر</p> <p>عدم توجه از جانب مسؤولان؛ در بعضی از مناطق که شناخته شده از طرف مردم (مثل بیوک چشممه و استخر طبیعی گورا) از طرف اهالی به لحاظ بهروری از نظر کشاورزی دارند تحت حفاظت قرار می‌گیرد.</p> <p>کاربری فعلی</p> <p>ارتباطات</p> <p>مسافرکش‌های محلی</p> <p>عملابدون هیچ نوع زیرساختی</p> <p>زیرساخت‌ها</p> <p>برخوردها</p> <p>وضعیت قانونی</p>	
جهنمه‌ای کاربردی	<p>کشاورزی</p> <p>دسترسی</p> <p>جاذیت</p> <p>حفاظت</p> <p>کاربری فعلی</p> <p>ارتباطات</p> <p>زیرساخت‌ها</p> <p>برخوردها</p> <p>وضعیت قانونی</p>	

ارزیابی نهایی

امتیازات به دست آمده از ارزیابی عیار گردشگری و عیار بهره‌وری در محدوده مورد مطالعه م مقایسه قرار گرفته و توانمندی‌های هر یک از این مکان‌های ژئومورفولوژیکی نشان داده شده است. هم‌چنین اولویت برنامه‌ریزی را در توسعه‌ی این مکان‌ها نشان داده شده است. مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده از محاسبه‌ی عیار گردشگری نشان می‌دهد که محدوده ایل میدانی، بیشترین امتیاز(۰/۴۵) را به خود اختصاص داده است و مکان‌های دیگر در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند (قرمزی گول(۰/۳۶۵)، هفت چشمی(۰/۳۵) (جدول شماره‌ی ۱۱).

جدول شماره‌ی (۱۱): خلاصه‌ی آمار ارزیابی عیار گردشگری و عیار بهره‌وری به روشن پرالونگ برای مکان‌های ژئومورفولوژیکی محدوده مورد مطالعه

معیار	مکان ژئومورفولوژیکی	ایل میدانی	قرمزی گل	روستای هفت چشمی
عیار زیبایی ظاهری		۰/۶	۰/۶۷	۰/۷۳
عیار علمی		۰/۷۵	۰/۴۲	۰/۷۵
عیار فرهنگی		۰/۴۵	۰/۲۱	۰/۲۷
عیار اقتصادی		۰/۴۵	۰/۳۷	۰/۳۷
عیار گردشگری		۰/۴۲	۰/۳۶۵	۰/۳۵
عیار میزان بهره‌وری		۰/۴۳	۰/۳۴	۰
عیار کیفیت بهره‌وری		۰/۲۵	۰/۱۸	۰
عیار بهره‌وری		متوسط	متوسط	کم

نتیجه‌گیری

ژئوتوریسم بخشی از گردشگری است که در سراسر جهان در سال‌های اخیر توسعه و بسط یافته است. در واقع، از مدتها قبل مردم از شگفتی‌های زمین‌شناسی مانند کوه‌ها، غارها، آتشفسان‌ها، دره‌ها و فسیل‌های برجای مانده دیدار می‌کردند. با این حال، تنها در دوران اخیر یک چالش واقعی برای این بخش و بازاری با ویژگی‌های خاص و بدیع وجود داشت. بر اساس تفسیر تحقیق حاضر، حفاظت از میراث‌های زمین‌شناسی در حال توسعه است. هم‌سو با دیگر کشورهای توسعه یافته نیز در تحقیق حاضر، حفاظت از میراث‌های ژئوتوریستی بر پایه‌ی روش (پرالونگ) ابداعی می‌باشد. تا مکان‌های ژئومورفولوژیکی در شهرستان آذرشهر بر اساس روش فوق مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی‌ها نشان دهنده پتانسیل بالای ژئوتوریستی در ناحیه‌ی مورد مطالعه با وجود موانع (عدم وجود زیرساخت‌ها) می‌باشد. بر این اساس ۳ مکان ژئومورفولوژیکی در محدوده مورد مطالعه انتخاب و بر اساس روش پرالونگ مورد ارزیابی قرار گرفته است:

۱- محدوده ایل میدانی با پدیده‌هایی از قبیل اولا، چشمی آب معدنی شورسو، تافونی و ...؛

۲- قرمزی گول با پدیده‌هایی از قبیل استخر طبیعی، رودخانه و ...؛

۳- هفت چشمی با پدیده‌هایی از قبیل صخره‌های سر به فلک کشیده، چشم‌های پرآب، استخر طبیعی و...؛

ارزیابی‌های انجام گرفته با توجه به روش پرالونگ در محدوده‌های انتخابی حاکی از ارزش بالای علمی و در موقعی ارزش بالای فرهنگی آن (ایل میدانی) می‌باشد. و با عنایت به اینکه ژئوتوریسم به لحاظ ماهیت بین رشته‌ای خود به ایجاد ارتباط بین انسان، زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی و هم‌چنین به پتانسیل‌های میراث‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی از بعد اقتصادی آن می‌پردازد. باستی ارزش بهره‌وری و کیفیت بهره‌وری آن نیز مورد تأکید قرار گرفته

تا وجود این مناطق بکر عواملی در راه توسعه‌ی اهالی بومی را فراهم ساخته موجبات حفاظت از این منابع طبیعی را ایجاد نماید.

منابع

- حیدری، رحیم(۱۳۸۷). «مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری»، چاپ اول، تهران: سمت.
- علایی طالقانی، محمود(۱۳۸۶). «ژئومورفوژئی ایران»، چاپ چهارم، تهران: قومس.
- کی داولینگ، راس و دیوید نیوسام(۱۳۸۸). «ژئوتوریسم (جهانی)»، مترجمان: عادل نجفزاده و بهرام نکویی صدری، تبریز: انتشارات سازمان منطقه‌ی آزاد تجاری-صنعتی ارس.
- محمودی، فرج‌الله(۱۳۸۶). «ژئومورفوژئی دینامیک»، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- مختری، داود(۱۳۸۹). «ارزیابی توأم‌مندی اکوتوریستی مکان‌های ژئومورفیکی حوضه‌ی آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ (Pralong)»، جغرافیا و توسعه، شماره ۱۸ (تابستان).
- نقشه‌ی زمین‌شناسی برگ ۱:۱۰۰۰۰۰ آذرشهر (۱۳۸۱). سازمان زمین‌شناسی کشور.
- نقشه‌ی زمین‌شناسی برگ ۱:۱۰۰۰۰۰ اسکو (۱۹۹۰). سازمان زمین‌شناسی کشور.

- Ashley, C., & Rose, D (2002). "Making tourism work for the poor: Strategies and challenges in southern Africa", Development Southern Africa, Vol. 19 (1), PP: 61-82.
- Blackstock, K (2005). "A critical look at community based tourism", Community Development Journal, Vol. 40(1), PP: 39-49.
- Blamey, R.K (2001). Principles of Ecotourism, In D. Weaver, The Encyclopedia of Ecotourism, Wallingford, UK: CAB.
- Boley, B (2009). "Geotourism in the crown of the continent: Developing and testing the geotourism survey instrument (GSI)", Thesis of Master of Science, Department of society and conservation, The University of Montana Missoula, MIT.
- Boyd, S (2002). "Cultural and heritage tourism in Canada: Opportunities, principles and challenges", Tourism and Hospitality Research, Vol. 3(3), PP: 211-233.
- Ceballos, H (1996). Tourism, ecotourism, and protected areas, IUCN Protected Areas Programme. Gland: Switzerland.
- Clark, G., & Chabrel, M (2007). "Measuring integrated rural tourism", Tourism Geographies, Vol. 9 (4), PP: 371-396.
- Comanescu, L & Dobre, R (2009). "Inventorying, evaluating and tourism valuating the geomorphosites from the central sector of the Ceahlau National Park", Geojournal of Tourism and Geosites, Vol. 3, PP: 86-96.
- Coratza, P & et al (2008). "Management of geomorphosites in high tourist vocation area: An example of geo-hiking maps in the Alpe Di Fanes (Natural Park Of Fanes- Senes-Braies, Italian Dolomites)", Geojournal of Tourism and Geosites, Vol. 2, PP: 106-117.
- Fennell, D.A (2001). "A content analysis of Ecotourism", Current Issues in Tourism, Vol. 4 (5), PP: 403-421.
- Frey, M. L & et al (2002). "Geowissenschaftliche öffentlichkeitsarbeit – eine option", Fur die Zukunft, Scriptum, Vol, 9, PP: 17-37.
- Ghasemi, A & et al (2010). "Identification of Some of the Geotourism Sites in Iran", World Applied Sciences Journal, Vol. 11(11), PP: 1342-1347.
- Giardino, M & et al (2010). "GIS and geomatics application for the evaluation and exploitation of Piemonte Geomorphosites", Mapping Geoheritage, Lausanne, Institut de geographie, Geovisions, Vol. 35, PP: 97-113.

- Hose, T.A (1995). “**Selling the story of Britain stone**” Environmental interpretation, Vol. 10(2), PP: 16-17.
- Ilbery, B., Saxena, G., & Kneafsey, M (2007). “**Exploring tourists and gatekeepers attitudes towards integrated rural tourism in the England-Wales border region**”, Tourism Geographies, Vol. 9(4), PP: 441-468.
- Joppe, M (1996). “**Sustainable community tourism development revisited**”, Tourism Management, Vol. 17(7), PP: 475-479.
- Juric, B., Cornwell, T.B., & Mather, D (2002). “**Exploring the usefulness of an ecotourism interest scale**”, Journal of Travel Research, Vol. 40(3), PP: 259-269.
- Kang, M & Moscardo, G (2006). “**Exploring cross- cultural differences in attitudes towards responsible tourist behavior: A comparison of Korean**”, British and Australian tourists. Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 11(4), PP: 303-320.
- McNeely, J. A (1988). **Ecotourism and Biological Diversity: Developing and Using Incentives to Conserve Biological Reserves**, Gland, Switzerland: International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources.
- Moscardo, G., & Pearce, P (1999). “**Mindful visitors: Heritage and tourism**”, Annals of Tourism Research, Vol. 26(2), PP: 416-434.
- Newsome, D & Dowling, R. K (2006). “**Geotourism: sustainability, impacts and management**”, Elsevier, Oxford, PP: 3-25.
- Oliver, T., & Jenkins, T (2003). “**Sustaining rural landscapes: the role of integrated tourism**”, Landscape Research, Vol. 28(3), PP: 293-307.
- Pralong, J-P (2005). “**A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites method pour evaluation du potential et de utilization touristiques de sites geomorphologiques**”, Geomorphologie: relief, processes, environment. Vol. 3, PP: 189-196.
- Reynard, E (2008). “**Scientific research and tourist promotion of geomorphological heritage**”, Geogr, Fis. Dinam. Quat. Vol. 31, PP: 225-230.
- Ross, S., & Wall, G (1999). “**Ecotourism: towards congruence between theory and practice**”, Tourism Management, 20(1), 123-132.
- Rybar, p (2010). “**Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects**”, Acta Geotouristica, Vol. 1(2), PP: 13-21.
- Saleh, F., & J. Karwacki (1996). “**Revisiting the Ecotourism: The Case of Grasslands National Park**”. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 4(2), PP: 61-80.
- Saxena, G., Clark, G., Oliver, T., & Ilbery, B (2007). “**Conceptualizing integrated rural tourism**”. Tourism Geographies, Vol. 9(4), 347-370.
- Scheyvens, R (1999). “**Ecotourism and the empowerment of local communities**”, Tourism Management, Vol. 20(2), PP: 245-249.
- Serrano,E & Trueba,J (2005). “**Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Picos de Europa Park (Spain)**”, Geomorphologic: relief, processes , environment, 2005,Vol. 3, PP: 197-208.
- Swarbrooke, J (1999). “**Sustainable Tourism Management**”, UK, London: Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn.
- Western, D (1993). **Defining ecotourism in Within Ecotourism: a guide for planners and managers**, ed. by K. Lindberg and D. E. Hawkins. The Ecotourism Society: North Bennington, Vermont.
- Wimbledon, W.A (1998). “**Paleontological site conservation in Britain**”, Special paper in paleontology Vol. 40, PP: 41-55.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی