



## Temperature Hazards Assessment of Khuzestan Province

Mandana Amani <sup>a</sup>, Reza Borna <sup>b\*</sup>, Manijeh Zouhorian <sup>c</sup>

<sup>a</sup> Department of Geography, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

<sup>b</sup> Department of Geography, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

<sup>c</sup> Department of Geography, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

Received: 20 February 2021

Revised: 7 April 2021

Accepted: 9 May 2021

### Abstract

In this study, to evaluate the temperature hazards of Khuzestan province, first the matrix of maximum daily temperature data for the warm period of the year of the stations from May 15 to October 6 (156 days) for a total of 24 years (2013-2017) is equivalent to 3744 days was extracted. In order to distinguish hot, very hot, and super hot days, the average and long-term standard deviation of the total station data during the period of 3744 days were calculated and the standardized maximum daily temperature index was calculated for all stations. Days with an index anomaly of less than 1, between 1 to 1.5 and more than 1.5 were designated as hot, very hot and super hot days, respectively. The application of cluster analysis by cumulative stacking method on the temperature data matrix of 3744\*1144 and drawing a zoning map using (GIS), showed four temperature risk zones (low risk, medium risk, high risk, and very high risk) in the province: 1) Low risk area: with the northwest-southeast trend of the province, including mountainous and relatively highlands, which are located on the Zagros highlands at the eastern and northeastern extremities; 2) Medium risk zone: low altitude belt adjacent to Zagros mountain range in the southeast, East and North; 3) High-risk area: low-lying central, eastern and western lands of the province; 4) Very high-risk area: most of the central and western regions of Khuzestan.

**Keywords:** Environmental Hazards, Temperature, Indexing, Cluster Analysis

\*. Corresponding Author: Reza Borna E-mail: bornareza@iauhvaz.ac.ir Tel: + 989127930669

**How to cite this Article:** Amani, M., Borna, R., Zouhorian, M. (2021). Temperature Hazards Assessment of Khuzestan Province. *Journal of Geography and Environmental Hazards*, 10(4), 243-260.

doi: 10.22067/geoeh.2021.67887.1005



Journal of Geography and Environmental Hazards are fully compliant with open access mandates, by publishing its articles under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).



Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

# Geography and Environmental Hazards

Volume 10, Issue 4 - Number 40, Winter 2021

<https://geoeh.um.ac.ir>

<https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.67887.1005>

جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دهم، شماره چهارم، زمستان ۱۴۰۰ صص ۲۴۵-۲۲۹

مقاله پژوهشی

## ارزیابی مخاطرات دمایی استان خوزستان

ماندانا امانی - دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

رضا برنا<sup>۱</sup> - دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

منیژه ظهوریان - استادیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۲/۲ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۱/۱۸ تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۲/۱۹

### چکیده

استان خوزستان با داشتن پتانسیل‌های بالای طبیعی و انسانی، چالش‌های محیطی بسیاری پیش روی دارد که مخاطرات اقلیمی و پیامدهای آن چون امواج گرمایی، خشکسالی، سیل و ... از مهم‌ترین مظاهر آن است. در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از داده‌های دمای سالانه ۱۱ ایستگاه استان طی دوره زمانی ۲۵ ساله (۲۰۱۷-۱۹۹۳) مخاطرات دمایی خوزستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دمای حداکثر روزانه دوره گرم ایستگاه‌های استان از ۱۵ اردیبهشت‌ماه (۵ می) تا ۱۵ مهرماه (۵ اکتبر) طی یک دوره ۱۵۶ روزه برای هرسال و مجموعاً برای ۲۴ سال معادل روز  $3744 = (24 * 156)$  برای هر ایستگاه استخراج شد و ماتریس داده‌های خام دمای حداکثر روزانه آماده‌سازی شد. در ادامه جهت تشخیص روزهای گرم، خیلی گرم و ابر گرم، میانگین و انحراف معیار بلندمدت داده‌های کل ایستگاه‌ها طی دوره ۳۷۴۴ روزه محاسبه و شاخص استاندارد شده دمای حداکثر روزانه برای همه ایستگاه‌ها محاسبه گردید. روزهای با ناهنجاری مثبت شاخص بیش از ۱/۵ تحت عنوان روزهای ابر گرم (بیش از ۴۸/۳ درجه)، روزهای با ناهنجاری شاخص بین ۱ تا ۱/۵ تحت عنوان روزهای خیلی گرم (۴۶/۶ تا ۴۸/۳ درجه) و روزهای با ناهنجاری شاخص کمتر از ۱ تحت عنوان روزهای گرم (۴۳/۲۸ تا ۴۶/۶) تعیین شد. در ادامه اعمال تحلیل خوشه‌ای به روش پایگانی انباشتی بر روی ماتریس داده‌های دمایی ۱۱ \* ۳۷۴۴ و ترسیم نقشه پهنه‌بندی با استفاده از (GIS)، چهار پهنه مخاطره‌آمیز دمایی (کم مخاطره، مخاطره متوسط، پرمخاطره و بسیار پرمخاطره) را در استان

Email: bornareza@iauahvaz.ac.ir

۱ نویسنده مسئول: ۰۹۱۲۷۹۳۰۶۶۹

نحوه ارجاع به این مقاله:

امانی، ماندانا؛ برنا، رضا؛ ظهوریان، منیژه؛ ۱۴۰۰. ارزیابی مخاطرات دمایی استان خوزستان. جغرافیا و مخاطرات

<https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.67887.1005>

محیطی. ۱۰(۴). صص ۲۴۵-۲۲۹

آشکار نمود. الف) ناحیه کم مخاطره: با روند شمالغربی - جنوبشرقی استان شامل سرزمین‌های کوهستانی و نسبتاً مرتفع که بر روی ارتفاعات زاگرس در منتهی‌الیه شرق و شمالشرقی؛ ب) ناحیه متوسط مخاطره: شامل کمربند کم ارتفاع مجاور رشته‌کوه زاگرس در جنوبشرق؛ شرق و شمالی؛ ج) ناحیه زیاد مخاطره: در برگیرنده سرزمین‌های کم ارتفاع مرکزی، شرقی و غربی استان؛ د) ناحیه پرمخاطره: که بیشتر مناطق مرکزی و غربی خوزستان را در بر می‌گیرد.

**کلیدواژه‌ها:** مخاطرات محیطی، دما، شاخص سازی، تحلیل خوشه‌ای.

#### ۱- مقدمه

زیر بنای مدیریت بحران و سوانح طبیعی بر پیش‌آگاهی قبل از وقوع رخداد بنا نهاده شده است. اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش ریسک مخاطرات اقلیمی همواره مورد توجه بوده است. هر ساله مخاطرات مختلفی در ایران رخ می‌دهد. مخاطرات اقلیمی بر اساس چشم‌اندازهای جغرافیایی هر منطقه از کشور، با ریسک مالی و جانی خاصی همراه می‌باشند. در منطقه جنوب غرب ایران (خوزستان) با توجه به موقعیت جغرافیایی و چشم‌انداز طبیعی منطقه، مخاطرات دمایی بیشتر خودنمایی می‌کنند.

دما به عنوان یکی از بارزترین و مهم‌ترین عناصر آب‌وهوایی است که پدیده‌های دیگر محیطی، خصوصاً عوامل مؤثر در فعالیت‌های انسانی را کنترل می‌کند و خود نیز در کنترل عوامل دیگر مانند ارتفاع از سطح دریا است. دما به عنوان یک پارامتر ترمودینامیک و مهم جوی منشأ بسیاری از تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیست‌محیطی و اقلیمی است. بررسی روند رخداد امواج گرمایی به عنوان نمادی از مخاطرات جوی، همزمان با گرمایش جهانی، از چالش‌های زیست‌محیطی قرن حاضر است. به دلیل اهمیت و تأثیر دما بر شرایط محیطی و زیستی و نیز نقش آن در ایجاد و تنوع زیست‌بوم‌ها و کنترل شرایط مطلوب حیات، بررسی تغییرات رفتاری آن در بازه‌های زمانی طولانی مدت (روند) و کوتاه مدت (فازها و چرخه‌ها) ضروری است.

در مورد مخاطرات دمایی در ایران و جهان پژوهش‌های متعددی انجام شده است. اسمعیل نژاد و همکاران (۱۳۹۲) در بررسی شناسایی امواج گرم ایران مشخص کردند که در مرکز و جنوب ایران رخداد امواج گرم زیاد است. آن‌ها همچنین نمودند که روند افزایشی در رخداد موج‌های گرمایی در ایران وجود دارد. مجرد و همکاران (۱۳۹۴) با بررسی امواج گرمایی بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد در غرب ایران مشخص کردند که شکل‌گیری فشار حرارتی در سطح زمین در جنوب غرب ایران و مکش هوا گرم بیابان‌های عربستان موجب رخداد گرمایی شده است. فرج زاده (۱۳۹۳) مخاطرات اقلیمی ایران و توزیع زمانی - مکانی آن‌ها را در ایران مشخص نمود. نتایج نشان داد که سوزبادها و امواج گرمایی جزو مخاطرات عمد اقلیمی در مناطق نیمه شرقی کشور محسوب می‌شود. برنا و رضایی (۱۳۹۵) ضمن ارزیابی و تحلیل رویدادهای حدی آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از روش من‌کنندال

یافتند که تعداد روزهای بالای ۳۰ درجه سانتی گراد در همه ایستگاه‌ها روندی افزایشی دارد. روزهای با حداقل دمای ۲۱ درجه سانتی گراد در مناطق جنوبی استان روند افزایشی دارد، اما بخش شمالی بدون روند و بخش شرقی دارای روندی منفی است. میانگین دمای سالانه در جنوب و شرق استان روند افزایشی دارد، اما در شمال استان بدون روند است. اعتمادیان و دوستان (۱۳۹۶) ضمن تحلیل فضایی امواج گرمایی ایران یافتند که بیشینه آستانه دما در نیمه جنوبی و کمینه در نیمه شمالی و نقش ارتفاعات چشمگیر است، اما بیشترین امواج گرمایی ایران در نیمه غربی و به سمت شرق کاهش دارند. از منطقه کوهپایه داخلی ایران به سمت شمال و جنوب کشور (سواحل) و مناطق مرکزی، این پدیده اقلیمی کاهش دارد. سری‌های زمانی نشان می‌دهد، مجموع فراوانی دهه‌ای امواج گرما در تمام ماه‌ها روند افزایشی داشته است، با این تفاوت که ماه‌های دوره سرد سال روند افزایشی معنادارتری و دوره گرم سال معناداری کمتری دارند. فلات ایران طی دهه ۲۰۰۰ بیشترین فراوانی امواج گرما را نسبت به دو دهه دیگر تجربه کرده است. دوستکامیان و همکاران (۱۳۹۶) در واکاوی و شناسایی تغییرات مکانی پهنه‌های گرم و سرد دمایی ایران یافتند که پهنه‌های گرمای دمایی ایران به سمت دوره‌های اخیر علاوه بر اینکه به لحاظ گستره مکانی به سمت عرض‌های بالاتر (به سمت عرض‌های شمالی و تقریباً ۳/۲ درصد) کشیده شده است نسبت به دوره‌های اخیر ۱/۳ درجه سانتی‌گراد افزایش داشته است. رضایی و همکاران (۱۳۹۷) ضمن تعیین آستانه دمایی موج گرما طی دوره گرم سال بر اساس شاخص‌های جهانی در مناطق مختلف کشور یافتند که مقادیر آستانه دمایی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف کشور در دوره گرم سال یکسان نیست و از رنج متفاوتی برخوردار است. در ماه‌های آوریل، می و سپتامبر، این آستانه از تفاوت مکانی بیشتر و در ماه‌های ژوئن و جولای و آگوست تقریباً از یکنواختی نسبی برخوردار است که علت آن را می‌توان وجود پرفشار جنب‌حاره‌ای آזור دانست که تمام ایران را تا جنوب کوه‌های البرز تحت استیلای خود در می‌آورد و از جهتی وجود این پدیده باعث می‌شود که نقش عوامل محلی مانند ارتفاعات، عرض جغرافیایی در مقدار آستانه دمایی در این ماه‌ها چندان محسوس نباشد و آستانه دمایی از یکپارچگی نسبی برخوردار باشد. بالاترین آستانه دمایی موج گرما در دوره گرم سال مربوط به استان خوزستان و کمترین آستانه مربوط به قسمت‌های از نوار شمالی و شمال غرب کشور است. یاراحمدی و همکاران (۱۳۹۸) در تحلیل آماری بی‌هنجاری‌های دمای حداقل و حداکثر ایران در دوره سرد سال به‌منظور درک اثر تغییر اقلیم بر مناطق مختلف ایران نشان دادند که کمترین میانگین دمای حداقل پاییز (اکتبر، نوامبر، دسامبر) و زمستان (ژانویه، فوریه، مارس) در نیمه غربی و بیشترین آن در نیمه جنوبی رخ داده است. کمترین ضریب تغییرات دمای حداقل پاییز در سواحل شمالی و جنوبی، در زمستان سواحل شمالی و جنوبی و قسمت‌های شرق مشاهده می‌شود. همچنین کمترین دمای حداکثر در پاییز در شمال غرب و غرب و در زمستان در شمال و شمال غرب رخ داده است. بیشترین دمای حداکثر در دو دوره در نیمه جنوبی ثبت شده است که با کمترین ضریب تغییرات هماهنگ است.


راستکاجی (۲۰۱۶) تغییرات موج‌های گرما و دماهای گرم حدی در آرژانتین را بررسی کرد. نتایج نشان داد که امواج گرمایی یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی می‌باشد و هر ساله بر فراوانی و شدت آن افزوده می‌شود. سچرنی و همکاران (۲۰۱۶) در مطالعه‌ای به بررسی امواج گرمایی و سرمای در سراسر آمریکای جنوبی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بسامد و شدت دوره‌های گرم بخصوص در ۱۰ سال اخیر افزایش یافته است؛ اما تغییرات قابل توجهی در امواج سرمای ایجاد نشده است. شی و همکاران (۲۰۱۶) توزیع زمانی - مکانی رخداد‌های اقلیمی پرتکرار را بررسی کردند. ایشان یافتند که با توجه به تغییرات اقلیمی رخداد دماهای گرم و سرد بیشتر می‌شود و انجام راهکارهای مدیریتی و سازگارانه حائز اهمیت می‌باشد. لاتکا و همکاران (۲۰۱۷) امواج گرمایی را از طریق سناریوها تغییر اقلیم در اروپا بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که تحت شرایط تغییر اقلیم جهانی فراوانی رخدادها گرمایی و مخاطرات دمایی در حال افزایش است.

از آنجاکه هر نوع برنامه‌ریزی اعم از مدیریت بحران بلایای طبیعی (سیل، یخبندان و...)، پیش‌بینی‌های جوی و نیز توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشور نیازمند شناخت دقیق توان‌های محیطی و از جمله پارامترهای اقلیمی و سیستم‌های ایجاد کننده آن می‌باشد، بررسی مخاطرات دمایی به‌عنوان یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار اقلیمی، ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌ای و محلی باشد.

استان خوزستان به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و نیز تنوع محیطی در ساختارهای ارتفاعی و ناهمواری، زمین‌شناسی و هیدرولوژیکی، مستعد رخداد‌های حدی جوی مانند توفان‌های تندری، سیل، خشکسالی، بادهای شدید، توفان‌های گردوغبار و امواج گرمایی و ... است که خسارات جانی و مالی و در پی آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را باعث شده است. از سوی دیگر با توجه به ویژگی‌های ممتازی چون تراکم جمعیت بالا، وسعت زیاد، تنوع آب و هوایی و داشتن توان‌های محیطی قابل بهره‌برداری بسیار در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و توریستی و نیز موقعیت‌های جدید آمایش فضای سرزمینی، بررسی و شناخت دقیق پتانسیل‌های اقلیمی از جمله دما جهت برنامه‌ریزی‌های محلی - منطقه‌ای را لازم و ضروری می‌سازد. بر این اساس در پژوهش حاضر با استفاده از روش شاخص سازی، ناهنجاری‌های مثبت دمای حداکثر در گستره فضایی خوزستان مورد واکاوی قرار می‌گرفت و پهنه‌های مخاطره‌آمیز دمایی استان شناسایی گردید تا جهت توسعه همه‌جانبه استان مورد بهره‌برداری برنامه ریزان قرار گیرد. نتایج پژوهش پیشرو در تنظیم برنامه‌های زمانی برای اجرای سیاست‌های کلان انرژی، مدیریت مصر سوخت، گردشگری و سایر سازمان‌های برنامه‌ریزی و مدیریت کشور به‌منظور کاهش مخاطرات مؤثر خواهد بود.

## ۲- داده‌ها و روش شناسی

در این پژوهش به منظور پهنه‌بندی مخاطرات دمایی در استان خوزستان، داده‌های بارش ماهانه ۱۱ ایستگاه سینوپتیک منطقه در یک دوره زمانی ۲۵ ساله (۱۹۹۳-۲۰۱۷) مورد بررسی قرار گرفت شکل ۱. در ادامه به منظور آماده‌سازی و تحلیل داده‌ها مراحل زیر انجام گرفت.



شکل ۱- ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان

- ۱- داده‌های دمای حداکثر روزانه یازده ایستگاه استخراج شد (۱۹۹۳-۲۰۱۵) و نبود و مفقودی داده‌ها از طریق روش‌های آماری میانگین و ... بازسازی گردید و صحت داده‌ها کنترل شد.
- ۲- به دلیل مشاهده دمای ۴۰ درجه از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه در ایستگاه‌های استان خوزستان و نیز کارکردن بر روی مقادیر فرین دما، دمای حداکثر روزانه دوره گرم ایستگاه‌های استان از ۱۵ اردیبهشت‌ماه (۵ می) تا ۱۵ مهرماه (۵ اکتبر) طی یک دوره ۱۵۶ روزه برای هر سال و مجموعاً برای ۲۴ سال معادل روز  $3744 = 156 * 24$  برای هر ایستگاه استخراج شد و ماتریس داده‌های خام دمای حداکثر روزانه آماده‌سازی شد.
- ۳- در ادامه جهت تفکیک و تشخیص روزهای گرم، خیلی گرم و آبر گرم از مشخصات گرایش به مرکز و پراکندگی داده‌ها بر اساس رابطه زیر استفاده شده است.

$$D_{sh} = \sum T_{max} + \delta T_{max} \quad \text{رابطه ۱-}$$

Dsh عبارت است از روز ابرگرم

$\Sigma T_{max}$  عبارت است از میانگین دماهای حداکثر کل ایستگاه‌های مورد مطالعه برای ۳۷۴۴ روز

$\delta_{Tmax}$  عبارت است از انحراف معیار بلندمدت (دوره ۳۷۴۴ روزه) داده‌های دمای حداکثر کل ایستگاه‌ها

۴- در ادامه ابتدا میانگین دمای حداکثر ایستگاه‌های استان برای هرروز تقویمی محاسبه شد. برای تشخیص روز ابرگرم، میانگین و انحراف معیار بلندمدت داده‌های دمای حداکثر کل ایستگاه‌ها طی دوره ۳۷۴۴ روزه محاسبه شد. بر این اساس روز گرم و خیلی گرم به روزهای حاصل جمع میانگین بلندمدت (۴۳/۲۶) و انحراف معیار بلندمدت (۳/۳۷) دمای حداکثر کل ایستگاه‌ها طی دوره ۳۷۴۴ روزه گفته می‌شود ( $43/26 + 3/37 = 46/63$ ) و عدد آستانه  $46/63$  به عنوان ملاک رخداد روز گرم و خیلی گرم در هر یک از ایستگاه‌های استان مورد استفاده قرار گرفت.

۵- نهایتاً شاخص استاندارد شده دمای حداکثر روزانه برای همه ایستگاه‌های استان محاسبه گردید. روزهای با ناهنجاری مثبت شاخص استاندارد بیش از ۱/۵ تحت عنوان روزهای آبرگرم (بیش از  $48/3$  درجه)، روزهای ناهنجاری مثبت شاخص استاندارد بین ۱ تا ۱/۵ تحت عنوان روزهای خیلی گرم ( $46/6$  تا  $48/3$  درجه) و روزهای با ناهنجاری مثبت شاخص استاندارد کمتر از ۱ تحت عنوان روزهای گرم ( $43/28$  تا  $46/6$ ) نام‌گذاری شدند.


۶- نقشه‌های پهنه‌بندی روزهای گرم، خیلی گرم و آبرگرم استان خوزستان به عنوان یکی از مخاطرات اقلیمی مهم ترسیم و تفسیر گردید. برای پهنه‌بندی استان از نظر مخاطرات دمایی تحلیل خوشه‌ای به روش پایگانی انباشتی بر روی ماتریس داده‌های دمایی ۱۱\*۳۷۴۴ انجام شد و با استفاده از قابلیت‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) چهار پهنه مخاطره‌آمیز دمایی (کم مخاطره، دارای مخاطره متوسط، پرمخاطره و بسیار پرمخاطره) در استان شناسایی و مورد تحلیل فضایی و مکانی قرار گرفت.

## ۲-۱- موقعیت منطقه مطالعاتی

استان خوزستان از نظر آب‌وهوایی در یک منطقه حد واسطه (بین ارتفاعات زاگرس در شرق و شمال، بیابان عربستان و دریای سرخ در جنوب غربی و خلیج فارس در جنوب) قرار گرفته است. استان خوزستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی یعنی موقعیتش در منطقه حاره یا کمربند پرفشار جنب حاره، در طول سال مورد هجوم توده‌های هوایی و سامانه‌های سینوپتیکی با منشأ مختلف و خصوصیات فیزیکی گوناگون قرار می‌گیرد که با ورود به منطقه، موجب تنوع و تغییر در عناصر آب و هوایی استان از جمله دما می‌گردند. استان خوزستان با مساحت  $64000$  کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران در محدوده عرض‌های جغرافیایی  $30$  تا  $33$  درجه شمالی و طول‌های جغرافیایی  $47$  تا  $50$  درجه شرقی در جوار خلیج فارس و اروندرود قرار دارد. شهر اهواز مرکز استان خوزستان است. خوزستان از شمال به استان لرستان، از شمال شرقی و شرق به استان چهارمحال و بختیاری، از شمال غربی به استان ایلام، از شرق و جنوب شرقی به استان کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود می‌شود.



این استان با ۴ درصد از وسعت ایران وسیع ترین استان در بخش نیمه غربی کشور است. مناطق کوهستانی استان غالباً در بخش های شرقی و شمالی متمرکزند و مناطق غربی و جنوبی استان را عموماً دشت ها و جلگه ها می پوشانند شکل ۲.



شکل ۲- موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

استان خوزستان به لحاظ وسعت زیاد (۴ درصد مساحت کشور) از شرایط آب و هوایی متنوعی برخوردار است. قسمت های جنوبی و غربی استان، نیمه خشک با زمستان های ملایم و تابستان های گرم و طولانی است. در حالی که بخش های شمالی و مناطق کوهستانی دارای زمستان های سرد و تابستان های ملایم می باشند. استان خوزستان تحت تأثیر کم فشارهای باران زای مدیترانه ای و در بخش جنوبی متأثر از کم فشارهای سودانی و دریای سرخ است که از اواسط مهرماه تا اواخر اردیبهشت به تناوب از منطقه عبور می نمایند (استان شناسی خوزستان، ۱۳۹۰: ۱۲).

میانگین بارندگی در جنوب غربی استان کمتر از ۱۵۰ میلی متر، ناحیه اهواز بیش از ۲۰۰ میلی متر، دامنه های شمالی مانند دزفول و مسجد سلیمان بیش از ۳۰۰ میلی متر و به طرف ارتفاعات شمال شرقی استان به تدریج افزایش یافته و تقریباً به ۱۰۰۰ میلی متر می رسد. خوزستان از نظر دمایی گرم است میانگین درجه حرارت آن در تیرماه حدود ۳۰ درجه سانتی گراد و در دی ماه حدود ۱۰ درجه سانتی گراد است (قاسمی و همکاران، ۱۳۸۳).

#### ۴- نتایج و بحث


دما به عنوان یک پارامتر ترمودینامیک و مهم جوی منشأ بسیاری از تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی و اقلیمی است. روند رخداد مخاطرات دمایی به عنوان نمادی از مخاطرات جوی، همزمان با گرمایش جهانی، یکی از چالش های زیست محیطی قرن حاضر است. در همین راستا جهت ارزیابی مخاطرات دمایی استان خوزستان ابتدا روزهای گرم و مقادیر حدی دما در ایستگاه های منتخب استان خوزستان محاسبه و استخراج گردید



جدول ۱- محاسبات روزهای گرم و مقادیر حدی دما در ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان


		abadan	ahwaz	bandarma	behbahan	bostan	dezful	izeh	masjedso	omidiyeh	ramhormo	shoshtar
	49-50	156	102	48	22	115	54	0	36	147	83	91
	48-49	271	251	118	69	227	117	0	66	200	199	165
	47-48	416	364	215	144	358	249	2	163	375	298	324
	46-47	440	482	326	302	394	387	11	297	469	470	474
	45-46	462	486	446	384	409	502	59	455	483	501	500
	44-45	388	421	421	409	436	404	139	439	456	448	423
	43-44	405	367	400	474	339	369	219	435	367	400	353
	42-43	282	323	359	457	359	277	390	392	334	347	305
	41-42	249	237	319	397	274	275	452	325	249	259	293
	40-41	168	203	303	296	197	217	435	288	210	211	208
	39-40	127	152	235	238	163	199	384	217	140	157	183
دمای بیش از 48/3	S s max > 1.5	459	347	161	79	364	177	0	104	378	269	255
دمای بین 48/3 تا 46/6	S s max 1-1.5	758	714	443	366	671	521	8	368	704	650	648
دمای بیو 43/28 تا 46/6	S s max 0-1	882	1063	1116	1266	1001	1037	378	1354	1024	1207	1023

بررسی دسته‌بندی دمای حداکثر ایستگاه‌های ۱۱ گانه منتخب خوزستان برای دماهای بیش از ۴۰ درجه تا بالای ۵۰ درجه در جدول ۱ نشان داد که ایستگاه‌های جنوبی و غربی استان از شرایط دمایی سخت‌تری برخوردار هستند. مجموع رخداد‌های دماهای فرین در ایستگاه‌های آبادان، اهواز، بستان و امیدیه بیشتر از سایر ایستگاه‌ها است. ایستگاه‌های شرقی و شمالی از شرایط متعادل‌تری برخوردار هستند. با توجه به جدول بالا می‌توان نتیجه گرفت که ایستگاه ایذه خنک‌ترین و ایستگاه آبادان گرم‌ترین بوده‌اند.




شکل ۳- تعداد روزهای با دمای ۴۵-۴۶ درجه در ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان

بررسی تعداد روزهای با دمای ۴۵-۴۶ درجه در ایستگاه‌های منتخب خوزستان آشکار نمود که رکورددار این آستانه دمایی ایستگاه‌های دزفول، شوشتر و رامهرمز با بیش از ۵۰۰ روز دمای ۴۵-۴۶ درجه می‌باشند. ایستگاه ایذه با ۵۹ روز کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است شکل ۳.



شکل ۴- تعداد روزهای با دمای ۴۶-۴۷ درجه در ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان


بررسی شکل ۴ نشان داد که تعداد روزهای با آستانه دمای ۴۶-۴۷ درجه در ایستگاه‌های اهواز، شوشتر، امیدیه و رامهرمز بیش از ۴۷۰ روز می‌باشد. ایستگاه‌های مرتفع استان شامل ایذه، مسجدسلیمان، بهبهان و ایستگاه ماهشهر به دلیل نزدیکی به دریا و تأثیر عامل رطوبتی تعداد روزهای کمتری را تجربه کرده‌اند. ایستگاه ایذه با ۱۱ روز کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است. در این آستانه دمایی نسبت به دماهای کمتر از ۴۶ درجه تفاوت کمی و کیفی بیشتری مشاهده می‌شود؛ به عبارت دیگر از تجانس و همگنی دمایی میان ایستگاه‌های استان خوزستان کاسته شده است.



شکل ۵- تعداد روزهای با دمای ۴۷-۴۸ درجه در ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان


بررسی شکل ۵ نشان داد که با رسیدن به دماهای بالای ۴۷ درجه تفاوت نسبتاً زیادی میان ایستگاه‌های خوزستان مشاهده می‌شود به عبارتی تفاوت‌های کمی آشکارتر می‌شوند به گونه‌ای که آبادان با ۴۱۶ روز بیشترین و ایذه با ۲ روز کمترین مقادیر را به خود اختصاص داده‌اند. ایستگاه‌های بهبهان، دزفول و مسجدسلیمان را با کمتر از ۲۵۰ روز به

دلیل واقع شدن در پای کوه‌های زاگرس را می‌توان در یک گروه قرار داد. ایستگاه ماهشهر هم به واسطه ساحلی بودن و قرار گرفتن در محدوده نفوذ و تأثیرپذیری رطوبت خلیج فارس حدود ۲۲۰ روز دمای ۴۸-۴۷ درجه دارد.




شکل ۶- تعداد روزهای با دمای ۴۹-۴۸ درجه در ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان

بررسی شکل ۶ آشکار می‌سازد که در آستانه دمایی ۴۹-۴۸ درجه، ایستگاه‌های جنوب‌غربی استان شامل آبادان و اهواز با بیش از ۲۵۰ روز و بستان با بیشتر از ۲۲۵ روز، گرم‌ترین شرایط را داشته‌اند. ایستگاه‌های شوشتر، امیدیه و رامهرمز با کمتر از ۲۰۰ روز در جایگاه بعدی قرار دارند. ایستگاه‌های ماهشهر و دزفول با کمتر از ۱۲۰ روز در رتبه سوم قرار می‌گیرند. در ایستگاه‌های واقع در پای کوه‌های زاگرس شامل بهبهان و مسجدسلیمان کاهش محسوسی در شرایط دمایی مشاهده می‌شود به گونه‌ای که کمتر از ۷۵ روز این آستانه دمایی را تجربه کرده‌اند. در ایستگاه ایذه در طول دوره آماری دمای بالای ۴۰ درجه را مشاهده نشده است. به نظر می‌رسد در این آستانه دمایی بیشترین ناهمگونی در ایستگاه‌های استان دیده می‌شود.



شکل ۷- تعداد روزهای با دمای ۵۰-۴۹ درجه در ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان


با رسیدن به آستانه دمایی ۵۰-۴۹ درجه تغییرات محسوسی در گروه‌بندی ایستگاه‌های استان مشاهده می‌شود. ایستگاه‌های آبادان و امیدیه در جنوب‌غرب و جنوب‌شرق استان با بیش از ۱۴۰ روز گرم‌ترین شرایط را داشته‌اند. ایستگاه‌های اهواز و بستان با بیشتر از ۱۰۰ روز در جایگاه بعدی قرار دارند. ایستگاه‌های ماهشهر و دزفول با کمتر از ۶۰ روز در رتبه سوم قرار می‌گیرند. ایستگاه‌های واقع در پای کوه‌های زاگرس شامل بهبهان و مسجدسلیمان کاهش محسوسی در این آستانه دمایی دارند؛ به‌گونه‌ای که کمتر از ۴۰ روز دمایی ۵۰-۴۹ درجه را تجربه کرده‌اند شکل ۷.




شکل ۸- تعداد روزهای با دمایی بیش از ۵۰ درجه در ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان

بررسی شکل ۸ آشکار می‌سازد که در آستانه دمایی بیش از ۵۰ درجه ایستگاه آبادان با ۷۸ روز رکورددار گرم‌ترین منطقه استان است. ایستگاه‌های بستان و امیدیه با بیش از ۵۰ روز در جایگاه دوم قرار دارند. ایستگاه‌های مسجدسلیمان، ماهشهر و دزفول با کمتر از ۱۲۰ روز در رتبه بعدی قرار می‌گیرند.

بررسی شکل ۹ آشکار نمود که طی دوره آماری خنک‌ترین ایستگاه استان ایذه است. ایستگاه آبادان علی‌رغم گرم بودن دمایی بالای ۵۲ درجه را تجربه نکرده است. ایستگاه‌های شوشتر، بستان و امیدیه دمایی بالای ۵۲ درجه را تجربه نموده‌اند.




شکل ۹- دمای حداکثر مشاهده شده در ایستگاه‌های منتخب در دوره آماری (۱۹۹۳-۲۰۱۵)




شکل ۱۰- فراوانی تعداد روزهای گرم ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان در آستانه‌های مختلف

بررسی شکل ۱۰ نشان می‌دهد که در میان روزهای بالاتر از ۴۰ درجه، بیشترین فراوانی مشاهده شده در ایستگاه‌های خوزستان متعلق به آستانه‌های دمایی ۴۶-۴۵ درجه و ۴۷-۴۶ درجه است. با رفتن به دماهای بالاتر و پایین‌تر از فراوانی تعداد روزها کاسته می‌شود. تحلیل نقشه روزهای با ناهنجاری مثبت شاخص استاندارد کمتر از ۱، تحت عنوان روزهای گرم (دمای ۴۳/۲۸ تا ۴۶/۶ درجه) استان خوزستان چهار پهنه با پراکندگی فضایی و مساحت متفاوت را نشان داد. بخش کوچکی از استان شامل شهرستان‌های بهبهان و مسجدسلیمان در گروه خیلی زیاد قرار گرفته‌اند. شرق استان شامل شهرستان‌های ایذه، اندیکا و باغملک در گروه کم و متوسط می‌باشند. باقیمانده مساحت استان در گروه زیاد واقع شده است. در آستانه دمایی گرم به جز بخش‌های پایکوهی و کمی ناهموار استان، باقیمانده رفتار نسبت همگونی را نشان می‌دهد شکل‌های ۱۱ و ۱۲.




شکل ۱۱- تعداد روزهای با ناهنجاری مثبت شاخص استاندارد کمتر از ۱، تحت عنوان روزهای گرم (دمای ۴۳/۲۸ تا ۴۶/۶ درجه) استان خوزستان



شکل ۱۲- نقشه روزهای با ناهنجاری مثبت شاخص استاندارد کمتر از ۱، با عنوان روزهای گرم (دمای ۴۳/۲۸ تا ۴۶/۶ درجه) استان خوزستان


بررسی شکل ۱۳ ترسیم نقشه روزهایی که ناهنجاری مثبت شاخص استاندارد آن‌ها بین ۱ تا ۱/۵ انحراف معیار بالاتر از میانگین بود و تحت عنوان روزهای خیلی گرم (۴۶/۶ تا ۴۸/۳ درجه) نام گذاری شده‌اند پنج پهنه مخاطره خیز دمایی با پراکندگی فضایی و گستردگی مکانی متفاوت را در استان خوزستان آشکار نمود. بر این اساس بخش کوچکی از استان شامل شهرستان‌های آبادان و اهواز در گروه خیلی زیاد قرار گرفته‌اند. مناطقی از شرق و شمال‌شرق، جنوب‌شرق (بهبهان) بخشی از جنوب (ماهشهر) در گروه متوسط می‌باشند. مناطق پیرامونی ایذه در آستانه مخاطره ای کم و خیلی کم قرار گرفته است. باقیمانده مساحت استان در گروه زیاد واقع شده است. در آستانه دمایی خیلی گرم تأثیر عامل ناهمواری، دوری و نزدیکی به دریا و عرض جغرافیایی در رفتار مکانی کاملاً محسوس است.



شکل ۱۳- نقشه روزهای ناهنجاری مثبت شاخص استاندارد بین ۱ تا ۱/۵ با عنوان روزهای خیلی گرم (۴۶/۶ تا ۴۸/۳ درجه) استان خوزستان







شکل ۱۵- نقشه پهنه‌بندی مخاطرات دمایی استان خوزستان بر اساس روش تحلیل خوشه‌ای

بررسی شکل ۱۵ نقشه پهنه‌بندی مخاطرات دمایی در استان خوزستان چهار پهنه مخاطره‌آمیز را در قالب چهار رده کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد نشان می‌دهد.

کم مخاطره: این ناحیه با روند شمال‌غربی - جنوب‌شرقی در منتهی‌الیه شرق و شمال‌شرقی استان (مجاور چهارمحال) مشاهده می‌شود. این ناحیه دمایی را می‌توان نماینده مناطق کوهستانی استان بشمار آورد که سرزمین‌های کوهستانی و نسبتاً مرتفع، شامل شهرستان‌های لالی، اندیکا، باغملک و ایذه در شرق و شمال شرقی استان بر روی ارتفاعات زاگرس گسترش یافته است.

متوسط مخاطره: این ناحیه شامل کمربند کم ارتفاع مجاور رشته‌کوه زاگرس در جنوب‌شرق؛ شرق و شمال استان شامل شهرستان‌های، امیدیه، رامهرمز، مسجدسلیمان، اندیمشک، دزفول، بهبهان، رامشیر، هندیجان و شهرستان ساحلی ماهشهر است. این ناحیه را می‌توان نماینده مناطق پایکوهی استان بشمار آورد.

زیاد مخاطره: این ناحیه را می‌توان نماینده سرزمین‌های کم‌ارتفاع استان دانست که شامل شهرستان‌های هفتگل، رامهرمز، گتوند در مرکز و شرق و شهرستان‌های شوش، دشت آزادگان و هویزه در غرب استان است.

بسیار پرمخاطره: بیشترین مخاطرات دمایی در بخش مرکزی و غربی استان به وقوع پیوسته است. ناحیه بسیار پرمخاطره در شهرستان‌های مرکزی و جنوب‌غربی شامل، آبادان، خرمشهر، اهواز، شادگان، کارون، حمیدیه و باوی گسترش یافته است.

در حقیقت این ناحیه را باید بخش حاره‌ای استان به شمار آورد. کمبود ابر، جو سرشار از رطوبت و بادهای گرم جنوبی از علل گرمی شدید هوا در این ناحیه است. در بخش‌های جنوبی رطوبت جوی حاصل از خلیج فارس نیز در دمای این ناحیه مؤثر است.

#### ۵- جمع‌بندی

بررسی مخاطره‌آمیزی دمای استان خوزستان آشکار نمود که وقوع مخاطرات دمایی یکی از ویژگی‌های بارز مناطق خشک و خوزستان می‌باشد که تحت تأثیر عوامل جغرافیایی مانند همسایگی با توده آبی خلیج فارس، عرض جغرافیایی متغیر و پراکندگی ناهمواری و نیز ناهمگونی سامانه‌های فشار ورودی در فصول مختلف از تنوع مکانی نسبتاً بالایی برخوردار است. بررسی نمودارها و نقشه‌های حاصل نشان داد که با رسیدن به آستانه‌های دمایی بالاتر رفتار فضایی و مکانی پهنه‌های هم مخاطره ناهمگونی بیشتری را آشکار می‌سازند. کم مخاطره‌ترین پهنه دمایی استان با روند شمالغربی - جنوبشرقی در منتهی‌الیه شرق و شمالشرقی استان (مجاور چهارمحال) بر روی ارتفاعات زاگرس گسترش یافته است و پر مخاطره‌ترین پهنه دمایی خوزستان در شهرستان‌هایی مرکزی و جنوبغربی استان شامل، آبادان، خرمشهر، اهواز، شادگان، کارون، حمیدیه و باوی مشاهده می‌شود. نتایج این تحقیق دلالت بر این حقیقت علمی دارد که جهت ساخت و تحلیل دقیق‌تر مخاطرات دمایی استان خوزستان باید از شاخص‌های مختلف استفاده کرد؛ زیرا این شاخص‌ها مکمل همدیگر هستند و تنها با استفاده از یک شاخص نمی‌توان به نتایج دقیقی در این زمینه دست یافت.

#### کتابنامه

- استان‌شناسی خوزستان؛ ۱۳۹۹. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی. چاپ ۱۳۹۹.
- اسمعیل نژاد مرتضی؛ خسروی، محمود؛ علیجانی بهلول، مسعودیان، سیدابوالفضل؛ ۱۳۹۲. شناسایی امواج گرم ایران. مجله جغرافیا و توسعه. زمستان. دوره ۱۱ شماره پیاپی ۳۳ از صفحه ۳۹ تا صفحه ۵۳.
- اعتمادیان، الهه؛ دوستان، رضا؛ ۱۳۹۶. تحلیل فضایی امواج گرمایی ایران. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی. سال چهارم. شماره ۱. صص ۱۷-۳۲.
- باغقیده، محمد؛ احمدی، حمزه؛ صفرزایی، نعمت الهه؛ ۱۳۹۵. ارزیابی مخاطرات دمایی منطقه جنوب شرق ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی امداد و نجات. سال هشتم. شماره ۴. صص ۱۶-۱.
- برنا، رضا؛ حسن‌زاده شاه رضایی، الناز؛ ۱۳۹۵. ارزیابی و تحلیل رویدادهای حدی آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از روش من‌کنندال. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای). دوره ۶. شماره ۳ - شماره پیاپی ۲۳. صفحه ۷-۱۸.
- دوستکامیان، مهدی؛ حقیقی، اسماعیل؛ بور بوری، رضا؛ ۱۳۹۶. واکاوی و شناسایی تغییرات مکانی پهنه‌های گرم و سرد دمایی ایران طی دوره‌های مختلف. مجله جغرافیا و مخاطرات طبیعی. شماره ۲۲. صص ۱۶۲-۱۴۱.

رضایی، فرشته؛ احمدی، محمود؛ شکیبیا، علیرضا؛ ۱۳۹۷. تعیین آستانه دمایی موج گرما طی دوره گرم سال بر اساس شاخص‌های جهانی در مناطق مختلف کشور. *جغرافیا و مخاطرات محیطی*. شماره ۲۶. صص ۱۱۵-۱۳۱.

سازمان هواشناسی کشور؛ مرکز خدمات ماشینی. *آمار روزانه عناصر اقلیمی ایستگاه‌های سینوپتیک و کلیماتولوژی در سال‌های ۱۹۹۳-۲۰۱۷ میلادی*. تهران.

علیجانی، بهلول؛ ۱۳۹۸. *آب و هوای ایران*. انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ دهم.

علیجانی، بهلول؛ کاویانی، محمدرضا؛ ۱۳۸۶. *مبانی آب و هواشناسی*. انتشارات سمت. چاپ یازدهم.

مجرد، فیروز؛ معصوم پور، جعفر؛ رستمی، طیبه؛ ۱۳۹۴. تحلیل آماری-همدیدی امواج گرمایی بالای ۴۰ درجه سلسیوس در غرب ایران. *جغرافیا و مخاطرات محیطی*. شماره سیزدهم. صص ۵۷-۴۱.

یاراحمدی، الهام؛ کرم پور، مصطفی؛ قائمی، هوشنگ؛ مرادی، محمد؛ نصیری، بهروز؛ ۱۳۹۸. تحلیل آماری بی‌هنجاری‌های دمایی حداقل و حداکثر ایران در دوره سرد سال به منظور درک اثر تغییر اقلیم بر مناطق مختلف ایران. *جغرافیا و مخاطرات محیطی*. شماره ۲۹. صص ۱۷۱-۱۹۷.

Ceccherini, G., Russo, S., Ameztoy, I., Patricia Romero, C., Carmona-Moreno, C., 2016. Magnitude and frequency of heat and cold waves in recent decades: the case of South America. *Nat. Hazards Earth Syst*, 16: 821-831.

Radinović, D., & Ćurić, M., 2009. Criteria for heat and cold wave duration indexes. *Theoretical and Applied Climatology*,

Shi, J., Wen, K., & Cui, L. Temporal and spatial variations of high-impact weather events in China during 1959- 2014. *Theoretical and Applied Climatology*. 2016. 129(1-2):