

Research Paper

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Distress Tolerance and Depression in Students

Atefeh Rezaeian<sup>\*1</sup>, Liah Agha Akbari<sup>2</sup>, Fatemeh Amirzadeh<sup>3</sup>, Naghmeh MalekMohammadi<sup>4</sup>

1. M.A. Student in Family Counselling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2. M.A. Student in Clinical psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3. M.A. Student in General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4. M.A. Student in Clinical Psychology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

**Citation:** Rezaeian A, Agha Akbari L, Amirzadeh3 F, alekMohammadi N. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on distress tolerance and depression in students. J Child Ment Health. 2021; 8 (4):94-107.

URL: <http://childmentalhealth.ir/article-1-1068-en.html>



doi: [10.52547/jcmh.8.4.8](https://doi.org/10.52547/jcmh.8.4.8)  
10.1001.1.24233552.1400.8.4.13.8

ARTICLE INFO

ABSTRACT

**Keywords:**

Acceptance and commitment, distress tolerance, depression, students

**Background and Purpose:** One of the most frequent and disabling problems of students in different age periods is depression that researchers have examined different components in the perception of depression, including distress tolerance. In this way, the purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on distress tolerance and depression in students.

**Method:** This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group design. The statistical population included all 7<sup>th</sup> grade female students in Qayen in the academic year of 2019-20, of which 30 students were selected by available sampling method and were randomly assigned to the experimental (n=15) and control (n=15) groups. The instruments used in the study included the Beck Depression Inventory (BDI-II; Beck, Steer, GK Brown, 1996) and the Distress Tolerance Scale (Simons, Gaher, 2005). The experimental group received 8 one – hour sessions, while the control group underwent no intervention. Data were analyzed by the multivariate analysis of covariance using the SPSS statistics version 24 program.

**Results:** The results showed that there is a significant difference between the mean scores of distress and depression in the experimental and control group, in the way that ACT reduced depression and improved distress tolerance in students ( $P < 0.01$ )

**Conclusion:** In through mindful exercises, the acceptance of thoughts, beliefs, emotions, and sensory and physical receipts are facilitated. As a result, the infrastructure mechanisms of this treatment reduced depression and improved distress tolerance in students in this study.

Received: 8 Sep 2020

Accepted: 19 Dec 2020

Available: 5 Mar 2022



\* **Corresponding author:** Atefeh Rezaeian, M.A. Student in Family Counselling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

E-mail: Rezaian.rezaian72@gmail.com

Tel: (+98) 5138805000

2476-5740/ © 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

## **Extended Abstract**

### **Introduction**

The school age is one of the most important time periods that shapes one's personality (1). One of the most common and debilitating issues of students during adolescence and youth is depression (2). In the fifth edition of diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), depression is defined as: grief, the feeling of being empty, or irritable mood with cognitive and physical changes that effectively affect the functional capacity of the individual (4). A systematic research in Iran showed that the prevalence of depression in different age groups was between 69.5 and 73% (10). One of the abilities associated with mental health is the ability to tolerate distress, which is defined as a meta-emotional construct and as a person's ability to analyze and resist negative emotional states (11). The results of several studies also indicate that this structure is one of the factors involved in psychological vulnerability (15 and 14). Also, a number of studies have shown that low distress tolerance is associated with a wide range of mental health problems (17 and 16).

One of the therapeutic interventions that has become popular in recent years is acceptance and commitment therapy (ACT) in which instead of changing a person's cognitions, it is attempted to increase the cognitive communication of the individual with his thoughts and feelings (19). The effectiveness of ACT has been proven on various variables such as: depression and test anxiety in students with thalassemia (22) decreasing depression of high school male students with attention deficit / hyperactivity disorder (23), decreasing depression of female students with special learning disorder (24) depression and compromise of blind girls (25), reducing the anxiety and depression of students with social phobia (26), anxiety and depression (27), increasing the distress tolerance in students with social anxiety disorder (28). Increasing ambiguity tolerance of students with obsessive-compulsive disorder (29), increasing distress tolerance in people with substance abuse (30), increasing tolerance of

women with substance dependence (31). Students are of particular importance as the future intellectual community. Considering that depression is a major contributor to the progress and academic performance of students that impose huge costs on societies (33), the present study aims to determine the effectiveness of ACT on distress tolerance and depression in students.

### **Method**

This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group design. The statistical population included all 7th grade female students in Qayen<sup>1</sup> in the academic year of 2019-20, of which 30 students with low scores in distress tolerance and high scores in depression were selected by available sampling method and were randomly assigned to the experimental (n=15) and control (n=15) groups. Inclusion criteria included: having a high score in depression and low score in distress tolerance based on the evaluations, not having a history of psychological disorders based on school counseling records, undergoing no psychological treatment or other effective methods, informed concern of participants in the research. Exclusion criteria included: absence in more than two sessions and lack of cooperation in the interventions. The instruments used in the study included the Beck Depression Inventory (35 and 36) and the Distress Tolerance Scale (13 and 37). The experimental group received 8 one – hour sessions, while the control group underwent no intervention. Data were analyzed by the multivariate analysis of covariance using the SPSS statistics - 24 program.

### **Results**

The mean and standard deviation of pre-test and post-test scores of distress tolerance and depression in the experimental and control groups are presented in Table 1. The results indicate the increase in distress tolerance scores and the decrease in depression scores in the experimental group in the post-test phase.

**Table 1 : Descriptive indicators of pre-test and post-test resilience scores of participants in experimental and control groups**

Variables	Phase	Group	Mean	SD	SH-W	P
tolerance	pretest	Experiment	8.70	2.712	0.572	0.899
		Control	9.10	3.352	0.703	0.706
	posttest	Experiment	11.21	2.736	0.783	0.582
		Control	9.76	3.132	0.680	0.744
absorbtion	pretest	Experiment	7.50	2.434	0.905	0.386
		Control	8.17	1.933	0.769	0.569
	posttest	Experiment	10.67	2.235	0.766	0.600
		Control	8.64	2.120	0.778	0.558
evaluation	pretest	Experiment	16.36	4.448	0.701	0.710
		Control	15.23	4.490	0.633	0.818
	posttest	Experiment	18.63	4.405	0.774	0.587
		Control	17.16	4.431	0.611	0.849
regulation	pretest	Experiment	7.48	2.624	0.745	0.635
		Control	7.15	2.264	0.524	0.947

1. Qayen is a city in and the capital of Qaen County, in South Khorasan Province, Iran.

depression	posttest	Experiment	10.30	2.267	0.727	0.666
		Control	7.75	2.987	0.511	0.957
	pretest	Experiment	25.72	9.326	0.490	0.970
		Control	24.85	10.190	0.369	0.999
	posttest	Experiment	22.83	9.334	0.553	0.920
		Control	24.25	10.285	0.637	0.812

In order to investigate the significance of the effectiveness of ACT on students' distress tolerance, multivariate analysis of covariance was used. The results showed that F - statistics is significant for tolerance ( $F_{1,24}=23.921$ ,  $P<0.01$ ), Absorption ( $F_{1,24}=16.009$ ,  $P<0.01$ ), evaluation ( $F_{1,24}=22.122$ ,  $P<0.01$ ), and regulation ( $F_{1,24}=10.451$ ,  $P<0.01$ ). These findings indicate that there is a significant difference between groups in these variables. The results of the mean of the experimental group in tolerance (523.11), absorption (1025.10), evaluation (882.18) and regulation (105.10) showed that the mean of the experimental group is more than the mean of the control group with the means: (951.9), (777.8), (911.16) and (743.7), respectively in these variables. According to these findings, it can be said that ACT is effective and increases the distress tolerance of students. Also, the effect size showed that group membership explains 49.9% of tolerance's variance, 40% of absorption's variance, 48% of the evaluation's variance, and 30.3% of regulation's variance.

Univariate analysis of covariance was used to investigate the effectiveness of ACT on students depression. The results showed that F - statistics were significant for depression variable ( $F_{1,24}=43.687$ ,  $P<0.01$ ). These findings indicate that there is a significant difference between groups in this variable. The results also showed that the mean of experimental group in depression (398.29) is less than the mean of the control group (687.24) in this variable. In conclusion, ACT was effective and reduced the depression of students. Additionally, the size of the effect showed that group membership explains 61.8% of depression's variance.

## Conclusion

The purpose of this study was to determine the effectiveness of ACT on distress tolerance and depression in students. The first finding of the research showed that ACT was effective and reduced the depression of students. The result is in line with previous studies in this field (25 and 22). In this way, people can be encouraged to evaluate their behavior based on whether their strategies are successful. Depressed students usually seek to provide various reasons for depression, which leads to an increase in rumination and criticizing their experiences. In ACT through mindful exercises, self-observation, and awareness of

the functioning of one's own limbs, one can connect with his thoughts and be able to accept his thoughts, beliefs, emotions, and sensory and physical receipts (27); Therefore, people view their depressing thoughts and will be able to stop ruminating thoughts that lead to depression.

Another finding showed that ACT increased the distress tolerance and its components (tolerance, absorption, evaluation and regulation) in students. The result is in line with previous studies in this field (28 – 31). One of the processes that is emphasized in ACT is work commitment. Encouraging individuals to clarify values, determine the goals, predict obstacles and ultimately, commit to achieving goals will increase the their life satisfaction. As a result, a person is released from the circles of negative thoughts and emotions (anxiety, hopelessness, depression) (31).

The implementation of this study only on female students and lack of follow-up results in the long run are the limitations of this study. Considering the effect of ACT in reducing depression and increasing the distress tolerance in students, school counselors and psychologists are suggested to use ACT in group and individual counseling sessions. Future studies can also compare the impact of this educational intervention to other therapeutic approaches such as cognitive analytical psychotherapy and cognitive behavioral therapy.

## Ethical Considerations

**Compliance with ethical guidelines:** This study has been implemented independently and its implementation license has been issued by education department of the city of Qaem with code 45789/10 dated 31/3/1399.

**Funding:** The present study was conducted without any sponsoring from a specific organization.

**Authors' contribution:** This article was written by the first author, analyzed by the second author, and edited by the third author. the data was collected by the fourth author.

**Conflict of interest:** There is no conflict of interest for the authors in this study.

**Acknowledgments:** The authors of the article consider it necessary to appreciate all the participants in the research

## اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و افسردگی دانشآموزان

عاطفه رضاییان<sup>\*</sup>, لیاه آقا علی اکبری<sup>۱</sup>, فاطمه امیرزاده<sup>۲</sup>, نعمه ملک محمدی<sup>۳</sup>

۱. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
۲. دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی باليي، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، اسلامشهر، ایران
۳. کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومي، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران
۴. کارشناسی ارشد روان‌شناسی باليي، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران

### چکیده

### مشخصات مقاله

**زمینه و هدف:** یکی از شایع ترین و ناتوان‌کننده‌ترین مشکلات دانشآموزان در دوره‌های مختلف سنی، افسردگی است که پژوهشگران در سبب‌شناسی افسردگی مؤلفه‌های مختلفی از جمله تحمل پریشانی را بررسی کرده‌اند. بدین ترتیب هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تحمل پریشانی و افسردگی دانشآموزان بود.

**روش:** طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر پایه هفتم شهر قائن در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ بودند که ۳۰ نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه ۱۵ نفر) جای‌دهی شدند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسش‌نامه تجدیدنظر شده افسردگی بک و همکاران (۱۹۹۶) و مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (۲۰۰۵) استفاده شد. سپس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در ۸ جلسه ۶۰ دقیقه‌ای تنها بر روی گروه آزمایش انجام شد و گروه گواه در آموزش شرکت نکردند. برای تحلیل داده‌ها از نسخه ۲۴ نرم افزار SPSS و تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

**یافته‌ها:** نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات تحمل پریشانی و افسردگی در گروه آزمایش و گواه تفاوت وجود دارد، به طوری که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش افسردگی و بهبود تحمل پریشانی دانشآموزان شده است ( $P < 0.01$ ).

**نتیجه‌گیری:** در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از طریق تمرین‌های ذهن‌آگاهی، پذیرش افکار، باورها، احساسات و دریافت‌های حسی و بدنی تسهیل می‌شود. در نتیجه مجموعه مکانیسم‌های زیربنایی این شیوه درمان باعث کاهش افسردگی و بهبود تحمل پریشانی در دانشآموزان در این مطالعه شده است.

### کلیدواژه‌ها:

پذیرش و تعهد،

تحمل پریشانی،

افسردگی، دانشآموزان

دریافت شده: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

پذیرفته شده: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

منتشر شده: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

\* نویسنده مسئول: عاطفه رضاییان، کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

رایانامه: Rezaiyan.rezaiyan72@gmail.com

تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۵۰۰۰

## مقدمه

فراهیجانی و به عنوان قابلیت فرد برای تجزیه و مقاومت در برابر موقعیت‌های روان‌شناختی و یا حالت‌های هیجانی منفی تعریف شده است (۱۱). این سازه حالتی از رنج هیجانی است که با نشانه‌های افسردگی و اضطراب تعریف می‌شود و با علائم فیزیولوژیکی بی‌خوابی، سردرد، و انرژی پایین همراه است که بر عملکرد اجتماعی و زندگی روزمره تأثیر منفی می‌گذارد (۱۲). در مجموع تحمل پریشانی ماهیتی چندبعدی دارد و شامل ابعاد متعددی از جمله: ۱. توانایی تحمل، ۲. ارزیابی و ظرفیت پذیرش حالت هیجانی، ۳. شیوه تنظیم هیجان به وسیله فرد و ۴. مقدار جلب توجه به وسیله هیجان‌های منفی و مقدار سهم آن در وجود آمدن اختلال در عملکرد می‌شود (۱۳). نتایج پژوهش‌های متعدد نیز حاکی از آن است که این سازه یکی از عوامل دخیل در آسیب‌پذیری روانی است (۱۴ و ۱۵). همچنین برخی از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تحمل پریشانی پایین با دامنه گسترهای از نگرانی‌های سلامت روانی و اختلال‌های روانی همراه هست (۱۶ و ۱۷).

با وجود پیشرفت‌های قابل توجهی که در مداخلات درمانی مربوط به افسردگی انجام شده است، همچنان با شیوع بالا، عود مکرر دوره‌ها و مزمن شدن اختلال افسردگی مواجه هستیم (۱۸). دسته‌ای از مداخلات روان‌شناختی که در سال‌های اخیر علاوه رو به افزایشی را سبب شده‌اند، درمان‌های مبتنی بر پذیرش<sup>۳</sup> هستند که به عنوان درمان‌های شناختی رفتاری موج سوم شناخته می‌شوند. در این نوع درمان تلاش می‌شود به جای تغییر شناخت‌ها، ارتباط شناختی فرد با افکار و احساسات افزایش یابد (۱۹). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شش فرایند مرکزی دارد که به انعطاف‌پذیری شناختی و در نهایت زندگی ارزشمندتر و رضایت‌بخش تر منجر می‌شوند. این شش فرایند عبارت‌اند از: پذیرش، گسلش شناختی، ارتباط با زمان حال، خود به عنوان زمینه، ارزش‌ها، و عمل متعهد (۲۰). در این درمان پذیرش روانی فرد درباره تجارت ذهنی (افکار و احساسات) افزایش می‌یابد و هرگونه عملی که موجب اجتناب یا مهار این تجارت ذهنی ناخواسته می‌شود بی‌اثر یا آثر آن، به طور کامل حذف می‌شود (۲۱).

دوران دانش آموزی یکی از حساس‌ترین دوران زندگی است که اساس شخصیت آینده افراد را می‌سازد (۱). یکی از شایع‌ترین و ناتوان‌کننده‌ترین مشکلات دانش آموزان در دوران نوجوانی و جوانی، افسردگی<sup>۱</sup> است (۲). این اختلال یکی از پدیده‌های هیجانی قرن کنونی است که بر اساس برآورد سازمان سلامت جهانی در سال ۲۰۱۲، پس از بیماری‌های قلبی و عروقی، دومین بیماری تهدید‌کننده سلامت و حیات انسان، دومین اختلال هزینه‌بر در جهان و دومین علت معلولیت تا سال ۲۰۲۵ ذکر شده است (۳). در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، افسردگی عبارت از وجود اندوه، احساس تهی بودن یا خلق تحریک‌پذیر همراه با تغییرات شناختی و جسمی است که به شکل چشمگیری روی ظرفیت کارکردی فرد تأثیر منفی می‌گذارد (۴).

افسردگی شامل غمگینی و هیجانات خودمعکس کننده همچون شرم‌ساری است و غالباً با در نظر گرفتن پنج دسته ویژگی تعریف می‌شود که شامل غمگینی و خلق بی‌عاطفه، خودپنداشت منفی شامل سرزنش‌گری و خودشرم‌منده‌سازی، تمایل به اجتناب از دیگران، کاهش خواب و اشتها به همراه کاهش وزن، کاهش تمایل جنسی، و تغییر در میزان فعالیت همراه با خواب آلودگی و گاه آشتفتگی است (۵). علائم این اختلال مانند غم و اندوه، احساس بی‌ارزشی، عدم تمرکز و توانایی اندیشیدن، احساس گناه، بی‌خوابی، احساس شکست، خودکشی، و بسیاری از نشانه‌های خطرناک دیگر در انسان‌های افسرده قابل مشاهده هست (۶). پژوهش‌ها نشان می‌دهند حدود ۲۰ درصد از افرادی که در طی زندگی شان دچار افسردگی هستند، اولین بار در ۱۲ تا ۱۹ سالگی این اختلال را تجربه کرده‌اند (۷ و ۸). شیوع افسردگی در دختران دو برابر پسران هست (۹). پژوهشی نظاممند در ایران نشان داد شیوع افسردگی در گروه‌های مختلف سنی بین ۵/۶۹ تا ۷۳ درصد بود و میزان افسردگی در زنان و دختران حدود ۱/۵ برابر بیشتر از مردان؛ و در جمعیت روستایی و شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ، بیشتر بود (۱۰).

از سویی یکی از توانایی‌هایی که در دوره نوجوانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، توانایی تحمل پریشانی<sup>۲</sup> است که به صورت سازه‌ای

1. Depression
2. Distress tolerance

3. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ بودند (۱۵۰۰ نفر)؛ و با توجه به اینکه حداقل نمونه در طرح‌های آزمایشی برای هر گروه ۱۵ نمونه کفایت می‌کند (۳۴)، تعداد ۳۰ دانشآموزی که در مقیاس تحمل پریشانی و افسردگی نمره‌شان از نمره برش فاصله داشت با روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (در هر گروه ۱۵ نفر) جایدهی شدند. ملاک‌های ورود دانشآموزان در این پژوهش عبارت بود: دارا بودن نمره بالا در افسردگی و نمره پایین در تحمل پریشانی بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده، نداشتن سابقه اختلال روان‌شناختی یا روش‌های اثربخش دیگر، تمایل قرار نداشتن تحت درمان روان‌شناختی یا روش‌های اثربخش دیگر، تمایل و رغبت برای شرکت در پژوهش (رضایت دانشآموزان و والدین). ملاک‌های خروج نمونه نیز شامل غیبت بیش از دو جلسه و عدم همکاری در جریان مداخله آموزشی بود.

### ب) ابزار

۱. پرسشنامه افسردگی بک<sup>۱</sup>: برای سنجش افسردگی از دومین نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه افسردگی بک با ۲۱ گویه استفاده شد. روش مقیاس نمرات ۰ تا ۹ نشان دهنده بهنجار بودن، ۱۰ تا ۱۹ میزان افسردگی خفیف، ۲۰ تا ۲۹ سطح افسردگی متوسط، و نمره ۳۰ به بالا نشان دهنده افسردگی شدید است (۳۵). بک، استیر و برون اعتبار<sup>۲</sup> این آزمون را ثبات درونی را ۰/۹۶ تا ۰/۹۲ با میانگین ۰/۸۶ و ضریب آلفای کرونباخ برای گروه بیمار ۰/۸۶ و غیر بیمار ۰/۸۱ گزارش کرده‌اند (۳۵). در ایران دابسون و محمدخانی ضریب آلفای ۰/۹۳ برای دانشجویان و ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته را ۰/۹۳ گزارش کردند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی، سنجش اعتبار و روایی<sup>۳</sup> پرسشنامه افسردگی بک-۲ حکایت از شاخص‌های روان‌سنگی مناسب این ابزار دارد (۳۶).

۲. مقیاس تحمل پریشانی<sup>۴</sup>: مقیاس تحمل پریشانی یک ابزار خود گزارشی ۱۵ گویه‌ای است که به وسیله سیمونز و گاهر در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است و چهار مؤلفه تحمل (گویه‌های ۱-۳ و ۵)، جذب

اثربخشی درمان تعهد و پذیرش بر کاهش تندگی، افسردگی، و اضطراب امتحان در دانشآموزان مبتلا به تالاسمی (۲۲)، کاهش افسردگی دانشآموزان پسر دوره متوسطه با اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (۲۳)، کاهش افسردگی دانشآموزان دختر دارای اختلال یادگیری ویژه (۲۴)، کاهش افسردگی و افزایش سازش‌یافتنگی دختران نایینا (۲۵)، کاهش اضطراب و افسردگی دانشآموزان دارای ترس اجتماعی (۲۶)، کاهش اضطراب و افسردگی (۲۷)، افزایش تحمل پریشانی در دانشآموزان با اختلال اضطراب اجتماعی (۲۸)، افزایش تحمل ابهام دانشآموزان با اختلال وسواس-بی‌اختیاری (۲۹)، افزایش تحمل پریشانی افراد سوءصرف مواد (۳۰)، افزایش تحمل زنان وابسته به سوءصرف مواد (۳۱) تائید شده است؛ بنابراین مرور پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که اثربخشی درمان تعهد و پذیرش در افسردگی و تحمل پریشانی، کمتر روی گروه‌های دانشآموزان بهنجار انجام شده است، بنابراین ضرورت انجام مطالعه درباره استفاده از این نوع درمان در دانشآموزان گروه‌های سنی مختلف فاقد اختلالات روان‌شناختی، احساس می‌شود.

دانشآموزان به عنوان قشر فکری آینده جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و بررسی مشکلات آنها و طرح‌ریزی اقدامات پیشگیرانه، انعکاس بسیار مثبتی بر کارکرد جامعه خواهد گذاشت (۳۲). همچنین با توجه به اینکه افسردگی به عنوان یک عامل عملده بازدارنده در پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان است که هزینه‌های هنگفتی را بر جوامع تحمیل می‌کند (۳۳)، و از سویی با توجه به خلاصه پژوهشی درباره استفاده از این شیوه در گروه‌های دانشآموزی بهنجار، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تحمل پریشانی و افسردگی دانشآموزان دختر پایه هفتم انجام شد.

## روش

**الف) طرح پژوهش و شرکت‌کنندگان:** طرح این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دختر پایه هفتم شهر قائن در

3. Validity
4. Disturbance Tolerance Scale

1. Beck Depression Inventory—Second Edition
2. Reliability

منفی، و وابستگی به سیگار به ترتیب همبستگی های ۰/۵۴۳، ۰/۲۳۴ و ۰/۶۵۳ به دست آمده است. این پژوهشگران همچنین اعتبار این پرسش نامه از نوع پایایی<sup>۱</sup> را به روش بازآزمایی ۰/۷۹، ۰/۸۱ و ۰/۸۷ اثبات کردند و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را ۰/۷۳، ۰/۷۱ و ۰/۷۷ گزارش کردند.<sup>(۳۷)</sup>

**ج) معروفی برنامه مداخله‌ای:** جلسات درمانی پذیرش و تعهد مبتنی بر جلسات درمانی هیز، لوین، پلامب- ویلاردج، ویلاتی و پیسترولو<sup>(۳۸)</sup> بود که اعتبار آن در مطالعه ترخان تأیید شده است<sup>(۳۹)</sup> و توسط پژوهشگر طی ۸ جلسه درمانی ۶۰ دقیقه‌ای و در هفته یک جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد. خلاصه جلسات درمانی در جدول ۱ گزارش شده است.

(گویه‌های ۱۵-۴-۲)، ارزیابی (گویه‌های ۱۲-۱۱-۹-۷-۶) و تنظیم (گویه‌های ۱۴-۱۳-۸) را بر روی طیف لیکرت پنج درجه‌ای از یک (کاملاً موافق) تا پنج (کاملاً مخالف) می‌سنجد. دامنه نمرات این ابزار بین ۱۵ تا ۷۵ است و نمره بالاتر در این مقیاس، تحمل بالای پریشانی را نشان می‌دهد<sup>(۱۳)</sup>. سیمونز و گاهار ضرایب آلفای کرونباخ خوده‌آزمون‌های تحمل، ارزیابی، جذب، و تنظیم را به ترتیب ۰/۷۳، ۰/۶۶، ۰/۷۴ و ۰/۸۷ به دست آوردند و گزارش کردند که این مقیاس دارای روایی ملکی و همگرایی مطلوبی است و ضریب روایی آن را ۰/۶۱ به دست آوردند<sup>(۱۳)</sup>. شمس، عزیزی و میرزایی<sup>(۳۷)</sup> همبستگی مقیاس تحمل پریشانی را با شیوه‌های مقابله‌ای مسئله محور، هیجان محور، کمتر مؤثر، و غیر مؤثر به ترتیب ۰/۲۷۸، ۰/۳۳۷، ۰/۲۱۳ به دست آوردند. همچنین بین مقیاس تحمل پریشانی با هیجان مثبت، هیجان

جدول ۱: خلاصه جلسات آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

جلسه	عنوان هر جلسه	شرح مختصر جلسه	تکنیک	تمرین
۱	آشنایی و ایجاد اعتماد	آشنایی اولیه با مراجع و برقراری رابطه و ایجاد اعتماد، اجرای پیش آزمون، معرفی درمانگر	-	-
۲	معرفی درمان پذیرش و تعهد	آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و برقراری رابطه درمانی، معرفی درمان پذیرش و تعهد، اهداف و محورهای اصلی آن، تعیین قوانین حاکم بر جلسات درمان،	-	-
۳	بررسی انتظارات افراد از درمان پذیرش و تعهد	مروری بر تجارت جلسه قبل و دریافت بازخورد از افراد، بحث درباره تجربیات و ارزیابی آنها، ارزیابی میزان تمایل فرد برای تغییر بررسی انتظارات بیماران از درمان پذیرش و تعهد، ایجاد درمانگری خلاق استراحت و پذیرایی، جمع‌بندی بحث‌های مطرح شده در جلسه و ارائه تکلیف خانگی	استعاره مردی در گودال، طناب کشی با هیولا	ثبت مواردی که مراجعت موفق به کنار گذاشتن شیوه‌های ناکارآمد مهارگری شده‌اند.
۴	اجتناب از تجارت در دنارک و آگاهی از پامدهای اجتناب	مروری بر تجارت جلسه قبل و دریافت بازخورد از افراد؛ تشخیص راهبردهای ناکارآمد مهارگری و پی بردن به پیوستگی آنها، توضیح دادن مفهوم پذیرش و تفاوت آن با مقاہیم شکست، یاس، انکار، مقاومت و ... و اینکه پذیرش یک فرآیند همیشه‌گی است؛ توضیح درباره اجتناب از تجارت در دنارک و آگاهی از پامدهای اجتناب؛ کشف موقعیت‌های اجتناب شده و تماس با آنها از طریق پذیرش؛ استراحت و پذیرایی؛ جمع‌بندی بحث‌های مطرح شده در جلسه و بررسی تمرین جلسه بعد؛ ارائه تکلیف خانگی	استعاره صندلی بد	ثبت مواردی که مراجعت موفق به مشاهده و عدم ارزیابی تجارت و هیجانات شده‌اند
۵	معرفی و تفهیم آمیختگی به خود مقاوم‌سازی شده و گسلش، کاربرد تکنیک‌های گسلش شناختی	مروری بر تجارت جلسه قبل و دریافت بازخورد از افراد، تکلیف و تعهد رفتاری، معرفی و تفهیم آمیختگی به خود مقاوم‌سازی شده و گسلش، کاربرد تکنیک‌های گسلش شناختی، مداخله در عملکرد زنجیره‌های مشکل ساز زبان و استعاره‌ها، تضعیف اتفاق خود با افکار و عواطف، استراحت و پذیرایی، جمع‌بندی بحث‌های مطرح شده در جلسه و بررسی تمرین جلسه بعد، ارائه تکلیف خانگی	مراقبه برگ‌های رودخانه	ارائه فایل صوتی مراقبه
۶	نشان دادن جدایی بین خود، تجربیات درونی و رفتار مشاهده شده به عنوان زمینه، تضعیف خود مفهومی و بیان خود در این تمرینات. در مشاهده شده به عنوان زمینه	مروری بر تجارت جلسه قبل و دریافت بازخورد از افراد، نشان دادن جدایی بین خود، تجربیات درونی و رفتار مشاهده شده به عنوان زمینه؛ تضعیف خود مفهومی و بیان خود در این تمرینات. در این مورد شرکت کنندگان می‌آموزند بر فعالیت‌های خود (مانند تنفس، پیاده‌روی و ...) تمرکز	استعاره با غایبی	مراجعت چه زمانی بر اساس ارزش‌های ایشان عمل می‌کنند و تفاوت‌ها را حس کنند.

## 1. Stability

<p>در فاصله بین جلسات در صورت تمایل به محض تشخیص کشمکش با احساسات خود، تمرین را آغاز کرده و مراحل را یادداشت کنند.</p> <p>گزارش از گام‌های پیگیری ارزش‌ها و اندیشیدن پیرامون دستاوردهای جلسات</p> <p>تمرين تنفس توجه ارائه فایل صوتی مراقبه</p>	<p>کنند و در هر لحظه از احوال خود، آگاه باشند و زمانی که هیجانات، حس‌ها و شناخت‌ها پردازش می‌شوند بدون قضاوت مورد مشاهده قرار گیرند. یعنی می‌آموزند به افکار و احساسات خودشان توجه کنند ولی به محتوای آن نچسبند.</p> <p>استراحت و پذیرایی، جمع‌بندی بحث‌های مطرح شده در جلسه، و بررسی تمرین جلسه بعد و ارائه تکلیف خانگی</p> <p>مرور تجارت جلسه قبلی و دریافت بازخورد از افراد، شناسایی ارزش‌های زندگی افراد و تصریح و تمرکز بر این ارزش‌ها و توجه به قدرت انتخاب آنها</p> <p>شناسایی ارزش‌های زندگی افراد و تصریح و تمرکز بر این ارزش‌ها و توجه به قدرت انتخاب آنها</p>	<p>تفاوت بین ارزش‌ها، اهداف و اشتباہات و موانع درونی و بیرونی احتمالی در دنبال کردن ارزش‌ها</p> <p>مرور و جمع‌بندی</p>
<p>اطلاعات و نام افراد در پژوهش کاملاً رعایت شد. جهت تحلیل داده‌ها از نسخه ۲۲ نرمافزار SPSS و آزمون تحلیل کووایاریانس چند متغیره در سطح معنای‌داری <math>0.05\%</math> استفاده شد.</p>	<p>در ک ماهیت تمایل و تعهد (آموزش تعهد به عمل)؛ شناسایی طرح‌های رفتاری مطابق با ارزش‌ها و ایجاد تعهد برای عمل به آنها درباره مفهوم عود و آمادگی برای مقابله با نکاتی که بیان شده، مرور تکالیف و جمع‌بندی جلسات به همراه مراجع؛ در میان گذاشتن تجارت اعضا گروه با یکدیگر و دستاوردها و انتظاراتی که برآورده نشده بود، و در پایان اجرای پس آزمون و تشکر و قدردانی از اعضای شرکت کننده.</p>	<p>در ک ماهیت تمایل و تعهد (آموزش تعهد به عمل)؛ شناسایی طرح‌های رفتاری مطابق با ارزش‌ها و ایجاد تعهد برای عمل به آنها درباره مفهوم عود و آمادگی برای مقابله با نکاتی که بیان شده، مرعلمان انجام شد و درباره اهداف پژوهش نکات لازم گفته شد. پس از تعیین و تخصیص تصادفی افراد به گروه‌های مطالعه، همه شرکت کنندگان به مقیاس افسردگی و تحمل پریشانی (پیش آزمون) پاسخ داده و سپس پروتکل جلسات درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز و همکاران (۳۸) توسط پژوهشگر طی ۸ جلسه درمانی ۶۰ دقیقه‌ای و در هفته یک جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد، اما گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. سپس از افراد هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. همچنین در این پژوهش ملاحظات اخلاقی شامل حضور داوطلبانه اعضا در جلسات درمان، تکمیل کردن پرسش‌نامه‌ها با میل و رغبت توسط شرکت کنندگان، برنامه‌ریزی مناسب برای اجرای جلسات مشاوره به طوری که مزاحم تدریس معلمان و برنامه‌های مدرس نشود، محرمانه ماندن</p>
<p>یافته‌ها</p> <p>میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای تحمل پریشانی و افسردگی دو گروه آزمایش و گواه در جدول ۲ ارائه شده است. همچنین در این جدول نتایج آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه‌ها گزارش شده است. با توجه به این جدول نتایج این آزمون برای تمامی متغیرها معنی دار نیست، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال است.</p>	<p>د) روش اجرا: در مرحله اجرا پس از کسب اجازه از آموزش و پرورش و مجوزهای لازم به مدرسه هدف مراجعة شد و هماهنگی لازم با مدیر آموزشگاه و معلمان انجام شد و درباره اهداف پژوهش نکات لازم گفته شد. پس از تعیین و تخصیص تصادفی افراد به گروه‌های مطالعه، همه شرکت کنندگان به مقیاس افسردگی و تحمل پریشانی (پیش آزمون) پاسخ داده و سپس پروتکل جلسات درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز و همکاران (۳۸) توسط پژوهشگر طی ۸ جلسه درمانی ۶۰ دقیقه‌ای و در هفته یک جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد، اما گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. سپس از افراد هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. همچنین در این پژوهش ملاحظات اخلاقی شامل حضور داوطلبانه اعضا در جلسات درمان، تکمیل کردن پرسش‌نامه‌ها با میل و رغبت توسط شرکت کنندگان، برنامه‌ریزی مناسب برای اجرای جلسات مشاوره به طوری که مزاحم تدریس معلمان و برنامه‌های مدرس نشود، محرمانه ماندن</p>	<p>یافته‌ها</p> <p>میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای تحمل پریشانی و افسردگی دو گروه آزمایش و گواه در جدول ۲ ارائه شده است. همچنین در این جدول نتایج آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه‌ها گزارش شده است. با توجه به این جدول نتایج این آزمون برای تمامی متغیرها معنی دار نیست، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال است.</p>

جدول ۲: شاخص‌های توصیفی نمرات پیش آزمون-پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه (تعداد: ۳۰)

متغیر	وضعیت	گروه	میانگین	انحراف معیار	شاپیرو-ویلکز	p
	پیش آزمون	آزمایش	۸/۷۰	۲/۷۱۲	۰/۵۷۲	۰/۸۹۹
	تحمل	گواه	۹/۱۰	۳/۳۵۲	۰/۷۰۳	۰/۷۰۶
	پس آزمون	آزمایش	۱۱/۲۱	۲/۷۳۶	۰/۷۸۳	۰/۵۷۲
	پس آزمون	گواه	۹/۷۶	۳/۱۳۲	۰/۶۸۰	۰/۷۴۴
	پیش آزمون	آزمایش	۷/۵۰	۲/۴۳۴	۰/۹۰۵	۰/۳۸۶
	جذب	گواه	۸/۱۷	۱/۹۹۳	۰/۷۶۹	۰/۵۹۵
	پس آزمون	آزمایش	۱۰/۶۷	۲/۲۳۵	۰/۷۶۶	۰/۶۰۰
	ارزیابی	گواه	۸/۶۴	۲/۱۲۰	۰/۷۷۸	۰/۵۸۰
	پیش آزمون	آزمایش	۱۵/۲۳	۴/۴۹۰	۰/۶۳۳	۰/۸۱۸
	پیش آزمون	گواه	۱۶/۳۶	۴/۴۳۸	۰/۷۰۱	۰/۷۱۰
	ارزیابی	آزمایش	۱۸/۶۳	۴/۴۰۵	۰/۷۷۴	۰/۵۸۷
	پس آزمون	گواه	۱۷/۱۶	۴/۴۳۱	۰/۶۱۱	۰/۸۴۹
	پیش آزمون	آزمایش	۷/۴۸	۲/۶۲۴	۰/۷۴۵	۰/۶۳۵
	تنظیم	گواه	۷/۱۵	۲/۲۶۴	۰/۵۲۴	۰/۹۴۷
	پس آزمون	آزمایش	۱۰/۳۰	۲/۲۶۷	۰/۷۷۷	۰/۶۶۶
	پس آزمون	گواه	۷/۷۵	۲/۹۸۷	۰/۵۱۱	۰/۹۵۷
	پیش آزمون	آزمایش	۲۵/۷۲	۹/۳۲۶	۰/۴۹۰	۰/۹۷۰
	ارزیابی	گواه	۲۴/۸۵	۱۰/۱۹۰	۰/۳۶۹	۰/۹۹۹
	افسردگی	آزمایش	۲۲/۸۳	۹/۳۳۴	۰/۵۵۳	۰/۹۲۰
	پس آزمون	گواه	۲۴/۲۵	۱۰/۲۸۵	۰/۶۳۷	۰/۸۱۲

تنظیم ( $F_{1,28} = ۰/۰۵$ ,  $p < ۰/۰۵$ ) در گروه‌ها برابر است. نتایج آزمون ام باکس برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه آزمایش و گواه نیز نشان داد که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه برابر است ( $F = ۱/۶۷۹$ ,  $p < ۰/۰۵$ ,  $BOX = ۱۹/۹۰۱$ ). نتایج آزمون خی دو بارتلت برای بررسی کرویت یا معناداری رابطه (M). نتایج آزمون خی دو بارتلت برای بررسی کرویت یا معناداری رابطه بین متغیرها نشان داد که رابطه بین این مؤلفه‌ها معنادار است ( $p < ۰/۰۱$ ,  $\chi^2 = ۱۷/۳۷۰$ ,  $df = ۹$ ).

به منظور بررسی اثریخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تحمل پریشانی دانش آموزان، از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج آزمون بررسی همگنی شبیه رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمرات در گروه آزمایش و گواه نشان داد که شبیه رگرسیون در هر دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که شبیه رگرسیون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای وابسته در گروه‌ها نشان داد که واریانس مؤلفه‌های تحمل ( $F_{1,28} = ۰/۰۵$ ,  $p < ۰/۰۵$ ), جذب ( $F_{1,28} = ۰/۰۶۵$ ,  $p < ۰/۰۵$ )، ارزیابی ( $F_{1,28} = ۰/۰۲۰$ ,  $p < ۰/۰۵$ ) و

جدول ۳: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه تحمل پریشانی در گروه آزمایش و گواه

افر	آزمون‌ها	مقادیر	F	سطح معناداری	درجه آزادی اثرب	درجه آزادی اثرب	اندازه اثر
	اثر پیلایی	۰/۶۸	۱۱/۳۹۶	۴	۲۱	۰/۰۰۱	۰/۶۸۵
	لامبادی ویلکر	۰/۳۱۵	۱۱/۳۹۶	۴	۲۱	۰/۰۰۱	۰/۶۸۵
گروه	اثر هتینگک	۲/۱۷۱	۱۱/۳۹۶	۴	۲۱	۰/۰۰۱	۰/۶۸۵
	بزرگ‌ترین ریشه روی	۲/۱۷۱	۱۱/۳۹۶	۴	۲۱	۰/۰۰۱	۰/۶۸۵

آزمایش و گواه، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررسی این که گروه آزمایش و گواه در کدام یک از مؤلفه‌ها با یکدیگر تفاوت دارند در جدول ۴ نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری گزارش شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود سطح معناداری هر چهار آماره چندمتغیری یعنی اثر پیلایی، لامبادای ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگ‌ترین ریشه روی، کوچک‌تر از  $0.01$  است ( $p < 0.01$ ). بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص می‌شود که بین تحمل پریشانی دو گروه

جدول ۴؛ نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفه‌های تحمل پریشانی

متغیر	منبع	میانگین	تفاوت میانگین	خطای استاندارد	F	P	اندازه اثر
تحمل	آزمایش	۱۱/۵۲۳	۲/۰۷۲	۰/۳۰۴	۲۳/۹۲۱	۰/۰۰۱	۰/۴۹۹
	گواه	۹/۴۵۱					
جذب	آزمایش	۱۰/۵۲۵	۱/۷۴۸	۰/۳۷۱	۱۶/۰۰۹	۰/۰۰۱	۰/۴۰۰
	گواه	۸/۷۷۷					
ارزیابی	آزمایش	۱۸/۸۸۲	۱/۹۷۱	۰/۳۰۱	۲۲/۱۱۲۲	۰/۰۰۱	۰/۴۸۰
	گواه	۱۶/۹۱۱					
تنظیم	آزمایش	۱۰/۳۰۵	۲/۰۵۶۲	۰/۵۰۱	۱۰/۴۵۱	۰/۰۰۴	۰/۳۰۳
	گواه	۷/۷۴۳					

شده است. همچنین اندازه اثر نشان می‌دهد که عضویت گروهی  $49/9$  درصد از تغییرات تحمل،  $40$  درصد از تغییرات جذب،  $48$  درصد از تغییرات ارزیابی، و  $30/3$  درصد از تغییرات تنظیم را تبیین می‌کند. به منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی دانش آموزان، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج آزمون بررسی همگنی شبیه رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمرات در گروه آزمایش و گواه نشان داد که شبیه رگرسیون در هر دو گروه برای است ( $p < 0.05$ )، نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته در گروه‌ها نشان داد که واریانس متغیر افسردگی ( $p < 0.05$ )،  $F_{1,26} = 0.047$  در گروه‌ها برابر است.

با توجه به جدول ۴ آماره F برای مؤلفه‌های تحمل ( $p < 0.01$ )،  $F_{1,24} = 23/921$  جذب ( $p < 0.01$ )،  $F_{1,24} = 16/009$  ارزیابی ( $p < 0.01$ ) و تنظیم ( $p < 0.01$ )،  $F_{1,24} = 10/451$  معنادار است. این یافته‌ها نشان‌گر آن هستند که بین گروه‌ها در این متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج بررسی میانگین‌ها در جدول ۴ نشان می‌دهد که میانگین گروه آزمایش در تحمل (۱۱/۵۲۳)، جذب (۱۰/۵۲۵)، ارزیابی (۱۸/۸۸۲) و تنظیم (۱۰/۳۰۵) بیشتر از میانگین گروه گواه در این متغیرها به ترتیب با میانگین (۹/۴۵۱)، (۸/۷۷۷) (۱۶/۹۱۱) و (۷/۷۴۳) است. با توجه به این یافته‌ها می‌توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مؤثر بود و موجب افزایش تحمل پریشانی دانش آموزان

جدول ۵؛ نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در افسردگی

متغیر	منبع	میانگین	تفاوت میانگین	خطای استاندارد	F	P	اندازه اثر
افسردگی	آزمایش	۲۲/۳۹۸	۲/۰۲۸۹	۰/۲۴۵	۴۳/۶۸۷	۰/۰۰۱	۰/۶۱۸
	گواه	۲۴/۶۸۷					

ها در جدول فوق نشان می‌دهد که میانگین گروه آزمایش در افسردگی (۲۲/۳۹۸) کمتر از میانگین گروه گواه در این متغیر با میانگین (۲۴/۶۸۷) است. با توجه به این یافته‌ها می‌توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و

با توجه به جدول ۵ آماره F برای متغیر افسردگی ( $p < 0.01$ )،  $F_{1,27} = 43/687$  معنادار است. این یافته‌ها نشان‌گر آن هستند که بین گروه‌ها در این متغیر تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج بررسی میانگین

خود به عنوان زمینه، و زندگی در زمان حال، به افراد آموزش می‌دهد که محتویات ذهن خود را بپذیرند و برای تغییر آنها حرکت نکنند و همچنین حرکت آنها به سمت ارزش‌ها و اهداف مهم زندگی خود باشد (۲۶).

از سویی دیگر در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک مداخله رفتاری به فرد کمک می‌شود تا بیشتر در لحظات کنونی زندگی کنند و به جای افکار، احساسات و تجارب در دنیاک، بر ارزش‌ها و اهداف مهم تمرکز کنند. فرد با این باور که بسیاری از مشکلات او غیرقابل مهار هستند وارد مرحله درمانی می‌شود، اما در درمان این انتظارات در فرد به وجود می‌آید که می‌تواند مشکلات خود را به نحوی مؤثر مهار کنند و سپس مهارت‌هایی به افراد آموزش داده می‌شود تا به نحوی مؤثر هم به مشکلات فعلی و هم به مشکلات جدیدی که بعد از پایان درمان به وجود می‌آیند، روبرو شده و پاسخ دهند (۲۷).

در تبیینی دیگر می‌توان گفت در درمان پذیرش و تعهد، افراد تشویق می‌شوند تا رفشارشان را بر اساس اینکه آیا راهبردهایی که به کار می‌برند موفقیت‌آمیز است؛ ارزیابی کنند. راهبردهای موفقیت‌آمیز معمولاً آنها را هستند که به افراد کمک می‌کند بر اساس ارزش‌های خود عمل کنند. دانشآموزان با علائم افسردگی به طور معمول به دنبال دلیل آوردن برای افسردگی هستند که این موضوع به افزایش نشخوار فکری منجر می‌شود و تجربه خود را مورد انتقاد منفی قرار می‌دهند. در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از طریق تمرین‌های ذهن‌آگاهی، خودمشاهده‌گری و آگاهی از وضع اندام و اصلاح ارتباط فرد با افکارش، تقویت می‌شود که در نتیجه پذیرش افکار، باورها، احساسات و دریافت‌های حسی و بدنی فرد تسهیل می‌شود (۲۸). نتیجه اینکه افراد، افکار افسرده‌وار خود را مورد مشاهده قرار می‌دهند و خود را از نشخوارهای فکری منتج از افسردگی، جدا می‌کنند.

دیگر یافته این پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه، در نمرات مربوط به تحمل پریشانی و مؤلفه‌های آن (تحمل، جذب، ارزیابی، و تنظیم)، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، چنین نتیجه می‌شود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مؤثر بوده و موجب افزایش تحمل پریشانی و مؤلفه‌های آن (تحمل، جذب، ارزیابی، و تنظیم) در دانشآموزان شد. نتیجه به دست آمده با پژوهش‌های پیشین در

تعهد مؤثر بوده و موجب کاهش افسردگی دانشآموزان می‌شود. همچنین اندازه اثر نشان می‌دهد که عضویت گروهی ۶۱/۸ درصد از تغییرات افسردگی را تبیین می‌کند.

## بحث و نتیجه‌گیری

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تحمل پریشانی و افسردگی دانشآموزان بود. نخستین یافته پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه در نمرات مربوط به افسردگی، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به پایین تر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نتیجه می‌شود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مؤثر بوده و موجب کاهش افسردگی دانشآموزان شد. نتیجه به دست آمده با یافته‌های پژوهش‌های پیشین در این زمینه همسو است. برای مثال یافته‌های پژوهش اوکاتی، شیرازی و ثناگویی محرر نشان داد که آموزش روان‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش تندیگی و افسردگی و اختصار امتحان در دانشآموزان مبتلا به تالاسمی در مرحله پس آزمون و پیگیری مؤثر است (۲۹). در مطالعه‌ای پیری، حسینی نسب و لیوارجانی بر روی دانشآموزان پسر دوره متوسطه با اختلال نارسایی توجه / فرون‌کشی دریافتند که روان‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش میزان افسردگی دانشآموزان مؤثر بوده است (۳۰). نتایج پژوهش عنایتی شبکه‌ای نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش سازش یافته‌گی اجتماعی و بهبود افسردگی در دانشآموزان دختر با اختلال یادگیری شد (۳۱). در مطالعه‌ای دیگر پژوهش بر روی دختران نایینا نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به کاهش افسردگی و افزایش سازش یافته‌گی دختران نایینا شد (۳۲) که نتایج همه این مطالعات به نوعی با نتایج به دست آمده در

پژوهش حاضر در یک راستا هستند.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که یکی از مشکلات افراد با اختلال افسردگی، بازگشت مداوم به گذشته و اتفاقات مربوط به آن است. گذشته‌گری در زمان حال به مراجع کمک می‌کند خود را از بر جاماندگی گذشته نجات دهد و زمان حال را دریابد و به آن ارزش‌گذاری کند. از دیگر مشکلات این افراد، چسییدن به خود و افکار و احساسات موجود در آن است. روش پذیرش و تعهد از طریق فرایندهای پذیرش، گسلش،

تجربه های درونی با استفاده از استعاره و آموزش های ارائه شده در جلسه درمان، میزان تحمل پریشانی روان شناختی افراد نمونه را افزایش داده است.

این مطالعه فقط بر روی دانش آموزان دختر انجام شد. همچنین به علت مشکلات اجرایی، پیگیری نتایج در بلند میسر نشد که این دو محدودیت در تعمیم دهی نتایج به دست امده باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تأثیر درمان تعهد و پذیرش در کاهش افسردگی و افزایش تحمل پریشانی دانش آموزان، به روان شناسان مدارس پیشنهاد می شود ضمن تسلط یافتن کامل بر شیوه درمان تعهد و پذیرش، از تمرینات آن در جلسات مشاوره دانش آموزی استفاده کنند. همچنین مطالعات آینده تأثیر این مداخله آموزشی را در مقایسه با سایر مهارت ها و رویکردهای درمانی همچون روان درمانی شناختی تحلیلی و رفتار درمانی شناختی، مورد بررسی قرار دهند تا اثربخشی و اندازه اثر هر کدام مشخص شود. همچنین جهت کمک به تعمیم بیشتر نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود این پژوهش در محیط های غیر تحصیلی و بر روی سایر گروه های سنی با اختلالات مختلف، انجام شود.

### ملاحظات اخلاقی

**پیروی از اصول اخلاقی:** این مطالعه به صورت مستقل اجرا شده است و حاصل پایان نامه یا طرح پژوهشی مصوب نیست و مجوز اجرای آن توسط آموزش و پرورش شهر قائن با شماره مجوز ۱۰/۴۵۷۸۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صادر شد.

**حامي مالي:** این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ مؤسسه و سازمان دولتی یا خصوصی انجام شده است.

**نقش هر یک از نویسندها:** نویسنده نخست این مقاله در نگارش مقاله و نویسندها دوم، سوم، و چهارم به ترتیب در تحلیل آماری، ویراستاری علمی، و جمع آوری داده ها نقش داشتند.

**تضاد منافع:** نویسندها اعلام می دارند که در نتایج این پژوهش هیچ گونه تضاد منافع وجود ندارد.

**تشکر و قدردانی:** بدین وسیله از تمامی کسانی که در اجرای این پژوهش مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی می شود.

این زمینه همسو است. برای مثال نتایج یک مطالعه نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش شفقت به خود، افزایش تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانش آموزان تأثیر داشته است (۲۸). در مطالعه ای دیگر نیز نشان داده شد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانش آموزان با اختلال وسواس فکری - عملی تأثیر معناداری داشته است (۲۹). در پژوهشی دیگر (۳۰) روان درمانی گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد تأثیر قابل توجهی در کاهش دشواری در تنظیم هیجان و افزایش تحمل پریشانی افراد سوء مصرف مواد به دنبال داشته است و در نهایت در مطالعه ای دیگر مشخص شد که این شیوه درمان باعث افزایش تحمل پریشانی و کاهش حساسیت اضطرابی زنان وابسته به سوء مصرف مواد شده است (۳۱). نتایج مطالعات ذکر شده به طور مستقیم و غیر مستقیم با یافته های این مطالعه همسو است.

در تبیین این یافته می توان گفت که یکی از فرایندهایی که در درمان پذیرش و تعهد به آن توجه می شود، فرایند عمل متعهدانه است. ترغیب افراد به روشن کردن ارزش ها، تعیین اهداف، پیش بینی موانع و در نهایت، تعهد به انجام اعمالی در راستای دستیابی به اهداف و حرکت در جهت ارزش ها، باعث می شود که تا ضمن تحقق اهداف و شادی سیتی ناشی از آن بر رضایت از زندگی فرد افزوده شود و از گیر افتادن در حلقه ای از افکار و احساسات منفی (اضطراب، یاس، افسردگی) که باعث کاهش تحمل پریشانی می شوند، رهایی یابد. نتیجه اینکه این شیوه موجبات افزایش تحمل پریشانی و سلامت را در فرد فراهم می کند (۳۱). همچنین می توان اذعان داشت که در درمان پذیرش و تعهد، هدف از تأکید بسیار بر تمایل افراد به تجربه های درونی این بود که به آنها کمک شود تا افکار آزاردهنده خودشان را فقط به عنوان یک فکر تجربه کنند و از ماهیت ناکارآمد برنامه فعلی شان آگاه شده و به جای پاسخ به آن، به انجام آنچه در زندگی برایشان مهم بوده و در راستای ارزش های آنها است، به تدریج پردازند (۳۰). نتیجه اینکه این شیوه درمان با تمرکز بر استعاره های مختلف و تمرکز بر درد و رنج و رهاسازی ذهن و پرهیز از اجتناب

## Reference

1. Badeleh A, Toomaj A. Structural equations of relationships between learning disorder, emotional intelligence and depression in primary school students. *J Child Ment Health*. 2018; 4(4):59-70. [Persian]. [\[Link\]](#)
2. Rostamzadeh Z, khalilzadeh K. Prevalence and severity of depression in high school girls in Urmia. *Nurs Midwifery J*. 2007; 5(2):12-8. [Persian]. [\[Link\]](#)
3. Amini-Javid L, Zandipoor T, Karami J. The effectiveness of spiritual intelligence training on female students' depression and happiness. *Quarterly Journal of Women and Society*. 2015; 6(22):141-68. [Persian]. [\[Link\]](#)
4. Goran Arbanas M. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). *Alcoholism and Psychiatry Research*. 2015; 51(1):61-64. [\[Link\]](#)
5. Salehi Omran E, Abedini baltork M, Azizi Shomami M, Keshavarz K. Relationship between Internet Addiction and depression among secondary school students in kordkuy, iran, with an emphasis on the type of virtual network. *J Educ Community Health*. 2018; 5(1):13-8. [Persian]. [\[Link\]](#)
6. Mowery D, Smith H, Cheney T, Stoddard G, Coppersmith G, Bryan C, et al. Understanding depressive symptoms and psychosocial stressors on Twitter: a corpus-based study. *JMIR*. 2017; 19(2): 48-66. [\[Link\]](#)
7. Casement MD, Guyer AE, Hipwell AE, McAloon RL, Hoffmann AM, Keenan KE, et al. Girls' challenging social experiences in early adolescence predict neural response to rewards and depressive symptoms. *Developmental cognitive neuroscience*. 2014; 8(4):18-27. [\[Link\]](#)
8. Chauhan S, Lal P, Nayak H. Prevalence of depression among school children aged 15 years and above in a public school in Noida, Uttar Pradesh. *JAIR*. 2014; 3(6):269-273. [\[Link\]](#)
9. Albert PR. Why is depression more prevalent in women? *Journal of psychiatry & neuroscience: JPN*. 2015; 40(4):219-221. [\[Link\]](#)
10. Montazeri A, Mousavi S, Omidvari S, Tavousi M, Hashemi A, Rostami T. Depression in iran: a systematic review of the literature (2000-2010). *Payesh*. 2013; 12(6):567-94. [Persian]. [\[Link\]](#)
11. O'Cleirigh C, Ironson G, Smits JA. Does distress tolerance moderate the impact of major life events on psychosocial variables and behaviors important in the management of HIV? *Behavior therapy*. 2007; 38(3):314-323. [\[Link\]](#)
12. Reitzel LR, Smith NG, Obasi EM, Forney M, Leventhal AM. Perceived distress tolerance accounts for the covariance between discrimination experiences and anxiety symptoms among sexual minority adults. *Journal of anxiety disorders*. 2017; 48(5):22-27. [\[Link\]](#)
13. Simons JS, Gaher RM. The Distress Tolerance Scale: Development and validation of a self-report measure. *Motivation and emotion*. 2005; 29(2):83-102. [\[Link\]](#)
14. McHugh RK, Kertz SJ, Weiss RB, Baskin-Sommers AR, Hearon BA, Björvinsson T. Changes in distress intolerance and treatment outcome in a partial hospital setting. *Behavior therapy*. 2014; 45(2):232-240. [\[Link\]](#)
15. Forouzanfar A. Distress tolerance: Theory, Mechanism and Relation to Psychopathology. *Rooyesh-e-Ravanshenasi*. 2017; 6(2):239-262. [Persian]. [\[Link\]](#)
16. Leyro TM, Zvolensky MJ, Bernstein A. Distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders: a review of the empirical literature among adults. *Psychological bulletin*. 2010; 136(4):576-600. [\[Link\]](#)
17. Gaher RM, Hofman NL, Simons JS, Hunsaker R. Emotion regulation deficits as mediators between trauma exposure and borderline symptoms. *COTR*. 2013; 37(3):466-475. [\[Link\]](#)
18. Madahi ME, Madah L. Effectiveness of dialectical behavior therapy in reducing depression and suicide thoughts in girl students. *Journal of School Psychology*. 2014; 3(3):74-85. [Persian]. [\[Link\]](#)
19. Habibollahi A, Soltanizadeh M. The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on obsessions-compulsions in girl adolescents with body dysmorphic disorder. *Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry*. 2016; 2(4):1-10. [Persian]. [\[Link\]](#)
20. Juncos DG, Heinrichs GA, Towle P, Duffy K, Grand SM, Morgan MC, et al. Acceptance and commitment therapy for the treatment of music performance anxiety: a pilot study with student vocalists. *Frontiers in Psychology*. 2017; 8(7):986-990. [\[Link\]](#)
21. Mirzaeidoostan Z, Zargar Y, Zandi Payam A. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on death anxiety and mental health in women with HIV in Abadan City, Iran. *IJPCP*. 2019; 25(1):2-13. [Persian]. [\[Link\]](#)
22. Okati M, Shirazi M, Sanagouye Moharar G. Acceptance and commitment therapy on stress, depression, and Test anxiety in students with Thalassemia. *MEJDS*. 2020; 10(0):97-97. [Persian]. [\[Link\]](#)
23. Piri s, Hoseininasab D, Livarjani S. The effectiveness of Acceptance and commitment therapy on academic procrastination, resilience and depression in students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). *The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine*. 2020; Accepted online publishing. [Persian]. [\[Link\]](#)
24. Enayati-Shabkolaei M, Dousti Y, Mirzaian B. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Social Adjustment and Depression among Female High School Students with Specific Learning Disorder in Sari in Northern in Iran. *Community Health*. 2019; 6(3):244-252. [Persian]. [\[Link\]](#)
25. Tajvar Rostami S, Rahimi Khorasgani F, Sadat Kazemi M. The Effectiveness of Acceptance & Commitment Therapy (ACT) on Depression and Adjustment of Blind Girls. *Achievements of Clinical Psychology*. 2016; 2(2):49-66. [Persian]. [\[Link\]](#)
26. Molavi P, Mikaeili N, Rahimi N, Mehri S. The effectiveness of acceptance and commitment therapy based on reducing anxiety and depression in students with social phobia. *J*

- Ardabil Univ Med Sci. 2014; 14(4):412-23. [Persian]. [\[Link\]](#)
27. Swain J, Hancock K, Hainsworth C, Bowman J. Acceptance and commitment therapy in the treatment of anxiety: a systematic review. Clinical psychology review. 2013; 33(8):965-78. [\[Link\]](#)
28. Roohi R, Soltani AA, Zinedine Meimand Z, Razavi Nematollahi V. The Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Increasing the Self-Compassion, Distress Tolerance, and Emotion Regulation in Students with Social Anxiety Disorder. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2019; 6(3):173-87. [Persian]. [\[Link\]](#)
29. Asli azad m, Manshaee gr, Ghamarani A. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on cognitive emotion regulation and intolerance of uncertainty of the students with obsessive-compulsive disorder. Psychology of Exceptional Individuals. 2020; 9(36):33-53. [Persian]. [\[Link\]](#)
30. Amirian K, Mami S, Ahmadi V, Mohamadzadeh J. Effectiveness of Group Psychotherapy Based on Acceptance and Commitment Therapy on Difficulties Emotion Regulation and Distress Tolerance in Substance Abusers. J Educ Community Health. 2018; 5(2):53-61. [Persian]. [\[Link\]](#)
31. Forouzanfar A, Gholamali Lavasani M, Shoa kazemi M. The Effectiveness of Group Counselling based on Acceptance and Commitment Therapy in Distress Tolerance and Anxiety Sensitivity among Female Substance Abusers. Research on Addiction. 2018; 11(44):135-54. [Persian]. [\[Link\]](#)
32. Yarollahi NA, Rahimi M, Khabaz Shirazi A. Investigation the relationship of type D personality and it's sub-scales with depression in female students at Shahin shahr. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2018; 5(1):18-28. [Persian]. [\[Link\]](#)
33. Sheykholeslami A, Seyedesmaili ghami N. Comparing the effect of mindfulness-based stress reduction program and study skills training on the test anxiety in students. Journal of School Psychology. 2014; 3(2):104-21. [Persian]. [\[Link\]](#)
34. Gall MD, Borg WR, Gall JP. Educational research: An introduction, Boston: Longman Publishing; 1996. [\[Link\]](#)
35. Beck AT, Steer RA, Brown GK. Beck depression inventory-II. San Antonio. 1996; 78(2):490-8. [\[Link\]](#).
36. Dabson K Mohammadkhani P. Psychometric Co-ordinates of Beck Depression Inventory in patients with major depressive disorder during Relapse. Journal of Rehabilitation. 2005; 8(1):80-6. [Persian]. [\[Link\]](#)
37. Shams J, Azizi A, Mirzaei A. Correlation between Distress Tolerance and Emotional Regulation with Students Smoking Dependence. Hakim Health Systems research journal. 2010; 13(1):11-8. [Persian]. [\[Link\]](#)
38. Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J, Villatte JL, Pistorello J. Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior therapy. 2013; 44(2):180-98. [\[Link\]](#)
39. Tarkhan M. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Emotion Regulation and Life Meaning of Depressed Women. Journal of Psychological Studies. 2017; 13(3):147-164. [Persian]. [\[Link\]](#)

ژوئن کاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پریال جامع علوم انسانی