

می‌شوند که عوارض فردی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری به همراه دارد. لذا بررسی علل بازگشت این بیماران به ایران می‌تواند کمک بسیار مؤثری به تصمیم‌گیران حوزه سلامت حج زیارت در کاهش بار اقتصادی و اجتماعی حاصل از این موضوع بنماید. هدف از این مطالعه بررسی علل بازگشت زائران بیمار به ایران در موسم حج ۸۹ است.

روش‌ها: در این مطالعه مقطعی در سال ۸۹ که در بخش روانپزشکی بیمارستان‌های هلال احمر ایران در مکه و مدینه در ایام حج تمتع در کشور عربستان سعودی انجام شد، همه بیمارانی که براساس یک مصاحبه دقیق روانپزشکی و معیارهای DSMIV-TR در وضعیت حاد تشخیص داده می‌شدند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، نوع اختلال، زمان ارجاع و بیمارستان محل بستری همه بیماران ثبت و پس از ورود به نرم افزار spss نسخه ۱۷ تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: در مجموع ۱۰۶ مورد بیمار اعزام شده به ایران در حج تمتع ۸۹ بیماری‌های روانی با فراوانی ۲۶/۴ درصد، بیشترین علل اعزام ایران در طول ایام حج تمتع سال ۱۳۸۹ بود. بیشترین فراوانی اختلال مربوط به دمانس با ۴۱/۲ و دلیریوم حاد با ۳۸/۴ درصد بود.

نتیجه گیری: بیماری‌های روانی بیشترین علل بازگشت زائران قبل از موسم حج در حج ۸۹ بود که دقت عمل بیشتر پزشکان در غربالگری و تشخیص شدت این بیماری‌ها در هنگام معاینه در ایران و تأیید استطاعت و تحت نظر داشتن این بیماران در استفاده به موقع از داروها می‌تواند کمک مؤثری در کاهش هزینه‌ها و بار بیماری این بیماران در ایام حج باشد.

کلمات کلیدی: بیماران روانپزشکی، غربالگری صحیح، حج تمتع.

بررسی الگو و فراوانی اختلالات روانپزشکی در بین بیماران ارجاع شده به ایران در حج تمتع ۱۳۸۹

امین رضا طباطبائی^۱، غلامحسین مبارکی^۲، حسین فضلی^۳، مهدی رستمی فر^۴

۱- نویسنده مسئول: دکترای پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت در حج و زیارت، تهران، ایران

Email:art@hmc.ir

۲- متخصص روانپزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۳- دکترای پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت در حج و زیارت، تهران، ایران

۴- لیسانس رادیولوژی، مرکز تحقیقات سلامت در حج و زیارت، تهران، ایران

وصول مقاله: ۹۰/۲/۱۵ پذیرش مقاله: ۹۰/۴/۱

چکیده

مقدمه: عده‌ای از زائران به علت بیماری، کهولت سن و یا عود بیماری، دارای توانایی و استطاعت جسمی - روانی لازم برای به جا آوردن اعمال سنگین حج نیستند و بعضی از آنان قبل از موعد به ایران باز گردانده

مقدمه

کشور عربستان سعودی انجام شد. تمام بیمارانی که بنابر تشخیص پزشکان کاروان با اختلالات روان به بیمارستان هلال احمر ایران اعزام شده بودند، وارد مطالعه شدند و از بین آنان بیمارانی که براساس یک مصاحبه دقیق روانپزشکی و معیارهای DSMIV-TR در فاز حاد تشخیص داده و براساس نظر شورای پزشکی بیمارستان کاندید بازگشت به ایران می شدند وارد مطالعه گردیدند. این بیماران پس از درمان موقت، آمده ارجاع به ایران بر اساس پروازهای کشور عربستان (دو مرحله پرواز قبل از مناسک و بعد از مناسک حج) از طریق واحد انتقال مرکز پزشکی حج و زیارت در بیمارستان های مکه و مدینه شدند. از همه بیماران رضایت کتبی برای ورود به مطالعه اخذ گردید. این مطالعه در کمیته اخلاق مرکز تحقیقات سلامت در حج و زیارت مرکز پزشکی حج و زیارت نیز به لحاظ رعایت مسائل اخلاقی تصویب شد.

اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، نوع اختلال، زمان ارجاع و بیمارستان بستری همه بیماران ثبت و پس از ورود به نرم افزار spss نسخه ۱۷ تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

در مجموع ۱۰۶ مورد اعزام به ایران در حج تمتع ۸۹ مورد از فرودگاه جده و مدینه انجام شده بود. بیماری های روانی با فراوانی $\frac{26}{4}$ درصد، بیشترین علل اعزام ایران در طول ایام حج تمتع سال ۱۳۸۹ بود.

۵۷/۱ درصد بیماران اعزامی به علل اختلالات روانی را مردان و ۴۲/۹ درصد را زنان تشکیل می دادند. ۵۳/۶ درصد اعزامها قبل از انجام مناسک حج، ۴۶/۴ درصد بعد از انجام مناسک بود. ۹۲/۹ درصد اعزامها از مکه مکرمه و ۷/۱ درصد اعزامها از مدینه متوجه انجام شده بود. میانگین سن بیماران اعزامی $۱۲/۳۸ \pm ۷۹/۳۴$ بود و دامنه سنی بین ۴۰ تا ۹۳ سال بود.

دوره ۳۵ تا ۴۵ روزه ایام حج تمتع از بعد سلامت پیچیدگی ها و ویژگی های خاص خود را دارد (۱). عموماً مشکلات سلامت در طی دوران حج را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: گروه اول مشکلات سلامتی اکتسابی مانند بیماری های عفونی، ترومما، گرمایشی، مشکلات گوارشی و تنفسی است که زائر در طول دوران حج به دلیل شرایط خاص موسوم حج به آن دچار می گردد و گروه دوم عود یا تشدید بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی - عروقی، تنفسی و روانی به دلیل تغییر سبک و شرایط زندگی است (۲ و ۳).

اختلال یا بیماری روانی علاوه بر رنج و محدودیت هایی که برای فرد در ایام حج ایجاد می کند باعث می شود تا وی در فعالیت های عبادی و انجام مناسک واجب خود نیز دچار مشکلات شود (۴). تأثیر اختلالات روانی در ایام حج بر روی دیگر حجاج نیز به دلیل مراقبت از آنان و حمایت های فیزیکی و باور غلط بعضی نسبت به تهاجمی بودن و یا خطرناک بودن این افراد، مشکلات بسیار دیگر را نیز در کاروان های حجاج فراهم می آورد. بار سنگین هزینه های درمان نیز از دیگر عواملی است که این بیماری را در جمله بیماری های پرخطر در ایام حج قرار داده و مبتلایان به نوع حاد آن در ایام حج به ایران برای درمان های تخصصی ارجاع داده می شوند (۵ و ۶).

شناسایی میزان و نوع این اختلالات می تواند کمک مؤثری به تصمیم گیران سیستم سلامت در برنامه ریزی برای حجی سالم تر باشد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و علل ارجاع به ایران بیماران با تشخیص اختلال روانی در حج تمتع ۱۳۸۹ است.

روش ها

این مطالعه در بخش اعصاب و روان بیمارستان ایرانیان در مکه و مدینه در ایام حج تمتع ۱۳۸۹ در

می‌پردازد و نشان دهنده شیوع بالای بیماری‌های شناختی در بین زائران با سن بالا است. مطالعات بیشتر در خصوص شناسایی و درمان ناراحتی‌های روانی و اختلالات روانی در بین زائران ضروری به نظر می‌رسد.

نتیجه گیری

اختلالات روان‌پزشکی بیشترین علل بازگشت پیش از موعد زائران به ایران در موسوم حج^{۸۹} بود که لزوم دقت عمل بیشتر پزشکان کاروان در غربالگری و تشخیص این بیماری‌ها در معاینات قبل از اعزام زائران در ایران و تأیید استطاعت آنان را نشان می‌دهد. پایش مداوم این بیماران در طی سفر در مورد کترول عوامل تشدید کننده و مصرف صحیح و به موقع داروهای نیز می‌تواند کمک مؤثری در کاهش ابتلا به این اختلالات و نیز کاهش هزینه‌های انسانی و مالی حاصل از آن در ایام حج باشد.

References

1. Tabatabaei A, Mortazavi, M. Shamspour. N. "Prevalence of underlying diseases in Hajj & Pilgrimage". Medical Congress in Hajj & Pilgrimage. Tehran, 2011. P. 12 (In Persian).
2. Shamspour N Tabatabaei, A. Heidari, M. Disseminate knowledge in the health status of in Hajj pilgrimage. Medical Congress in Hajj & Pilgrimage. Tehran, 2011. P. 20. (In Persian).
3. Shafi S., Booy R, Haworth E., Rashid H, Memish Z.A. "Hajj: Health lessons for mass gatherings". Journal of Infection and Public Health. 2008; 1(1): 27-32.
4. Eytan A, Loutan L. Travel and psychiatric problems. Rev Med Suisse 2006; 2:1251-1255.
5. Şakir Özen, "Sociodemographic characteristics and frequency of psychiatric disorders in Turkish pilgrims attending psychiatric outpatient clinics during Hajj." Dicle Tip Derg / Dicle Med J2009.Vol 37, No 1, 8-15.
6. Masood K, Gazzaz ZJ, Ismail K, Dhafar KO, Kamal A. "Pattern of psychiatry morbidity during Hajj period at Al-Noor Specialist Hospital". Int J Psychiatry Med 2007; 37:163-172.

در بین بیماران روان‌پزشکی ارجاع شده، بیشترین نوع اختلال مربوط به دمانس حاد با ۴۱/۲ درصد بود و پس از آن دلیریوم حاد با ۳۸/۴ درصد و اختلالات خلقی با ۱۱/۲ درصد و اختلالات شخصیتی با ۹ درصد بیشترین علل اختلالات روان را تشکیل می‌دادند و ۰/۸ درصد موارد دیگر اختلالات روانی را تشکیل می‌داد. جنسیت و سن تاثیری در نوع اختلال نداشت ($p>0.05$).

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که بیماری‌های روانی بیشترین علل بازگشت به ایران در طول ایام حج بوده‌اند و بیماری‌ها دمانس و دلیریوم حاد بیشترین نوع اختلال روانی را تشکیل می‌دهند.

مطالعات اوزن در ۲۰۰۹ در بین زائران ترکیه‌ای افسردگی (۲۶ درصد) و اضطراب (۱۶ درصد) بیشترین علل بیماری‌های روانی در بین زائران ترکیه‌ای در شهر مکه را نشان داد و در مطالعه مسعود و همکاران نیز افسردگی و اضطراب بیشترین علل بیماری‌های روان را تشکیل می‌دادند که در هر دو مطالعه فوق میانگین سنی بسیار پایین‌تر از مطالعه حاضر بود (۵ و ۶).

به نظر می‌رسد، سن بالا، قطع مصرف یا مصرف نامرتب دارو به دلایل مختلف مثلًا اعتقاد به شفا در مکان‌های مقدس، تغییر شرایط آب و هوایی و سبک زندگی و اضطراب برای انجام صحیح اعمال و شک در انجام صحیح اعمال از عوامل مهم تشدید و عود بیماری‌های روانی در حج می‌باشد (۴ و ۵ و ۶).

همچنین اقامت طولانی در مکه و مدینه و شرایط دوری از خانواده و زندگی دسته جمعی نیز ممکن است از دلیل بروز یا عود بیماری‌های روانی در ایام حج باشد (۲ و ۱).

مطالعه حاضر اولین مطالعه‌ای است که به بررسی شرایط روانی در بین زائران بازگردانده شده به ایران

The Pattern and Frequency of Mental Disorders Among Patients who Returned to Iran from Hajj in ٢٠١٩

Corresponding author: Tabatabaei A, MD, Health Management Research Center at the Hajj & pilgrimage, Tehran, Iran
Email: art@hmc.ir

Mobaraki GH, Psychiatrist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Fazli H, MD, Health Research Center at the Hajj & pilgrimage, Tehran, Iran

Rostamifar M, BA in Radiology, Health Research Center at the Hajj & pilgrimage, Tehran, Iran

Received: ٢٠١٩-٠٦-٠٢

Accepted: ٢٠١٩-٠٧-٢٢

Abstract

Introduction: Some of the pilgrims were returned to Iran due to illness, aging, disease exacerbation, and physical or mental disabilities to perform the necessary actions in Hajj. However, this can impose individual, social and economic side effects on the country. The aim of this study was to investigate the causes of Iranian patients' pilgrims return to the country in Hajj season in ٢٠١٩.

Methods: This cross sectional study was done in psychiatric department of Iranian Red Crescent society Hospital in Mecca and Medina during the Hajj season in Saudi Arabia in ٢٠١٩. All patients with acute conditions were studied regarding DSMIV-TR criteria and a detailed psychiatric interview.

Findings: Totally, ١٠٧ patients with different problems were sent to Iran during the Hajj ٢٠١٩. The mental disorder was the most common cause (٪٢٧٪); then, the highest frequency of disorders was related to dementia and acute delirium, ٪٤١٪ and ٪٣٨٪ respectively.

Conclusion: Mental illness was the most common reason among pilgrims who were returned to Iran before Hajj season in ٢٠١٩. Actually, by accurate diagnostic and screening tests during medical examination in the country, and patients care in timely use of medicines during the pilgrimage, most physicians can help the patients and decrease the cost effectively.

Key words: patients, psychiatry, proper screening, Hajj