



Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

doi: <https://dx.doi.org/10.22067/jgrd.2023.80433.1230>

مقاله پژوهشی-مطالعه موردی

مدل‌سازی آماری رابطه بین شیب قرار رسوبات و شیب دامنه نیکاها (مطالعه موردی: نیکاهای کویر ابراهیم‌آباد سیرجان)

صادق کریمی (دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران)

karimi.s.climatologist@uk.ac.ir

محسن پورخسروانی (دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، نویسنده مسئول)

pourkhosravani@uk.ac.ir

صص ۲۹۹ - ۲۸۱

چکیده

تنوع پوشش گیاهی و هم‌زیستی آن با فرایندهای ژئومورفولوژیک تأثیر مهمی بر تعادل مناظر طبیعی دارد؛ بر همین اساس، این پژوهش سعی دارد اختلاف موجود بین شیب تعادلی نیکاهای مختلف و شیب قرار رسوبات در منطقه مطالعاتی را به صورت کمی اندازه‌گیری و مقایسه کند؛ بدین منظور ابتدا شیب قرار رسوبات در منطقه تعیین شد. سپس نیکاهای نمونه در امتداد ۱۰ ترانسکت که کل منطقه را پوشش می‌داد، انتخاب شد و شیب دامنه نیکا توسط شیب‌سنج در جهات چهارگانه شمال، جنوب، شرق و غرب به درصد اندازه‌گیری شد. پس از آن، متوسط شیب دامنه نیکا محاسبه شد. در نهایت، ارتباط بین شیب دامنه نیکاها و شیب قرار رسوبات با استفاده از مدل‌های آماری ارزیابی و تحلیل شد. بررسی نیکاهای منطقه مورد مطالعه مبین وجود چهار نوع نیکا براساس نوع گونه گیاهی است. نتایج آزمون تجزیه واریانس، اختلاف معناداری بین شیب تعادلی نیکاهای گونه‌های مختلف نشان می‌دهد. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها براساس فاکتورهای شیب تعادلی نیکاها و شیب حد رسوبات منطقه دو گروه متمایز را نشان می‌دهد؛ به این صورت که در

سطح احتمال خطای یک درصد ($\alpha < 0/01$) گروه اول شامل نیکاهای گونه‌های درختچه گز، گل گزی و اشنان و گروه دوم شامل نیکاهای گونه خار شتر و شیب حد رسوبات منطقه مطالعاتی است. نتایج گروه‌بندی براساس شیب تعادلی نیکا بیانگر عملکرد متفاوت گونه خار شتر در مقایسه با سایر گونه‌هاست که علت این اختلاف در مکانیسم تطابقی این گونه در مواجهه با تنش فرایند بادرفتی است. نتایج آنالیز واریانس میانگین شیب جهات مختلف دامنه نیکاهای گونه‌های گیاهی مختلف نشان می‌دهد، متوسط شیب جهات مختلف دامنه نیکا در گونه خار شتر در سطح یک درصد ($\alpha < 0/01$) معنادار شده است. به‌طور کلی، میانگین شیب هریک از جهات چهارگانه در نیکاهای گونه خار شتر یکسان نیست؛ یعنی نیکاهای گونه خار شتر در مقایسه با نیکاهای گونه‌های دیگر نامتقارن‌تر هستند؛ بنابراین شکل رویشی گیاهان نقش مهمی در ایجاد مورفولوژی چشم‌انداز ناهمواری نیکاهای ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها: شکل رویشی، شیب تعادلی، شیب قرار، نیکا، کویر ابراهیم‌آباد، سیرجان.

۱. مقدمه

سیستم‌های اکوتومورفیک از جمله سیستم‌های باز هستند. انتقال ماده و انرژی داده‌های این نوع از سیستم‌هاست که می‌تواند عامل فعالیت سیستم قلمداد شوند. سیستم حاکم بر چشم‌انداز نیکا حکایت از انباشت تصادفی ماده و انرژی در یک نقطه زمانی-فضایی دارد که به‌صورت اجزاء یا خرده‌سیستم‌های به‌هم‌مرتبطی سازمان یافته‌اند که دارای کنش و واکنش‌اند و جهت حرکت ابعاد فضایی دامنه گسترش یا پراکنش نیکاهای را رقم می‌زند. انباشت نقطه‌ای مواد از قانون عمل و عکس‌العمل یا کنش و واکنش تبعیت می‌کند که عملگر سیستم فرایند بادرفتی و عکس‌العمل سیستم نیروی پوشش گیاهی است که مهارکننده نیروی عمل یا کنش سیستم است. پوشش گیاهی فرایندی است که در مقابل فرایند بادرفتی مقاومت می‌کند و هرچه انرژی آن افزایش یابد، انباشت مواد و تشکیل ژئوفرم نیکا بهتر و سریع‌تر صورت می‌پذیرد. با توجه به اینکه پیچیدگی و تنوع از خصوصیات اصلی سیستم‌های باز و سیستم‌های اکوتومورفیک است (پورخسروانی و همکاران، ۱۳۸۹، ص. ۱۴۰)، مدل‌سازی به‌عنوان ابزاری

برای درک ارتباطات اکوتومورفولوژیک پیچیده است که در سیر تکامل ناهمواری و پوشش گیاهی حاکم می‌تواند در مدیریت تغییرات محیطی یا انسانی در سیستم‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک مؤثر واقع شود (پورخسروانی و همکاران، ۱۳۹۴، ص. ۱۸)؛ بر همین اساس، اکوتومورفولوژی مناطق بیابانی نمونه‌ای بارز از سیستم‌های پیچیده است که درک آن‌ها به‌وسیله دو فرایند اکولوژی و ژئومورفولوژی و پس‌خوراند بین آن‌ها بهتر صورت می‌گیرد (استالینز^۱، ۲۰۰۶، ص. ۴). باید توجه داشت که پدیده‌شناسی این سیستم‌ها شامل بررسی رفتار فوق‌العاده و ساختارهای پراکنده در فرم نمونه‌های فضایی و موقتی مورد بحث آن‌هاست (آندریاس^۲، ۲۰۰۷، ص. ۱۱). چشم‌اندازهای نیکایی عموماً در سطوح همواری تشکیل می‌شوند که یک رژیم باد قوی وجود داشته باشد، رسوب مورد نیاز در دسترس باشد، سطح آب زیر زمین بالا باشد و رطوبت موجود برای حیات پوشش گیاهی کافی باشد (هسپ و اسمیت^۳، ۲۰۱۷، ص. ۱۳). شکل نیکا تابعی از اندازه، تراکم و به‌خصوص نحوه رشد گیاه میزبان است (لی لی^۴ و همکاران، ۲۰۱۳، ص. ۳۴۵). گیاهان با کاهش سرعت باد و تجمع رسوبات اطراف خود باعث ایجاد چشم‌انداز نیکا می‌شوند (مایوه و همکاران، ۲۰۱۷، ص. ۳۷۹). به‌طور کلی، عوامل مختلفی نظیر بردباری اکولوژیک گونه‌های گیاهی در توسعه چشم‌انداز نیکا نقش بسزایی دارد و قابلیت ایجاد نیکا در گونه‌های مختلف متفاوت است (لانگفورد^۵، ۲۰۰۳، ص. ۸). از آنجا که عوامل متعددی در شکل‌شناسی و پایداری نیکا دخیل‌اند، این تحقیق سعی دارد با ثابت نگه داشتن برخی از این عوامل مانند عوامل اقلیمی (رطوبت، دما، باد و...)، عوامل ترسیمی (اندازه، دانه‌بندی و...) و عامل زمان به بررسی رابطه بین مقدار شیب حد رسوبات و شیب دامنه نیکاهای مختلف و تأثیر آن بر میزان پایداری نیکاهای در کویر ابراهیم‌آباد سیرجان بپردازد.

1. Stallins
2. Andreas
3. Hesp & Smyth
4. Lili
5. Mayaud
6. Langford

۲. پیشینه تحقیق

اهمیت کاربردی مطالعات اکوژئومورفولوژیک در چشم‌اندازهای بیابانی بیشتر به ارتباط طبیعی بین عوامل این سیستم‌های سازماندهی مربوط است؛ به همین دلیل، کشف روابط بین پارامترهای این سیستم پیچیده اهمیت بسیاری در ثبات، پایداری و مدیریت محیط خواهد داشت؛ از این رو، محققان پژوهش‌های متفاوتی را در این راستا انجام داده‌اند؛ از جمله هسپ^۱ (۱۹۸۱) بیان می‌کند که ارتفاع تپه‌های ماسه‌ای به قطر تپه و زاویه قرار رسوبات بستگی دارد؛ در حالی که طول تپه‌ها به قطر تپه ماسه‌ای و سرعت باد بستگی دارد. همچنین هسپ و مک لچلان^۲ (۱۹۹۲) ضمن بررسی تأثیر فرم رویشی گونه‌های گیاهی بر توسعه، دینامیک و مورفولوژی تپه‌های نیکایی گزارش دادند که فرم رویشی گونه گیاهی تا حد زیادی منعکس‌کننده مورفولوژی، شیب تعادلی و پایداری تپه‌های نیکایی است. نگهبان و همکاران (۱۳۹۲) ضمن ارزیابی چشم‌اندازهای نیکایی در حاشیه بیابان لوت بیان کردند، نیکاهای تابعی از رژیم باد در منطقه، مقدار بار رسوب در دسترس، رویشگاه گونه گیاهی و نوع پوشش گیاهی هستند. جیان‌هویی^۳ و همکاران (۲۰۱۰) ضمن بررسی توزیع فضایی نیکاهای در مناطق خشک شمال چین بیان کردند، برای حفظ و ترمیم محیط زیست در مناطق خشک و نیمه‌خشک، توسعه نیکاهای و تنوع پوشش گیاهی نقش اساسی دارد. در پژوهشی دیگر، یانگ ژنگ^۴ و همکاران (۲۰۱۲) ضمن مطالعه رابطه بین ارتفاع و طول نیکاهای گونه *Nitraria sphaerocarpa* در بیابان گبی بیان کردند، بیشتر آن‌ها در مرحله رشد قرار دارند. جمز و الوادهی^۵ (۲۰۱۳) ضمن مطالعه ارتباط بین سرعت باد، پوشش گیاهی و تپه‌های نیکایی نتیجه گرفتند، مورفولوژی نیکا به وسیله الگوی رشد گونه گیاهی کنترل می‌شود؛ به طوری که ارتفاع نیکا به مقدار زیادی به ارتفاع تاج پوشش گیاه بستگی دارد، اما طول نیکا به ارتفاع گیاه، عرض گیاه و سرعت باد وابسته است. همچنین ژانگ^۶ و همکاران (۲۰۲۲) ضمن مطالعه


-
1. Hesp
 2. Hesp & Mclachlan
 3. Jianhuei
 4. Yong Zhong
 5. Jasem & Al-Awadhi
 6. Zhang

مورفولوژی نبک‌های بیابان گبی در شمال چین بیان کردند، ارتفاع، طول و عرض تپه‌های نبکایی با ارتفاع، طول و عرض پوشش گیاهی ارتباط دارد.

۳. روش‌شناسی تحقیق

۳.۱. موقعیت منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه موسوم به کویر ابراهیم‌آباد سیرجان با مساحتی در حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع از محدوده حوضه آبریز کویر سیرجان است که در فرورفتگی کوچکی واقع در انتهای جنوبی آبخیز اصفهان قرار گرفته است (کلینسلی، ۱۳۸۱، ص. ۲۲۲). حوضه آبریز کویر سیرجان در محدوده طول‌های $57^{\circ} 54'$ و $27^{\circ} 56'$ شرقی قرار دارد که کویر ابراهیم‌آباد در محدوده $44' 55''$ تا $58' 55''$ طول شرقی و $28^{\circ} 53'$ تا $29^{\circ} 05'$ عرض شمالی در جنوب شرق آبریز کویر سیرجان واقع شده است. ۱، موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می‌دهد. کویر ابراهیم‌آباد سیرجان با ارتفاع متوسط ۱۷۰۰ متر از سطح تراز دریا و متوسط بارندگی ۱۰۰ میلی‌متر و میانگین دمای سالانه ۱۷/۱ درجه سانتی‌گراد در جنوب شرق شهرستان سیرجان قرار دارد. جهت باد غالب در این کفه 135° جنوب شرقی است.



شکل ۱. موقعیت منطقه مورد مطالعه

مأخذ: نگارندگان، ۱۴۰۱

۲.۳. مواد و روش‌ها

تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، محدوده کویر ابراهیم‌آباد سیرجان مشخص شد و سپس ضمن بازدید صحرایی از منطقه قلمرو توسعه نبکاها تعیین شد. سپس زاویه شیب قرار رسوبات منطقه مطالعاتی اندازه‌گیری شد. به‌طورکلی، اگر رسوبات در شرایط عادی از نظر رطوبت و ساختمان آزادانه تجمع حاصل کنند، شیب دامنه توده یا تپه تشکیل شده به سمت یک حد میل می‌کند که از این مرحله به بعد با افزایش ارتفاع شیب دامنه توده تغییر نمی‌کند. به این زاویه، «زاویه شیب حد» یا «شیب قرار رسوبات» می‌گویند (لانگ‌فورد^۲، ۲۰۰۳، ص. ۷). برای اندازه‌گیری زاویه شیب حد رسوبات در منطقه مورد مطالعه با استفاده از صفحه مدرج

1. Angle of Repose


2. Langford

طراحی شده (شکل ۵)، زوایای قرارگیری رسوبات در جهات مختلف اندازه‌گیری شد؛ به این صورت که طبق جدول ۲، رسوبات موجود در منطقه مورد مطالعه به مرکز صفحه مدرج طراحی شده ریخته شد و در هر مرحله، ارتفاع و شیب قرار رسوبات در جهات چهارگانه در جهات چهارگانه اندازه‌گیری شد تا اینکه در مرحله‌ای از آزمایش شیب رسوبات ثابت شد. از آن مرحله به بعد، هر قدر ارتفاع رسوبات افزایش یابد، زاویه شیب رسوبات ثابت باقی می‌ماند که این زاویه بیانگر زاویه شیب حد رسوبات منطقه مورد مطالعه است که برابر با ۵۵ درصد است. برای اطمینان از درستی عدد به دست آمده، این زاویه در قسمت‌های مختلف منطقه مورد مطالعه اندازه‌گیری شد. در مرحله بعد، نمونه برداری در امتداد ۱۰ ترانسکت ۱۰۰۰ متری که کل کویر را پوشش می‌داد، صورت گرفت. تنها نبکاهایی که با ترانسکت‌های مزبور برخورد کردند، مطالعه و اندازه‌گیری میدانی شده‌اند. حجم نمونه برای نبکاهای مختلف متفاوت بوده و به موقعیت نبکاها و محل ترانسکت‌ها بستگی داشته است که در مجموع، ۳۹۲ نبکا از گونه‌های مختلف اندازه‌گیری و ارزیابی شد. از این تعداد، ۱۴۳ نبکا به گونه *Tamarix* *mascatensis*، ۱۵۷ نبکا به گونه *Reaumeria turcestanica*، ۶۱ نبکا به گونه *Alhagi* *manifera* و ۳۱ نبکا به گونه *Seidlitzia florida* مربوط است. سپس در امتداد هر ترانسکت شیب دامنه نبکا توسط شیب‌سنج در جهات چهارگانه شمال، جنوب، شرق و غرب به درصد اندازه‌گیری شد و متوسط شیب دامنه نبکا محاسبه شد. پس از اندازه‌گیری شیب حد رسوبات و شیب دامنه نبکاها، برای تفکیک نبکاهای گونه‌های مختلف گیاهی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، اختلافات بین میانگین صفت شیب نبکاهای مختلف و شیب حد رسوبات آزمون شد. سپس با استفاده از آزمون‌های مقایسه میانگین‌ها، گروه‌های مختلف نبکاها بر اساس شیب دامنه نبکا و شیب حد رسوبات پهنه مطالعاتی تفکیک شد. برای این امر از آزمون مقایسه میانگین S.N.K در سطح احتمال خطای یک درصد ($\alpha=0/01$) استفاده شد.

جدول ۱. محاسبه زاویه شیب قرار رسوبات در منطقه مورد مطالعه

مأخذ: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۱

ارتفاع رسوبات cm	جهت شیب								حجم رسوبات
	غرب		شرق		جنوب		شمال		
	درصد	درجه	درصد	درجه	درصد	درجه	درصد	درجه	
۷	۴۵	۲۰	۴۶	۲۱	۴۸	۲۲	۴۶	۲۱	مرحله اول
۹	۴۸	۲۳	۴۷	۲۳	۵۰	۲۳	۴۹	۲۴	مرحله دوم
۱۰	۵۱	۲۶	۵۱	۲۶	۵۲	۲۶	۵۳	۲۷	مرحله سوم
۱۳/۵	۵۳	۲۸	۵۵	۲۹	۵۴	۲۸	۵۵	۲۹	مرحله چهارم
۱۵	۵۵	۲۹	۵۵	۲۸	۵۵	۲۹	۵۵	۲۹	مرحله پنجم
۱۶/۵	۵۵	۲۹	۵۵	۲۹	۵۶	۳۰	۵۵	۲۹	مرحله ششم
۱۹	۵۵	۲۹	۵۵	۲۹	۵۵	۲۹	۵۵	۲۹	مرحله هفتم



شکل ۲. اندازه‌گیری شیب قرار رسوبات در منطقه مورد مطالعه

مأخذ: نگارندگان، ۱۴۰۱

جدول ۲. مشخصات گونه‌های گیاهی تشکیل دهنده نیکا در منطقه مورد مطالعه

مأخذ: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۱

اسم علمی	اسم فارسی	خانواده	فرم حیاتی	فرم رویشی
Tamarix macatensis	گز	Tamaricaceae	درختچه‌ای	فانروفیت
Seidlitzia florida	اشنان	Tamaricaceae	بوته‌ای	فانروفیت
Reaumuria Turcestanica	گل‌گری	Tamaricaceae	بوته‌ای	کاموفیت

اسم علمی	اسم فارسی	خانواده	فرم حیاتی	فرم رویشی
Alhagi mannifera	خارشتر	Fabaceae	فورب چند ساله	همی کریپتوفیت

گونه‌های گیاهی تشکیل دهنده نبکاهای منطقه با مراجعه به فلور ایران مورد شناسایی واقع شده که در مجموع مشخصات گونه‌های مزبور در جدول ۱ درج شده است (مظفریان، ۱۳۸۲، ص. ۳۴۵).



Reaumuria Turcestanica

Tamarix mascatensis



Alhagi mannifera

Seidlitzia florida

شکل ۳. تصویر نبکاهای گونه‌های مختلف گیاهی در منطقه مورد مطالعه

مأخذ: نگارندگان، ۱۴۰۱

۴. مبانی نظری تحقیق

پدیده فرسایش بادی بیشتر در اقالیم خشک و نیمه‌خشک عمل می‌کند و با توجه به اینکه بیش از دو سوم ایران در این اقالیم قرار گرفته است، فرسایش بادی به‌عنوان عاملی مؤثر در تخریب و ایجاد خسارت در این مناطق است. به‌طور کلی، خاک‌های مناطق خشک در مقابل عوامل فرساینده به‌دلیل کمبود مواد آلی آسیب‌پذیری بیشتری دارند. با افزایش میزان خاک در طی زمان، میزان فرسایش در مکان نیز افزایش می‌یابد. بررسی پویایی و تغییرپذیری عوارض ژئومورفولوژیکی زمین، به‌ویژه در مناطق خشک و بیابانی که به‌طور عمده از عوارض ماسه‌ای پوشیده شده است، به‌دلیل تأثیر منفی ماسه‌های متحرک در زندگی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد. فضای وسیع دشت‌ها، فقر یا نبود پوشش گیاهی، فراوانی ذرات ریزدانه، سست و منفصل بودن دانه‌ها، از جمله عواملی هستند که شرایط را برای شکل‌زایی باد در دشت‌های داخلی فراهم کرده‌اند (علائی طالقانی، ۱۳۸۴، ص. ۲۹۵). در همین راستا، ژئومورفولوژی بادی زمینه‌ای غنی و گسترده برای بررسی فرایندها و لندفرم‌های بادی در سطح زمین فراهم می‌کند. حمل ماسه توسط فرایند بادی تحت‌تأثیر روابط پیچیده غیرخطی قرار می‌گیرد و توسعه و تکامل ناهمواری‌های ماسه‌ای متأثر از پدیده خودتنظیمی حاکم بر سیستم چشم‌انداز است. از آنجاکه گیاهان در برابر رطوبت پایاترند، نقش مؤثرتری در تنظیم حرکت مواد به‌وسیله باد ایفا می‌کنند. مهم‌ترین نقش پوشش گیاهی در کاهش فرسایش بادی ایجاد ناهمواری است که به این وسیله سرعت باد را در نزدیکی سطح خاک کاهش می‌دهد (رفاهی، ۱۳۸۸، ص. ۳۰). نوع و تراکم پوشش گیاهی منجر به دینامیک رسوبات در سیستم می‌شود؛ به‌طوری‌که پوشش گیاهی انتقال رسوب را کاهش می‌دهد و منبع رسوب را محدود می‌کند (لان کاستر و باس^۱، ۱۹۹۸، ص. ۱۵). بین سیستم‌های بادی که از لحاظ مقدار بار رسوب فقیر و غنی هستند، تشکیلات متفاوتی از تپه‌های ماسه‌ای می‌توان مشاهده کرد (هرسن^۲، ۲۰۰۴، ص. ۱۳) که عوارض نبکایی یکی از آنهاست. در واقع، نبکا عکس‌العمل طبیعی سیستم در مقابل تنش فرسایش بادی است و سیستم با ایجاد این عارضه در تعدیل چشم‌انداز بادی سعی کرده است؛

1. Lancaster & Baas

2. Hersen

به عبارت دیگر، سیستم با اتخاذ راهکارهای پسخوراند منفی در خنثی کردن تنش فرسایش بادی سعی داشته است که نتیجه آن ایجاد چشم‌انداز نیکاست (موسوی و همکاران، ۱۳۹۱، ص. ۱۱۳). این چشم‌اندازها که عمدتاً در منطق حمل یا ترانسفر رسوبات متحرک ایجاد می‌شوند، نقش مهمی در کنترل و کاهش اثرات ناشی از عملکرد فرایند بادرستی در مناطق مستعد خواهند داشت.

۵. یافته‌های تحقیق

اطلاعات آمار توصیفی شیب دامنه نیکاهای مختلف در منطقه مورد مطالعه در جدول ۳ آورده شده است.

جدول ۳. اطلاعات آماری شیب نیکاهای مختلف در منطقه مورد مطالعه

مأخذ: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۱

گونه	پارامتر	تعداد	میانگین	انحراف معیار
Tamarix mascatensis	شیب شمالی	۱۴۳	۳۶/۲۳۰۸	۱۴/۵۱۴۰۵
	شیب جنوبی	۱۴۳	۳۵/۹۵۸۰	۱۴/۷۴۷۵۶
	شیب شرقی	۱۴۳	۳۸/۵۲۴۵	۱۳/۰۸۹۰۱
	شیب غربی	۱۴۳	۳۵/۰۰۷۰	۱۳/۸۷۱۳۹
Reaumaria turcestanica	شیب شمالی	۱۷۵	۳۶/۷۳۲۵	۱۴/۲۷۴۹۵
	شیب جنوبی	۱۷۵	۴۰/۹۶۸۲	۱۷/۸۰۲۴۸
	شیب شرقی	۱۷۵	۳۵/۳۷۵۸	۱۶/۵۷۱۶۸
	شیب غربی	۱۷۵	۳۹/۱۲۷۴	۱۸/۹۶۵۴۶
Alhagi manifera	شیب شمالی	۶۱	۴۷/۲۴۵۹	۲۱/۷۰۹۰۱۸
	شیب جنوبی	۶۱	۴۸/۰۱۶۴	۱۵/۳۶۱۷۴
	شیب شرقی	۶۱	۴۸/۷۷۰۵	۱۳/۲۱۱۶۰
	شیب غربی	۶۱	۴۳/۰۶۵۶	۱۴/۶۰۵۷۹
Seidlitzia florida	شیب شمالی	۳۱	۳۵/۸۰۶۵	۱۷/۷۶۲۱۷
	شیب غربی	۳۱	۳۲/۰۷۴۱۹	۱۵/۵۴۹۸۵
	شیب جنوبی	۳۱	۳۵/۱۹۳۵	۱۲/۴۲۱۵۴
	شیب غربی	۳۱	۳۶/۸۰۶۵	۱۴/۰۹۸۲۷

خلاصه اطلاعات آماری شیب دامنه نیکاهای گونه‌های مختلف در جدول ۳ ارائه شده است. این اطلاعات شامل میانگین، انحراف معیار و تعداد نمونه‌هاست.

جدول ۴. نتایج آنالیز واریانس میانگین شیب نیکاهای مختلف و شیب حد رسوبات در منطقه مورد مطالعه
 مأخذ: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۱

مقدار معناداری	مقدار F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	عوامل	پارامتر (صفت)
۰/۰۰۰	۱۱/۰۲۲	۱۵۰۵/۴۶۷	۴	۶۰۲۱/۸۷۰	بین گروه‌ها	متوسط شیب
.....	۱۳۶/۵۸۵	۳۹۲	۵۳۵۴۱/۱۴۶	داخل گروه‌ها	
.....	۳۹۶	۵۹۵۶۳/۰۱۶	مجموع	

جدول ۴ نتایج آنالیز واریانس میانگین شیب دامنه نیکاهای گونه‌های گیاهی مختلف و شیب حد رسوبات را در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد. براساس این جدول، متوسط شیب برای نیکاهای گونه‌های گیاهی مختلف و همچنین شیب حد رسوبات منطقه مورد مطالعه با استفاده از آنالیز واریانس تحلیل شده است؛ به طوری که میانگین شیب برای نیکاهای مختلف و شیب حد رسوبات در سطح احتمال خطای کمتر از یک درصد ($\alpha = 0/01$) معنادار شده است؛ یعنی به طور کلی میانگین هریک از صفات در نیکاهای مختلف یکسان نیست و شیب دامنه نیکاهای همواره کوچکتر از شیب حد است.

جدول ۵. نتایج مقایسه میانگین فاکتور شیب، نیکاهای مختلف و شیب حد رسوبات با استفاده از آزمون

S.N.K

مأخذ: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۱

گروه‌ها با میزان خطای ($\alpha = 0/01$)		تعداد	فاکتور
۲	۱		
.....	۳۶/۱۳۷۱	۳۱	متوسط شیب نیکا اشنان
.....	۳۶/۴۳۰۱	۱۴۳	متوسط شیب نیکا در ختجه گز
.....	۳۸/۲۰۰۶	۱۵۷	متوسط شیب نیکا گل گزی
۴۶/۵۸۶۱	۶۱	متوسط شیب نیکا خارشتر
۵۴/۶۰۰۰	۱	متوسط شیب حد

نتایج جدول ۵ نشان می‌دهد، براساس میانگین شیب مخروط نبکاهای گونه‌های مختلف گیاهی و میانگین شیب حد رسوبات، دو گروه مخروط تفکیک‌شدنی است. در سطح احتمال خطای یک درصد، گروه اول شامل نبکاهای گونه اشنان، درختچه گز و گل گزی است و گروه دوم شامل نبکای گونه خارشتر و شیب حد رسوبات منطقه مورد مطالعه است. نتایج این جدول نشان می‌دهد، گونه‌های گیاهی مختلف نبکاهایی با شیب دامنه مختلف به وجود می‌آورند. نتایج نشان می‌دهد، گونه خارشتر، نبکاهای با شیب تندتری در مقایسه با بقیه گونه‌های گیاهی به وجود آورده است که مؤید ناپایداری نسبی بیشتری در مقایسه با سایر گونه‌هاست.

جدول ۶. نتایج آنالیز واریانس میانگین شیب جهات مختلف نبکاهای مختلف در محدوده مورد مطالعه

مأخذ: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۱

مقدار معناداری	مقدار F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	عوامل	پارامتر (صفت)	نوع نبکا
۰/۱۸۷	۱/۶۰۷	۳۱۸/۱۳۸	۳	۹۵۴/۴۱۳	بین گروه‌ها	متوسط شیب	درختچه گز
.....	۱۹۷/۹۷۱	۵۶۸	۱۱۲۴۴۷/۷۹۰	داخل گروه‌ها		
.....	۵۷۱	۱۱۳۴۰۲/۲۰۳	مجموع		
۰/۰۱۸	۳/۳۶۴	۹۷۱/۴۹۵	۳	۲۹۱۴/۴۸۴	بین گروه‌ها	متوسط شیب	گل گزی
.....	۲۸۸/۷۵۳	۶۲۴	۱۸۰۱۸۱/۸۵۵	داخل گروه‌ها		
.....	۶۲۷	۱۸۳۰۹۶/۳۶۹	مجموع		
۰/۳۱۵	۱/۱۹۵	۲۷۲/۰۷۳	۳	۸۱۶/۲۱۸	بین گروه‌ها	متوسط شیب	اشنان
.....	۲۲۷/۵۸۷	۱۲۰	۲۷۳۱۰/۴۵۲	داخل گروه‌ها		
.....	۱۲۳	۲۸۱۲۶/۶۶۹	مجموع		
۰/۰۰۰	۶/۹۲۸	۱۷۲۲/۷۴۷	۳	۵۱۶۸/۲۴۲	بین گروه‌ها	متوسط شیب	خار شت
.....	۲۴۸/۶۴۸	۲۴۰	۵۹۶۷۵/۵۷۴	داخل گروه‌ها		
.....	۲۴۳	۶۴۸۴۳/۸۱۶	مجموع		

جدول ۶ نتایج آنالیز واریانس میانگین شیب جهات مختلف دامنه نبکاهای گونه‌های گیاهی مختلف را در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد. براساس این جدول، متوسط شیب جهات

مختلف دامنه نبکا برای نبکاهای گونه گیاهی خارشتر در سطح احتمال خطای کمتر از یک درصد ($\alpha = 0/01$) معنادار شده است؛ یعنی به‌طور کلی میانگین شیب هریک از جهات چهارگانه در نبکاهای گونه خارشتر یکسان نیست، اما طبق نتایج جدول آنالیز واریانس، میانگین شیب جهات مختلف دامنه نبکاهای گونه‌های درختچه گز، گل گزی و اشنان در سطح احتمال خطای کمتر از یک درصد ($\alpha = 0/01$) معنادار نشده است؛ یعنی میانگین شیب هر یک از جهات چهارگانه در نبکاهای این گونه‌های گیاهی یکسان است.

جدول ۷. نتایج مقایسه میانگین‌های فاکتور شیب جهت مختلف دامنه نبکاهای مختلف در منطقه مورد مطالعه

با استفاده از آزمون S.N.K

مأخذ: یافته‌های پژوهش، ۱۴۰۱

نوع نبکا	فاکتور	تعداد	گروه‌ها با میزان خطای ($\alpha=0/01$)	
			۱	۲
درختچه گز	شیب غربی	۱۴۳	۳۵/۰۰۷۰
	شیب جنوبی	۱۴۳	۳۵/۹۵۸۰
	شیب شمالی	۱۴۳	۳۶/۲۳۰۸
	شیب شرقی	۱۴۳	۳۸/۵۲۴۵
گل گزی	شیب شرقی	۱۵۷	۳۵/۳۷۵۸
	شیب شمالی	۱۵۷	۳۶/۷۳۲۵
	شیب غربی	۱۵۷	۳۹/۱۲۷۴
اشنان	شیب جنوبی	۱۵۷	۴۰/۹۶۸۲
	شیب جنوبی	۳۱	۳۲/۷۴۱۹
	شیب شرقی	۳۱	۳۵/۱۹۳۵
	شیب غربی	۳۱	۳۶/۸۰۶۵
خارشتر	شیب شمالی	۳۱	۳۹/۸۰۶۵
	شیب غربی	۶۱	۴۳/۱۶۳۹
	شیب جنوبی	۶۱	۴۶/۵۴۱۰
	شیب شمالی	۶۱	۴۸/۲۷۸۷
	شیب شرقی	۶۱	۵۵/۷۳۷۷

نتایج جدول ۷ نشان می‌دهد، براساس میانگین شیب جهات مختلف دامنه نبک‌های گونه-های مختلف گیاهی، تنها نبک‌های گونه خارشتر در دو گروه قرار می‌گیرند. در سطح احتمال خطای کمتر از یک درصد، گروه اول شامل شیب‌های شمال، جنوب و غرب و گروه دوم شامل شیب‌های شرقی هستند، اما در نبک‌های گونه‌های درختچه گز، گل‌گری و اشنان شیب جهات مختلف دامنه نبکا در یک گروه قرار می‌گیرند. این نتایج حاکی از آن است که به‌طور کلی مخروط نبک‌های گونه‌های درختچه گز، گل‌گری و اشنان در مقایسه با مخروط نبک‌های گونه خارشتر متقارن‌تر هستند و می‌دانیم که در شکل‌شناسی، طبق اصل تقارن هرچه شکلی متقارن‌تر باشد، میزان پایداری آن بیشتر است؛ بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده، مخروط نبک‌های گونه خارشتر که تقارن کمتری دارند، پایداری کمتری دارند.

۶. نتیجه‌گیری

نکته درخور توجه در فرایند ایجاد و توسعه نبکا، وضعیت پوشش گیاهی است. عوامل مختلفی نظیر بردباری اکولوژیک گونه‌های گیاهی در توسعه چشم‌انداز نبکا نقش بسزایی دارد و قابلیت ایجاد نبکا در گونه‌های مختلف متفاوت است؛ به‌طوری‌که مورفولوژی نبکا تا حد زیادی به‌وسیله الگوهای رویشی گونه‌های گیاهی تشکیل‌دهنده آن کنترل می‌شود. در این چشم‌انداز شرایط رویشی گونه‌های گیاهی نقش مهمی در میزان پایداری و تعادل رسوبات ترسیبی دارد؛ به‌طوری‌که نوع گونه گیاهی تشکیل‌دهنده نبکا تعیین‌کننده میزان پایداری و تعادل آن است. همچنین فرم حیاتی گونه‌های مختلف گیاهی تأثیر بسزایی بر شیب تعادلی رسوبات ترسیب‌شده توسط آن گونه گیاهی دارد؛ بدین ترتیب که گیاهان درختی و درختچه-ای و همچنین گیاهان بوته‌ای که اندام‌های پایا دارند، نبک‌های پایدارتری در مقایسه با گیاهان یک‌ساله یا گیاهانی ایجاد می‌کنند که در پایان دوره رویشی و فصل مساعد اندام‌های هوایی خود را از دست می‌دهند. در گیاهان دارای اندام‌های هوایی پایا، شیب دامنه نبکا ملایم‌تر است؛ به همین دلیل، پایداری تپه‌های نبکایی بیشتر می‌شود.

همان‌گونه که نتایج تحقیق نشان می‌دهد، نبک‌های گونه خارشتر که دارای فرم حیاتی فورب چندساله هستند و اندام‌های هوایی آن در پایان فصل مساعد رشد از بین می‌رود، دارای

شیب بیشتری در مقایسه با نبک‌های سایر گونه‌های گیاهی موجود در منطقه‌اند و از نظر شیب با شیب حد رسوبات منطقه در یک گروه حد می‌گیرند، اما نبک‌های گونه‌های گیاهی درختچه گز، گل‌گزی و اشنان که دارای فرم حیاتی درختچه‌ای و بوته‌ای و دارای اندام‌های هوایی پایا هستند، دارای متوسط شیب کمتری هستند و از نظر شیب در یک گروه حد می‌گیرند که این خود نشان از اهمیت زیاد اندام‌های هوایی گونه‌های گیاهی تشکیل‌دهنده نبکا در میزان شیب نبکا و به تبع آن، میزان پایداری تپه‌های نبکایی دارد. با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت، دامنه بردباری عوامل زنده تعیین‌کننده نوع چشم‌اندازهای اکوتومرفولوژیک حاکم در یک ناحیه است. حال اگر شرایط محیطی باعث اختلال در دوره زندگی یا میزان رشد عامل بیولوژیک شود، نوع لندفرم‌های شکل‌گرفته در منطقه‌ای خاص دچار تغییر اساسی خواهد شد؛ پس دامنه بردباری عنصر بیولوژیک میزان تعادل در چشم‌انداز اکوتومرفیک را مشخص می‌کند. به‌طورکلی، لندفرمی که دارای تعادل ژئومرفولوژیک ضعیف باشد، تنها می‌تواند تغییرات بسیار محدودی را در فرایندهای شکل‌زا تحمل کند و برعکس، لندفرم‌های دیگری که قادر باشند در شرایط متفاوت یا بسیار متغیر خود را تثبیت کنند، می‌توانند دوام بیشتری داشته باشند. تعادل ژئومرفولوژیک در یک لندفرم مشخص بر حسب اینکه لندفرم مدنظر در چه مرحله‌ای از رشد باشد، متفاوت خواهد بود (باقریه نجار، ۱۳۷۷، ص. ۲۳۵). به‌طورکلی، تغییرات در محیط با اثرگذاری بر روابط تعادلی سبب بروز تغییر در فرم و ایجاد معادلات جدیدی در فضا می‌شود و بر شرایط تعادل تأثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت حصول این شرایط در ژئومورفولوژی، دستیابی به روابطی از فرم که بیان‌کننده حالت‌های گوناگون چشم‌اندازها باشد، بسیار ضروری است و این کار نیازمند شاخص‌های رقومی است. مدل-سازی مفهومی است که چنین ضرورتی را برای ما تدارک می‌بیند؛ به همین علت، فرم حیاتی گونه‌های گیاهی نقش بسزایی در پایداری تپه‌های نبکایی و تثبیت آن‌ها دارد. محمودی (۱۳۸۲، ص. ۲۵۹) بیان کرده است، تا زمانی که گیاه امکان حیات داشته باشد، نبکا به حیات خود ادامه می‌دهد، اما به محض خشک‌شدن بوته، تخریب نبکا آغاز می‌شود و از بین می‌رود. ازجمله پارامترهای اساسی دیگر در میزان پایداری اشکال میزان تقارن شکل مربوطه است. همان‌گونه که می‌دانیم، در مباحث شکل‌شناسی هرچه شکلی متقارن‌تر باشد، میزان پایداری آن بیشتر

خواهد بود. همان‌گونه که نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد، مخروط نبکاهای گونه خارشتر دارای تقارن کمتری در مقایسه با مخروط نبکاهای گونه‌های درختچه گز، گل‌گزی و اشنان است که این موضوع حاکی از کم بودن میزان پایداری مخروط نبکاهای گونه خارشتر در مقایسه با نبکاهای گونه‌های دیگر است.

به‌طور کلی، عملکرد سیستم‌های مختلف منوط به روابط بین اجزای سیستم، سیستم‌های مجاور آن و فعالیت‌هایی است که در آن سیستم صورت می‌گیرد. در همین رابطه، سیستم چشم‌انداز طبیعی که سیستمی باز قلمداد می‌شود، روابط بین کارکردها یا فرایندهای تحمیلی بر آن سیستم بر چهره آن مؤثر است. در همین راستا باید توجه داشت که شکل‌زایی در مناطق مختلف به‌خصوص در مناطق خشک حاصل فعالیت مستمر فرایند باد است و شکل تکامل‌یافته شکلی است که در اثر پاسخ‌گویی مستمر به این فرایند حاصل می‌شود؛ به عبارت دیگر، هر شکل بیشترین ارتباط را با فرایندی دارد که بیشتر بر آن تأثیر می‌گذارد؛ پس هرچه این ارتباط قوی‌تر باشد، ظرفیت بافری سیستم بیشتر خواهد بود. چشم‌انداز نکا حاصل فرایند بادرفتی و عملکرد پوشش گیاهی است؛ بنابراین روابط بین عوامل بیولوژیک و عوامل شکل‌شناسی نکا حاکی از هماهنگی میان کارکرد این دو عامل است. اگرچه این روابط شدت‌های ثابت ندارند، شدت این ارتباطات دارای دامنه معینی است. از طرف دیگر، اگر بین فرایندهای شکل‌ساز و فرم‌های نکا رابطه‌ای برقرار نباشد، میزان مبادله ماده و انرژی با سیستم‌های مجاور بیشتر می‌شود و تعادل سیستم‌های مجاور بیشتر دچار تغییر می‌شود؛ پس هرچه ارتباط بین فرم و فرایند در سیستم چشم‌انداز نکا قوی‌تر باشد، بیانگر تثبیت ماده و انرژی بیشتری داخل سیستم است و کارایی سیستم افزایش می‌یابد؛ بنابراین ایجاد چشم‌انداز نکا بیانگر تثبیت حجم هنگفتی از ماده و انرژی در سیستم بادرفتی است؛ از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت، در مدیریت محیط حفظ هماهنگی بین نیروهای عمل‌کننده و سیمای چشم‌انداز بسیار مهم است که رسیدن به این هدف تنها با شناخت نوع و میزان روابط بین اجزای سیستم حاصل می‌شود.

کتابنامه

۱. باقریه نجار، م. ب. (۱۳۷۷). *مقدمه‌ای بر بوم‌شناسی*. گرگان: انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۲. پورخسروانی، م.، ولی، ع.، و محمودی محمدآبادی، ط. (۱۳۹۴). تحلیل مقایسه‌ای مدل‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد حجم رسوبات نیکاها (مطالعه موردی: نیکاهای درختچه گز در کویر ابراهیم‌آباد سیرجان). *فصلنامه پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی*، ۴(۱)، ۱۷-۲۹.
۳. پورخسروانی، م.، ولی، ع.، و موحدی، س. (۱۳۸۹). گروه‌بندی مقایسه‌ای نیکاهای، سیدلیتیزیا فلوریدا، روماریاتورکستانیکا و الحاجی مانیفرا بر اساس عملکرد فرم‌های رویشی گیاهان در منطقه خیر آباد سیرجان. *فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی*، ۳۱(۱)، ۱۵۸-۱۳۷.
۴. رفاهی، ح. (۱۳۸۸). *فرسایش بادی و کنترل آن* (چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۵. علایی طالقانی، م. (۱۳۸۴). *ژئومورفولوژی ایران*. تهران: نشر قومس.
۶. کلینسلی، د. (۱۳۸۱). *کویرهای ایران* (ع. عباس پاشایی، مترجم). تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
۷. محمودی، ف. (۱۳۸۲). *ژئومورفولوژی دینامیک*. تهران: انتشارات پیام نور.
۸. مظفریان، و. (۱۳۸۲). *فرهنگ نام‌های گیاهان ایران*. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
۹. موسوی، س. ح.، معیری، م.، و ولی، ع. (۱۳۹۱). انتخاب مناسب‌ترین نوع گونه گیاهی نیکا برای تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد، شمال شرق طرود). *مجله محیط شناسی*، ۳۱(۱)، ۱۱۶-۱۰۵.
۱۰. نگهبان، س.، یمانی، م.، مقصودی، م.، و عزیزی، ق. (۱۳۹۲). بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه-بندی ارتفاعی نیکاهای حاشیه غربی دشت لوت و تأثیرات پوشش گیاهی بر مورفولوژی آنها. *پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی*، ۴(۱)، ۱۷-۴۲.
11. Andreas, C., & Baas, W. (2007). Complex systems in Aeolian geomorphology. *Geomorphology*, 91(13), 311-33.
12. Hersen, P. (2004). On the crescentic shape of barchan dunes. *The European Physical Journal*, 37(3), 507-514.
13. Hesp, P. A. (1981). The formation of shadow dunes. *Sediment. Petrol*, 51(6), 101-112.

14. Hesp, P., & Mclachlan, A. (1999). Morphology, dynamics, ecology and fauna of *Arctotheca populifolia* and *Gazania rigens* nebkha dunes. *Journal of arid Environments*, 44(3), 155-17.
15. Hesp, P.A., & Smyth, T.A.G. (2017). Nebkha flow dynamics and shadow dune formation. *Geomorphology*, 282(21), 27-38.
16. Jasem, M., & Al-Awadhi, A. (2014). The effect of a single shrub on wind speed and nabkhas dune development: A case study in Kuwait. *International Journal of Geosciences*, 5(2), 20-26.
17. Jianhui, D., Ping, Y., & Yuxiang, D. (2010). The progress and prospects of nebkhas in arid areas. *Journal of Geography Science*, 20(5), 712-728.
18. Lancaster, N., & Baas A.C.W. (1998). Influence of vegetation cover on sand transport by wind: field studies at Owens Lake, California. *EarthSurface Processes and Landforms*, 23(7), 69-82.
19. Langford, R. P. (2003). Nabkha (coppice dune) fields of south-central New Mexico. *Journal of Arid Environments*, 46(9), 25-41.
20. Lili, L., Xunming, W., Eerdun, H., & Ting, H. (2013). Nebkha (coppice dune) formation and significance to environmental change reconstructions in arid and semiarid areas. *Journal of Geographical Sciences*, 23(2), 344-358.
21. Mayaud, J. R., Wiggs, G. F. S., & Bailey, R. M. (2017). A field-based parameterization of wind flow recovery in the lee of dryland plants. *Earth Surface Processes and Landforms*, 42(11), 378-386.
22. Stallins, J.A. (2006). Geomorphology and ecology: Unifying themes for complex systems in biogeomorphology. *Geomorphology*, 77(23), 207-216.
23. Yong Zhong, Su., Rong, Y., ZhiHui, Zh., & Ming, W. D. (2012). Distribution and characteristics of *Nitraria sphaerocarpa* nebkhas in a Gobi habitat outside an oasis in Hexi Corridor region, China. *Sciences in Cold and Arid Regions*, 4(4), 288-295.
24. Zhang, Z. C., Han, L. Y., Pan, K. P., Dong, Z. B., Liang, A., Nan, L., Li, X. C., .., & Li, C. (2022). Dune morphology in the Gobi deserts of northern China and potential implications for dust emission. *Sedimentology*, 67(2), 1-29.