



Performace Evaluation of PERSIAN PDIR-Now and PERSIANN CCS Products for Precipitation leading to the Most Severe Floods in Iran between 2017 and 2019

Seyed Hossein Sanaei Nejad^{a*}, Khosro Salari^b

^a Professor in Agrometeorology, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

^b PhD Candidate in Agrometeorology, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Received: 25 December 2021

Revised: 19 February 2022

Accepted: 24 February 2022

Abstract

Precipitation is one of the main components of the hydrological cycle. Rainfall distribution plays a significant role in the Earth's energy balance and human access to water resources, but rainfall is not always promising for humans. Floods cause a lot of human and financial losses to people and infrastructure all over the world annually. Planning for the damage reduction must be done with some measurements. It is necessary to record the amount of rainfall in high resolution, but measuring precipitation in high spatial and temporal resolution is a costly process. Scientists have developed many models to estimate precipitation values. It is necessary to evaluate the output data of these models and their performance before using them. In this study, the performance of two precipitation estimation products, PERSIANN-CCS and PDIR-Now, was evaluated against precipitation recorded in all synoptic stations of Iran for the devastating flood events from 2017 to 2019. For comparing precipitation estimations with the ground data, 9 indices (PC, BIAS, FAR, POD, HSS, R^2 , ME, MAE & RMSE) were used. The results showed high variability of indicators in different events. On average, PERSIANN-CCS and PDIR-Now products have a coefficient of determination of 0.16 and 0.19 and RMSE of 9.38 and 12.78, respectively. The values are not desirable, even though the average of PC is high. Moreover, the results showed that the PERSIANN-CCS and PDIR-Now products do not perform well due to the statistical indexes for all stations, and further researches for better heavy rainfall estimation are needed.

Keywords: PERSIANN-CCS, PDIR-Now, Precipitation, Remote Sensing, Flood

*. Corresponding author: Seyed Hossein Sanaei Nejad E-mail: sanaein@gmail.com Tel: 09153136888

How to cite this Article: Sanaei-Nejad, S. H., & Salari, K. (2023). Performance evaluation of PDIR-Now and PERSIANN CCS products for precipitation leading to the most severe floods in Iran between 2017 and 2019. *Journal of Geography and Environmental Hazards*, 12(1), 229-246.

DOI: 10.22067/GEOEH.2022.74364.1147



Journal of Geography and Environmental Hazards are fully compliant With open access mandates, by publishing its articles under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).



Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Geography and Environmental Hazards

Volume 12, Issue 1 - Number 45, Spring 2023

<https://geoeh.um.ac.ir>

<https://doi.org/10.22067/geoeh.2022.74364.1147>

جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دوازدهم، شماره چهارم و پنجم، بهار ۱۴۰۲، صص ۲۴۶-۲۲۹

مقاله پژوهشی

ارزیابی عملکرد محصولات PDIR-Now و PERSIANN CCS برای بارش‌های منجر به

خسارت‌بارترین سیلاب‌های کشور ایران در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸

سید حسین ثنائی نژاد^۱- استاد هوشناسی کشاورزی، گروه مهندسی علوم و آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
خسرو سالاری- دانشجوی دکتری هوشناسی کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۲/۵

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۴

چکیده

بارش یکی از اصلی‌ترین اجزای چرخه هیدرولوژی است. علاوه بر این، توزیع بارش نقش بسیار مهمی را در توازن انرژی کره زمین و دسترسی بشر به منابع آبی ایفا می‌کند؛ اما بارندگی همواره برای بشر ثمربخش نیست. هر ساله وقوع سیل در کشور ایران خسارات جانی و مالی بسیاری را به مردم و زیرساخت‌ها تحمیل می‌نماید. برای به حداقل رساندن این خسارت‌ها لازم است مقدار بارش‌های وقوع یافته اندازه‌گیری شود، تا بتوان برای کاهش خسارت‌ها برنامه‌ریزی کرد. از آنجایی که اندازه‌گیری بارش با دقت مکانی و زمانی بالا هزینه بسیاری دارد، مدل‌های بسیاری برای تخمین مقادیر بارش توسعه یافته‌اند؛ اما برای استفاده از داده‌های خروجی این مدل‌ها لازم است ابتدا عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در این پژوهش به ارزیابی عملکرد دو محصول تخمین بارش PERSIANN-CCS و PDIR-Now با استفاده از بارش‌های تمامی ایستگاه‌های سینوپتیک کشور برای خسارت‌بارترین سیلاب‌های ایران در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ اقدام گردید. برای ارزیابی عملکرد از شاخص‌های آماری PC، BIAS، FAR، POD، HSS،

Email: sanaein@gmail.com

۱ نویسنده مسئول: ۰۹۱۵۳۱۳۶۸۸

نحوه ارجاع به این مقاله:

ثنائی نژاد، سید حسین؛ سالاری، خسرو؛ ۱۴۰۲. ارزیابی عملکرد محصولات PDIR-Now و PERSIANN CCS برای بارش‌های منجر به خسارت‌بارترین سیلاب‌های کشور ایران در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸. *جغرافیا و مخاطرات محیطی*. ۱۲(۱). صص ۲۴۶-۲۲۹

۲۲۹

<https://doi.org/10.22067/geoeh.2022.74364.1147>

R^2 ، MAE، RMSE و استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر تغییرپذیری بالای شاخص‌ها در وقایع مختلف است. به‌طور میانگین ملاحظه شد که محصولات PERSIANN-CCS و PDIR-Now اگرچه دارای میانگین PC بالا هستند اما به ترتیب دارای ضریب تعیین $0/16$ و $0/19$ و RMSE برابر با $9/38$ و $12/78$ بوده که مقادیر بسیار مطلوبی نیستند. با توجه به شاخص‌های آماری خطا در تاریخ‌های موردبررسی ملاحظه می‌شود که این دو محصول برای تخمین مقادیر بارش تمامی ایستگاه‌ها عملکرد مناسبی نداشته و برای تخمین بهتر بارش‌های منجر به سیلاب‌های سنگین، بررسی‌های بیشتر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: PERSIANN-CCS، PDIR-Now، بارش، سنجش‌ازدور، سیل.

۱- مقدمه

بارش بخش اصلی چرخه آب‌شناختی است که وظیفه توزیع آب در سرتاسر کره زمین را بر عهده دارد؛ اما بارش همواره برای بشر مفید نبوده و گاه از طریق ایجاد سیل، منجر به بروز خسارات جانی و مالی فراوانی در کشورهای مختلف شده است. بر اساس تعریف آزمایشگاه ملی طوفان‌های شدید (۲۰۲۰) به جاری شدن آب بر روی سطحی از زمین که معمولاً خشک است، سیل گفته می‌شود.

به‌منظور آمادگی در برابر سیلاب، مدل‌های هشدار زودهنگام سیل در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند (ون هوآنگ و همکاران، ۲۰۱۹). یکی از داده‌های مورد نیاز این مدل‌ها، مقادیر بارش در حوضه‌های آبریز است (شریفی و همکاران، ۱۳۹۵؛ قهرمان و همکاران، ۱۳۹۷). به دست آوردن مقادیر بارش با استفاده از داده‌های زمینی، امری بسیار زمان‌بر و پرهزینه است (شریفی و همکاران، ۱۳۹۵؛ برت و بومونت، ۱۹۹۴)، اما با ورود ماهواره‌های هواشناسی، امکان بررسی بهتر ابرها و در نتیجه تخمین مقادیر بارش در بسیاری از مناطق فراهم شد (کید، ۲۰۰۱). در سال‌های اخیر، محصولات تخمین بارش ماهواره‌ای فراوانی در دنیا عرضه گشته‌اند. از آنجایی که پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی برای بارش در ایران کاربرد چندانی (از نظر کمی و کیفی) برای استفاده در مدل‌های هشدار زودهنگام ندارند (خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۳۹۸)، لذا محصولات ماهواره‌ای به‌عنوان گزینه مناسب احتمالی برای استفاده در این مدل‌ها مطرح می‌شوند. قبل از استفاده از محصولات بارش ماهواره‌ای، این محصولات باید توسط داده‌های ایستگاهی مورد ارزیابی قرار گیرند، تا میزان عملکرد آن‌ها مشخص شده و محصولی که بهترین عملکرد را در زمینه تخمین بارش دارد، مورد استفاده قرار گیرد.

1 Van Hoang et al.,

2 Barrett & Beaumont

3 Kidd

در این رابطه پژوهش‌های متعددی انجام شده است. **سبحانی و همکاران (۱۳۹۵)** برای تحلیل مقدار بارش پیش‌بینی شده از محصول بارش پروژه TRMM استفاده کردند، اما نتایج مقایسه پیش‌بینی‌های TRMM با داده‌های زمینی بیانگر عملکرد ضعیف این محصولات در تخمین بارش استان چهارمحال و بختیاری بود. **چاوشیان و کتیرایی (۱۳۹۸)** به بررسی و مقایسه متوسط سالانه بارش‌های اندازه‌گیری شده کشور با هفت مجموعه شامل مجموعه بارش زمینی و ماهواره‌ای اقدام کردند. ایشان سه مجموعه TRMM، GPCP و PERSIANN-CDR را به عنوان مجموعه‌های دارای بیشترین شباهت با داده‌های باران‌سنجی سالانه معرفی کردند. **اکبری و کاظم‌زاده (۱۳۹۸)** به ارزیابی بارش ماهانه تخمینی ماهواره TRMM محصول 3B43v7 در ایران پرداختند. نتیجه نهایی این پژوهش دربردارنده این موضوع بود که تخمین‌های ماهواره TRMM در اکثر مناطق خشک و نیمه‌خشک دارای بیش برآورد و پرباران دارای کم‌برآورد است. **رحمتی و مساح (۱۳۹۸)** در مطالعه موردی به ارزیابی مجموعه داده‌های PERSIANN، ERA-INTERIM و CHIRPS V2، TRMM-3B42RT، APHRODITE، PERSIANN-CDR و ERR-INTERIM در بازه زمانی ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۳ پرداختند. نتایج این پژوهش بیانگر عملکرد بهتر داده‌های APHRODITE و ERA-INTERIM در مقایسه با سایر مجموعه‌ها است، و داده‌های APHRODITE را به عنوان جایگزینی برای مناطق فاقد ایستگاه مشاهداتی پیشنهاد دادند. **گرچی‌زاده و همکاران (۱۳۹۸)** به مقایسه دو مجموعه بارشی PERSIANN-CCS و PERSIANN-CDR با داده‌های بارش ایستگاه‌های باران‌سنجی در بالادست سد مارون واقع در کشور ایران پرداختند. بررسی‌های ایشان نشان داد که مقادیر بارش‌های سالانه تخمینی، دارای کم‌برآورد بوده، اما در محصول PERSIANN-CCS مقادیر تخمین زده شده، به مقادیر مشاهده شده نزدیک‌تر است. در مورد بارش‌های روزانه و ماهانه، عملکرد محصول PERSIANN-CDR نسبت به محصول دیگر بهتر بوده است. **شکری و همکاران (۱۳۹۹)** به ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های بارش ماهواره‌ای PERSIANN و PERSIANN-CDR و بررسی تأثیر ناهمواری‌ها بر این الگوریتم‌ها در حوضه آبریز حله پرداختند. ایشان دریافتند، که دقت محصولات مذکور در تخمین بارش روزانه قابل قبول نبوده، اما در مقیاس‌های زمانی ماهانه و سالانه از عملکرد بهتری برخوردار هستند. **مسعود و همکاران^۱ (۲۰۱۹)** به ارزیابی محصولات بارش زمان واقعی چند ماهواره‌ای برای کشور پاکستان در دوره آماری ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۹ برای مقیاس زمانی روزانه، ماهانه و سالانه پرداختند. ایشان بیان داشتند که عملکرد محصولات بارشی در مقیاس زمانی ماهانه و سالانه به مراتب بهتر و قابل قبول‌تر از مقیاس روزانه است و عملکرد تصاویر ماهواره‌ای IMERG را نسبت به سایر محصولات بهتر ارزیابی نمودند. **السوماتی و همکاران^۲ (۲۰۲۰)** در مطالعه‌ای به ارزیابی عملکرد دو مجموعه GPM IMERG V06 و CMORPH در امارات متحده عربی برای دوره آماری ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸ و مقیاس‌های زمانی روزانه و سالانه پرداختند. ایشان بیان داشتند که هر دو محصول عملکرد بسیار خوبی را در شناسایی بارش داشته‌اند،

1 Masood et al.,

2 Alsumaiti et al.,


اما در گزارش‌های ماهواره‌ای مواردی وجود دارد که توسط ایستگاه‌های زمینی و به خصوص برای بارش‌های سبک به ثبت نرسیده است. **صائمیان و همکاران (۲۰۲۱)** در پژوهشی جامع به بررسی همه‌جانبه محصولات بارشی اقدام کرده که در آن تمامی محصولات بارشی موجود برای کشور ایران در مقیاس روزانه ماهانه و سالانه مورد ارزیابی قرار گرفت. ایشان در این پژوهش محصول PDIR-Now را به‌عنوان تنها محصولی زمان واقعی موجود و با عملکرد مناسب برای ایران معرفی نمودند.

با دقت در پژوهش‌های انجام شده مذکور، روشن می‌شود که ارزیابی عملکرد محصولات ماهواره‌ای بارش به‌صورت کلی و برای تمامی وقایع بارشی در یک دوره آماری انجام شده است. علاوه بر این، سعی شده تا تعداد بیشتری از محصولات ماهواره‌ای در این مطالعات مورد بررسی قرار گیرند. این نحوه بررسی اگرچه بسیار جامع و مفید است، اما توانایی محصولات بارشی برای تخمین بارش‌های سنگین، که عموماً منجر به وقوع سیلاب می‌شوند، مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. به همین منظور در این پژوهش با رویکردی متفاوت، به بررسی عملکرد دو محصول تخمین بارش PERSIANN-CCS و PDIR-Now برای خسارت‌بارترین وقایع سیلاب کشور در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ پرداخته شد. این دو محصول صرفاً مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای بوده و همین موضوع باعث می‌شود تا در زمان سریع‌تری نسبت به محصولات ترکیبی با داده‌های ایستگاه‌های زمینی و یا محصولات چندسنجنده‌ای در دسترس باشند. علاوه بر این تنوع اقلیمی گسترده در ایران باعث می‌شود که عملکرد مدل‌های تخمین بارش در نواحی اقلیمی مختلف، متفاوت باشد (**عزیزیان، امینی ۱۳۹۹**، **کنیری و همکاران ۲۰۱۳**)؛ بنابراین به نظر می‌رسد، محصولاتی مانند PDIR-Now که تصحیحات اقلیمی را بر روی تخمین‌ها اعمال می‌کنند، عملکرد بهتری در تخمین بارش داشته باشند.

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش کشور ایران است. کشور ایران دارای مساحت ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع است و در محدوده طول جغرافیایی ۴۴ الی ۶۳/۵ و عرض جغرافیایی ۲۵ الی ۴۰ درجه گسترده شده است، که این کشور را در محدوده جنب حاره قرار می‌دهد.



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی کشور ایران و ایستگاه‌های سینوپتیک

در پژوهش انجام شده اخیر توسط رضیئی (۱۳۹۶) به روش کوپن - گایگر، کشور ایران به ۹ منطقه عمده اقلیمی تقسیم شده است.

جدول ۱- ویژگی‌های گروه‌های اقلیمی کوپن گایگر موجود در ایران (رضیئی، ۱۳۹۶)

ویژگی	کد اقلیم
بیابان خشک و بسیار گرم	BWh
بیابان خشک و سرد	BWk
نیمه بیابانی (استپ) خشک و بسیار گرم	BSh
نیمه بیابانی (استپ) خشک و سرد	BSk
معتدل با تابستان‌های خشک و بسیار گرم	Csa
معتدل با تابستان‌های خشک و گرم	Csb
معتدل پرباران (بدون فصل خشک) با تابستان‌های گرم	Cfa
اقلیم برفی با تابستان‌های خشک و بسیار گرم	Dsa
اقلیم برفی با تابستان‌های خشک و گرم	Dsb

۲-۲- روش انجام پژوهش

به منظور بررسی عملکرد محصولات PERSIANN-CCS و PDIR-Now برای وقایع سیلاب خسارت‌بار، مقدار بارش ثبت شده در روز وقوع سیل و روز ماقبل آن که در جدول ۲ ارائه شده است، برای تمامی ایستگاه‌های سینوپتیک کشور که دارای داده بارش بودند، از پایگاه داده سازمان هواشناسی کشور^۱ تهیه گردید. از آنجایی که مقادیر بارش ۲۴ ساعته ایستگاهی از ساعت ۶ صبح هر روز الی روز بعد اندازه‌گیری می‌شود و مقادیر بارش ماهواره‌ای برای ساعت ۲۴ بامداد هر روز الی روز بعد محاسبه می‌گردد، لذا برای برطرف کردن این عدم هماهنگی، مقادیر ساعتی تخمینی بارش از پایگاه داده محصولات^۲ استخراج شده و بارندگی ۲۴ ساعته با استفاده از مجموع مقادیر ساعتی برای ساعت ۶ هر روز محاسبه گردید.

جدول ۲- فهرست سیل‌های انتخاب شده و روزهای مورد بررسی

روزهای مورد بررسی	محل وقوع	تاریخ وقوع سیل	ترتیب واقعه
۲۵ فروردین ۹۶	شمال غرب ایران	۲۵ فروردین ۱۳۹۶	واقعه اول
۲۶ فروردین ۹۶			
۲۰ مرداد ۹۶	شمال و شمال شرق ایران	۲۰ مرداد ۱۳۹۶	واقعه دوم
۲۱ مرداد ۹۶			
۲۷ اسفند ۹۷	شمال ایران	۲۸ اسفند ۱۳۹۷	واقعه سوم
۲۸ اسفند ۹۷			
۵ فروردین ۹۸	جنوب غربی ایران	۶ فروردین ۱۳۹۸	واقعه چهارم
۶ فروردین ۹۸			
۷ فروردین ۹۸			
۸ فروردین ۹۸			
۱۱ فروردین ۹۸	جنوب و غرب ایران	۱۱ فروردین ۱۳۹۸	واقعه پنجم
۱۲ فروردین ۹۸			
۱۳ فروردین ۹۸			
۱۴ فروردین ۹۸			
۸ خرداد ۹۸	شمال شرق ایران	۸ خرداد ۱۳۹۸	واقعه ششم
۹ خرداد ۹۸			
۱۰ خرداد ۹۸			
۱۱ خرداد ۹۸			

1 data.irimo.ir

2 https://chrdata.eng.uci.edu

۲-۲-۱- معرفی محصول PERSIANN-CCS

سامانه طبقه‌بندی ابر یا به اختصار PERSIANN-CCS یک محصول ماهواره‌ای بارش زمان واقعی با تفکیک بالا (۴ کیلومتر در ۴ کیلومتر) است. این محصول توسط مرکز هیدرومتئورولوژی و سنجش‌ازدور در دانشگاه اروین کالیفرنیا توسعه داده شده است. سامانه PERSIANN-CCS امکان طبقه‌بندی ویژگی‌های تکه‌های ابر بر اساس ارتفاع ابر، گستردگی سطحی و تغییرات بافت که توسط تصاویر ماهواره‌ای تخمین زده می‌شود را فراهم می‌کند. در قلب PERSIANN-CCS الگوریتم تقسیم‌بندی متغیر آستانه ابر قرار دارد. برخلاف رویکرد سنتی آستانه ثابت، روش آستانه متغیر امکان شناسایی و تفکیک تکه‌های منفرد ابرها را فراهم می‌سازد. تکه‌های انفرادی سپس می‌توانند بر اساس بافت، ویژگی‌های هندسی، تحولات دینامیکی و ارتفاع قله ابر طبقه‌بندی شوند. این طبقه‌بندی‌ها برای تخصیص مقادیر بارش به هر پیکسل که درون ابر قرار دارد، با توجه به منحنی مشخصه‌ای که رابطه بین شدت بارش و دمای درخشندگی را تبیین می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد (مرکز هیدرومتئورولوژی و سنجش‌ازدور، ۲۰۱۹).

۲-۲-۲ معرفی محصول PDIR-Now

تخمین بارش با استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور به وسیله‌ی شبکه عصبی مصنوعی نرخ بارش پویای مادون‌قرمز نزدیک به زمان واقعی یا به اختصار PDIR-Now، مانند محصول PERSIANN-CCS یک محصول ماهواره‌ای بارش زمان واقعی با تفکیک بالا (۴ کیلومتر در ۴ کیلومتر) است. این محصول نیز توسط مرکز هیدرومتئورولوژی و سنجش‌ازدور در دانشگاه اروین کالیفرنیا توسعه داده شده است.

مزیت اصلی PDIR-Now در مقایسه با سایر مجموعه‌های داده بارشی زمان واقعی در وابستگی به تصاویر مادون‌قرمز که به تعداد زیاد در واحد زمان نمونه‌برداری می‌شوند، است. در نتیجه، تأخیر PDIR-Now از زمان وقوع بارش بسیار لندک است (بین ۱۵ الی ۶۰ دقیقه). علاوه بر این PDIR-Now خطاها و عدم قطعیت‌هایی که به دلیل استفاده از تصاویر مادون‌قرمز امکان به وجود آمدن دارد را اصلاح می‌نماید. این کار با روش‌های مختلفی که مهم‌ترین آن جابه‌جایی پویای منحنی بارش - دما است، به وسیله اقلیم‌شناسی بارش انجام می‌شود. تأخیر کوتاه PDIR-Now، این مجموعه داده را برای کاربردهای هیدرومتئورولوژیکی نزدیک به زمان واقعی، نظیر پیش‌بینی سیلاب و توسعه نقشه‌های طغیان سیلاب مناسب می‌سازد (مرکز هیدرومتئورولوژی و سنجش‌ازدور، ۲۰۱۹).

۲-۲-۳ ارزیابی داده‌های تخمین ماهواره‌ای

بسیاری از پدیده‌های هواشناسی را می‌توان به صورت وقایع دودویی ساده، در نظر گرفت (هوگن و میسون، ۲۰۱۲). از جمله این وقایع می‌توان به بارش، سیل، یخبندان و یا سایر موارد اشاره کرد. حال برای ارزیابی عملکرد

یک سیستم پیش‌بینی می‌توان از جدول توافقی 2×2 و شاخص‌های استخراج شده از این جدول استفاده کرد (جوان، ۱۳۹۲). این جداول به شکل زیر هستند:

جدول ۳- جدول توافقی 2×2

بارش مشاهده شده در ایستگاه			نام مدل ارائه شده	
مجموع	بدون باران	بارانی	بارانی	بارش برآورد شده توسط مدل
$a + b$	b	a	بدون باران	
$c + d$	d	c	مجموع	
$a + b + c + d$	$b + c$	$a + c$		

در جدول ۳، a تعداد ایستگاه‌هایی است که هم توسط دیده‌بان و هم توسط مدل به‌صورت بارانی ثبت شده‌اند. b تعداد ایستگاه‌هایی هستند که بارش در آن‌ها فقط توسط مدل تخمین زده شده است. c وقایعی است که توسط دیده‌بان در هر ایستگاه ثبت شده، اما توسط مدل تخمین زده نشده است. d تعداد وقایعی است که هم مدل و هم ایستگاه بدون بارش گزارش کرده‌اند. این جدول‌ها برای هر روز بارشی پس از میانگین‌گیری ۲۴ ساعته از مقادیر بارش یک‌ساعته محصولات تهیه گردید، و بعد از آن، شاخص‌های ارزیابی از جدول‌های توافقی به دست آورده شدند. این شاخص‌ها به شرح زیر هستند:

$$PC = \frac{a + b}{a + b + c + d} \quad \text{رابطه (۱) شاخص نسبت صحیح (PC):}$$

$$BIAS = \frac{a + b}{a + c} \quad \text{رابطه (۲) شاخص ارزیابی (BIAS):}$$

$$FAR = \frac{b}{a + b} \quad \text{رابطه (۳) نسبت هشدار اشتباه (FAR):}$$

$$POD = \frac{a}{a + c} \quad \text{رابطه (۴) احتمال تشخیص (POD):}$$

$$HSS = \frac{2(ad - bc)}{(a + c)(c + d) + (a + b)(b + d)} \quad \text{رابطه (۵) نمره مهارت جدول 2×2 توافقی}$$

علاوه بر شاخص‌های ذکر شده، برای مقایسه مقدار بارش‌های تخمینی توسط دو محصول با بارش‌های ایستگاه‌های زمینی، از معیارهای آماری ضریب تعیین (R^2)، میانگین خطا (ME)، میانگین خطای مطلق (MAE) و جذر میانگین توان دوم خطا (RMSE) استفاده شده است. این معیارها به‌صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$R^2 = \frac{\sum (S_i - \overline{O_i})^2}{\sum (O_i - \overline{O_i})^2} \quad \text{رابطه (۶)}$$

$$ME = \frac{\sum_{i=1}^N (S_i - O_i)}{N} \quad \text{رابطه (۷)}$$

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^N |S_i - O_i|}{N} \quad \text{رابطه (۸)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (S_i - O_i)^2} \quad \text{رابطه (۹)}$$

در این روابط S_i مقدار بارش تخمین زده شده توسط محصولات PDIR-Now یا CCS بوده، O_i مقدار بارندگی مشاهده‌ای و N تعداد کل مشاهدات است.

۳- نتایج و بحث

جدول‌های ۴ و ۵ به ترتیب نتایج به‌دست آمده از ارزیابی دو محصول PDIR-Now و PERSIANN-CCS را برای ۶ واقعه سیل خسارت‌بار اخیر کشور نمایش می‌دهند.

۳-۱- واقعه اول

عملکرد محصول PDIR-Now در هر دو روز این واقعه بسیار به یکدیگر نزدیک است. مقادیر شاخص PC برای روز اول و دوم به ترتیب برابر ۰/۴۵ و ۰/۴۰ است که مناسب نبوده و بیانگر این است که محصول در تخمین وقایع بارش و بدون بارش عملکرد مناسبی را نداشته است. شاخص BIAS و FAR نیز در این واقعه بسیار بالا و بیانگر تشخیص‌های اشتباه محصول است. در واقع مقادیر بالای BIAS بیانگر این موضوع است که این محصول وقایع بارشی را بیشتر از آنچه رخ داده پیش‌بینی کرده و به همین دلیل مقادیر FAR بسیار نزدیک به یک هستند. مقادیر بالای POD نیز حاکی از تشخیص صحیح محصول در تخمین وقایع بارش است، اما این شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهنده مناسب بودن عملکرد محصول باشد. شاخص HSS با مقدار نزدیک به صفر بیانگر این موضوع است که محصول PDIR-Now عملکرد خوبی را از خود در تخمین مقادیر بارش در این واقعه ارائه نکرده است. مقدار کم R^2 نشان‌دهنده همبستگی بسیار ضعیف تخمین‌ها با مقادیر بارش اندازه‌گیری شده است. به‌علاوه مقادیر بالای ME، MAE و RMSE نیز تأیید کننده همین موضوع هستند. مقدار مثبت شاخص ME بیانگر بیش برآورد مقادیر بارش توسط محصول PDIR-Now است.

نتایج به دست آمده از محصول PERSIANN-CCS بسیار مشابه با نتایج به دست آمده از محصول PDIR-Now است. تنها وجه تمایز این دو محصول در تخمین مقادیر بارش به وقوع پیوسته است، که محصول PDIR-Now عملکرد بهتری نسبت به محصول PERSIANN-CCS دارد، اما همچنان مناسب نیست.

در پژوهش **گرچی و همکاران (۱۳۹۸)** مقادیر به دست آمده RMSE، POD و FAR برای محصول CCS به طور میانگین برای محدوده مورد مطالعه ایشان، کمتر از مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر بود، دلیل این موضوع عملکرد متفاوت محصولات بارشی در هر منطقه می باشد. مقادیر به دست آمده ضریب تعیین برای این واقعه در مقایسه با پژوهش زنگنه نیز (۱۳۹۷) کمتر است. این اختلاف به دلیل تفاوت محصولات مورد استفاده، چندان دور از انتظار نیست. در محصولات TRMM علاوه بر استفاده از داده های دمای درخشندگی سطح ابر، از داده های راداری و ماکروویو نیز بهره می برند. به این ترتیب علاوه بر تشخیص ویژگی های سطح فوقانی ابر، وضعیت رطوبتی داخل ابر نیز مشخص شود و تخمین بارش با دقت بهتری انجام می شود؛ اما حتی با وجود این برتری باز هم نتایج به دست آمده از پژوهش **زنگنه و همکاران (۱۳۹۷)** در مورد محصول بارشی TRMM و **گرچی و همکاران (۱۳۹۷)** درباره محصول CCS بیانگر عملکرد ضعیف هر دو محصول در مقیاس روزانه است.

۳-۲- واقعه دوم

شاخص PC در مورد محصول PDIR-Now برای هر دو روز بسیار بالا، و مقادیر BIAS برای این واقعه نسبت به واقعه اول بسیار کمتر است. مقدار بالای شاخص FAR بیانگر ضعف بالای این شاخص برای تخمین ایستگاه های بدون بارش در این واقعه است. میزان پایین شاخص POD نیز نشانگر ضعف محصول در تشخیص وقایع بارشی است. شاخص HSS نیز در این واقعه اندک است. شاخص های مقداری خطا اگرچه کم و امیدوار کننده هستند، اما به معنای عملکرد مناسب محصول نمی باشند؛ زیرا در هماهنگی با شاخص های دیگر نیستند. به علاوه محصول PDIR-Now در برآورد مقدار بارش روز اول واقعه دوم، دارای کم برآورد بوده و شاهد این موضوع مقدار منفی ME است. عملکرد محصول CCS نسبت به PDIR-Now در این واقعه کمی بهتر است؛ به طوری که شاخص PC در حالتی ایده آل قرار گرفته و مقادیر شاخص FAR و BIAS نیز به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده اند. البته در این محصول BIAS از یک کمتر بوده و به این معنی است که محصول PERSIANN-CCS در این واقعه تعداد ایستگاه های دارای بارش را کمتر از واقعیت تخمین زده است؛ به طوری که FAR برای روز دوم واقعه برابر با صفر شده است. مقادیر شاخص های مقداری نیز به صورت مشابه با محصول PDIR-Now بسیار کم است؛ اما محصول PERSIANN-CCS در واقعه دوم مقدار بارش را کمتر برآورد کرده است.

۳-۳- واقعه سوم

در واقعه سوم بین مقادیر شاخص‌ها در روز اول و دوم اختلاف زیادی وجود دارد، به صورتی که عملکرد محصول PDIR-Now در تشخیص وقوع بارش در روز اول، به مراتب بهتر از روز دوم است. شاخص BIAS نزدیک به یک، نشان‌دهنده تخمین نسبتاً صحیح وقایع بارشی در روز اول است؛ اما بر اساس شاخص HSS همچنان محصول PDIR-Now عملکرد خاصی را دارا نیست. در رابطه با شاخص‌های مقداری نیز اختلاف زیادی بین مقادیر تخمین زده شده و مقادیر مشاهداتی دیده می‌شود، که کمتر از واقعیت تخمین زده شده‌اند. این وضعیت درباره محصول PERSIANN-CCS نیز صادق بوده و مشابه با محصول PDIR-Now است.

۳-۴- واقعه چهارم

این واقعه شامل چهار روز بوده که عملکرد PDIR-Now در هر چهار روز متفاوت است. بهترین عملکرد برای تخمین وقوع بارش، در روزهای دوم و سوم صورت گرفته است. علت این عملکرد مناسب بالا بودن مقادیر PC و POD و پایین بودن BIAS و FAR است. شاخص HSS نیز در مقایسه با وقایع دیگر تفاوت زیادی ندارد. در رابطه با تخمین مقادیر بارش، روز اول دارای بیشترین ضریب تعیین و بیشترین اختلاف را با مقادیر اندازه‌گیری شده است. در روزهای دوم و سوم نیز محصول در تخمین مقادیر بارش دارای کم‌برآورد است. در رابطه با محصول PERSIANN-CCS نیز شرایط به صورت مشابه با محصول PDIR-Now است. تفاوت محصول PERSIANN-CCS با محصول PDIR-Now در این واقعه، در تخمین مقادیر بارش است، که در محصول PERSIANN-CCS بر خلاف محصول دیگر بیش برآورد مقدار بارش مشاهده می‌شود. در پژوهش السوماتی (۲۰۲۰) که با استفاده از محصول بارش ماهواره IMERG-V6 انجام گرفته نیز مقادیر POD بالا بوده که نشان می‌دهد، مدل مورد استفاده در تشخیص وقوع بارش موفق است، اما مقادیر بالای FAR نیز به این معنی است که در خیلی از ایستگاه‌ها وقوع بارش به اشتباه اعلام شده است. نکته حائز اهمیت در پژوهش ایشان پایین بودن مقادیر RMSE و MAE و ME است. علت این برتری را نیز می‌توان در لایه‌های مورد استفاده در مدل یافت. محصول IMERG-V6 از داده‌های GPM و داده‌های ماکروویو ATMS استفاده می‌کند، که همانند محصولات TRMM باعث افزایش دقت محصول می‌شود.

۳-۵- واقعه پنجم

بهترین عملکرد محصول PDIR-Now در واقعه پنجم برای تخمین وقوع بارش در روز سوم صورت گرفته است. مقادیر شاخص‌های تخمین وقوع بارش در این روز نسبت به سایر روزها بیشتر است. بهترین تخمین در برآورد مقدار بارش بر اساس شاخص ضریب تعیین در روز دوم اتفاق افتاده است، اما در این روز مقادیر RMSE به مقدار بسیار زیادی بالا است.

در محصول PERSIANN-CCS بهترین عملکرد در تخمین روزهای بارانی در روز دوم قابل ملاحظه است. با این حال همچنان پایین بودن شاخص HSS بیانگر عملکرد غیر خاص محصول است. به علاوه بهترین عملکرد محصول برای تخمین مقادیر بارش نیز در همین روز است؛ اما همچنان مقادیر خطا بسیار بالاست.

۳-۶- واقعه ششم

در این واقعه بهترین عملکرد محصول PDIR-Now در مورد شاخص‌های وقوع بارش در روز دوم صورت گرفته است؛ اما در رابطه با تخمین‌های مقداری، بهترین عملکرد در روز سوم اتفاق افتاده که مقادیر ضریب تعیین همچنان پایین است.

محصول PERSIANN-CCS بهترین عملکرد را در تخمین وقوع بارش برای روز سوم واقعه داشته است. بهترین عملکرد برای تخمین مقدار بارش در روز دوم اتفاق افتاده است.

۳-۷- میانگین‌ها

مقدار میانگین شاخص PC برای محصول PDIR-Now برابر ۰/۷۲ است. این مقدار بیانگر این است که در ۷۲ درصد ایستگاه‌ها، وقوع یا عدم وقوع بارش توسط محصول به درستی پیش‌بینی شده است. این شاخص برای محصول PERSIANN-CCS برابر ۰/۷۳ است. شاخص BIAS برای محصول PDIR-Now برابر ۱/۸۴ بوده و به این معنی است که در بیشتر ایستگاه‌ها وقوع بارش پیش‌بینی شده است، در حالی که ایستگاه‌ها بدون بارش بوده‌اند. این شاخص برای محصول PERSIANN-CCS برابر ۱/۴۹ است که نشان می‌دهد پیش‌بینی محصول PDIR-Now نسبت به محصول PERSIANN-CCS دارای بیش برآورد است. مقدار شاخص FAR برای محصول PDIR-Now برابر است با ۰/۵۱ که به معنی پیش‌بینی اشتباه وقوع بارش در ۵۱ درصد موارد است. مقدار این شاخص در محصول PERSIANN-CCS برابر با ۰/۴۵ است. شاخص POD در محصول PDIR-Now برابر ۰/۷۵ بوده که بیانگر پیش‌بینی صحیح وقوع بارش در ۷۵ درصد از موارد است و محصول PERSIANN-CCS تنها در ۶۸ درصد از موارد، پیش‌بینی صحیح ارائه داده است.

شاخص HSS برای محصول PDIR-Now برابر ۰/۱۶ است. با توجه به اینکه مقدار این شاخص به صفر نزدیک است؛ بنابراین محصول عملکرد خوبی را در تخمین وقایع بارشی دارا نیست. شاخص HSS برای محصول PERSIANN-CCS برابر ۰/۱۵ بوده و نتیجه مشابه با محصول قبلی را در میزان عملکرد دارد.

مقدار R^2 (ضریب تعیین) برای محصول PDIR-Now برابر با ۰/۱۹ است، که بیانگر عملکرد ضعیف محصول در تخمین مقدار بارش رخ داده در مجموعه ایستگاه‌ها است. ضریب تعیین برای محصول PERSIANN-CCS برابر با ۰/۱۶ بوده که همچنان مقدار اندکی است.

مقدار ME در محصول PDIR-Now برابر با $1/94$ می‌باشد و به این معنی است که محصول دارای بیش‌برآورد می‌باشد. این شاخص برای محصول PERSIANN-CCS برابر با $4/39$ بوده که نشان می‌دهد، میزان بیش‌برآورد PERSIANN-CCS بیشتر از محصول PDIR-Now است.

در محصول PDIR-Now شاخص‌های MAE و RMSE به ترتیب برابر $5/76$ و $9/38$ هستند. این دو شاخص نشان‌دهنده وجود خطای بالا در محصول PDIR-Now برای پیش‌بینی مقدار بارش در مجموعه ایستگاه‌ها هستند. مقادیر MAE و RMSE برای محصول PERSIANN-CCS نیز به ترتیب برابر $7/93$ و $12/78$ هستند، که نشان می‌دهد عملکرد محصول PDIR-Now لندگی بهتر است. نوین و همکاران^۱ (۲۰۲۰) در مقیاس روزانه و مقیاس وقایع حدی، مقادیر بهتری از شاخص‌های آماری را در مقایسه با این پژوهش بدست آوردند. ایشان در این پژوهش داده‌های خود را با داده‌های ماهواره‌ای و چندسنسوری IMERG4 و NCEP4 مورد مقایسه قرار دادند که همین موضوع باعث می‌شود عملکرد محصولات افزایش پیدا کند.

همان‌طور که مشاهده شد، در محصول PERSIANN-CCS نتایج میانگین بسیار به محصول PDIR-Now نزدیک است. تنها تفاوت موجود عملکرد نسبتاً بهتر محصول PDIR-Now در مقایسه با محصول PERSIANN-CCS است، که این موضوع با نتیجه حاصل از پژوهش نوین و همکاران^۲ (۲۰۲۰) مطابقت دارد.

در ارزیابی صائمیان و همکاران (۲۰۲۱) با رویکرد نقطه به پیکسل، محصولات PERSIANN-CCS و PDIR-Now به ترتیب دارای همبستگی $0/17$ و $0/26$ بوده و BIAS نیز به ترتیب برابر $1/58$ و $1/03$ می‌باشد، که این مقادیر با نتایج به‌دست آمده در پژوهش حاضر همخوانی دارد. مقادیر HSS (نمره مهارت هیگ) در پژوهش ایشان اما به ترتیب برابر $0/35$ و $0/53$ است. علت مقادیر بالای نمره مهارت هیگ در پژوهش صائمیان (۲۰۲۱) را می‌توان در این دانست که ایشان به‌جای بررسی وقایع خاص، تمامی روزها را در دوره آماری مورد مطالعه، بررسی کرده‌اند، همین موضوع باعث بهبود عملکرد محصولا به دلیل افزایش تعداد پیش‌بینی‌های موفق مدل شده است.

به‌طورکلی با توجه به نتایج به‌دست آمده در این پژوهش عملکرد محصولات PERSIANN-CCS و PDIR-Now برای تخمین بارش‌های سنگین مورد مطالعه در این پژوهش چندان مطلوب نبوده که با نتایج به‌دست آمده از پژوهش‌های عزیزیان و امینی (۱۳۹۹) و زنگنه و همکاران (۱۳۹۷) مبنی بر عملکرد نامناسب محصول ماهواره‌ای PERSIANN-CCS مطابقت دارد.

1 Nguyen et al.

2 Nguyen et al.,

جدول ۴- مقادیر تمامی معیارهای آماری خطا و شاخص‌های مستخرج از جدول‌های توافقی برای تمامی وقایع

بارشی محصول PDIR-Now

تاریخ	PC	BIAS	FAR	POD	HSS	R ²	ME	MAE	RMSE
۲۵ فروردین ۹۶	۰/۴۰	۴/۷۲	۰/۸۰	۰/۹۷	۰/۱۰	۰/۱۶	۹/۴۹	۹/۵۹	۱۵/۶۲
۲۶ فروردین ۹۶	۰/۴۵	۳/۰۷	۰/۶۸	۰/۹۹	۰/۱۵	۰/۰۴	۸/۹۳	۱۰/۰۹	۱۳/۴۴
۲۰ مرداد ۹۶	۰/۸۹	۱/۷۰	۰/۸۲	۰/۳۰	۰/۱۷	۰/۱۳	-۰/۱۷	۰/۵۱	۳/۰۲
۲۱ مرداد ۹۶	۰/۸۹	۲/۵۳	۰/۸۴	۰/۴۰	۰/۱۸	۰/۰۱	۰/۱۴	۰/۲۶	۱/۱۲
۲۷ اسفند ۹۷	۰/۹۵	۰/۹۸	۰/۰۲	۰/۹۶	۰/۵۰	۰/۰۶	-۵/۹۳	۸/۳۹	۱۵/۱۷
۲۸ اسفند ۹۷	۰/۵۱	۱/۲۰	۰/۶۸	۰/۳۸	-۰/۰۴	۰/۰۱	-۱/۰۰	۳/۹۹	۱۰/۱۷
۵ فروردین ۹۸	۰/۷۲	۱/۳۹	۰/۲۸	۰/۹۹	۰/۰۱	۰/۶۴	۱۴/۱۰	۱۵/۱۷	۲۴/۰۸
۶ فروردین ۹۸	۰/۸۶	۱/۱۱	۰/۱۲	۰/۹۸	۰/۰۳	۰/۳۱	-۲/۹۴	۱۲/۶۸	۱۷/۶۳
تاریخ	PC	BIAS	FAR	POD	HSS	R ²	ME	MAE	RMSE
۷ فروردین ۹۸	۰/۸۴	۱/۰۴	۰/۱۰	۰/۹۳	۰/۱۰	۰/۰۸	-۳/۳۳	۶/۸۸	۹/۴۴
۸ فروردین ۹۸	۰/۵۱	۱/۵۴	۰/۶۶	۰/۵۲	۰/۰۲	۰/۰۱	۲/۰۴	۳/۴۱	۶/۲۵
۱۱ فروردین ۹۸	۰/۶۸	۱/۴۱	۰/۳۲	۰/۹۶	۰/۱۵	۰/۲۹	۵/۹۹	۷/۱۴	۱۱/۰۱
۱۲ فروردین ۹۸	۰/۷۷	۱/۲۸	۰/۲۳	۰/۹۹	۰/۰۵	۰/۴۰	۱/۵۲	۱۱/۵۹	۱۷/۹۴
۱۳ فروردین ۹۸	۰/۷۳	۱/۳۵	۰/۲۷	۰/۹۸	۰/۱۴	۰/۰۶	۱/۸۹	۷/۸۰	۱۰/۱۳
۱۴ فروردین ۹۸	۰/۴۵	۳/۵۵	۰/۷۴	۰/۹۴	۰/۱۳	۰/۰۱	۳/۳۹	۳/۷۰	۶/۰۲
۸ خرداد ۹۸	۰/۷۶	۱/۴۸	۰/۷۲	۰/۶۸	۰/۲۷	۰/۰۵	۰/۵۷	۰/۸۲	۲/۳۲
۹ خرداد ۹۸	۰/۸۵	۱/۳۳	۰/۴۶	۰/۷۲	۰/۵۳	۰/۱۷	۰/۲۵	۰/۶۲	۱/۹۱
۱۰ خرداد ۹۸	۰/۸۷	۱/۴۵	۰/۵۱	۰/۷۰	۰/۵۰	۰/۳۸	۰/۱۱	۰/۳۲	۰/۹۷
۱۱ خرداد ۹۸	۰/۷۶	۰/۹۳	۰/۸۷	۰/۱۳	-۰/۰۱	۰/۰۰	-۰/۲۰	۰/۶۴	۲/۷۰
میانگین	۰/۷۲	۱/۸۴	۰/۵۱	۰/۷۵	۰/۱۶	۰/۱۹	۱/۹۴	۵/۷۶	۹/۳۸

جدول ۵- مقادیر تمامی معیارهای آماری خطا و شاخص‌های مقادیری و مستخرج از جدول‌های توافقی برای

تمامی وقایع بارشی محصول PERSIANN-CCS

تاریخ	PC	BIAS	FAR	POD	HSS	R ²	ME	MAE	RMSE
۲۵ فروردین ۹۶	۰/۴۴	۴/۴۸	۰/۷۸	۰/۹۷	۰/۱۳	۰/۱۰	۱۳/۱۲	۱۳/۱۳	۲۳/۵۶
۲۶ فروردین ۹۶	۰/۴۴	۳/۰۳	۰/۶۹	۰/۹۵	۰/۱۲	۰/۰۱	۱۶/۱۰	۱۷/۶۵	۲۷/۲۸
۲۰ مرداد ۹۶	۰/۹۵	۰/۱۰	۰/۵۰	۰/۰۵	۰/۰۸	۰/۵۷	-۰/۳۷	۰/۳۷	۳/۱۳
۲۱ مرداد ۹۶	۰/۹۷	۰/۱۳	۰/۰۰	۰/۱۳	۰/۲۳	۰/۰۲	-۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۷۹
۲۷ اسفند ۹۷	۰/۸۸	۰/۹۰	۰/۰۲	۰/۸۹	۰/۲۹	۰/۰۱	-۶/۳۹	۹/۸۱	۱۶/۰۵
۲۸ اسفند ۹۷	۰/۶۰	۴/۲۰	۰/۷۳	۰/۱۱	-۰/۰۵	۰/۰۱	-۱/۶۱	۳/۶۰	۱۰/۶۸
۵ فروردین ۹۸	۰/۷۲	۱/۳۸	۰/۲۸	۱/۰۰	۰/۰۱	۰/۵۵	۳۹/۲۹	۳۰/۲۴	۳۹/۳۱

تاریخ	PC	BIAS	FAR	POD	HSS	R ²	ME	MAE	RMSE
۶ فروردین ۹۸	۰/۸۸	۱/۱۳	۰/۱۲	۱/۰۰	-۰/۰۱	۰/۲۵	۳/۹۸	۱۶/۲۴	۲۱/۶۳
۷ فروردین ۹۸	۰/۷۸	۰/۹۴	۰/۱۰	۰/۸۵	۰/۱۱	۰/۰۰	-۲/۲۲	۸/۴۱	۱۱/۶۸
۸ فروردین ۹۸	۰/۵۸	۱/۰۰	۰/۶۵	۰/۳۵	۰/۰۴	۰/۰۲	۱/۲۹	۲/۶۸	۵/۸۹
۱۱ فروردین ۹۸	۰/۶۸	۱/۳۷	۰/۳۲	۰/۹۴	۰/۱۷	۰/۳۰	۵/۹۹	۷/۱۴	۱۱/۰۱
۱۲ فروردین ۹۸	۰/۷۸	۱/۲۸	۰/۲۲	۱/۰۰	۰/۰۹	۰/۴۵	۷/۵۰	۱۳/۲۷	۱۹/۴۷
۱۳ فروردین ۹۸	۰/۶۹	۱/۳۳	۰/۲۹	۰/۹۵	۰/۰۳	۰/۰۱	۴/۰۱	۹/۹۵	۱۳/۴۷
۱۴ فروردین ۹۸	۰/۵۱	۲/۹۶	۰/۷۳	۰/۸۱	۰/۱۴	۰/۰۱	۴/۴۸	۴/۸۲	۹/۳۸
۸ خرداد ۹۸	۰/۷۵	۲/۵۷	۰/۷۳	۰/۷۰	۰/۲۷	۰/۰۴	۲/۰۷	۲/۲۵	۶/۶۶
۹ خرداد ۹۸	۰/۸۲	۱/۵۳	۰/۵۲	۰/۷۳	۰/۴۷	۰/۲۳	۱/۲۳	۱/۴۴	۴/۰۷
۱۰ خرداد ۹۸	۰/۸۸	۱/۳۴	۰/۴۹	۰/۶۸	۰/۵۱	۰/۱۹	۰/۵۳	۰/۶۹	۲/۶۱
۱۱ خرداد ۹۸	۰/۷۶	۰/۸۸	۰/۸۸	۰/۱۱	-۰/۰۲	۰/۰۰	۰/۰۲	۰/۸۸	۳/۱۳
میانگین	۰/۷۳	۱/۴۹	۰/۴۵	۰/۶۸	۰/۱۵	۰/۱۶	۴/۳۹	۷/۹۳	۱۲/۷۸

۴- جمع بندی

اگرچه محصولات تخمین بارش ابزارهای بسیار مناسبی برای پیش بینی بارندگی و هشدار سیل هستند، اما قبل از استفاده از این محصولات لازم است ابتدا عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، عملکرد دو محصول PDIR-Now و PERSIANN-CCS برای خسارت‌بارترین وقایع سیل سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفت.

با توجه به نتایج به دست آمده، محصولات PDIR-Now و PERSIANN-CCS عملکرد متفاوتی در روزهای مورد بررسی از خود نشان دادند. این عملکرد از حالت‌های مطلوب تا حالت‌های فوق‌العاده ضعیف تغییر می‌کرد. نتایج به دست آمده از بررسی محصولات تخمین بارش PDIR-Now و PERSIANN-CCS نشان‌دهنده این است که عملکرد محصولات با توجه به میانگین شاخص‌های به دست آمده از جدول‌های توافقی ۲×۲ برای وقوع و یا عدم وقوع بارش در منطقه بدون در نظر گرفتن شاخص نمره مهارت بسیار بالا است، اما با دقت در شاخص نمره مهارت مشخص می‌شود که این عملکرد فقط به صورت ظاهری مناسب است. در حقیقت مقدار نمره مهارت نزدیک به صفر بیان‌گر این است که محصولات عملکرد بسیار خوبی ندارند. در واقع به دلیل اینکه همواره بخشی از کشور بدون پوشش ابر است، عملکرد این شاخص‌ها در تخمین وقوع بارش به صورت غیرواقعی بهبود پیدا می‌کند. به علاوه، ملاحظه می‌شود که در تعدادی از وقایع مورد بررسی، محصولات تخمین بارش، عملکرد بسیار ضعیفی را برای پیش بینی وقوع یا عدم وقوع بارش از خود نشان داده‌اند.

مقادیر به دست آمده از شاخص های آماری ME ، R^2 ، MAE و $RMSE$ نیز بیانگر عملکرد ضعیف این محصولات در تخمین مقادیر واقعی بارش است. در واقع با یک رویکرد کلی در مورد کشور ایران، این محصولات توانایی تخمین نزدیک به واقعیت را برای همه ایستگاه های زمینی کشور ندارند. با این حال عملکرد محصول $PDIR-Now$ از محصول $PERSIANN-CCS$ نسبتاً بهتر است؛ زیرا در این محصول از تأثیرات اقلیم بر بارش استفاده شده است. در واقع محصول $PDIR-Now$ نسخه بهبود یافته $PERSIANN-CCS$ با توجه به اقلیم مناطق مختلف است. با توجه به نتایج به دست آمده و عملکرد ضعیف محصولات مورد بررسی، پیشنهاد می شود عملکرد محصولات فوق در دوره های آماری طولانی تر مورد ارزیابی قرار گیرند، به علاوه عملکرد هر دو محصول برای سیستم های مختلف بارشی نیز بررسی شود.

کتابنامه

- اکبری، جواد؛ کاظم زاده، مجید؛ ۱۳۹۸. ارزیابی دقت توزیع مکانی بارش ماهواره $TRMM 3B43$ در اقلیم مختلف کشور ایران. *مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران*، ۱۳(۴۴)، ۷۳.
- <https://www.magiran.com/paper/1947294>
- جوان، خدیجه؛ ۱۳۹۲. ارزیابی تطبیقی داده های ماهواره ای و داده های زمینی در برآورد مقدار بارندگی در حوضه آبریز دریای ارومیه. پایان نامه دکتری دانشگاه تبریز. دانشکده جغرافیا. گروه آب و هواشناسی. اساتید راهنما دکتر بهروز ساری صراف، دکتر علی اکبر رسولی. استاد مشاور: دکتر مهدی عرفانیان.
- چاوشیان، علی؛ کتیرایی، پری سیما؛ ۱۳۹۸. ارزیابی و کاربرد انواع مجموعه داده های دیدبانی (زمینی و ماهواره ای) بارش بر روی ایران. *نشریه آب و خاک*، ۳۳(۳)، صص ۵۲۰-۵۰۱.
- <https://www.magiran.com/paper/2041188>
- خبرگزاری جمهوری اسلامی؛ ۱۳۹۸. هشدارهای هواشناسی قابلیت پیش بینی سیل را ندارند [اخبار]. بازیابی شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹، از <https://www.irna.ir/news/83327702>
- رحمتی، اکبر؛ مساح بوانی، علیرضا؛ ۱۳۹۸. ارزیابی پایگاه داده های جهانی بارش برای استفاده در مدل های فیزیکی، مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون. *مجله تحقیقات منابع آب ایران*. ۱۵(۱)، صص ۱۹۲-۱۷۸.
- <https://www.magiran.com/paper/1978598>
- زنگنه اینالو، محمدرضا؛ قهرمان، بیژن؛ فرید حسینی، علیرضا؛ ۱۳۹۷. مقایسه مقادیر مشاهداتی و اطلاعات بارش ماهواره ای $PERSIAN$ و $CMORPH$ - روش های درون یابی در مقایسه ساعتی و روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز شاپور). *مجله تحقیقات منابع آب ایران*. ۱۴(۴)، صص ۱-۱۲.
- <https://www.magiran.com/paper/1936725>
- سبحانی، بهروز؛ عالی جهان، مهدی؛ زینالی، بتول؛ ۱۳۹۵. واکاوی همدید - ماهواره ای موج بارشی سنگین استان چهارمحال و بختیاری. *نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی*. ۵(۲۰)، صص ۱۳۴-۱۰۹.
- <https://www.magiran.com/paper/1706341>

شریفی، احسان؛ ثقفیان، بهرام؛ هلد اشتایناکر، راین؛ ۱۳۹۵. بررسی کارایی جدیدترین نسل محصولات بارش ماهواره‌های با وضوح زمانی-مکانی بالا. ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران.

<https://civilica.com/doc/559219/>

شکری کوچک، سعید؛ آخوندعلی، علی محمد؛ شریفی، محمدرضا؛ ۱۳۹۹. ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های بارش ماهواره‌ای PERSIANN و PERSIANN-CDR و بررسی تأثیر ناهمواری‌ها بر آن (مطالعه موردی: حوضه آبریز حله. مجله اکو هیدرولوژی. ۷(۲)، صص ۵۲۷-۵۱۱.

<https://www.magiran.com/paper/2144274>

عزیزیان، اصغر؛ امینی، ستاره؛ ۱۳۹۹. تأثیر شرایط اقلیمی و توپوگرافیکی سطح زمین بر عملکرد محصولات بارشی خانواده PERSIANN در سطح ایران. مجله تحقیقات منابع آب ایران. ۱۶(۱)، صص ۱۰۱-۸۶.

<https://www.magiran.com/paper/2146596>

قهرمان، بیژن؛ زنگنه اینالو، محمدرضا؛ فریدحسینی، علیرضا؛ ۱۳۹۷. بررسی تطابق داده‌های بارش ماهواره‌ای TRMM اصلاح شده، با داده‌های بارش زمینی ایستگاه‌های هواشناسی حوضه‌ی آبخیز رود شاپور استان فارس. فصلنامه پژوهش‌های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). ۱۲۱، صص ۵۷-۴۳.

<https://www.magiran.com/paper/1963200>

گرجی زاده، علی؛ آخوندعلی، علی محمد؛ شهبازی، علی؛ مریدی، علی؛ ۱۳۹۸. مقایسه دو مجموعه داده بارش شبکه‌بندی شده با وضوح بالا در بالادست سد مارون در ایران. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. ۵۰(۳)، صص

<https://www.magiran.com/paper/2007634>. ۵۴۱-۵۲۷

- Alsumaiti, T. S., Hussein, K., Ghebreyesus, D. T., & Sharif, H. O., 2020. Performance of the CMORPH and GPM IMERG products over the United Arab Emirates. In *Remote Sensing* (Vol. 12, Issue 9). <https://doi.org/10.3390/RS12091426>
- Barrett, E. C., 1970. The estimation of monthly rainfall from satellite data. *Monthly weather review*, 98(4), 322-327. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1970\)098<0322:TEOMRF>2.3.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1970)098<0322:TEOMRF>2.3.CO;2)
- Hogan, R. J., & Mason, I. B., 2012. Deterministic Forecasts of Binary Events. In *Forecast Verification* (pp. 31-59). <https://doi.org/10.1002/9781119960003.ch3>
- Katiraie-Boroujerdy, P. S., Nasrollahi, N., Hsu, K. L., & Sorooshian, S., 2013. Evaluation of satellite-based precipitation estimation over Iran. *Journal of arid environments*, 97, 205-219. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2013.05.013>
- Kidd, C., 2001. Satellite rainfall climatology: A review. *International Journal of Climatology*, 21(9), 1041-1066. <https://doi.org/10.1002/joc.635>
- Laboratory, N. N. S. S., 2020. *SEVERE WEATHER 101 Flood Basics*. Retrieved March 8, 2021, from <https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/floods/>
- Masood, M., Shakir, A. S., Azhar, A. H., Nabi, G., & Habib-u-Rehman., 2020. Assessment of Real Time, Multi-Satellite Precipitation Products under Diverse Climatic and Topographic Conditions. *Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences*, 56(4), 577-591. <https://doi.org/10.1007/s13143-019-00166-1>
- Nguyen, P., Ombadi, M., Gorooh, V. A., Shearer, E. J., Sadeghi, M., Sorooshian, S., ... & Ralph, M. F., 2020. PERSIANN Dynamic Infrared-Rain Rate (PDIR-Now): A Near-Real-Time,

- Quasi-Global Satellite Precipitation Dataset. *Journal of hydrometeorology*, 21(12), 2893-2906. <https://doi.org/10.1175/JHM-D-20-0177.1>
- Saemian, P., Hosseini-Moghari, S. M., Fatehi, I., Shoarinezhad, V., Modiri, E., Tourian, M. J., ... & Sneeuw, N., 2021. Comprehensive evaluation of precipitation datasets over Iran. *Journal of Hydrology*, 603, 127054. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.127054>
- Ur Rahman, K., Shang, S., Shahid, M., & Wen, Y., 2020. An Appraisal of Dynamic Bayesian Model Averaging-based Merged Multi-Satellite Precipitation Datasets Over Complex Topography and the Diverse Climate of Pakistan. In *Remote Sensing* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.3390/rs12010010>
- Van Hoang, T., Chou, T. Y., Nguyen, N. T., Fang, Y. M., Yeh, M. L., Nguyen, Q. H., & Nguyen, X. L., 2019. A robust early warning system for preventing flash floods in mountainous area in Vietnam. In *ISPRS International Journal of Geo-Information* (Vol. 8, Issue 5). <https://doi.org/10.3390/ijgi8050228>

