



## خطر ابتلا به افسردگی پس از زایمان به روش سازارین ۲ برابر زایمان طبیعی است

پژوهشکده ابن سینا

پژوهشکی جهاددانشگاهی ابن سینا، در بخشی از این فصلنامه می‌خواهیم: "بر اساس پژوهش انجام شده توسط مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشخص گردید که بین نوع زایمان و افسردگی پس از زایمان رابطه معنی داری وجود دارد، به طوریکه خطر ابتلاء به

در آخرین شماره فصلنامه علمی، پژوهشی بازوری و نابازوری پژوهشکده فناوری‌های نوین علوم پژوهشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا عنوان شد: "افسردگی پس از زایمان به روش سازارین دو برابر زایمان طبیعی بوده است".  
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فناوری‌های نوین علوم

سزارین رابه عنوان یک عامل خطر جدی برای افسردگی پس از زایمان در نظر گرفت و توجه به نوع زایمان و مشاوره مناسب برای انتخاب روش صحیح با توجه به وضعیت مادر و نوزاد و اجتناب از انجام سزارین‌های انتخابی می‌تواند نقش موثری در کاهش افسردگی پس از زایمان و جلوگیری از صرف هزینه‌های فراوان در این زمینه ایفانمایند.

آدرس پژوهشکده ابن سینا: بزرگراه شهید چمران، اوین،

دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه.

تلفن: ۰۲۴۳۲۰۲۰

نمبر: ۰۲۴۳۲۰۲۱

Web Site : [www.avesina.ac.ir](http://www.avesina.ac.ir)

E-mail:[contact@avesina.ac.ir](mailto:contact@avesina.ac.ir)

افسردگی پس از زایمان سزارین تقریباً ۲ برابر زایمان طبیعی می‌باشد".

در ادامه مطلب به این نکته اشاره می‌گردد که دوره‌ی بعد از زایمان زمانی است که بیشترین خطر بروز اختلالات خلقي شامل اندوه، افسردگی و سایکوز وجود دارد و افسردگی پس از زایمان سندروم ترکیبی از ناخوشی‌های جسمی، روانی و تغییرات رفتاری است که بعضی از زنان، پس از تولد فرزند آن را تجربه می‌کنند.

گفتنی است، افسردگی پس از زایمان می‌تواند با کاهش فعالیت‌ها در مادر و اختلال در روابط مادر، کودک و خانواده همراه باشد و ادامه اختلال و عدم تشخیص و درمان به موقع آن منجر به تطابق غیر موثر مادر با کودک، همسر و خانواده و در نتیجه عدم توانایی انجام وظایف مادری و همسری گردد.

در خاتمه لازم به ذکر است که با توجه به اینکه افسردگی پس از زایمان به روش سزارین دو برابر زایمان طبیعی بوده است، باید

